






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.498

1.6.498




































Cor. Celsi mēmyrē Iuainalis sat. 6. lib. 2.  
— principia, atq. locos Celsi hictari paratē.

1. 6. 498

1 N. 6



Sta: Sacketij:

AI

In vehementib; malis medicamentis utendi 425.

Celsi secundus liber ab Hippocrate penè totus desumptus. 157

Bis die potius quam semel cibi et ex 17.

Concubitus rex. concupiscendus rex. promiscuus 17.

In secunda ualitudinè aduersa præsidia nō consumenda. 17.

Paulatim renutriendi 203 = famis definita 79.


1.6.498

XV 7

CELS

PH 18333







1  
6  
M98

A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B R I O C T O .

A C C E S S E R E  
In primum eiusdem, HIEREMIAE THRIVERI  
BRACHELII commentarij doctissimi:  
*In reliquos verò septem, BALDVINI RONSSEI  
GANDENSIS, Reipub. Goudanae medici*  
E N A R R A T I O N E S .



L V G D V N I B A T A V O R V M ,  
E X O F F I C I N A P L A N T I N I A N A ,  
A p u d F r a n c i s c u m R a p h e l e n g i u m .  
C L O I O . X C I I .

*N. S.*



*Hippocrati quantum debet Cos insula parua,  
Pergama tantundem docte Galene tibi.  
Sed tamen ambobus quantum sua patria debet,  
Tantum, Corneli, maxima Roma tibi.*



EX OFFICINA PLANTINIANA  
Apud Franciscum Raphelengium.  
CLO. 15. XCII.



NOBILISSIMIS,  
AMPLISSIMIS, <sup>III</sup>  
PRUDENTISSIMISQUE  
BATAVIÆ ORDINIBVS.

**S**ÆPE ego met mecum cogitare soleo, Viri Amplissimi, quî fiat vt in hac rerum omnium disciplinarumque luce, maximis erroribus tanquam nebulis densissimis antiquissimos auctores offuscatos comperiamus. Et quamquam omnibus in ore esset barbariem quæ multis iam annis in scholis viguisset, atque adeò immanissimas Gotthorum ac Longobardorum, Vandalorumque excursionem malo huic, quod aiunt, fenestram aperuisse, mihi certè id nondum satisfacere potuit, præsertim quando antiquissimi scriptores doctissimo hoc seculo omnibus in manu sint, atque inter reliquos corrupti deprauati que legantur. Altiùs igitur nonnihil huiusce rei causam indagandam

\* 2



dam censui, atque honestum quendam, ne  
dicam subrusticum pudorem, in causa com-  
peri, dum quæ apud graues auctores corruptè  
legimus, amicè interpretari, religioseque de-  
fendere malimus, quàm errati originem per-  
scrutari. Id namque, ut auctor est Plinius li-  
bro Naturalis historiæ quinto, plerumque fal-  
lacissimo experimento deprehenditur, qui di-  
gnitate indagare vera pigeat, ignorantia pu-  
dore mentiri non piget, haud alio fidei pro-  
niori lapsu, quàm ubi falsæ rei gravis auctor  
existit. Siquidem quando ea sit quorundam  
insania, ut quod semel animo conceperint,  
mordicus tueri malint (dummodo grauem  
aliquem auctorem in testimonium afferre  
possint) quàm saniori opinionì cedere, factum  
est ut dum in suam sententiam antiquorum  
scripta torquent, foedissimis nonnunquam  
lituris eosdem aspergant, contaminentque,  
quas temporum spacio, ni propicius aliquis  
intercedat deus, pro genuinis, germanisque  
recipi contingit. Quod fanè, prò dolor, in  
Celfo nostro usu venisse nimis quàm comper-  
tum habet, qui in eodem aliqua ex parte ver-  
satus est. Siquidem quum iam antè visos ut-  
cunque



cunque eiusdem libros in manus recepissē,  
ac quòd præ cæteris Hippocratis mentem ex-  
primerent, in eosdem breues enarrationes con-  
scribere mens esset, primùm, & ante omnia  
dum lecta prius attentius relego, atque cum  
Hippocratis sententiis, vt sic loquar, recoquo,  
multa occurrunt quæ ad senis illius Coi limam  
reuocanda erant, quòd mendi opinionem præ  
se ferrent: aut confitendum nobis erat, studio  
quodam in multis ab Hippocrate descivisse  
Celsum. Quod quàm sit verisimile, intelliget  
qui proœmium eiusdem in librum secundum  
De signis & communibus auxiliis legerit: si-  
quidem ibidem ingenuè fatetur, eo præsertim  
libro, sese auctoritate antiquorum virorum, &  
præcipuè Hippocratis, vti. Igitur quum non  
possemus in animum inducere eam esse multis  
locis Celsi genuinam lectionem quæ apud me  
esset, plurimos errores acceptos ferebam ex-  
emplari quod vnicum nobis erat Venetiis in  
officina Pinzana excusum: atque dum aliun-  
de alia accersò, adfertur aliud Haganoæ typis  
Ioannis Secerij cum lima Ioannis Cæsarij:  
quod sicuti ex titulo plurimum lucis allatu-  
rum videbatur, ita parum admodum, aut ni-

hil

\*

3

hil



hil contulit : nam præter breues aliquot  
 D. Cæsarij annotationes, nihil erat Pinzano  
 correctius. Quando igitur hinc nobis con-  
 staret, temporum iniuria, mutilum, hiulcum,  
 atque deprauatum esse Celsum, bonamque  
 illius partem ex Hippocrate, Galeno, Oriba-  
 sio, Dioscoride, Ægineta, atque aliis absolu-  
 sem, instandum iudico, atque quod antè re-  
 ligio erat, locos quos priùs inter legendum  
 asteriscis annotaueramus, immutare mens  
 erat, atque ad Hippocratis sententiam reuo-  
 care. Sed quum arduum hoc opus & ita dif-  
 ficile animaduernerem, vt alium virum, aliud  
 ingenium, aliasque vires deposceret, pedem  
 retrahere omnino erat animus, nisi iam antè  
 perspectum nobis fuisset, nihil tam esse du-  
 rum quod non emolliat, nihil tam arduum  
 quod non efficiat, nihil tam abstrusum  
 quod non eruat improbus assiduusque la-  
 bor. nam vt Galenus tertio De temperamen-  
 tis libro, *ἔτι δὲ τοῦ καὶ κείνο καλῶς εἰρηδοῦ  
 δοκεῖ,* *Πέτραν κοιλάνη ρανὶς ὕδατος ἐνδελεχέει:*  
 præsertim quando iugis, continuaque Hippo-  
 cratis lectio ad Celsi restitutionem satis esse  
 possit,



possit, vt omittam Galeni in Hippocratem.  
commentarios, qui non parum lucis eidem  
afferre queant. Nam hoc ingenuè fateor, me  
non solum ab Hippocrate, Galeno, Oribasio,  
atque aliis classicis auctoribus vbi res postu-  
labat, integras periodos desumpsisse, sed & à  
neotericis quibusdā: siquidem ē Ioannis Fer-  
nellij libello De arte vacuandi, multa mu-  
tuati sumus, capitibus secūdi libri De sangui-  
nis missione, de deiectione, & de cucurbitulis.  
libro autem quinto vbi simplicium quarum-  
cumque rerum ex quibus medicamenta fiunt  
facultates perscrutatur, plurima ad propo-  
situm nostrū ex Hollerij Stempiani De materia  
chirurgica libello decerpimus: Et quod de  
Fernelio, Hollerioque fatemur, de aliis idem  
quoque dictum volumus: siquidem quoties-  
cunque vsus postulabat, non piguit eorundem  
bene scripta pro nostris ascribere, quod prae-  
monendum censuimus, ne quis plagij nos in-  
cuset. Quum igitur totus in hoc sum, vt se-  
cundum Cornelij Celsi De signis & commu-  
nibus auxiliis tandem absoluerem, coeptisque  
vteunque aspiraret fortuna, me ipso iam quo-  
dammodo robustior effectus, plures longè  
quàm



quàm spes erat locos restituo, atque ita resti-  
tuo, vt sperem me nusquam in Celsum aut  
durum aut iniurium fuisse. Verùm postea-  
quam iam postremam manum operi impo-  
suissem, afferuntur nobis in eundem librum  
commentarij D. Gulielmi Pantini Tiletani,  
quos quando solum nomen Pantini omnibus  
modis absolutissimos, & doctissimos persua-  
sum redderet, animus erat nostras enarratio-  
nes suppressere ( tum quòd certò nobis con-  
staret, illum qua est eruditione, & diligentia,  
nihil intactum, nihil inexcussum relicturum;  
tum quòd puderet nostra cum illius scriptis  
conferre ) nisi aliquot nominis nostri nimis  
quàm studiosi, hortarentur, instarentque ne  
ab incepto desisterem; sed quod in reliquos po-  
steriores sex libros inceperam, tandem absol-  
uerem: nam etsi maximè perspicaci ingenio  
sit Pantinus; esse tamen nonnulla quæ illum  
subterfugiant, aliisque perspicua sint: Siqui-  
dem & ipse Pantinus post D. Doctoris Hiere-  
miæ præceptoris quondam nostri absolutissi-  
mas in primum Celsi De sanitate tuenda li-  
brum, enarrationes, alios superaddidit com-  
mentarios: & vtrisque succedens Iodocus  
Lommius



VI

Lommius Buranus tertios in eundem emisit:  
fore igitur si inceptum prosequar opus, ut non  
minus mihi debeant studiosi, quam aut Hie-  
remia, (debent autem plurimum.) aut ipsi  
Pantino. Nam si multa post fusissimas eius-  
dem in secundum librum enarrationes, à me  
sunt enodata, quæ non animaduertit ille,  
aut volens alioqui prætermisit, futura multo  
plura in reliquis sex quos ille obiter tantum  
percurrit, quæ censuram ac limam requirant.  
Ego interim mecum perpendens, quam sit  
domi mihi curta supellex, & quam sit varius,  
quam sit intricatus, neque semper pede stans  
in vno auctor, etiam si amplos satis Pinzani  
exemplaris margines annotationibus, quæ  
brevis commentarii vices supplere poterant,  
iam illeueram, meo me pede metiens operam  
recuso, quum illi eandem semper occincentes  
cantilenam urgent, nolentemque compel-  
lunt, ut coeptum opus semel ad umbilicum  
perducam, neque labores meos studiosis in-  
uideam, & auctorem qui quondam à doctis  
tantum legi poterat, quibusvis iam per me  
planum redditum euulgem. Quibus inter-  
pellationibus, Viri Nobilissimi, ac Patres  
\* \*  
Amplif-



Amplissimi, coactus quodammodo in publicum iam emitto nostras in posteriores Cornelij Celsi septem libros enarrationes: In primum etenim deinceps aliquid velle addere, aut commentari, quid sit aliud quàm θαλάττη ἐν χαράδρῃ ὕδαρ: quando tres in eundem, vt iam diximus, extent doctissimorum virorum amplissimæ enarrationes? Verùm quum magna sit hodie ingeniorum varietas, variaque sint hominum iudicia, & qui hodie aliquid in publicum emittunt, omnium subiiciantur censuris, sciens nostra tanta, taliaque non esse quæ per se maleuolorum calumnias subterfugere possint; ex veteri, & à multis vsque seculis vsurpata consuetudine hosce nostros labores sub alterius tutela & patrocinio in publicum emittere statui: & quum mecum reputo quem potissimùm deligam; vos, viri Amplissimi, statim occurritis, tum ob amplissimam auctoritatem qua præditi estis, tum ob doctrinam qua plerique vestrum excellitis; tum etiam quòd quasi iure quodam V. A. id debeatur, quum potiore vitam meam partem (elapsis iam quadraginta annis quòd Furnis municipio Flandriæ occidentalis publico stipen-



stipendio medicum agens, magistratus Gou-  
dani literis in. Hollandiam accitus sim ) hac  
transegerim, atq. operam meam non tantum  
ciuitati cui seruius impenderim, verum om-  
nibus, dum res ita postulare, qui me sibi au-  
xiliares manus allaturum putarent, praesens  
praesenti consilio adfuerim. Accipite igitur,  
Viri Amplissimi, exporrecta fronte, beneuo-  
loque animo, A. V. dicatum opus, tanquam  
meae erga A. V. obseruantiae *μνημόσυνον*: quod  
certè seu domi, seu militiae agatis, plurimum  
prodesse poterit. Siquidem si domi vitam  
tranquillam, & ab omni molestia securam,  
curisque liberam transigatis, docebit vos  
Celsus noster firmam quo ad fieri potest, con-  
seruare valetudinem: sin ea iam collapsa,  
molestior sit morbus, aut symptoma ali-  
quod, habetis ad manum explicata cuiusuis  
morbi signa, & causas, atque adeò ipsa  
tandem adscripta remedia. Verum si tur-  
bido bello impliciti, aut alio quouis modo  
faucij (quod omen auertat Deus) chirurgi  
exposcatis operam, en vobis Celsum in che-  
rurgicis exercitatissimum, & in ambiguis  
maximè expeditum. Ita vt ex hoc nostro

\*\*

2

Celso



Celso sanitatem integram & conseruare, &  
quouis modo collapsam valetudinem optimè  
resarcire possitis: quam vt firmam, stabi-  
lemque Deus opt. max. diu conseruet, vnice  
mihi in votis est. Gouda. ex Museo nostro  
Anno cId. Id. xcii.

A. V.

*addictissimus*

BALD. RONSSEVS.



VII

I. HEVRNIVS  
CLARISSIMO  
MEDICINÆ DOCTORI  
D. BALDVINO RONSSEO  
GOVDANORVM ARCHIATRO,  
AMICO SALVTEM.



OMMENTARIOS tuos ad Celsum legi:  
cum maxima animi voluptate: qui celsiora  
quædam viridaria medica quam vulgò  
solet, longèque amœniora, flosculisque vir-  
dique picturata facundia, ad vsum reuo-  
cas: Unde, te auctore, mox celsiores me-  
dicos spero, & voueo. Video enim te Latinum hunc Hippo-  
cratem ad Græcum, suum parentem, cum maxima studioso-  
rum medicarum rerum utilitate, deduxisse. Cui sanè ego tan-  
tum tribuo, vt primas ei per totam medicinam deferam, neque  
Galenum excipio, quod pace maximorum virorum dictum  
volo. Sit enim Galenus, quod omnes sani fatentur, amœnior  
ac suauior in dicendo, alliciat blandius in sententiam audito-  
rem: inductionibus, insinuationibus, demonstrationibusque  
nos ita circumscribat, vt nos sinamus quicquid velit persua-  
deri. Attamen Hippocrates pressa illa breuitate, oraculisque  
infallibilibus, tanquam cogentissimis rationibus, cunctos  
adigit manus dare veritati. Nam usu rationeque doctus,  
cominùs rem aggreditur, & abiectis Samnitum hastis, quibus  
ad voluptatem magis gladiatores quàm ad pugnam utebantur,  
\* \* 3 signis



signis tecmeriis, id est, fulgentibus veritatis armis, quibus  
rem ipsam aperiat, & si pugnandum, quibus mox iugulum  
petat, in hominū animos grassatur, & volentes nolentes suam  
in sententiam rapit. Ego, doctissime Ronssee, in ea senten-  
tia sum, optimos & significantibus verbis splendentes in qua-  
que arte scriptores legendos esse. qui, etiamsi nitore dicendi  
ornamenti nihil remediis adferant, certè dignitatem in edelis  
non detrahunt. Fateor, eloquentia non medicos, attamen  
maiores, in facienda medicina, ut appareant medici, facit.  
Illud non dissimulabo, ea quæ acutis & grauibus modulata  
sententiis animo immittimus, animos nostros in sui quasi  
characterem transferre, ac longè fidelius menti inherere.  
Viden ut Platonem legentes heroicam quandam amplitudi-  
nem hauriant, ac afflatis propè diuino concitentur? qui fre-  
quentes Isocratem voluunt, ut picturatam comptamque  
orationem effingant? qui Demosthenem voluunt, ut tubam  
quandam classicam animo fingant, ut paulò minùs ad arma  
profiliant, vulneraque inferre & accipere honestum pu-  
tent? quid dicam de his qui apud Ciceronem sunt? qualem  
illi ducunt animi habitum? qui clamores? qui tumultus? qui  
luctus? quæ deplorationes animis? Si itaque tantum po-  
test auctorum lectio; profectò optimus in quaque arte pro-  
ponendus erit. Si de medicis quis quærat? Unicus Celsus  
medicis Latinis præferatur: qui pomæria Romane eloquen-  
tiæ eò protulit, ut Medicina suauissimo ore eloquentiæ iam  
sefe cunctis cultioribus ingenis meritò commendet. Quàm  
preste ubi lubet ille progreditur! quàm luculenter causas  
morborum enarrat! certè rem planè admirandam præstitit,  
ut quum muta hæc nata ars sit, minimeque eloquentiæ capax,  
is tamen tanto splendore eam exornauit, ut non aliunde liben-  
tius



IX

tius eloquentiae medica rationem mutueris. Et quota hac portio innumerabilium laudum, quas facundus hic medicus promeruit? Velim sane omnes intelligant, ei qui in gloriam literatam surget, & sermonis decore opus esse: quo ablegato ac reiecto, non aliter fraudabitur, quam si oneraria nauis pacato in mari, remittentibus ventis, renitentibus ac inhibentibus nautis, fluctuet tantum, neque promoveat, portus optatos sibi polliceatur. Nec tamen ego hoc dico, quod ceteros medicina scriptores in ordinem redigam, aut suo honore fraudatos velim. absit à me hic furor, ut Celsum cunctis praeferam. An ego Dictatorem medicinae Hippocratem non suspiciam, & cunctis praeferam? qui eo scripsit animi acumine, ut recte dixerim in eo fulgere verborum pressam proprietatem, sententiarum concisam subtilitatem, sermonis venerandam antiquitatem, artificij commendabilem dignitatem: cuius tanta fuit benignitas, ut nihil sciuerit quod nos nescire voluerit, tanta autem solertia & sapientia, ut nemo post eum sciuerit, quod ipse ignorauerit. Quem, tanquam summum Medicinae praeceptorem publice in hac academia vnicumque, interpretor & enarro. Quid dicam Galezum? quem cunctis panè pretulerim, quo certè nemo mirificas illas naturae opes feliciore penicillo expressit, nemo suauius, nemo polydada rerum historia iucundius. At hoc dico, Celsum imitandum, Hippocratis imitatore, quod eleganter Hippocrates Latine loquatur. nam, ut verum fatear, eius potius latinitatem amplector, quam Medicinae scientiam, ubi ab Hippocrate abit. Fatetur ipse se in multis Asclepiadem sequutum esse. Prudentem itaque lectorem postulo ad Celsum, hoc est, qui Hippocratica à methodicis discernat.



cernat. Quare meritò tibi, Clariss. Ronssée, gratias debent omnes; qui indigitas ex quibus sedibus hac translata commigrarint in Latinam ditionem. quid ex Æsculapidum gente enatum, quid aliunde scriptis suis intulerit auctor: quo sanè nihil felicius ad commodam lectionem huius auctoris excogitari potuit. Vale, ac me ama. Ex hoc lyceō Batauiensi Leida. M. D. XCI. Die XVI. Iulij.

Tuus I. Heurnius.

BAL-



BALDVINVS RONSSEVS X  
LECTORI.

**P**OSTEA QUAM iam omnino staret  
sententia, candide lector, quæ in Cor-  
nelij Celsi libros De re medica com-  
mentatus essem, in publicum emittere,  
& ἀνέφαλον prorsus videretur opus,  
quòd primum quem De sanitate tuen-  
da conscripsit, intactum reliquisssem, quòd in eun-  
dem extarent D. Hieremiæ, Pantini, & Lom-  
mij Burani commentarij, non videbatur incon-  
sultum, si vnum aliquem prædictorum com-  
mentariorum nostris præfigi curarem enarratio-  
nibus, vt omni ex parte absolutum esset opus. Igi-  
tur quum mecum delibero cuiusnam potissi-  
mum deligam, vicit ea opinio, quæ D. Hiere-  
miæ Thriueri Brachelij quondam præceptoris  
mei doctissimi, & de re medica optimè meriti,  
adscribendas annotationes dictitaret: idque eo  
potissimum, quòd (sicuti fuit homo à natura pla-  
nè philosophus) inter reliquos (absit verbo in-  
uidia) magis philosophici sint, atque adeò ex in-  
timis medicinæ arcanis deprompti. Nobis por-  
rò in nostris enarrationibus id studio fuit, vt lo-  
cum loco ex Hippocrate redderemus, atque id  
si non vbique concederetur, saltem ad Græco-  
rum Hippocrate posteriorum censuram reuoca-  
remus. hæc enim vera mihi videbatur com-  
mentandi

\*\*\*

mentandi



mentandi ratio, idque eò potissimum quòd di-  
cat se auctoritate antiquissimorum virorum, &  
præsertim Hippocratis, vti. Quanquam & in id  
quoque incubuerim, vt si quando obscurior  
esset lectio, eandem enarrationibus planiorem  
reddiderim. Tu interim, amice lector, nostris  
hisce fruire ac vtere laboribus.

IN BALD.



IN BALD. RONSSEI

XI

*Gandensis*

CORNELIVM CELSVM

Epigramma

AD LECTOREM.

**R**ONSSEVS nuper Musis & Apolline dextro  
VENATVM melicè composuit MEDICVM,  
Ad Flacci genium permiscens vtile dulci:  
Nomine quo punctum quamlibet omne tulit.  
At modò dum CELSI scriptis adiungit honorem,  
Et face perplexis dum rutilante præt,  
Maior se, atque adeò CELSO propè celsior ipso,  
Latè conspicuum tollit in astra caput.  
Quæ patria huic? dices. Vel quis nunc degit in oris?  
GANDA dedit luci, GAVDA Batàua tenet.  
Felicem ô patriam, felicem hoc hospite Gaudam!  
Quàm vellem posset dicere LEYDA sum!  
Gymnasij auget famam ille decusque Batàui,  
Paonia illustrans Orgia voce, libris.

Bon. Vulcanij.

\*\*\*

2

DE



DE C. V.  
BALDVINI RONSSEI

IN  
CORNELIVM CELSVM

ENARRATIONIBVS

*Carmen.*

**D**EBES Ronſſeo tantum doctiſſime Celſe,  
Quantum æger medico cuius ab arte valet.  
Hic tibi reſtituit quod longior abſtulit ætas,  
Integer vt poſthac tempora plura feras.  
Mancuſenim mutiluſq. diu membra ægra trahebas,  
Huius ope incedis debilitate carens.  
Ergo cherurgis quod conſers, quodque medendi  
Peritiſ, Ronſſei id ſedula lima tibi.

*Zibrandus Dominicus, legum apud  
Duacenſes profeſſor.*

IN BAL-

DE



IN BALDVINI RONSSEI

NOVOS IN CELSVM

Commentarios.

**E**CQVID apud Latios scriptores doctius extat  
Quam Celsus medica primus in arte dedit?  
Cuius scripta tamen multis obscura videntur,  
Quod crassis mendis illa referta iacent.  
Sed quo cheirurgis placeat, doctis que probetur,  
Ronssei lima cuncta novata vides.  
Qui dedit obscuris lumen, reliquisque nitorem,  
Qui refecat falsum, restituens mutila.  
Vulnera qui veteri putredine fada repurgans  
Abstulit, & mendas, difficilesque locos.  
Quare isthunc emito, curandi vulneris artem  
Qui petis, aut medicus qui cupis esse bonus:  
Atque vide quantos impenderit ille labores  
Celfo illustrando; tum quoque gratus eris.

Henricus Iunius Goudanus.

\*\*\*

IN



IN NOVVM CELSVM

D. BALDVINI RONSSEI

*Gandensis Gaudanorum  
archiatri.*

**E**XESTE quotquot inuidentiæ sacro  
Caletis igne, iudices  
Amore Græciæ inuidi, ite Græculi,  
Exosculamini inuicem,  
Medendi arte qui negatis vspiam  
Vigere, & esse nobilem,  
Quem non vetusta protulere Pergama,  
Coi senis vel insula,  
Athenæ, Amidos, Ægina, & Quiritibus  
Boni relinquitis nihil  
In arte quæ omnibus sacratior cluit  
Patre edita Æsculapio.  
Vobis nihil salis, parumque pectoris  
Et fibra planè cornea est.  
Negatis? en vobis vel inuidentibus  
Viros in arte nobiles  
Quiritium orbe fusos, & perennibus  
Famæ decoros præmiis.  
Scribonius, Celsusque, & ipse Plinius,  
Qui vno Latiam volumine,  
Et Græciam conclusit, atque Cælius  
Aurelianus nomine,  
Marcellus ille, Priscianus, & quidem  
Hos CELSVS inter emicans,

Vt Phœ-



XIII

Vt Phœbus orbe splendidum fundens iubar  
Inter minora sidera:  
Cui pectus ipse præses Æsculapius,  
Suadæ rigauit nectare:  
Qui nunc vel ipsis inuidendus Gratiis  
Dias in oras luminis  
Prodit, nitens, venustus, elegans, tuo  
Labore docte Ronssee.  
O qualis hoc splendor, decor volumine!  
Quàm gratiosa gratia  
Diffusa semet explicat sententia,  
Prius remota & abdita!  
Nitore plena spirant omnia en tibi,  
Vernant rosæ hæc, & lilia,  
Nouus color, noua omnia, & Celsus nouus:  
Quem promus ecce Ronsseus  
In arte Apollinari haut infimus, tibi  
Donat, beatque munere,  
Quo magis optari haut queat, vel inuido, &  
Furente Momo iudice.  
Cape ergo lector candidi hoc munus viri  
Fauente natum Apolline,  
Cui triga Gratiarum abunde gratiam  
Et nectar infudit merum,  
Eique partus vt subinde edat nouos  
Æuum precare Nestoris.

*Gualterus Verdoefius Medic.*

ELEN-



# ELENCHVS AVCTORVM,

*quorum auctoritatibus auctor vtitur.*

Abenzoar	Ianus Cornarius
Aëtius	Iacobus Syluius
Albucas	Iacobus Holerius
Alexander Aphrodiseus	Ioannes Fernelius
Alexander Trallianus	Ioannes Cafarius
Alexander Benedictus	Ioannes Manardus
Aliabas	Ioannes Morisotus
Alexander Pedemontanus	Ioannes Guinterius Ander.
Andreas Martheolus	Iosephus.
Andreas Vesalius	Leonarthus Fuchsius.
Apitius	Martialis
Apuleius	Matthias Cornax
Aristoteles	Mefue
Actuarius	Michael Sauanarola.
Asclepiades	Nicolaus Massa.
Athenæus	Oribasius.
Auicennas.	Palladius
Carolus Stephanus	Paulus Aegineta
Cato	Philothæus
Cassius	Philon Iudæus
Cælius Methodicus	Plinius
Columella.	Psellus
Dion	Ptolemæus.
Dioscorides.	Q. Serenus Sammonicus.
Erasistratus.	Rembertus Dodonæus
Fabianus	Rhazes.
Franciscus Messarius.	Scribonius Largus
Galenus	Simeon Sethi
Gualterus Ryffius	Suidas.
Guilielmus Pantinus.	Theophilus
Hadrianus Iunius	Theodorus Priscianus
Herodotus	Theophrastus
Heraclides	Varro
Hesichius	Vidus Vidius
Hippocrates	Vitruuius.
Hieremias Thriuerus	
Horatius.	



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R P R I M V S,

Ab HIEREMIA DRIVERO BRACHELIO *medico,*  
*Commentarius illustratus.*

**V** T ALIMENTA sanis corporibus Agri-  
cultura, sic sanitatem ægris Medicina pro-  
mittit. Hæc quidem nusquam non est.  
Siquidem etiã imperitissimę gentes her-  
bas, aliaque prompta in auxilium vulne-  
rum, morborumque nouerunt. Verun-  
tamen apud Græcos aliquanto magis, quã in cæteris natio-  
nibus excolta est: ac ne apud hos quidem à prima origine, sed  
paucis ante nos seculis, utpote cùm vetustissimus auctor Æs-  
culapius celebreretur. Qui quoniam adhuc rudem & vulga-  
rem hanc scientiam paulo subtiliùs excoluit, in deorum nu-  
merum receptus est. Huius deinde duo filij Podalyrius &  
Machaon bello Troiano ducem Agamemnonem secuti, non  
mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt. Quos  
tamen Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus  
morborum aliquid attulisse auxilij, sed vulneribus tantum-  
modo ferro, & medicamentis mederi solitos esse proposuit.  
Ex quo apparet, has partes medicinæ solas ab his esse tentatas,  
casque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest,  
morbos, tum ad iram deorum immortalium relatos esse, &  
ab iisdem opem posci solitam. Verique simile est, inter non-  
nulla auxilia aduersæ valetudinis plerumque tamen eam bo-  
nam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque  
A luxu-



\* tentarāt. luxuria \* vitiant. Siquidem hæc duo, corpora prius in Græcia, deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim apud Græcos, neque apud alias gentes  
 \* nobis necessaria, vix aliquos ex \* bonis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos (de quibus retuli) nonnulli clari viri medicinam exercuerunt, donec maiore studio litterarum  
*Disciplina corpori inimica.* disciplina agitari cœpit, quæ ut animo præcipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi scientia, sapientiæ pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit. Scilicet his hanc maximè requirentibus, qui corporum \* sanorum  
 \* quieta robora \* inquieta cogitatione, nocturnaque vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiæ professoribus, peritos eius fuisse accipimus. Clarissimos verò ex his Pythagoram & Empedoclem, & Democritum. Huius autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis ab studio sapientiæ disciplinam hanc separavit, vir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiam in diuersas curandi vias processerint. Iisdemque temporibus, in tres parteis medicina diducta est, ut vna esset quæ victu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primam *διατητικὴν*, secundam *φαρμακευτικὴν*, tertiam *χειρουργικὴν*, Græci nominauerunt. Eius autem, quæ victu morbos curat, longè clarissimi auctores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoque naturæ sibi cognitionem vindicauerunt, tanquam sine ea trunca & debilis medicina esset. post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus, in usu tantum & experimentis eam posuit. Quem Apollonius & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & aliqui non mediocres viri secuti, ex ipsa professione, se Empiricos appellauerunt. Sic in duas parteis ea quoque quæ victu curat, medicina diuisa est, aliis rationalem artem, aliis usum tantum sibi vendicantibus, nullo verò quicquam post eos, qui suprâ comprehensi



prehenſi ſunt, agitante niſi quod acceperat: donec Aſclepiades medendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius ſucceſſoribus Themifon nuper ipſe quoque quædam in ſenectute deflexit. Et per hos quidem maximè viros ſalutaris iſta nobis profeſſio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus, vt difficillima, ſic etiam clariffima eſt ea, quæ morbis medetur, ante omnia de hac dicendum eſt. Et quia prima in ea diſſenſio eſt, quòd alij ſibi experimentorum tantummodo notitiam neceſſariam eſſe contendunt, alij niſi corporum rerumque ratione comperta, non ſatis potentem uſum eſſe proponunt: indicandum eſt, quæ maximè ex vtraque parte dicantur, quo faciliùs noſtra quoque opinio interponi poſſit. Igitur hi, qui rationalem medicinam profitemur, hæc neceſſaria eſſe proponunt, Abditarum & morbos continentium cauſſarum notitiam, deinde Euidentium, poſt hæc etiam Naturalium actionum, nouiſſimè partium Interiorum. Abditas cauſſas vocant, in quibus requiritur, ex quibus principiis noſtra corpora ſint, quid ſecundam, quid aduerſam valetudinem faciat. Neque enim credunt poſſe eum ſcire, quomodo morbos curare conueniat, qui vnde hi ſint, ignoret. Neque eſſe dubium, quin alia curatione opus ſit, ſi ex quattuor principiis, vel ſuperans aliquid, vel deficiens aduerſam valetudinem creat, vt quidam ex ſapientix profeſſoribus dixerunt, alia, ſi in humidis omne vitium eſt, vt Herophilo viſum eſt: alia, ſi in ſpiritu, vt Hippocrati: alia, ſi ſanguis in eas \*venas, quæ ſpiritu accommodatæ ſunt, transfunditur, & inflammationem, quam Græci φλεγμονή nominant, excitat, eaque inflammatio, talem motum efficit, qualis in febre eſt, vt Eraſiſtrato placuit: alia, ſi manantia corpuscula, per inuiſibila foramina ſubſiſtendo, iter claudunt, vt Aſclepiades contendit. Eum verò rectè curaturum, quem prima origo cauſſæ non feſellerit. Neque verò inficiantur, experimenta quoque eſſe neceſſaria. Sed ne ad hæc quidem aditum fieri potuiſſe, niſi ab aliqua ratione contendunt. Non enim quidlibet antiquiores viros ægris inculcaſſe: ſed cogitaſſe, quid maximè conueniret, & id uſu exploratſe, quod

\*arterias,



\* didicif-  
sent.  
\* an initia  
pleraque

antè coniectura aliqua \*duxissent. Neque interesse, \*an nunc iam pleraque explorata sint, si à consilio tamen coeperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sæpe verò etiam noua incidere genera morborum, in quibus nihil adhuc vsus ostenderit. Et ideo necessarium sit animadvertere, vnde ea coeperint: sine quo nemo mortalium reperire possit, cur hoc, quàm illo potius vtatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas causas persequuntur. Euidentes verò has appellant, in quibus quærunt initium morbi calor attulerit, an frigus: fames, an satietas: & quæ similia sunt. Occursurum enim vitio dicunt eum, qui originem non ignorarit. Naturales verò corporis actiones appellant, per quas spiritum trahimus, & emittimus cibum, potionemque & assumimus, & concoquimus. Itemque per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venæ nostræ modò submittant se, modò attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit. Sine quorum notitia neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis \* intra hæc nascentibus posse. Ex quibus \* quàm maximè pertinere ad rem concoctio videtur. \* Huic potissimum insistent, & duce alij Erasistrato, atteri cibum in ventre contendunt: alij Plistonico, Praxagoræ discipulo, putrescere: alij credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis æmuli, qui omnia ista vana & superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiam (sicut assumpta est) in corpus omne diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant. Illud verò conuenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc: \* aliud, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quærendum esse, qui facillimè teri possit. Si putrescit, eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum qui maximè calorem \* moueat. At nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur. Ea verò sumenda quæ maximè manent, qualia assumpta sunt. Eademque ratione cum spiritus grauis est, cum somnus, aut vigilia vrgēt, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa qualiter eueniant perceperit. Præter hæc eum in interioribus partibus & dolores, & morborum varia genera

\* intra  
\* quia  
quam in.  
\*, huic

\* alium,

\* foueat.



genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quæ ipse ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari: longeque optimè fecisse Herophilum, & Erasistratum, qui nocentes homines à regibus ex carcere acceptos, viuos inciderint, considerantque etiam spiritu remanente, ea quæ natura antè clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laxitatem, contactum: processus deinde singulorum, & recessus: & siue quid inseritur alteri, siue quid partem alterius in se recipit. Neque enim cum dolor intus incidit, scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque viscus, intestinumve sit, non cognouerit. Neque curari id quod ægrum est posse, ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum per vulnus alicuius viscera patefacta sunt, eum qui sanæ cuiusquam colorem partis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corruptis, aptiusque extrinsecus imponi remedia, compertis interiorum & sedibus & figuris, cognitaque eorum magnitudine: similesque omnia, quæ \* posita sunt, rationes habere. Neque esse crudele (sicut plerique proponunt) hominum nocentium, & horum quoque paucorum suppliciis, remedia populis innocentibus seculorum omnium quæri. Contrà, hi qui se Empiricos ab experientia nominant, euidentes quidem causas, vt necessarias amplectuntur: obscurarum verò causarum, & naturalium actionum quæstionem ideo superuacuum esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura sit. Non posse verò comprehendere, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re, neque inter sapientiæ professores, neque inter ipsos medicos conueniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quàm Herophilo? Cur huic potius, quàm Asclepiadi? Si rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabiles: si curationes, ab omnibus his ægros perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputationi, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiæ studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret: nunc

*Per lauerem, & contactum, aspectum, & ritatem intelligit, & quod illi est contrarium.*

*\*intus pos.*



illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorum genera medicinæ, & aliud opus esse Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ facerent ubique, remedia quoque ubique eadem esse \*debuissent. Sæpe etiam causas apparere, vtputa lippitudinis, vulneris, neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subiiciat euidens causæ, multominus eam posse subiicere, quæ in dubio est. Cum igitur illa incerta, incomprehensibilisque sit, à certis potius, & exploratis petendum esse præsidium, id est his, quæ experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. At nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere: eò quoque disci, quod qui diuersa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque à naturalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant, sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Ægrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter auiditatem primis diebus, protinus cibum assumptisse, alios propter fastidium abstinuisse, leuaturnque magis eorum morbum esse, qui abstinerant: itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulò ante eam, alios post remissionem eius, optimè deinde his cessasse, qui post finem febris id fecerint. Eademque ratione, alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo, grauiorisque eos factos, qui se impleverint. Hæc, similiaque, cum quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerumque melius responderent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciofa discernentem à salutaribus. Repertis deinde iam medicinæ remediis, homines de rationibus eorum differere cœpisse; nec post rationem medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quæsitam. \*Requirere etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem,

\*debuisset.

\*Requiratur



Si idem, superuacua esse: Si aliud, esse contrariam: Primò tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc verò iam explorata esse, neque vlla aut noua genera morborum reperiri, aut nouam desiderari medicinam. Quòd si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed cum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentaturumque remedia similia illis quæ vicino malo sæpe succurrerint, & per eius similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere consilio medicum non egere, & irrationale animal hanc artem posse præstare: sed has latentium rerum coniecturas ad rem non pertinere: quia non interfit, quid morbum faciat, sed quid tollat. Neque ad rem \*pertineat, quomodo, sed quid \*pertinere, \*incidat, siue de illa: & siue concoctio sit illa, siue tantum digestio. Neque quærendum esse quomodo spiremus: sed quid grauem, tardumque spiritum expediat. Neque quid venas moueat, sed quid quæque motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis, & in omnibus eiusmodi cogitationibus in vtranque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere, morbos autem non eloquentia, sed remediis curari. Quæ si quis elinguis, vsu \*discreta bene no- \*discretus rit, hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quàm si sine vsu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, superuacua esse tantummodo. Id verò quod restat, etiam crudele, viuorum hominum aluum, atque præcordia incidi, & salutis humanæ præsidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia quærantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, læuorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia non esse talia inciso corpore, qualia integro fuerint: quia cum corporibus inuiolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, \*mille aliis mediocribus affectibus, sæpe muten- \*milleque- tur: multo magis verisimile est, interiora, quibus maior molities, lux ipsa noua sit, sub grauissimis vulneribus, & ipsa trucidatione



\* Nam ne  
vter.

cidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, quàm quale  
quidque viuo homine est, tale existimare esse moriente, imò  
iam mortuo. \* Nam vterum quidem, quì minus ad rem  
pertineat, spirante homine posse diduci? Simul atque verò  
ferrum ad præcordia accessit, & discissum transuersum se-  
ptum est, quod membrana quadam superiores partes ab in-  
ferioribus diducit (*δισπαραγμῶ* Græci vocant) hominem pro-  
tinus animam amittere. Ita demum mortui præcordia, &  
viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod  
necesse sit tale esse, quale mortui sit, nō quale viui fuit. Itaq.  
consequi medicum, vt hominem crudeliter iugulet: non vt  
sciat qualia viui viscera habeamus. Si quid tamen sit, quod  
adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id sæpe casum  
offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena,  
vel militem in acie, vel viatorem à latronibus exceptum, sic  
vulnerari, vt eius interior aliqua pars aperiatur, & in alio \* alia  
fita, ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque co-  
gnoscerent prudentem medicum, non eadem, sed sanitatem  
molientem, idque per misericordiam discere, quod alij dira  
crudelitate cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem la-  
cerationem necessariam esse. Quæ etsi non crudelis, tamen  
fœda sit, cùm aliter pleraque in mortuis se habeant. Quan-  
tum verò in viuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cùm  
hæc per multa volumina, perque magnæ contentionis dispu-  
tationes à medicis sæpe tractata sint, atque tractentur, subii-  
ciendum est quæ proxima vero videri possint. Ea neque ad-  
dicta alterutri opinioni sunt, neque ab vtraque nimium ab-  
horrentia, media quodammodo inter diuersas sententias.  
Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet, sine  
ambitione verum scrutantibus, vt in hac ipsa re. Nam quæ  
demum causæ vel secundam valetudinem præstent, vel mor-  
bos excitent: quomodo spiritus, aut cibus, vel \* detrahatur,  
vel digeratur, ne sapientiæ quidem professores scientia com-  
prehendunt, sed coniectura persequuntur. Cuius autem rei  
non est certa notitia, eius opinio certum reperire remedium  
non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil  
plus

\* alia: ita  
sed.

\* defera-  
tur, al.  
distraba-  
tur.



plus conferre, quàm experientiam. Quancquàm igitur multa sint ad ipsas artes propriè non pertinentia, tamen eas adiuuat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ rerum contemplatio, \* quamuis non faciat medicum aptiorem, tamen medicinæ reddit perfectum. Verique simile est, & Hippocratem, & Erasistratum, & quicumque alij non contenti febres & vlcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideò quidem medicos fuisse, verum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione verò opus est ipsi medicinæ, etsi non \* inter obscuras causas, \* neque inter naturales actiones, tamen sæpe. \* Est enim hæc ars coniecturalis: neque respondet ei plerumque non solum coniectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifestè falsum est: cum ætate nostra quædam ex naturalibus partibus carne prolapsa, & \* arente, intra paucas horas expirauerit: sic vt nobilissimi medici, neque genus mali, neque remedium inuenerint. Quos ego nihil ideo tentasse iudico, quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua voluerit: ne occidisse, nisi seruasset, videretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali verecundia, & fortasse responsurum fuisse id, quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinæ genus neque semper similitudo aliquid confert, etsi quando confert, tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera, & morborum, & remedium cogitare, quo potissimum medicamento sit vtendum. Cum igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inueniat, quod non vtique fortasse, sed sæpius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum quoque consilium, non à rebus latentibus (istæ enim dubiæ, & incertæ sunt) sed ab his quæ explorari possunt, id est euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi, vini quæ abundantia, an intemperantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet, quæ sit ægri natura, humidum magis, an magis siccum corpus eius sit: validi nerui, an infirmi: fre-

\* *Alias:*  
quamuis  
non faciat  
medicum:  
aptiorem  
tamen me-  
dicina red-  
dit, atque  
perfectum.  
\* *semper*  
inter  
\* *atque*

*Caro ex*  
*naturali-*  
*bui pro-*  
*lapsa,*  
\* *hærente,*

B

mi: fre-



mi: frequens aduersa valetudo, an rara: eaque cum est, vehemens esse soleat, an levis: brevis, an longa. Quod is vitæ genus sit secutus, laboriosum, an quietum: cum luxu, an cum frugalitate. Ex his enim, similibusque sæpe curandi noua ratio ducenda est. Quamuis ne hæc quidem sic præterire debent, quasi nullam controuersiam recipiant. Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos dixit, quoniam & alij, & iidem aliàs post ista non febricitarent: & quidam medici seculi nostri sub auctore (vt ipsi videri volunt) Themisone contendunt, nullius causæ notitiam quicquam ad curationes pertinere, satisque esse quædam communia morborum intueri. Siquidem horum tria genera esse, vnum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modò parum excernere ægros, modò nimium: modò alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modò acuta esse, modò longa: & modò incrementum, modò consistere, modò minui \* consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profluuiolaborat, continendum: si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo: & aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis, aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obseruationem medicinam esse; quam ita finiunt, vt quasi viam quandam, quam *πρόδοξος* Græci nominant, eorumque quæ in morbis communia sunt, contemplatricem esse \* contendunt. ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari volunt, cum ab illis eo nomine dissentiant, quod in coniectura rerum latentium \* volunt esse medicinam ab his, eò quod parum artis esse in obseruatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum ipsa euidencia eius opinioni repugnat, quia raro, nisi post horum aliquid morbus venit. Deinde non sequitur, vt quod alium non afficit, aut eundem aliàs, id ne alteri quidem, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quædam subesse corpori, vel ex infirmitate eius, vel ex aliquo affectu, quæ vel in alio non sunt, vel in hoc aliàs non fuerunt, eaque per se non tanta \* vi concitant morbum,

\* consue-  
uisse.

\* contem-  
dant.

\* volunt

\* vt comi-  
tentur



bum, tamen obnoxium magis aliis iniuriis corpus \* efficiunt. \* efficiant.  
 Quòd si contemplationem rerum naturæ ( quam temere  
 medici sibi vendicant ) satis comprehendisset, etiam illud  
 scisset, nihil omnino ob vnam causam fieri, sed id pro causa  
 apprehendi, quod contulisse plurimum \* videtur. Potest au- \* videatur.  
 tem id dum solum est, non mouere, quod iunctum aliis ma-  
 ximè mouet. Accedit ad hæc, quòd ne ipse quidem Eras-  
 stratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit,  
 idque nimis repleto corpore incidere reperit, cur ex duobus  
 æquè repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo  
 vacarit ( quod quotidie fieri apparet ) non discreuerit. Ex quo  
 dici potest, vt vera sit illa transfusio, tamen illam non per se  
 ( cùm plenum corpus est ) fieri: sed cùm horum aliquid ac-  
 cesserit. Themisonis verò æmuli, si perpetua quæ promittunt  
 habent, magis etiam quàm vlli rationales sunt. Neque enim  
 si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius probat, protinus  
 alio nouo nomine artis indiget: si modò, quod primum est,  
 non memoriæ soli, sed rationi quoque insistit. Si, quod vero  
 propius est, vix vlla perpetua præcepta medicinalis ars recipit:  
 idem sunt quod ij, quos experimenta sola sustinent. Eo ma-  
 gis, quoniam si compresserit aliquem morbus, \* an fuderit,  
 quilibet etiam imperitissimus videt. Quid autem compres-  
 sum corpus resoluat, quid solutum teneat, si à ratione tractum  
 est, rationalis est medicus. Si ( vt ei, qui se rationalem negat,  
 confiteri necesse est ) ab experientia, Empiricus est. Ita apud  
 eum morbi cognitio extra artem, medicina intra vsum est.  
 Neque adiectum quicquam Empiricorum professioni, sed  
 demptum est: quoniam illi multa circumspiciunt, hi tantum  
 facillima, & non plus quàm vulgaria. Nam & ij qui pecori-  
 bus ac iumentis medentur, cùm propria cuiusque ex multis  
 animalibus nosse non possint, communibus tantum modo in-  
 sistunt. Et exteræ gentes, cùm subtilem medicinæ rationem  
 non nouerint, communia tantum vident. Et qui amplè vale-  
 tudinarios nutriunt ( quia singulis summa cura consulere non  
 sustinent ) ad communia ista confugiunt. Neque Hercules  
 istud, & antiqui medici nescierunt, sed his contenti non fue-  
 runt.

*Hinc me-  
dicina, ars  
interpolis  
à Plinio di-  
cta est.*

\* aut



runt. Ergo etiam vetustissimus auctor Hippocrates dixit, mederi oportere & communia, & propria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem consistere vlllo modo possunt. Siquidem & compressorum & fluentium morborum genera diuersa sunt, faciliusque id in his quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. Atque in partibus quoque humor erumpit, ut in oculos auresque. Quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ira protinus in his à cōmuni fluentis morbi contemplatione, ad propriam medicinam descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est: quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus opitulantur. Siquidem certæ quædam res sunt, quæ in pluribus ventrem aut astringunt, aut resoluunt. Inveniuntur tamen, in quibus aliter atque in cæteris, idem eueniat. In his ergo communium inspectio cōtraria est, priorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum soluit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius febricitanti cuidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cœpisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causa, quæ antè præcesserat. Estque etiam proprium aliquid & loci & temporis, istis quoque auctoribus, qui cum disputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt, ut grauius aut locis aut temporibus, magis vitetur frigus, æstus, satietas, labor, libido, magisque ut conquiescat iisdem aut locis, aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit, ac neque vomitu stomachum, neque purgatione aluum sollicitet. Quæ vera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt, nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod cælum, quod tempus anni sit, ægris

verò



verò non est. Quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quinetiam morborum in iisdem hominibus aliæ atque aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis sæpe restituitur. Plurimaque in dando cibo discrimina reperiuntur, ex quibus contentus vno ero. Nam famem facilius fert adolescens, quàm puer: facilius \* in denso cælo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm æstate: facilius vno cibo, quàm prandio quoque assuetus: facilius in exercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in ediam tolerat. Ob

\* cōiicit e.

quæ \* competit eum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere: eumque qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, vtiliorem tamen medicum esse amicū quàm extraneum. Igitur, ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem putō medicinam esse debere, instrui verò ab evidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem viūorum corpora, & crudele, & superuacuum est: mortuorum corpora discantibus necessarium. Nam positum, & ordinem nosse debent: quæ cadauera melius, quàm viuis, & vulneratus homo repræsentant. Sed & cætera, quæ modò in viuis cognosci possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius, vsus ipse monstravit. His propositis, primum dicam, quemadmodum sanos agere conveniat: tum ad ea transibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

## HIEREMIAE DRIVERI BRACHELII COMMENTARIA.

**D**ECRETUM erat semel exempto hoc capite ad artem salubrem transire, postea vero servari, ut ex illo lector antiquitatem medicina agnosceret, sectas atque ipsarum conditores, conditionesque in quo si quid

contrastè aut obscure ab ipso dictum est, à nobis illustratur: melius enim erat, non tantum duas hæreses, sed tres distinguere: vterum tertiam Celsus cum Empirica coniunxit: Etenim manca fuit longo tempore medicina, in nullas sectas distracta, paucis nec

B 3

\* Quibus-  
dā videtur  
hic legendū  
potius, in  
tenui cælo,  
quàm in de-  
lo: & æsta-  
& quā hye-  
me, propte-  
rea quod  
Hippocrat.  
dicat lib. 1.  
Aphor. Vē-  
tres hyeme  
et vere sunt  
calidissimi.  
Quare per  
ea tempora  
alimenta  
copiosiora  
sunt exhi-  
benda.  
Ex Paul.  
Ægineta  
libro itidē  
1. cap. 53.  
Hyeme qui-  
dē & for-  
tiori exer-  
citatione,  
& pleniorē  
cibo uten-  
dum est.  
Nisi eò re-  
feras, quod  
in denso  
cælo: & per  
hyemē cor-  
pora sunt  
robustiora,  
atque ideo  
etiam faci-  
lius quam  
libet mole-

stia ferunt.



dum firmis confirmata experientis, ratione quidem non contempta, sed nondum adiecta, id enim primus tentavit Hippocrates, qui insigniter medicinam locupletavit, at primus elementa in ordinem ac numerum digessit, veterum inuenta, ac fortunatas illas experientias, ratione expensas, circumquaque causis signisque instruxit, munivit, ac plura longe ratione eruit, quam ipsa experientia forte fortuna veteribus ostendit. Non tulit Philinus hoc medicine accessorium, sed rationalem contemplationem ab ea separavit, ac rationem empiricam primus instituit, quem Serapion postea secutus est, qui verò suam sectam antiquiorem, aut venerabiliorem facere volunt, \* Anacreonem huic sectæ præsiciunt. Multum tamen dissimilis fuit hæc factio ab his qui hodie Empirici vocantur, nam hi analphabeti quidem nebulones, ac circumforanei circulatores sunt, nulla experientia præditi, sed tantum duobus aut tribus remediis, at potius venenis instructi. Illi verò gravissimi erant philosophi, qui in singulis morbis, sua habebant remedia: & prius singulorum morborum concurrentia signa, syndromas, seu concursus, appellabant: verum naturæ in quas morbi incidunt, ac conditiones quæ corpora circumscribunt, tam varia sunt, ut congesta illa signorum series, nihil perpetuum habeat. Rarissimus enim morbus est ubi hæc omnia vel ipsorum plurima, concurrant, & non unum ex aliis omnibus asseatur, quod reliqua confundere possit. Ergo vulgari modo Cornelius Celsus arbitratus videtur, qui utrique sectæ aliquid indulget, & medium quoddam tenet, dum experientia medicinam instituit, ratione autem perficit. Nam contra maior pars ratione, minor autem ab experientia profiscitur: etenim simplicia experientia, ac sæpe forte fortuna inuenta sunt, tamen ratio sola morbos eruit, axiomata ac medicorum præcepta digerit, & ostendit: Quippe neque à simplicibus abstinet, sed hæc quoque in methodum refert. Quapropter recte in tertio Therapeutices, & multis aliis locis Galenus, rationem citra experientiam, quam experientiā citra ratio-

nem præfert: nam ut alibi dicit, ad solas suppurationes experientia comprehendendas, mille annorum tempus non sufficeret. Pessima tamen tertia secta est, quæ neutram tolerat, & si verum fateri velit, alia quam empirica non est, nisi quod multo sit inartificiosior. Anceps tamen ratio ipsius auctoris quæ methodicos à rationalibus separat, ubi dicit, Si verò quod propius est, vix vlla perpetua præcepta ars medicinalis continet, idem sunt quod ij quos sola experientia sustinet: Nam & rationales alios re vera involvere videtur, quoniam neque horum rationes perpetua sunt, sed plerumque tantum artificiales coniectura contingunt; ergo hæc redargutionem ad methodicos tantum referre licebit, qui ob eam forè causam rationales dedignabantur, quia ratio perpetua ac stabilis non erat, atque ob eandem causam methodum suam tanquam magis perpetuam præferebant: sed neque id iis obigit, quare dum rationem nimis angustè finiunt, neque sub rationali secta contineri, neque maiori iure sibi nomen usurpare methodica secta possunt, sed in empiricam nolentes incidunt: verum etiam dum sub lege perpetua sint, nonne ob hæc empiricos vincunt? nequaquam. nam empirici nihil adiciunt, sed particularia detrahunt, communibus contenti: ob gloriam tamen novum nomen sibi hæc hæresis instituit, & methodica appellari voluit. Huius primus artifex Themison, princeps autem Thessalus, quorum admodum brevis fuit methodus, quia nihil aliud quam purgare aut astringere docebat, ad quos mihi prope accedere videntur multi ex nostris philosophis, quibus per omnia hic unus ordo est, ut primo minoratum aliquod solutivum quod vocant exhibeant, secundo syrupum aliquem in tres aut quatuor vices partiuntur: hoc statim medicamentum quod eradicativum appellant, excipit, qualiscunque morbus fuerit, longus vel brevis: nam neq. morbi tempus animadvertunt, propterea, quocunque die occurrant, idem faciunt, & si forte quis diversos per annum integrum consulerit, eandem methodum

\* Acronem  
Agrigentium.



thodum inueniet: Propterea vir quidam neque malus neq. indoctus, iis qui rerum notis utuntur comparauit, quoniam viriq. suum perpetuo compendium ac formam seruant eandem: non tolerant tamen hanc toties repetitam tyrannidem morbi longi; & propterea quamuis ij à principio magis securi sunt, tamen fere plurimi illorum commoruntur, quod aduersis medicinis exasperantur: Atqui non est eadem omnibus fortuna, sed alia atque alia fama, quippe alios mores commendant, alios aurum, alium Græcæ, alium Latine lingua peritia, alium loquacitas, alium cōtentio, alium ingenium, alium muliebris assentatio, alium ex vrina impostura, & mille alia, nam quod nondum diximus, plurimos promouet fastus annuli, longa peregrinatio, & bibliotheca varia, prout scilicet agrorum varia sunt studia: etenim alius alio capitur. verumtamen omnes in hoc vno fere sunt, ut venirem soluant, vel astringant, adeo atque alius quidam propter hos nefcias breuius, an malignius medicinam desinuerit stercoreis vnius adiectionem aut detractionem, & re vera horum methodus, longe quàm methodicorum (quos diximus) breuior: etenim hi fluorem atque astringentem in singulis moliebantur partibus, illi vero tantum in ipso ventre, propterea quoque nostri breuius quàm illi euaserunt medici: nam methodicis iis sex (saltem mensibus) opus erat, nostris vero paucissimis diebus medicinam illis innasci, vel subito inspirari diceres, adeo subito fiunt medici, sine labore, sine ratione, nulla experientia instituti, sed tantum aliquot exemplaribus instructi, quibus quom. variè abundant seplasiarj, de medicorum, eadem fortuna certant primatu, non tantum vulgo iudico, sed & doctis, & quod magis miraberis, illiteratâ mulieres quoque in his suam laudem saepe obtinent, & quod hominibus saepe imponit etiam philosophis, quos ratio non vindicat, temeritas adiuvat. Cum qua secta ego hos omnes conseram, nescio: nam breuior videtur mihi predictarum sectarum numerus, quàm ut aliquis ex ijs contineat, certe nisi forte cum Thessaliis illis asinis locum sibi compascant.

tur, nullus superest. Credo vero quod neque hos Thessalis dignabitur, ut gratis admittat: atque inter reliquos philosophos vel empiricos, vel rationales nunquam non etiam precio locum innexient. Non enim ille rationalis statim dicitur qui axioma aliquod pronunciare didicit, aut qui verbis aliquot, nunquid contrarium contrario curetur, disceptare nouit, sed qui dialecticam, physicam speculationem, aut vniuersam rem medicam ad vnguem tenet: neque ob eam causam empiricus est, quia multa vidit, sed quia multa animaduertit, atque à se inuicem prompte discernit. Vide ergo quàm male huc confugunt, qui quom. rationibus parum valent, atque longe vincuntur, his contemptis experientiam multorum annorum iactant, & quasi reliquos omnes totis humeris supereminent: in singulis etenim citra rationem sibi tribui volunt, quorum experientia (si vera dicere fas est) cæcorum terroribus eadem est, qui varium perpetuo iter inierunt, sed dum viam baculo tentant, nunc huc nunc illuc oberrant, ita & iis, qui quotidie varia vident quidem, sed illorum rationem non tenent, imperitiores quotidie enadunt, atque nunc huc nunc illuc feruntur, tanquam hi qui sine remis velisque nauigant. certè pueri in platea ludentibus mihi videntur similes, dum velatis oculis de scopo aliquo certant: nam & ij quo frequentius à coetaneis prius circumducuntur, eo longius à scopo aberrant; verum hoc statim dicere audies & rationales sese esse, sed omnium rationem non exquirere, neque ad medicinam exigi, satis esse generalibus quibusdam contentos esse: quorum responsio multo peior est, quàm ipsa criminatio; nam hoc verbo plane se methodicos ostendunt. Itaque nunc se magis produnt: nam in variis locis Galenus asserit multo securiores medicos esse qui sola experientia nituntur, quàm qui dilutam illis rationem adiciunt, quippe ij optimam experientiam, saepe diluta ratione confundunt, ac vitiant, ac multo præstiterit nulla quàm infirma ratione vitii. Ac tantum de medicorum sectis: inter quos bonos non redarguimus, sed indoctos, ut ab illis discat



illis discat canere vulgus, prodimus. Super-  
est ut Cæsario scrupulum eximamus: qui  
non circa suspensionem, locum illum in fine  
legit: Nam famem facilius fert ad-  
ulescens, quàm puer; facilius in  
denso cœlo quàm in tenui, quasi se-  
cunda hæc pars cum aliis Hippocratis locis  
pugnaret. Renera autem nulla est contro-  
uersa: quoniam licet plus alimenti feratur  
sub denso cœlo, quàm tenni; tamen diutius  
differri potest. Exemplum exhibet hyems  
respectu æstatis, quod ipse quoque præscri-  
bit: quippe in hyeme cœlum densius, in  
æstate tenuius; & tamen hic quàm ibi ie-  
iunium egregius fertur, ferè enim sub ea-  
dem constitutione alimenti copia assatim  
exhibita admittitur, ubi ieiunium difficile  
toleratur. Magis suspectus est mihi locus  
qui præcessit, ubi dicitur: Itaque ista  
quoque naturæ rerum contempla-  
tio, quamuis non faciat medicum  
aptiorem, tamen medicinæ reddit  
perfectum. Cuius loco ego legere malim;  
tamen medicum reddit perfectum.  
Fortè autem hæc castigatio minus tibi arri-  
debit; quo magis cum prior parte disidet:  
nam siue aptiorem quidem faciat, quomodo  
perfectiorem reddet? Verum hac ratione  
non est quod reformides: quippe quum quod  
sequitur eandem habeat controuersiam; ubi  
legitur: non ideo quidem medicos  
fuisse, sed maiores medicos exti-  
tisse, quod idem est, ac si dicas, Medicos  
perfectiores: ita utrunque cum eo quod prius  
aptiores negauit, ex æquo pugnat. Quare  
quispiam arbitrabitur illum rerum differen-  
tias omisisse, quum in verbis luxuriaretur.

Malim tamē  
salua pace  
D. Hieremite  
priorē Celsi  
lectionē ser-  
uare. Alij sic  
hic legunt:  
Quamuis non  
faciat medicū,  
aptiorem ta-  
men medicina  
reddit, atque  
perfectum.

Renera autem ista ipse ex professo scripsit,  
quia ad artem propriè nihil istorum perti-  
nere dixit, sed ad exercendum artificum inge-  
nium. Neque est quod hic illi excusationem  
aliquam queramus, qui tantillum à ratio-  
nabili secta tanquam scrupulosa recessit, &  
medium quoddam inter utranque sectam  
elegit: & experientia quidem medicamina  
instituit; ratione autem perfecit. qua si ad  
inventionem medicinæ referas, vera sunt: è  
contrario verò, nunc in medio res se habet,  
quo primum ratione singulorum instrui de-  
bet, experientia perficitur. Nam, ut alibi  
(præsertim autem libro de Crisibus) dixit  
Galenus, priusquam quis omniaque scripta  
sunt diligenter didicerit, nihil agrotos in-  
tuendo proficiet. Et in tertio Therapeutices,  
solam rationem soli experientia præfert. Et  
iterum in quinto De sanitate tuenda usum  
quantumuis longum sine ratione nihil posse  
efficere perhibet. Rationem alibi citra expe-  
rientiam non item formidat: nam is putat  
ferè nihilo secius ex suis libris, quàm eni-  
dentibus operibus, instrui experientiam; ita,  
ipse dicente, in omnibus his nos quasi manu  
duxit. Vnus adhuc superest locus, qui  
Hippocratem fortè vitiat. Is autem in  
principio ferè scribitur; ubi ex Hippocrate  
omnium malorum causam spiritum reddit.  
nam contrà Hippocrates, primus ordinem  
elementorum ostendit; atque ex horum  
preparatione vel bene vel malè affici de-  
monstrauit. verumtamen spiritum subinde  
his malis occasionem præstare, in libello De  
statibus dixit: atque hoc est quod Celsus no-  
ster parum feliciter accepit.

## CAPVT I.

## Quemadmodum sanos agere conueniat.

**S**ANVS homo, qui & bene valet, & suæ spontis est, nul-  
lis obligare se legibus debet: ac neque medico, neque ia-  
tralipta egere. Hunc oportet varium habere vitæ genus:  
modò ruri esse, modò in vrbe: sæpiusque in agro, nauigare,  
venari,

\* Reuocato-  
res videtur  
transferre  
Plinius lib.  
29. cap. 1.



venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere. Si-  
quidem ignavia corpus hebetat, labor firmat: illa maturam  
senectutem, hic longā adolescentiam reddit. Prodest etiam  
interdum balneo, interdum aquis frigidis uti: modò vngi,  
modò idipsum negligere: nullū cibi genus fugere, quo populus  
vtatur: interdum in conuiuio esse, interdum ab eo se retra-  
here: modò plus iusto, modò non amplius assumere: bis die  
potius, quàm semel cibum capere: & semper quàm pluri-  
mum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis ex-  
ercitationes, cibi quē necessarij sunt, sic athletici superuacui.  
Nam & intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo  
exercitationis corpus affligit: & ea corpora, quæ more eo-  
rum repleta sunt, celerrimè & senescunt, & ægrotant. Con-  
cubitus verò neque nimis concupiscendus, neque nimis per-  
timefendus est. Rarus, corpus excitat, frequens \* soluit.  
Cum autem frequens, non numero sit, sed natura, ratione  
ætatis & corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem  
corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem inter-  
diu peior est, noctu tutior: ita tamen, si neque illum cibus,  
neque hunc cum vigilia labor statim sequitur. Hæc firmis  
seruanda sunt, cauendum quē ne in secunda valetudine, ad-  
uersa præsidia consumantur.

\* resoluit.

## COMMENTARIA.

**S**ANVS homo nullis se debet obligare  
legibus: sed, ut Hippocrates inquit,  
aliquando ad insueta permutare, propter  
fortunas (commentante Galeno) quæ nobis  
inuitis imminet: & ut Celsus noster in  
tertio capite dicit, quia potest incidere labo-  
ris necessitas, non autem laboris tantum, sed  
& multorum aliorum. Ne ergo ex inaspe-  
rato nos afficiant, oportet illorum unum-  
quodque prius in libertate tentare: lubrica  
enim est rerum humanarum conditio. Huc  
quidem Galenus putat reuocasse Hippocra-  
tem: ego verò & hunc & Celsum gene-  
ralius aliquid censuisse arbitror. Nam tam-  
etsi nobis semper aqua, libera verò atque lu-

culenta vita possit contingere conditio: in-  
dicarem ego molestum sanitati nostræ idem  
perpetuæ vitæ genus: natura enim nostræ  
non uno sed pluribus est constituta elemen-  
tis: unde quandam mediocritatem obtinet.  
vni autem viuendi generi, non nisi unum  
dominatur elementum: quare periculum est,  
ut vna similitudo plus satis hoc ipsum ele-  
mentum ultra alia efferat, ac mediocritatem  
corporis nostri tollat. Non ergo voluptas in  
varietate tantum est sita, ut vulgo dici-  
tur: sed & sanitas. Oportet autem hanc  
varietatem & in aliis capere, non tantum  
in cibo ac potu, nam aer nullo minus corpus  
nostrum immutat, quàm viruminis illorum.

C

Igitur

*Epistola Pauli ad Romanos*  
Paulus ad Romanos  
cap. 1.1.  
ca. 37. Fro-  
quæ concu-  
bitus, cor-  
pus rarius,  
frigidius,  
& imbecil-  
lius reddit.



Igitur tamen si pestilens aer aut aliter corruptus nunquam non sit fugiendus: tamen non semper rusticum, sed & urbanum subire salubre est. etenim hic crassus, ille vero tenuis, atque uterque suo more corpus afficit. Quapropter ne ex altero illorum periculum impendat; inimicem nunc hunc, nunc illum, magis autem rusticum eligere oportet. Sic interdum bis, interdum semel comedere, aliquando ientari, aliquando omittere, tum propter alia, tum ut defectus si quis ante fuit reponatur: & praeter ea e contrario, si quae fuit cruditas, abstinentia emendetur; ut etiam importunitate aegritudinis, (cuius paroxysmus aliquando mane cibum, aliquando in praedio, interim in cena reformidat, amantius) praevideas, ac cibum ut moris exigit, quocumque tempore melius ferat. Nam si quis per sanitatem praeter consuetudinem ientaculum non ferat; quomodo id ipsum in morbo tolerabit? Semper tamen, inquit, quamplurimum cibum prodest sumere, dummodo hunc concoquat: quoniam minor est error plenitudinis, quam parcimoniae. quippe, quod vulgo dicitur, Natura paucis contenta est, ut & id ipsum verissimum est; ita dumtaxat quod ultra vires concoctricis est, redarguit. Eo spectat quod ab Hippocrate dicitur, Vesci citra saturitatem, servare semen genitale, atque impigrum esse ad laborem, esse ex maxime salubribus. Sic & intelligitur id quod postea ab auctore nostro dicitur, ubi ad cibum ventum est, nunquam est utilis nimia satietas. Atque haec de vicissitudine cibi ipsius. Neque minus exercitium ipsum variare oportet, ut nulla sit pars quae relinquatur ociosa. Veruntamen athletica illa atque violenta exercitia non laudat. Redarguit vero eadem ante hunc Hippocrates: de quibus quia in primo Aphorismorum libro diximus, nunc super sedemus. Eandem mediocritatem & in Venere observare oportet: non enim minima sunt accidentia, quae reventum semen sequuntur; quippe calor naturalis, ab illius copia facile strangulatur: quamvis is qui breviter ratiocinatur, non libenter ista semini tanquam calido accepta

ferret. Quae vero incommoda sequantur profusam Venerem, quotidiana ostendit experientia, podagra, cheyagra, atque universum genus malorum, praesertim articulorum: quippe spiritus in ipsa frustra it, in quo plurima vitae nostra portio, ac fere tota est. atque alius quidem magis, alius minus Venerem tolerat: verum quam mens rectior, somnus iocundior, atque appetitus melior insequitur, generatim bona est; quemadmodum contra mala, quam dolor capitis evidens excipit, corporis mollicies, aut flaccidus aliquis languor: nam haec plus satis spirituum detrimentum consequuntur. multis etiam melius feritur a primo somno ac noctu, quam interdum ab ipsa vigilia. spiritus satis magnam patitur iacturam, tamen si ex Venere non accedit secunda. A primo autem somno, ut cruditatis fere in ventre nullum est periculum; ita si quae subit lassitudo, per sequentem somnum recreatur. nam si Venerem a somno statim labor accipiat, nihil melior est, quam quae interdum admittitur; sed quam cibus statim sequitur: quantum enim spiritus cibo statim recreantur, proportio ostendit corporis, si idem a cibo, & ante cibum expendas. Sed vel citra hoc, omnes sentientes nobis, a cibo finis leniores. Bene ergo se habet senis Hippocratis oratio atque ordo: Labor, cibus, potus, somnus, Venus; omnia mediocritate. Secundum hunc ordinem, si suam narrationem digessisset noster Cornelius, paula fuisset brevior, atque clarior. Huiusmodi ergo observatio integris atque firmis corporibus satis est. neque enim medico ager, neque cheyurgo quem forte aliptam vocant: nam contra nihil magis cavendum, quam ut praesidia adversa valetudinis, magna scilicet illa auxilia purgatio & phlebotomia, consumantur. in prospera etenim corpus colligant, atque effeminant, non autem firmant: quamvis hodie quibusdam aliter videtur non sine maximo hominum detrimento. Melius vulgares sentire dices, qui per sanitatem phlebotomia cavent; ut tempore aegritudinis (ita enim illos audies dicere) admissa praesentis conferat ad quorum forte opinionem, licet vulgare, nunc allusit Celsus.

CAPVT



## CAPVT II.

*Quæ stomacho imbecilli seruanda sint.*

**A**T imbecillis stomacho (quo in numero magna pars  
 vrbanoꝝ, omnesqꝛ penè cupidi litterarum sunt)  
 obseruatio maior necessaria est: vt quod vel corporis, vel loci,  
 vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene  
 concoxit, manè tutò surget: qui parum, quiescere debet: &  
 si manè surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui non con-  
 coxit, ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exer-  
 citationi, neque negotio credere. Qui crudum sine præcor-  
 diorum dolore ructat, is ex interuallo aquam frigidam bibe-  
 re, & se nihilominus continere. Habitare verò ædificio lu-  
 cido, \* per statum æstiuum hibernum solem habente, cauere  
 meridianum solem, matutinum & vespertinum frigus, item-  
 que auras fluminum, atque stagnorum, minimeque nubilo  
 cælo, soli aperienti se committere, ne modò frigus, modò ca-  
 lor moueat. Quæ res maximè grauedines, distillationesque  
 concitat. Magis verò grauibꝛ locis ista seruanda sunt, in qui-  
 bus etiam pestilentiam faciunt. Seire autem licet, integrum  
 corpus esse, cùm quotidie manè vrina alba, dein ruffa est.  
 Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi expectus  
 est aliquis, paulū intermittere, deinde (nisi hiems est) fouere  
 os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius  
 ante cibum, sin minus, post eum: per hiemem potissimum  
 totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post  
 cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdū  
 vel domestica, vel ciuilia officia tenuerunt, huic tempus ali-  
 quod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem  
 eius curatio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum  
 debet: in eo, qui minus laborauit, & bene concoxit, amplior:  
 in eo, qui fatigatus est, & minus concoxit, remissior. Com-  
 modè verò exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, ambula-  
 tio, atque hæc non vtique plana commodior est. Siquidem  
 melius ascensus quoque & descensus cum quadam varietate

\* perfato,  
 æst. hiber-  
 numque

Exercita-  
 tio.



*In sole, si caret non  
to, ambulat nuchus*

*Plin lib 3.  
epist: pri.*

*Lassitudo  
est graui-  
tas corpo-  
ris. Virgil.*

*Lassove  
papauera  
collo. qua  
etiam citra  
labore ac-  
cidit.*

*Fatigatio-  
nem verò  
nimietatē  
laboris in-  
telligimus.*

*idem: Velo-  
ces iaculo  
ceruos cur-  
susq; fati-  
gat. quod  
mox immo-  
dici labo-  
rem appel-  
lauit. Verū*

*de generi-  
bus lassitu-  
dinis legen-  
dus est lib.*

*3. Galeni  
de Sanitate  
tuenda.*

corpus \*moueat, nisi tamen id perquam imbecillum est. Me- \*mouet,  
lior autem est sub diuo, quàm in porticu: melior (si caput pa-  
titur) in sole, quàm in vmbra: melior in vmbra, quàm parie-  
tes, aut viridaria efficiunt, quàm quæ recto subest: melior  
recta, quàm flexuosa. Exercitationis autem plerunque finis  
esse debet sudor, aut certè lassitudo, quæ citra fatigationem  
sit, idque ipsum, modò minus, modò magis faciendum est.  
Ac ne his quidem Athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel  
immodicus esse labor debet. Exercitationem rectè sequitur,  
modò vnctio, vel in sole, vel ad ignem; modò balneum, sed  
in conclau quàm maximè & alto, & lucido, & spatiofo. Ex  
his verò neutrum \*sæpe fieri oportet, sed sapius alterutrum \*semper  
pro corporis natura. Post hæc paulum conquiescere opus est.  
Vbi ad cibum ventum est, nunquam vtilis est nimia satietas.  
Sæpe etiam inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intempe-  
rantia subest, \*durius est in portione, quàm in esca. Cibus à \*tutior  
salsamentis, oleribus, similibusque rebus melius incipit. Tum  
caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Condita  
omnia duabus de causis inutilia sunt, quoniã & plus propter  
dulcedinem assumitur, & quod \*modò par est, tamen ægrius \*modò  
concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, paruum  
in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, pal-  
mulas pomaque & similia melius primo cibo assumit. Post  
multas portiones, quæ aliquantum sitim excesserunt, nihil  
edendum est; post satietatem, nihil agendum. Vbi expletus  
est aliquis, facilius concoquit, si quicquid assumpsit portione  
aquæ frigida includit, tum paulisper inuigilat, deinde bene  
dormit. Si quis interdiu se impleuit, post cibum neque fri-  
gori, neque æstui, neq. labori se debet committere. Neque  
enim tam facile hæc inani corpore quàm repleto nocent. Si  
quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

#### COMMENTARIA

PRÆSTITERAT qua hic de medica-  
tione stomachi dicit, ad octauum caput  
transfere, quoniam hæc extra primam ra-  
tionem salutem est contemplatio: nihil  
secius fortassis, quia & iis qui stomacho la-  
borant, atque aliis qui circa querelam sani  
sunt, eadem somni ratio congruit, cū iis il-  
los simul perstrinxit, etenim hæc omni-  
bus



bus dormiendum est, donec perfecta fuerit in ventre concoctio: nam ea qua in hepate fit, non ita admodum multum somnum requirit; ferè autem prima concoctio spatio septem horarum perficitur. Itaque non temere, sed & eadem ratione, licet pauci fiant, in mediocri natura somnus mediocris tot horarum expenditur. Quòd si ultra differatur concoctio; & somnum amplius promovere oportet: neque ad hoc tu multum studere debes, nam vel ultro ferè longitudo somni diuturnitatem concoctionis imitatur. etenim non antè ferè vapor in cerebro diffunditur, qui vigilas moratur; quàm concoctio in stomacho perfecta fuerit. Quòd si non satis ex somno victus concoctionem assequatur (ut ex rusticis est deprehendere;) aquam frigidam libere quidem debet; modò lenius tantum malum fit; ac sine dolore. iam nunc contractum etenim frigida stomachum indensat, ac calorem naturalem congregat, ut postmodum dicemus. Neque iam obambulandum est, etiam si nullum somnum speres: sed saltem quiescendum, quia motus omnis concoctionem distrahit; de quo inferius. nam nunc fortè magis quispiam requireret causam, cur assente in principio Celsi) studiosi literarum stomacho minus valeant. non enim ex studiis tantum hoc illis accidit; sed felicioribus ingeniis innatum est: quia hæc spiritus subtilitate gaudent; qua cum corporis robore raro coniungitur.

### Habitare verò ædificio, &c.

TAMETSÌ ab hoc in illum aërē, atq. è conuerso, aliquando transeundum sit; tamen magna ex parte, aër perlucidus atque purus captandus est: atque hæc definitio in omni varietate audienda est. Ergo domicilium iam hieme quàm æstate ab ipso sole bene diffusile habere oportet. Quia autem omnis excessus cauendus est, meridianum in æstate sol; vespertinum ac matutinum frigus in hieme formidandum est. quoniam vnumquodque istorum excellenter corpus afficit: & quod magis miraberis, etiam aër cui flumina (paludes enim & stagna volens emitto) subiacent, inidoneus est. grauiissimus

tamen, qui inæqualis (modò frigidus, modò calidus) est; nam hic propemodum pestilens est, si diutius duret: nec tamen quantumcunq. diutius sit, discrimine vacat; quoniam distillationes siue catarrhos promptissimè mouet. caliditas enim attrahit; frigiditas expimit. Itaque minimè se committere oportet soli sese aperiendi per nubilum cælum: quoniam in huiusmodi constitutione maximè prædicta inæqualitas deprehenditur.

### Vbi experrectus est aliquis.

MIRABITVR quispiā fortasse cur æstate (nam hiemem excipit) aqua frigida os fouere moneat: nam, ut nequam aliquis conuitiabitur, tantum ad ablutionem, (quemadmodum Quintus ille dicebat de calido) spectare videtur. Re verà autem plurimum confort corroborando vniuerso cerebro, atque deinceps cunctis sensibus; dum spiritus, quibus animales operationes obveniunt, cogit atq. in vnum contrahit. unde & oculis præsentissimum remedium putauit Ægineta, illos manè aqua frigida imbui. Nimis autem noster Celsus indulgens est, dum meridianum in æstate concedit; nam nisi nocturnus somnus iusto breuior fuerit, omnino admittendus non est. nec fortè simpliciter consulit, sed potius ante cibum quàm post cibum admittit, si qui sint qui alterum pertinaciter facere velit. Habet autem id ex Hippocrate, ut multa alia. quanquam tu mirari non desines, quum potius post cibum, quàm ante illum, natura prima somnum instituisse videtur; nisi longè nostra ab illa discesserit, aut degenerauerit: nam pauci ante cibum, multi verò post ipsum ultro dormiunt. Re vera tamen tam breui somno citius potius corrumpitur, quàm concoquitur; ante illum forsàn defectum restituit, & corpus tantum leniter infigidat & humectat: idque non semel in hoc libro. sed pluries somnum à cibo redarguit; nonissimè autem in peste. Nec secus, cum Hippocrate, in libro De victu priuatorum, exercitium a cibo reformidat. Cui quid respondendum nescio; qui exercitium concoctioni conferre dicunt; atque ob id prandium quàm liberalis-



sumum accipiunt. bis etenim peccant: & quod plenius prandium quam cenam describunt; & secundo quod motum permittunt. Dicit enim praesens autor, ne lucubrandum quidem esse ante concoctionem: non enim contemnendum est literarum studium; nam cerebrum atque spiritus maxime ad se rapit, atque exercet, quos melius erat ad concoctionem concurrere. Nunquid ergo à meridie perpetuo feriandum est? nequaquam. sed more antiquorum philosophorum, qui non nisi mel ex pane lingeant, in prandio lenissimum aliquod gustandum est, quod non multam concoctionem desideret: reliquum facile cena supplet. in qua si quid peccatum fuerit, citra distractionem negotiorum nostrorum facile somnus emendabit. Quod autem in habitu corporis relictum est; hoc promptè matutina disiciet exercitatio, balneum, frictio: in quibus antiqui totam ferè cutis curationem collocaverunt; à quibus nos duntaxat proverbium ad ventrem accommodamus. Quovisque autem exercitium fieri debeat, contendunt adhuc neoterici. quidam usque ad lassitudinem; quidam citra fieri volunt. Qui si nostrum autorem, potius quam barbaros, amassent, nunquam in ea re tam diu hæsissent. nam is paucissimis verbis tantam absolvit disputationem; dicens: Exercitationis autem plerumque finis esse debet sudor, aut certè lassitudo, quæ citra defatigationem sit. Quippe lassitudo spiritum nonnihil exolvit, fatigatio etiam plus satis corpus incalfacit & exicat. Et tamen Galenus in libro De sanitate tuenda, lassitudinem cauet. Verum hæc de nomine tantum est controversia; Galeno, aut potius eius interprete, lassitudinem reddente quod Celsus fatigationem appellat. Quod quum neoterici non intelligant, de rebus etiam dubitare ceperunt. sed hæc latius in secundo Aphorismorum. Diligens autem fuit noster Latinus Hippocrates: qui non tantum discrimina exercitationis scripsit; sed ipsius aeris quoque, sub quo exercendum voluit. Vnum omnium eorum caput est, ut sit aer maxime illustris: nã & qui in vernalis est, magis dissipatur,

quam qui in porticus est. Solem tamen meridiano, ac omnem aerem ferventem vitare oportet.

### Vbi ad cibum ventum est.

NUNQUAM per se utilis nimia satietas: nisi scilicet vomitu corpus expurgare velis; de quo postea. nam & hic forte melius aliis quibusdam pronocantibus, quam ebrietate, provocatur aut crapula. Pauci vero intellexerunt quod sequitur. neque enim dubium est, quin immodica quantitas cibi molestior sit corpori quam potus. Nam eo alludit quod vulgo dicitur, Omnis repletio mala; panis autem pessima. Atque hæcenus illud verum est: non tamen ex omni parte, ut post dicemus. & si quam verissimum esset, non tamen hunc locum redarguit: quia Celsus qualitatem, non autem quantitatem, potus ac cibi inter sese aestimavit. dubium enim non est, quin in potu peior sit intemperies, quam in cibo: quippe intemperamenta cibi stomachus ferè retundit; quoniam primò illorum fert iniurias, dum diutius in eo morantur. At potus facillimè è ventre fluctuat, atque internis visceribus qualitas illius sese promptè insinuat; etiam cordi: quod nisi patitur, vita non interit. Exemplo Socrates est, qui tum primùm mortem sensit, quum, eo dicente, vis cicuta ad cor pervenit. Hac ferè ratione, (& quod quidam perhibent) vinum lymphatum promptius infigidat, quam ipsa aqua.

### Cibus à falfamentis, oleribus.

PRIMAM partem mensa sibi vendicant quæ ventrem movent. Talia sunt, inscula salsa, & pinguis. neque enim iis hæcenus credere oportet, qui exhibituri insculum aliquod ad emolliendum ventrem, insulsum ac macilentum propinant. Ferendi erant neoterici, si hac ratione & carnes salsas apponerent, & cerenissimam. Verum dum illarum cruditatem timent, dum vini caliditatem formidant; nostram excusationem adimunt. Et re verà, prout hodie assumuntur falfamenta illa rudia ac cerenissa, melius in sinum referuntur. quemadmodum & aqua. Quod autem



antem Cornelius Celsus per salsamenta potius colymbades & similia intellexit, quæ antiquis ad primam veniebant mensam; ex eo astruitur quod post hæc dicit: Tum caro assumenda est quæ assa optima aut elixa est: nam frigida exuicis est. Elixæ autem assumetur à siccis; assa ab humidis: quod elixa multo humidior sit, non enim eos amplius audire oportet, qui dicunt assa succo interno; elixa magis externo succulenta. Quorsum enim iis ambagibus vii oportet, quum elixa absolute multo melius humescit, ut patet ex Hippocrate de victu idiotarum. Conditæ antiqui medici ferè nominare solebant, quæ vulgo Hippocratica appellantur. nunc vero conditæ, hoc est carnes conditæ variis aromatis, damnat. ac post illum de sanitæ tuenda redarguit Galenus: non solum quia auidiùs assumuntur; sed quia, ut noster Celsus dicit, etiam difficilius concoquuntur. Nam & hoc attestatur Galenus, quod egrius multo huiusmodi concoquuntur aromata, quam ipsa caro: quoniam rudis ferè est horum substantia, quæ plus negotij ipsa carne exhibet: sicut & omnis alia herba etiam calida, quamquam rudis aliquis hæc, & similia ad carniū concoctionem multum momenti habere putet. Atque hæ sunt due partes primæ mensæ: secundam, quæ ex bellariis & (ut apparet) tempore auctoris, non secus quam nostro, ex fructibus & pomis fieri solet, merito redarguit: nam nisi fortunatum stomachum inuenerint, quædam aescunt, alia etiam vilesunt. Itaque & quibus aliis, & præsertim qui malè solido stomacho præditus est, potius ea ad primam mensam referet: nam & ibi quidem commoditatem quandam obtinent: & dum ventrem mouent, nihil illorum dulcedinem in parua quantitate veriti, quod multis hodie superstitiosè formidant. Committitur autem & aliis in fine error ab iis qui de poculis certant: nam veriti ut copia vini illis officiat, studio etiam cascum adiungunt; quasi hoc modo illius excessum temperent, ac contra bis delinquant, atq. dupliciter naturam affligunt: hoc est quod dicit, post multas potiones edendum non

est: nam cibus hic in ventre fluctuabit, nihil priori peccato conferens. Neq. post multum cibum aliud superbibere expedit: nisi forte aut aquam frigidam, aut cereuisiam adbibas; nam nihil segnius quam caseus, aut aliquid astringens, stomachum roborat: adducitq. non minimum ad concoctionem, atque somnum momentum. Nam stomachum cibum complecti est necessarium, si modò bene concocturus sit. sed neque tam multus vapor ad caput fertur, dum totus cibus frigida includitur. Quantum autem is vapor somnum aliquando inturbet, pueri exemplo sunt; qui ratione illius sæpe excitantur atque turbantur in somniis. nam & viri multi hac ratione à potu vini & breuius dormiunt & insanius. Rectè ergo & consentaneè cum Galeno alibi à nostro auctore idipsum dictum est, quod totum quod assumptum est, frigida portione includere salubre est.

### Si quis interdiu se impleuit.

QVAM difficile feratur immodicū prandium, ex hoc loco manifestum est, ubi inquit post satietatem nihil agendum. Durior tamen sermo apparet quem subiicit: Neque enim tam facile hæc inani quam repleto nocent corpori: nam corpus pleno ventre melius videtur perferre frigus, quam inani. Igitur per inane corpus moderatum intelligere oportet, ac mediocre: quod respectu cibi, quod admodum repletum est, inane dicitur, qualem in aliis commentationem & Galenus aliquando in Hippocrate exquirat. Mihi autem melius apparet audire ipsum sermonem simpliciter. non enim (quantis aliis putet) per immodicum alimentum quod concoqui non nisi longo tempore potest, natura ab iniuriis frigoris protegitur; sed aliqua ex parte strangulatur: quapropter eo tempore in mediam melius ferret; nam hæc nulla ex parte calorem suffocat. Optimum autem sub huiusmodi frigore mediocritas esse: nam ex iis natura non opprimitur, sed spiritus recreatur non minimum, caloris natini habitaculum. Quod autem labor potius pleno quam inanito noceat, ante sæpe dictum est. De



est. De aestu quoque cum frigore, eadem est ratio. natura enim lenius unum, quam duo, tolerat incommoda. eadem ratione labor prohibetur sub inedia. Nec pugnant haec cum priori sententia: nam aliud est inanitum esse,

ac foris ieiunum; aliud longa laborare inedia. Accepit autem Celsus hanc mutua ab Hippocrate sententiam, Vbi famies laborandum non est. quam quia in secundo Aphorismorum multis illustrauimus, nunc omittimus.

## CAPVT III.

*Observationes quaedam prout res nouae accidunt,  
& prout corporum genera, & sexus, &  
etates, & tempora anni sunt.*

ATQVE haec quidem pæne perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant & nouae res, & corporum genera, & sexus, & etates, & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in grauem, neque ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hieme: ex graui in eum, qui salubris est, prima ætate transire melius est. Neque verò ex multa fame, nimia satietas: neque ex nimia satietate, fames idonea est. Periclitaturque & qui semel, & qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem assumit. Item neq. ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam laborem facilius, vel puer, vel senex, quam infuetus homo sustinet. Atque ideo quoque nimis otiosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen infuetus aliquis laborauit, aut multo plus quam solet, etiam is qui assuevit, huic ieiunio dormiendum est, multo magis, si etiam os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum, nisi citò id quies susceperit. Quod si factum est, surgere oportet, & lentè paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modicè magis aliquis laborauit, tamen ingredi \*aliquid eodem modo debet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturis, vbi paulum

*Puer.  
Senex.  
Homo.  
ga pot. acci-  
dere laboris ni-  
cessitas, vel qua  
pot. incidere et  
legendu puto.*

\* aliquan-  
tum



lum deambulauerunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem vngi, atque sudare: si est, ante omnia in tepidario refidere, deinde vbi paulum conquieuerunt, intrare, & descendere in solium, tum multo oleo vngi, leniterque perfricari, interdum in solium descendere. Post hæc os aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato parè febris est, huic abunde est loco tepido demittere se inguinibus tenuis in aquam calidam, cui paulum olei adiectum sit: deinde totum quidem corpus, maximè tamen eas partes, quæ in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum, & paulum contriti salis sit adiectum. Post hæc, omnibus fatigatis, aptum est cibum sumere, eoque humido vt: aqua, vel certè diluta potione esse contentos, maximeque ea quæ moueat vrinam. Illud quoque nosse oportet, quòd ex labore sudanti, frigida potio perniciosissima est, atque etiam (cùm sudor se remisit) itinere fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam iudicauit. Quod in his verum est, quibus alius facilè, nec tutò resoluitur, quique facilè inhorrescunt. Perpetuum in omnibus non est, cùm potiùs naturale sit, potione æstuantem stomachum refrigerari, frigentem caleferi. Quod ita præcipio, vt tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc \* frigidum bibendum esse. Soler etiam prodesse, post varium cibum, frequentesque dilutas potiones, vomitus, & postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio vrget, in vicem modò aqua, modò vinum bibendum est, raroque balneo vtendum. Leuatque lassitudinem etiam laboris mutatio, eumque quem nouum genus \* eiusdem laboris preffit (id quod in consuetudine est) reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est, insolitum contrà lassat. Quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est. Propriè quædam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur: hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio, post iter, primùm sedile, deinde vinctio, tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quàm inferiores foueat. Si quis verò exustus in sole est, huic

\* frigidam  
bibendum  
esse.

\* cuiusdam

D

in bal-



\* super  
\* eū q. p.  
o. e. in b.  
p. in o-  
lutum

in balneum protinus eundum est, perfundendumque oleo corpus & caput, deinde in solium bene calidum descendendum est, tum multa aqua\* per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At\* ei qui perfrixit, opus est balneo primum inuoluto sedere donec insudet, tum vngi, deinde lauari, cibum modicum, deinde potiones meracas assumere. Is verò qui nauigabit, & nausea pressus est, si multam bilem euomit, vel abstinere cibo debet, vel paululum aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, vtiq; sumere cibum, sed assueto leuiorem: si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui verò toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currendum, sed lentè ambulandum est. Lenta quoque in balneo mora, dein cœna exigua prodesse consueuerunt. Si quis in balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acetum. Si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisque naturam sui corporis: quoniam alij graciles, alij obesi sunt, alij calidi, alij frigidiores, alij humidi, alij sicci, alios astricta, alios resoluta aluus exercet. Rarò quisquam, non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare: calidus refrigerare, frigidus calefacere: madens siccare, siccus madefacere: itemque aluum firmare is, cui fusa; soluere is, cui astricta est. Succurrendumque semper parti maximè laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, vñctio: & si post prandium est balneum, contracta aluus, modicum frigus hieme, somnus & plenus & non nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & potiones maximè dulcia & pingua, cibis & frequentior, & quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisque si salsa est, in ieiunio balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis, vel longus, lectus per æstatem terra, hieme durum cubile, cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, deiectio, acidæ res & austeræ, & semel die assumptæ epulæ, & vini non perfrigidipotio ieiunio in consuetudi-



suetudinem adducta. Cum verò inter extenuantia posuerim vomitum, & deiectionem, de his quoque propria quædam dicenda sunt. \* Eiectum esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod De tuenda sanitate composuit, video, neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie eiiciendo vorandi facultatem moliantur. Paulò etiam longius processit. Idem purgationes quoque eodem volumine expulit. Et sunt hæc perniciosæ, si nimis valentibus medicamentis fiunt. Sub hæc tamen submouenda esse non est perpetuum, quia corporum temporumque ratio potest ea facere necessaria, dum & modo, & non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid iam corruptum esset, expelli debere confessus est. Ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse eius etiam plures causæ possunt, est que in ea quædam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitum vtilior est hieme, quàm æstate. Nam tum & pituita plus, & capitis grauitas maior subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Vtilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plusest, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quàm id, qua via primùm expelli potest, eiicere. Itaque ubi amari ructus cum dolore & grauitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. \* Item \* Idem prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens saliuæ, vel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterque ei, qui vel cælum vel locum mutat. hisque quibus (si per plures dies non vomuerunt) dolor præcordia infestat. Neque ignoro inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. Interdum valetudinis causa rectè fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere, & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tanquam tepidam antè debet assumere: si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum



*Provacatio  
sua vomitu-  
m.*

*De vomitu.*

paulum adiacere. At qui manè vomiturus est, antè bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet, deinde aquam tepidam, ut suprà scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum (si stomachus infirmus est) paululum cibi sed huius idonei, gustandum, & aquæ frigida cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fauces exasperavit, qui vomit (si manè id fecit) ambulare debet, tum vngi, deinde cœnare. Si post cœnam, postero die lauari, & in balneo sudare, hinc proximo scibus, mediocris utilior est, utque esse debet cum panis hesternus, vino austero, meraco, & carne assa, cibisque omnibus quàm siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulat, si biduo continuerit, quàm si post quintum decimum diem vomuerit, nisi hæc mora gravitatem pectori faciat. Deiectio autem medicamento quoque petenda est,

*Deiectio.*

*Purgatio-  
nes.*

vbi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increpant. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies & inedia, quæ per illa maximè eueniunt? Qui eiicere vult, primum cibis, vinisque utetur his, quæ hoc præstant. Dehinc si parum illa proficiant, aloën sumat. Sed purgationes quoque ut interdum necessariae sunt, sic vbi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maximè infirmitas sit. Calefacit autem vinctio, aqua salsa, magisque si calida est, omnia salsa, amara, carnosâ, si post cibum est balneum, vinum austerrum: refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus, nisi nimis longus est, & omnia acida, aqua quàm frigidissima, oleum si aquæ misceatur. Humidum autem

*\* alias, mi-  
nor,*

*\* alias, im-  
modica*

*\* alias, im-  
modicus,*

corpus efficit labor \* maior, quàm ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hæc ambulatio, & vigilia: per se quoque ambulatio multa, & vehemens, & matutina exercitatio, & non protinus cibus adiectus, ea genera escae quæ veniunt ex locis frigidis, & pluuiis, & irriguis. Contra siccat, \* modica exercitatio, fames, vinctio sine aqua, color, sol \* modicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim sub-

iectus,



iectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens. Aluum astringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra soluit, aucta ambulatio atque esca, post motus qui post cibum est, subinde potiones cibo immixtae. Illud quoque scire oportet, quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum soluit. Itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est: soluit is, qui tardè superuenit. Quod ad ætates verò pertinet, inediam facillimè sustinet mediæ ætates, minus iuvenes, minimè pueri, & senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo sapius debet cibum assumere, maximeque eo eget, qui increfcit. Calida lauatio, & pueris & senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri ætati quæ inflationes mouent. Iuuenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur interest. Quibus iuuenibus fluxit aluus, plerumque in senectute contrahitur: quibus in adolescentia fuit astricta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem in iuvene fusior, in sene astrictior. Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse conuenit: minus, sed meracius bibere: multo pane uti, carne potius \* elixa, modicè oleribus; \* assa, semel die cibum capere, nisi si nimis venter astrictus est. Si prander aliquis, vtilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius vtendum est, vel calorem mouentibus. Venus tum non æquè perniciofa est. At vere paulum cibo demendum, adiiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est: magis carne vtendum, magis oleribus: transcundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Æstate verò & potione & cibo corpus sapius eget. Ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt, & caro, & olus, potio quàm dilutissima, vt & sitim tollat, nec corpus incendat, frigida lauatio, caro \* assa, frigida, elixa, gidi cibi, vel qui refrigerent. Vt sapius autem cibo vtendum, sic exiguo est. Per autumnum propter cæli varietatem periculum



culum maximum est. Itaque neque sine veste, neque sine calceamentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus: neque sub dio nocte dormire, aut certè bene operiri. Cibo verò iam paulo pleniore uti licet: minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodicè toto die plerunque sic assumuntur, \* ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quàm in his noxæ est. Sed his uti non sæpius, quàm alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neque æstate verò, neque autumno utilis Venus est. Tolerabilior tamen per autumnum: æstate verò in totum, si fieri potest, abstinendum.

\* ut ne q.

#### COMMENTARIA.

QVAM difficiles sint corpori subitæ mutationes, in Aphorismis Hippocratis ostendimus. Neque difficile est unicuique mutationi sua mala subscribere; sine ex subito otio in laborem assurgas, sine ex satietate diuturna in abstinentiam, sine è contravio transæat. Nam & qui præter consuetudinem ieiulantur, ventriculo gravantur. nec proderit si tantillum aut sequenti prandio, aut præterita cæna detraxeris: sæpe magis oberis, dum suo tempore alimentum subtrahis: fortè enim præ desiderio soliti alimenti inflammabitur. omitto quod tenuem illam quantitatem forsitan venter assuetus plurulus, contemnet, nec aliter quàm alienam qualitatem corrumpet: non enim magis mirum cibum corrumpi ob iniquam quantitatem, quàm qualitatem. Gravissima tamen incommoda eos sequuntur, qui aërem mutant: itaque valde religiose id faciendum est. Summa autem totius observationis est, ut tum has tum alias mutationes non repente, sed pedetentim; non affatim, sed paulatim obeas. Itaque (quod mirum tibi hæcenus visum est) mirari desines, cur ex salubri in gravem hieme, & contrarium in æstate transitum Cornelius noster præcipiat: nam gravis locus calidus & humidus

est; salubris verò, aut temperatus, aut frigidus & sicus. Nunc ergo aër gravis, hoc est calidus & humidus, ut tempore hiemis minus calidus; ita salubri, hoc est frigido & sicco, similior est. Sic & è contravio æstivus in salubri regione aër similior est gravi quàm hibernus: nam tempore æstatis calidus enatit; quamvis ex conditione loci sit bene frigidus. Summa ergo rei est quam dixit Hippocrates, Plurimum atque repente enaculare, replere, incalfacere, aut quonvis alio modo mutare, est periculosum: sed quod paulatim fit, intum est; nisi morbus scilicet acutus sit, de quo alibi.

#### Omnem etiam laborem.

HANC sententiam etiam accepit ab Hippocrate, secundo Aphorismorum: quam, ut ibi diximus, non integrè Galenus expressit. nam non est dubium, quin senis uniuscuius corpus imbecillius sit iuuenili: quippe & hoc supponit Hippocrates. & tamen promptius ac facilius exercebitur uniuerso corpore ac fortè pila (quippe quod vastissimum uniuersarum corporis partium exercitium est,) quàm dissuetus iuuenis. itaq. virtus in causa esse non potest; sed membrorum, lacerorum, ac nervorum promptitudo: tractabili-  
lior



lior enim in omnem partem nervus est confectus, quam diffusus. itaque à parva facultate facilius excutitur, quam rigidus à multa. Verum siue senex siue iuuenis inciderit in fatigationem; huic etiam ieiunio, (non autem à cibo, ut antè diximus) dormiendum: atque eò diutius quò fatigatio fuerit maior: nam fatigatio affectus quidam calidus & seccus est; quies autem infrigidat & humectat. cuius demonstrationem hic de me non expectabis, puto; quia ex physicis querenda est. Si ergo os emaricat, oculi caligant, aut turbator venter (hæc enim signa sunt, plus satis fatigatis sanguinem plus æquo biliosum reddidit,) eoque dormiendum, donec corpus ab eiusmodi accidentibus recreatum sit. Nec ob eam causam cubili exurgere debet quispiam, quia fortè dormire non lubet; fortè quia minus fatigatus est: nam & quies ipsa (necum somnus) siccum corpus recreat. itaque tametsi somni necessitas non fuit, tamen ingredi cubile aliquo tempore debet. Hæc scilicet videtur mihi nouissima sententia. cui non abstinilem in hoc loco Paulus Ægineta habet, ubi inquit: Caterum post longa itinera aliosque labores vehementiores, quanquam non fatigatus es; curari tamen exemplo fatigatorum debet, ut facilius futuras iniurias denitet.

### Communia deinde omnibus sunt.

HÆC pars est de apotheraia, atque de ea recreatione quam antiqui philosophi subierunt ab exercitio: qua corrigebatur si quid erat delictum; perficiebatur quod erat omisum. Subinde excrementa usque ad cutem exercitio perferuntur; sed ob cutis densitatem illic morantur. ob hanc causam aliquot ex his in Laconico sedebant, illinc ad solium calidum transibant: & ne corpus nimis cōtineret obnoxium externis iniuriis, denum varias unctiones, frictiones adhibebant; maximè tamen illis parvis qua fortè ex balneo magis connebant: aliquando tamen in postremis frigida suffundebantur.

Hæc tractat in hoc loco. nobis satis fuit eadem obiter percurrere, ad illustrationem nostri auctoris: nam usque ad fastidium ferè ea tractat Galenus in omnibus libris De sanitate tuenda. Atque hæc fortè hodie multis ridicula & superstitiosa videbuntur, qui nihil nisi medicamentosum ament. tamen talia hæc sunt, quæ grauissimi quique philosophi dignati sunt scribere, ac quibus suam sanitatem in longissimam senectam testantur sese promouisse: solaque hæc erat (ut antè dixi) ratio, qua quondam homines suam curam curarent, quamdiu sanitatem potiore quam voluptatem habebant.

### Post hæc omnibus fatigatis, &c.

CELSVS frigidam perniciosam dæcernit, non tantum sudantibus adhuc; verum etiam, dum sudor remisit, itinere fatigatis. Asclepiades etiam inutilem putant iis qui à balneo veniunt, tametsi sudor reliquit. In hoc autem ab Asclepiade Cornelius discedit. & re verà multo magis fatigatis quam à balneo venientibus periculosa est: nam in fatigatis uniuersum corpus conneet; in balneo verò magis externa cutis, multo ergo minus periculi à balneo quam à molesto itinere frigida minatur: etenim hic solum calorem uniuersi corporis facile exstinguit; saltè marasmo stomachum afficit: ibi verò æstum stomachi in laconico, atque balneo contractum, dumtaxat reprimat; nisi statulentum admodum, & frigidum corpus sit: nam hoc promptè refrigeratur, ac uniuerso ventre perturbatur; subinde etiam alius resoluitur, qui non ita facile restringi poterit. Intelligere tamen oportet, non statim à balneo, neque ante omnem alium cibum frigidam admitti: sed postquam cibus ingestus requirit. Semper enim meminisse oportet ordinem quem Hippocrates nobis reliquit, Labor, cibus, porus. Contra quem pueriliter deliquit, qui primus pueriliter versum illum descripsit, à potibus incipe cenam. Hæc autem non ita multis admodum oportet, quoniam neque imperiti vinum à multo



à multo labore peribunt; sed prius bolum aliquem assumunt; experientia edocti, sitim quidem extinguunt, sed tardius ad interiora viscera deferri: est enim id optimum ad tollendam sitim compendium. Quod verò Celsus à balneo dilutat: potionem, aut etiam aquam vino prætulit, foris ob eam causam erat, ut caliditatem præsentius reprimeret: foris siquid supererat, sudore excluderet. experientia enim id ostendit, tum à cerevisiatum ab aqua citius quam vino sudorem proveniri; nam frigiditas interna non aliter repellit foras quā intus sunt, quā externa, introque foris in habitu sunt. Cur autem adiecerit hoc in loco, Solet etiam prodesse &c: ego coniectare non possum: foris ex alio loco huc translatus est ab imperito; ut aliqua quædam que postea annotabimus.

### Si assidua fatigatio vrget.

VINUM perpetuo qui diutius fatigantur non competit, quia corpus excalfacit, ac digerit; neque rursum aqua, quia neque spiritus efficaciter recreat, neque virtutem instaurat: & rursum minus vinum lymphatum; quia periculum est, ne interna viscera fortius infrigidentur: quippe antè dictum est, vini lymphati quā aque periculosiorem subinde frigiditatem esse. Balneum etiam frequens inter multas fatigationes inutile est: quia corpus exoluit atque effeminat. Mirum autem quod scribit, altero labore corpus fatigatum, altero recreandum, nam contrā scripsit Hippocrates, In omni corporis motu, quies lassitudinem auferat. Habet tamen & illud ex Hippocrate aut Polybo, qui sic scripsit: Qui cursu fatigantur, luctari debent; qui lucta fatigationem sentiunt, his currendum est. Videtur autem mihi hoc eā ratione scriptum, quia in eiusmodi oppositis exercitiis, membra quæ prius exercebantur, non aliter sere quā si integrè quiescerent, feriantur: torpida etiam quodammodo in priori motu evaserūt opposita membra; unde non minus staccida apparet, quā si vere fuissent fatigata: quippe sic & sedentes, non sedili, sed lenta recreantur obambula-

tione. sic & postea dicitur, qui toto die vel in vehiculo, vel spectaculis sedet, huic lentè obambulandum est. Miraberis etiam quòd durum cnbile fatigato alicui quamvis consuetudo volupe sit: & tamen re vera ita est, quia nō aliter durum afficitur à molli, quā frigidum à calido; aut, ut propius accedamus, siccum ab humido. quia autem humidum plus afficitur à sicco, ac molle à duro; hinc ipsa mutationis ratio præ parvitate à te contemnitur.

### Propria quædam ad eum pertinent.

FRICTIO blandior motus est; quapropter emollit: quem autem citior aut violentior aut longior aliquis cursus excitavit, spiritum etiam attrahit, quem ille digerit. Mirum tamen est, quod ab itinere vel semel fatigatus (nam pluribus continuisque fatigationibus prius importuna balnea diximus) potius superiores quā inferiores partes balneo diluendas præcipiat; nam inferiores ut magis laboraverint, ita maiori quoque recreatione egebant. An ergo iste locus innersus erit, ut contrario modo legatur? id quoque mihi persuasum est.

### Si quis verò exustus in sole.

QUOD ille qui sub frigido aëre ambulavit, atque perfixit, diutius in Laconico atque balneo morari debet, quā qui sub æstate exercitatus est. luce clarior est: quippe in illo cutis enasit densior; quando autem usus aque frigide in balneo admittendus est, apud Galenum in libro De sanitate tuenda dicitur; non enim nisi in innuene bene carnoso tempore æstatis opportuna est.

### Is verò qui nauigavit.

LIBERIVS indulget cibum qui pituitam quā qui bilem inter nauigandum enomuerit: contrarium autem magis rationabile apparet; quoniam humidis corporibus, ut que pituitam colligunt, quā biliosus famem adhibere convenit. verumtamen biliosi promptius quā pituitosi nausea tentantur;



tentantur; itaque in illis studiosius vomitum observare oportet. in iis vero qui irrita nausea tentantur; pertinaciter pituita ventriculo adhuc affixa est; itaque omnino abstinere convenit; ut spacio temporis concoquas, vel post cibum vomere, ut promptius totam sentinam euacues. Non puto nunc ex me exigetis, quare nauigantibus, sed insuetis, plarumque nausea oboriatur. Nam si ambulatio qua inferiores partes exercet, inferiorem ventrem a cibo mouet; multo minus admirabile, superiorem ventrem his exerceri quibus superiores diutaxat partes agitantur. Insectio etiam aqua mota huc confert: argumento est, quod potius nauigantibus, quam curru vectis praecordia turbantur, quapropter ab ea contemplatione abstinere debet qui vomitum timet.

### Qui verò toto die.

DE eo superius dictum est: quod verò ab ocio minus; ab exercitio autem amplius & appetitur & concoquitur, omnibus manifestum est. Caue tamen ex eo inferas, prandium liberalius esse debere cena; nam contrarium potius sequetur.

### Si quis in balneo æstuat.

IN balneo non internas, sed externas partes rarefacere intendimus: fieri autem non potest, quum idem aer & suam caliditatem internis partibus maxime cordi insinuet. Itaque unum est illius remedium, vel acetum vel aquam in ore continere: sic enim ab altero istorum temporalius spiritus, priusquam ad cor perueniat.

### Ante omnia autem norit.

DEBET hic distinctio intercedere, quae ea quae sequuntur, a precedentibus partiat: nam ea quae sequuntur, ad secundam salubris partis sectionem attinent, quae corpus sanum ad melius traducit, non autem in eodem statu, ut prima, conseruat. etenim sunt quaedam intemperata corpora, quae licet sana sint, transferri tamen in aliam conditionem amant, ac plura quidem alia sunt quae in corpore emendationem requirant: commun-

nia tamen octo, caliditas paulo promotor, frigiditas, humiditas, siccitas, alui constantia, atque rursus ipsius mollicies. sapienter autem male fertur gracilitas in corpore, atque obesitas: quocirca haec duo Celsus primum corrigit, in quibus omnibus nullus est modus, excepto eo quod de balneo a prandio dicitur: nam & is error est vulgaris, & (dicente Galeno) admodum perniciosus, quippe concoctionem perturbat balneum a cibo, & cibum in corpus praecociter plerumque rapit: quo fit ut non secus quam exercitium aliquando venas infarciat. verumtamen si ab hoc periculo absit corpus, minus extenuat, quam idipsum ante cibum. Atque idipsum nostrum Celsum tantum dixisse puto: nam quomodo ipsum simpliciter impugnaret, non satis coniectare possum: neque enim a cibo crudo digesto, sed concocto nutritur. Balneum ergo a cibo vniuersum corpus malis succis implet; tantum abest, ut impinguet: & tamen Galenus idem in sexto libro De sanitate tuenda asserit; ubi de biliosis dicit, quod hos a cibi balneo quoque innuat, adiciens: Quidam verò eorum incredibile quàm etiam obesi sint redditi ex tali victus ratione. idem ille asserit XIII. Therapeutices. Ergo balneum id intelligendum est de balneo dulcissimi aquarum, quod non admodum cibum capere potest, sed tantum humectat: quanquam vel hoc nonnihil diffat; idè in gracilibus manè eiusdem usus suspectus est: atque a cibo tutior, ubi nullus resolutionis timor est: licet & hic quoque aliquando noceat, ut ibidem Galenus testatur. Ergo securiorem impinguandi vim habet cibus plenissimus. adicit tamen, Quantum concoqui potest. nam contra, edacitas ipsa, ut sacra littera testantur, vertitur in choleram: atque hac ratione ferè fit, ut gulosi quàm minimè nutrantur, sed atrophiam patientibus ferè similes fiat; nempe, licet multa ingurgitent, nequaquam corpus multum proficit, sed venter totam illam saburram indignatus deorsum praecipitat, priusquam hepar attrahere anticipet. argumento est quod plerique istorum, ventrem perpetuò mollem obtineant: quippe & ipsa contracta alui in-

E

zer in



ter impinguantia hic merito auditur. Multum etiam ad hoc confert somni plenitudo: nam vel brevis, vel longum admodum, utque extenuat; ac de brevi non est dubitatio: sed multa somni prolixitas, corporis molem servare potest, nam in externis partibus nutritionem offendit, ac tandem etiam in internis visceribus concoctionem ledit, quoniam spacio temporis calor emarcescit. Recte ergo & brevem & nimis prolixum somnum inter extenuantia posuit. Duvior apparet in ieiunio vini non perfrigidi aut calidi commendatio. quippe hactenus saepe auditum est, quod vinum ieiunio potum nocet articulis; praesertim dum per corpus impurum digeritur, nempe impingens excrementa secum rapit: forte ad articulos, quod loco defluxionibus oportuniore sint. non tamen in puro corpore hac formidanda sunt: nam contra Galenus in huiusmodi corpore non tantum simplex vinum, sed & diureticum commendat, ut a praedictis vitiis praeservetur. non etiam simpliciter Celsus mane ante omnem cibum fortassis laudat; sed mane in ipso ientaculo: semper enim cibis potum antecedere debet, nam alioqui copia vini dum nullo impediante ad univrsum corpus deferitur, saltem nervos mordere possit. atque hoc est secundum vini incommodum: quo vel illi offenduntur, qui corpus purum habent; modo simpliciter vel ieiunii, vel liberaliter admodum bibant.

#### Quum vero inter extenuantia.

ASCLEPIADES aetate magni Pompeij; quia ex Rhetorica parum laute vivebat, ad medicinam se converterit, ut maiorem faceret quaestum; nescias maiori cum temeritate an felicitate. nam occurrens ignoto funeri, hominem a rogo abstulit, atque etiam servavit; adeo ut sponsonem cum fortuna fecisse videretur. qui usque ad multam senectam validus vixit, nec ullo morbo, sed scalarum lapsu exanimatus est: quasi aliter mori non potuisset. Hic decreta medicorum antiquorum abstulit; & ut ipse magis solemnis esset, quasi nova secta auctor, vectigallis sui causa

leges posuit; quae non tantum imperitum hominem apud plebeculam promoverunt, sed & regibus venerabiles fecerunt; adeo ut Mithridatis regis pollicitationes ac legationes sperneret. Nec ego adeo ista, ut Plinius, demiror: nam is saltem neque inter rhetores, neque inter philosophos minimus erat, quanquam in re medica parum versatus: At (deum immortalem!) quales homunciones hodie fortuna, atque plebecula usque ad miraculum effert! atque hactenus ferendum erat: dum vero etiam a doctis conspiciuntur, quis non indignabitur? Fere autem huiusmodi homines bisariam sunt: alij qui de se atque potentis in corpore posunt insigniter mentiri (nam ista docti, indoctique mirantur): alij vero qui elegantiores literas, forte etiam Graecas posunt ostentare. nam hi statim hodie totam recentiore medicinam, ipsum Hippocratem atque Galenum videntur imbibisse. Sed neque ab his, neque fortunis, amicis, vel etiamdum divitiis (quippe & hac insignia fere primum in exultatione locum obtinet) medicum aestimare oportet: sed, ut Hippocrates, ut Galenus a natura sine ingenio, ac bona a pueris institutione, novissime a perpetuo labore. nam cui ista obtigerunt, periculum non est ut male aliquid committat: quemadmodum cui aliquid istorum trium desideratur, medicus iustus esse non potest. Tanto autem tolerabilior erat Asclepiades homuncionibus quos diximus, quanto purgationum frequentia, vino ipso, gestationibus, frictionibus, quae abstinentia est molestior: nam in his fere ille summam medicaminis ponebat: vomitus, deiectiones, (in quibus aliis fere unica anchora ac spes est; usque adeo ut fere nihil aliud faciant) ab usu submonebat, non quidem omnium ut videtur, sed sanorum. neque in hoc multa reprehensione dignus est; nam si aliquando, raro tamen, expetunt; verumtamen inter praecepta salubria audiri debent: praesertim vomitus; quippe neque hunc Hippocrates redarguit, & Galenus iuxta antiquos in libro De usu partium, semel aut bis mense commendat. temporis tamen, temperatura, & aliorum (ut statim subscribitur).



subscribitur) observationem adhibere oportet  
ut opportunitatem illius melius teneas.

### Vomitum utilior est hieme.

Ex diametro, ut apparet, hac sententia ab ea quae in quarto Aphorismorum scripta est, diffidet: nam ea contra vomitum in aestate commendat, in hieme vituperat. Itaque si praecipis fueris, statim nostrum auctoritatem tanquam parum similia vero commentatum contemnes. Et forte in sequentibus locis minorem illi fidem habebis. In qua criminatione ipse maxime recriminandus es: nam et hanc sententiam ipse ab Hippocrate de victu idiotarum mutuo accepit. Componit autem eas inter se Galenus, dum in altera quae in hieme probat vomitum, audit purgationem ipsius ventris; in altera autem, universi corporis. Verum hac concordia difficultates nihilo minus nobis relinquere videtur, quam prior discordia: non enim universum corpus, sed tantum ea quae supra praecordia sunt, vomitu purgare expedit; quemadmodum altera perhibuit in aphorismis auctoritas. Decet autem neque hanc neque simpliciter in aphorismis, sed tantum exilis motum humoris discere: quippe qui in praecordiis, hoc est superiore ventre, herent, promptius per vomitum educuntur; quae vero infra, vel inferius, vel alibi, copiosius per sedem; nisi forte aliud impediatur: ut caloris circumfluentis aestus: nempe huius occasione, humores etiam ab universo corpore potius sursum rapiuntur, quam deorsum. non tamen pituita multa in ventre generatur hoc tempore, sed hiberno magis: et quae in inferiori parte gignitur, per sedem abire potest; at ea quae in superiori parte nascitur, nullam a natura excretionem promptam habet: quapropter stimulum aliquem requirit; quippe etsi cum utilitate aliqua ibidem generetur, non tamen utilitatem aliquam invenies, quae illius moram ibi requirat. itaque singulis mensibus vomere expedit, modo alia conveniant, neque natura multum abhorreat: nam, ut alibi Galenus inquit, cogere volentem absurdum est. Eadem ratione in-

utilis est gracilitas: etenim hi calidi sunt, et imbecillum stomachum, hoc est extenuatum, habent. nam neque illic pituita multa accumulatur, sed promptè stomachus lacoratur. Utilis tamen et plenis et biliosis et reliquis temperaturis omnibus, ubi vel multa ingesserunt, vel aliqui modica concoxerunt. cuius signa sunt, dolor, gravitas praecordiorum, saliva, ac pitissatio praeter solitum frequens, sonitus utriusque auris, vel lachryma utrorumque oculorum; nam quae alterum tantum organum praebendunt, magis ex ipsa parte, vel saltem non longius quam a cerebro ferè descendunt. Quod si iam pectus, hoc est, praecordia ipsa aestuant, aut etiam os amaricat (quamvis hoc aliud alibi significet) hic tamen non simplicem sed corruptam pituitam arguit: atque vel ob hanc causam magis vomitum requirit. maxime autem nausea: nam hic vomitus non bene differtur, etenim hac non a temperaturis, sed a praesenti dispositione accipiuntur signa. Sed et citra hac vomitus consulti-  
tur iis qui calum aut locum mutant: nam melius externum aërem fert corpus purum quam impurum; salubre quam insalubre. Non tamen sapius vomitus monendus est, ut ij qui luxuria student, ac subinde vomunt, ut multa ingerant: sed satis est semel vel bis hibernis mensibus. Quod autem duobus diebus continuus in mense vomere, praestare, quam per longiora intervalla, dixit Cornelius; et ante illum scripsit aut Hippocrates aut Polybius; meritò tamen recusavit Galenus. At nos distinctionem ponere possumus, et servare utriusque auctoritatem. nam si primo vomitu satis purgatum sit; secundus melius differtur: sin aliter, exquisitor erit qui alterum sequitur: nam duas in uno die evacuationes moliri, tantum neoterici ausi sunt. Itaque neque illud perpetuum est, quod inter vomendum quietem servare necesse est: quippe Hippocrates quibusdam è contrario morum consulit, si forte non satis vomant. huc Celsus accessit, quando dixit, quod quies non in omnibus idem facit; etenim quibusdam inutilis, quibusdam rursus utilis erit.

E 2

Qui



### Qui vomere post cibum volunt.

QVIDAM facile, quidam difficile vomunt: calidi ac macri natura, facile; crassi aut frigidi, iterum difficile. his ergo à cibo; illis vero manè commodius excitatur vomitus, nam, ut alias purgationes, ita & hanc quoque vacuus venter melius fert. Itaque in iis qui manè vomituri sunt, satis est vel nullum simplex libere, vel (si difficilior sit) in quo hyssopus aut radícula elixa fuerit, aut aliquid quod incidat; deinceps aquam tepidam assumere, quæ stomachum infirmet, aut quæ emolliat. hac etiam ratione promptissime vomitus sequitur. A cæna autem variâ (nam variam esse oportet & in cibo, & potu, à quâ vomitum expectes) satis effertur humor sursum; adeo ut hic tantum aquam tepidam superbibere sit satis: nisi forte pituita tenacius hæreat. nam tum & hic vel salis, vel mellis parum adicere oportet; aliquando etiam radiculam, aut aliquod simile prius esse: Quippe cætera (ut inquit) quibus antiqui vomitum ciebant, helleborus, asarum, nimis stomachum vellitant: & re vera helleborus sanis non competit, sed tantum extremis morbis. Recreatio autem quæ à vomitu præcipit, nullam difficultatem habet; nisi fortè mireris cur potius à cæna quàm manè vomenti præscribat balneum. sed neque eius causa longè posita est; quippe duas euacuationes, ut diximus, egre corpus vno die sustinet.

### Deiectio autem medicamento.

NIMIS perniciosus error hactenus fuit medicorum (egris enim condonandum erat,) putantium eadem medicamenta esse stercorearia, atque purgantia: qui iis qui difficile desiderant, medicamentum purgans statim exhibebant; atque ob id se ferè tantum; nam & Avicenna (si rectè memini) dixit quàm periculosa aliquando illis accidentia superveniunt, qui constipato aliquot diebus ventre purgationem experiuntur: Quippe non per se, sed per accitens tantum evenit,

ut purgationem, dixit, stercus sequatur, dum venter ab humoribus discurrentibus vellicatur. itaque nunquam purgationes in duro venire; periculo vacant. Sed distinguere oportet, (sicuti nunc noster auctor fecit) deiectionem à purgatione: hanc quidem molimur, ubi univèrsum corpus, atque ipsas venas à suis excrementis afferere; illam autem, ubi ventrem suo onere lenare volumus; præsertim si diutius alvus fuerit astricta; pro univèrsusque scilicet conditione, nam & hoc spatium potius est aliis quibusdam accidentibus metiri, quàm dierum numero, quibusdam à natura sæpius in die, quibusdam vix tertio quaque die respondet alvus. Astrictiorem ventrem congeruntur inflammationes superiorum partium; nō quidem nunc propriè inflammationes nobis vocabitur, sed improprie omnem calidam evaporationem, quam sequuntur dolores capitis, caligines & alia. His igitur apparentibus, statim ventrem movere oportet: primum oleritis, insculis & aliis humidioribus, cibis, vinis quæ id præstant, ut quæ melle condita sunt; nam musta aliis quibusdam conditionibus plus obfunt quàm sua lenitate prosunt: idem ex aliis capere oportet, quoniam varia est causa (quemadmodum in Aphorismis diximus) quæ ventrem firmant. Nonisimè autem ipsa aloë nō quidem per os ingesta (sicut illi qui pilulas ante cibum, aut statim post cibum vocant) sed in glandem redacta; aut si neque id profuit, per clysterem sedi infusa: nam neque quies neq. inedia ventrem molliunt; potius sistunt: quippe prædicta mala sæpe ultro sunt visa sequi; tamen, si non nihil contulerint, conferre aliquando loco purgationis possunt: dicit enim Galenus in quarto Therapeutices, Non statim laborante corpore confugiendum ad phlebotomiam, aut purgationem; sed optimam pro his commutationem esse aliquando; ambulationem, aut inediam. Quàm autem periculose sint temerarie, aut frequentes purgationes, nos alibi diximus: dicit autem id ipsum Celsus paucis, Quia corpus infirmant, hoc est (ut insinuat) omniū morbis obnoxium faciunt. Id vero & ipsa experientia testatur. pauci enim.



enim ex iis medicamentis indulgent, qui non  
ferè perpetuò valetudinarij fiant, atque ab  
omnibus causis promptissimè afficiantur: et  
enim calorem naturalem deterunt, liquant;  
à quo omnis sanitatis firmitas.

### Calefacit autem vnctio.

DIGRESSVS est hactenus à proposito;  
regrediur nunc ad emendanda reliqua, quæ  
prius attulit, corporis vitia: scilicet calidum  
infrigidat, siccum humectat; & è contra, in  
quibus nulla est difficultas, si non virtuosissi-  
mum hic esset exemplar, & multa ab uno  
loco in alium transposita. Primum est, quod  
inter humectantia dixit, multa porio,  
posthæc ambulatio, & vigilia. Ac de  
multa quidem potione, nemo tam rudis est  
qui contendat; quoniam insigniter hume-  
ctat, ac digestionem in corpus promouet: &  
propterea rectè vulgo dicitur, Tentaculum  
caninum extenuare; dilutum verò potum,  
obesum reddere. Illud tamen scimus quod  
ambulatio & vigilia nullam insigniter vim  
habent humectandi; sed potius exiccandi:  
& quamuis modicè id potest ambulatio,  
non tamen vigilia ullam eius rationem pa-  
tuitur. Excusari potest utrumque, si aliquid  
tale hic audiamus quale prius de balneo à  
cibo. opinor enim Cornelium Celsum, non  
illud dicere quod ambulatio & vigilia sim-  
pliciter humectet, sed minus quam antè ci-  
bum exiccat: nam tamen vigilia minus,  
magis motus, potum in corpus pertrahit, at-  
que ita magis humectat; non est sine crimi-  
ne hoc consilium. ergo & in calidis remediis  
audire decet, balneum à cibo calefacere, hoc  
est minus quam antè cibum, infrigidare.  
Verum quod sequitur, Per se quoq. am-  
bulatio multa & vehemens, & ma-  
tutina exercitatio, & non protinus  
cibus adiectus humectat: nulla ratione  
excusari potest; nam eadem ferè prius inter  
extenuantia audita sunt, quæ ferè cum exic-  
cantibus conueniunt. ergo ad exiccantia to-  
tus ille sermo transferri debet: quemadmo-  
dum ille qui sequitur in siccantibus auxiliis,  
cibus exercitationi statim subiectus;  
hæc è contrario transcribere oportet. Fortè

autem & illud quod dicit, vnctio line  
aqua: nam aqua potius humectare quam  
exicare videtur. quod tamen frigidum per  
se aquam inter exiccantia posuit, tolerari  
potest: nam insigniter calidum, & frigidum  
per accidens ambo astringentiam facultatem  
obinent; caliditas tamen magis. inde &  
fructus & escas bene humidas, non tantum  
à locis humidis, sed simul frigidis commen-  
dat; è contrario, sicus à calidis, nedum siccis.  
est tamen in regione frigida aliquando re-  
perire fructus multo exiliores quam calida.  
Potissimum autem humectationis vis in vi-  
ctu consistit: nam natura quasi vitæ nostræ  
inuida, medicamenta humida nobis negasse  
videtur: nam si vel vitæ, vel medicami-  
nitus, detrimentum humiditatis reponere  
possemus, immortales maneremus. sed de iis  
alibi. Vinum autem omisimus inter cale-  
facientia exponere, quod austerum vinum  
ibidem pro acri audiri oportet: sic & in aliis  
quibusdam locis ac posterioribus.

### Aluum astringit labor, fedile, &c.

ID est septimum & octauum quod sa-  
nitatem non infirmat, verum tamen incer-  
torem facit. itaque durum magis mouere,  
& motum astringere expedit: hoc autem fa-  
cit, inquit, labor, fedile: labor scilicet  
ante cibum; fedile post cibum: creta figu-  
laris corpori, præsertim macilento, illita:  
in obesum etenim pauca facultate dotata est.  
Putarem illum nunc vocare cretam figu-  
laris, secundam speciem terræ cimolice, quæ  
paulo tenacior est; nisi utraque discenteret.  
Cibus non imminuens sine modicus, nam  
excrementa ferè semper respondent ali-  
mento. exigua potioneque adhibi-  
ta, nisi quum cibi quis quantum  
assumpturus est, cepit: hoc est, Huic  
expedit, non paulum, sed in sine assatim bi-  
bere. Contra illi qui durioris ventris est,  
magis conuenit paulatim quam assatim bi-  
bere: & id ferè omnibus simpliciter sanis  
magis utile est; quoniam hoc pacto melius  
cibus cum potu subigitur, temperatur, ac fa-  
cilis digeritur. at in agris plerisque & fe-  
bricitantibus.



bricitantibus è contrario expedit affatim potius quàm paulatim bibere; nam modico potu, potius calorem suscitant, quàm sedant; more salutorum, qui ferrum ut magis igniant, prius obiter diluunt. Sed & vomitus nimis violentus est, ut lubrici aut duri ventris remedium sit: ob eam etenim causam à cibo ventrem comprimit; quia ipsum cibum enomiz, atque materiam ventri adimit: verumtamen iam delapsam ad inferiora facem, ad sedem comprimit atque detrudit.

### Quod ad ætates verò pertinet.

MIROR quare hæc interposuit, nam omnia ista usque ad sequens caput potius ad initium tertij capitis spectant; atque ad primam partem salutem desiderantur, non autem ad secundam. Quod verò calidi & humidi (cæteris paribus) minus ferant inediam, in causa est quia promptius dissolantur: tamen si biliosi forte ieiunij magis tentantur dolore capitis, & similibus accidentibus. Diximus autem de iis in primo Aphorismorum; aliter autem ac paulo clariùs in Secundo: etenim controuersiam ista disceptatio habet non parnam. Indulgens est Cornelius Celsus, qui pueris dilutum vinum permittit: nam Plato omnino interdixit. quanto ergo amplius parentes qui adhuc stident proli- bus; nutrices quæ lactant; mulier quæ vterum gerit, abstinere debent? non enim multo minus infans in vtero leditur, quàm si ab ipso sumeretur: non tamen si vis vini prius utcumque refingitur, tamen ipse conceptus multo tenerior est, atque à leniore causa offenditur. nec est quod conceptionem eo promoueri dicas, nimis enim facile mentem ledit; ac spiritum, qui non nisi halitus quidam est, digerit. Hoc, puto, considerauit, qui prius vinum, potius quàm cordi aut hepati, cerebro nimirum prodesse pronunciauit: nam hoc frigidum, illa verò calida; itaque id ipsum reliquis vino magis oblectari decebat. Ego certe, etiamsi cogor aliam causam reddere, non possum, cur plerumque debiles ac stupidos parentes generosiores pariant; nisi v-

triusque parentis, tum in aliis tum in vino luxuriam. Iam non tantum spectare oportet an iuuenes sint; sed an calidi, frigidi, humidi vel sicc: itaque rectè adiecit, Iuuenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. puto sic legendum: Iuuenum qui minus assumerunt &c: Forè ad illud Hippocratis allusit, qui postquàm pueros minimè ferè inediam ferre scripsit, notam ex temperatura adiecit ingēs in omnes & inter hos maxime qui animo sunt viuiores. alterā autem partem illius dictionis credo pertinere ad illud quod statim sequitur quibus iuuenibus &c. nam quibus iuuenibus alium fluida est, mollioribus medicamentis egent, reliqui durioribus. Sumpsit autem hanc sententiam noster auctor ex sene Hippocrate, secundo aphorismorum; quam nos ibi illustrauimus. Eo autem quod subiicit, Melior in iuuenē fusio, in sene astringior; videtur mihi reddere sententiam nouissimi aphorismi in fine secundi libri Aphorismorum qui sic habet: Quicumque alios humidas habent, siquidem iuuenes fuerint, melius degunt; ad senectutem verò deterius, nam senescentibus magna ex parte exiccatur. in quo interpretes variant: sed nos ibi causam reddidimus.

### Tempus quoque anni considerare oportet.

IN vinctu iuxta hiemem assa pro elixis scribere oportet: sic in eo qui æstate competit, elixa pro assis; & iterum in eo qui veri accommodatur, legendum est ab assis ad elixa, pro eo quod scriptum est ad assa ab elixis. & ex iis & similibus locis liquet, à quàm paucis hætenus Celsus sit lectus, quum adhuc tam multis scateat mendis. nam Celsus non nisi obuia correxit. Sic autem restituto loco, nulla est difficultas: nisi fortassis mireris cur panis copiam laudauit in hieme; carnem in æstate: etenim ea ut calida est, ita parum in æstate congruere apparet; atque aliqui plus semper panis quàm carnis conueniunt; melius tamen fertur in hieme



in hiemo quam aestate, quoniam vires requirit, quae in hieme pleniores sunt. Possent hic multa transfundere quae à Galeno, & aliis scripta sunt, de panum discrimine; si quidem ego in labore alieno desudare vellem more neotericorum scriptorum, qui hodie nihil aliud faciunt: sed nunquam fuit mihi is animus, ut alienis plumis superbi-rem; vel quod alij prius scripserunt, reco-querem. Itaque hoc loco dicere sufficit, ut syncomistos, siue antopyros maximè fami-liaris est; ita generatim sanis maximè salu-bris est, atque in huius quidem substantia omnes continentur; praeter unum Ruellinum, qui contraria in eodem loco super eo scribit, atque aliquando leniter, aliquando autem omnino non secreto fursure antopyron fieri dicit; multa autem & alia ibidem confun-dit: nam & cibarium (quem tamen ex Celso infirmissimum allegat) secundario committit, atque secundum ab antopyro habet. minùs delinquit, quando sordidum cum syncomisto comparat, atque paulum miratur quodammodo quòd ipsum à synco-misto separet; nam saltem magis cum ipso quam cum cibario convenit, qui proxime illi asidet. Videtur ergo aliquando alium syn-comistum, alium antopyrum putasse. Sed & siliginem potius speciem quandam tritici, quam partem, videtur arbitratus, & in hoc non solum vulgarem opinionem, sed & Plinium habere patronum: tamen, si mihi liberè liceat dicere quod sentiam, Celsus no-ster potius tritici optimam partem, quam speciem aestimasse videtur, ubi differentias panis enumerans ait, Firmius triticum quam milium; id ipsum quam hor-deum; ex tritico firmissima siligo est; deinde simila; deinde cui nihil ademptum est, quod autopyron Græci vocant; infirmior est ex polline, infirmissimus cibarius panis. Itaque res mihi partes videtur in tritico cogitasse Celsus; optimam siliginem, secundo loco pol-linè, tertio fursur: quod si verum sit, pol-linem ipse dixit, quod alij viriculos appel-lant, aut fortè quod ex viriculis & fursure est commissum; quale ferè remanet dum per

renuins cribrum sola siligo concernitur: si-milam verò forsitan putavit, quod nonnihil pollinis habet admixtum; ut quando leniter tantum fursur secernitur. noua profectò hac sunt; neque ego diu pro his contendere volo, & aliter hunc locum Celsi interpretari pos-sum: verumtamen ipsius auctoris dictio huc magis inclinasse videtur: nam absque dis-cretione, si siliginem iuxta communem mo-dum audias, nequaquam ex ea nitidissimus panis pinsetur: hæc si vera sunt, (nam con-iectare possum, asserere nolo,) panis diffe-rentias ostendere facile erit: nam qui ex sincerissima parte ipsius tritici fit, siliginem appellatur; huic responder qui albus dicitur hodie; qui verò ex simila fit, ut ubi fursur tantum leniter secernitur, semidalis Græcè dicitur, secundarium quidam appellant; cui non iniquè comparatur is qui hodie secun-dum locum ab albo obtinet: quod si nullo modo, nec obiter fursur discernitur, synco-mistos atque antopyros est, quo hodie fami-liariter utimur. Sordidus ergo erit, qui ex polline; cibarius autè, qui ex fursure. Quan-quam & hic fortè multi mirabuntur, nos pollinem pro viriculis usurpasse: verum nisi ita fit, nescio quomodo ex polline sordidio-rem, atque infirmiore panem Cornelius Celsus pinset. Itaque (non tamen sine for-midine) omnes has differentias ex uno tri-tico consari putem, qui verò siliginem ali-ter audiunt, ita facere non possunt; veram-tamen liberum unicuique suum manet iu-dicium. nunc de salubritate harum aliquid obiter dicamus: nam licet siliginis nitidis-simus ac solidissimus sit; tamen senibus, & qui ad obstructions oportuni sunt, periculo-sus est; & syncomistos magis laudatur: ita & secundarius siue semidalis is suspectus est; ne nunc dicam multò insalubriorem esse quem nos album vocamus, quoniam fermentum nullum habet, quod Galenus perpetuo frè requirit, ac tantum de panis diferen-tia. Possent hic & carnis & piscium va-rietatem ostendere: sed quia hæc satis ab omnibus dicta sunt, sufficit hoc tantum di-xisse; inter pisces, optimos esse marinos; peiores fluminales, præsertim qui in vis fluminis degunt

Et iure mi-  
retur quibus,  
quando pol-  
len is in tri-  
tico fit, quod  
flos in siligi-  
ne. Marcel-  
lus Pollinem  
esse dicit re-  
nuissimum  
puluerem,  
magis quam  
farinam: qua-  
lis circa mo-  
las plerūque  
& loca qui-  
bus panis  
pinsetur, pa-  
rietibus hæ-  
rens inueni-  
tur. unde fit  
panis om-  
nium infir-  
missimus.  
Nos libro se-  
cundo de his  
panum dif-  
ferentiis  
etiam non-  
nulla in me-  
dium attu-  
limus.



degunt qui cimitas expurgant; pessimos paludinosos ac stagnales. inter marinos vero optimi sunt saxatiles ac squammosi. Sed nunc ad propositum reuertamur: nam eadem ratione qua panis fertur in estate, itaque neque aliud assatum alimentum, sed modicum: conuenit autem hac occasione, ut & fames sepius incidat; itaque leni & exiguo, sed frequente, opus est alimento. Hieme autem, raro solido ac pleno, tum propter alia, tum quia modicum semel ingestum cibum forte natura contemnit atque corrumpit: itaque non solum propter negotia, ut alibi diximus, uilius est, sed ob hanc dictam causam, salubrius quoque est inustum cibum in duabus vicibus accipere, quam in tres aut quatuor parti. Bene autem distinxit Cornelius in estate cibum frigidum, vel qui refrigeret: quamuis quis alterum vocare putaret; nam alius actu vel phantasia frigidus, alius uero duntaxat facultate, aut energia: utraque in estate competit. Ex nullo autem quam superiori loco manifestius est prandium longe ante canam esse debere; nam in hieme omnino prandium adiuuit, in estate tantum exiguum permittit. quare Platina non satis diligenter Celsum perlegit, licet ex eo plurima transcripsit; qui canam quoque leniorem prandio precepit.

### Per autumnum propter cœli varietatem.

ET in hieme cauendum quoque frigus putant: sed magis in autumno admonuit, ne aliquis illius paruitatem cōtemneret. nam etsi non aequale cum hieme frigus autumnus habeat; tamen quia cum inæquali frigore coniunctus est, non minus periculum affert. Poma (quibus potissimum autumnum tempore abutimur) literius commendauit: ac tu forte paradoxum putabis. & re uerâ admodum sunt, & magis quam caro, excrementitia, non solum autem poma, sed & panis: quamuis nihil salubriorem carnem quam panem dicimus; quippe & illius plus quam huius assumimus. Iam nihil plus molestum ex pomis contractum, excrementum, quam ex carnis plenitudo: idq; recte dixit; quod non ipsa poma, sed ipsorum consummatio, atque copia nocet. nam & quondam dum homines tantum mediocriter uincerent, neque infelicius degebant, neque breuius. quod autem potius his, quam aliis, abutimur, dulcedo facit; propter quam immodicè appetuntur: contra autem modicè illis uti oportet, ac tantum solidiori cibo detrabere, quantum illis indulgetur; nam plus satis multitudine istorum oneramus, præsertim quum ex solidiori cibo præterea nihil remittitur.

### CAPVT III.

*De his qui aliqua parte corporis laborant, & primum  
de his quibus caput infirmum est.*

PROXIMUM est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is (si bene concoxerit) leniter perfricare id manè manibus suis debet: nunquam id (si fieri potest) veste velare, aut ad cutem tonderi: uileque lunam vitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solisque concursum: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere, multum ambulare: sed (si licet) sub tecto, neque in sole. Ubique autem vitare solis ardorem,



ardorem, maximeque post cibum & vinum potius vngi quàm lauari, nunquam ad flammam vngi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi vngi, tum transire in calidarium: vbi \*sudabit, \*sudauit, in solum non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere: tum tepida vti, dein frigida, diutiusque ea caput, quàm cæteras partes perfundere: deinde id aliquandiu perfricare: nouissimè detergere & vngere. Capiti nihil æquè prodest, atque aqua frigida: itaque is, cui hoc infirmum est, per ætatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subiicere. Semper autem, etiam si sine balneo vnctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cùm cæteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad ceruices aqua descendat, eamque ne quid oculis, aliisue partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem faciliè concoquat: isque, si ieiunio caput læditur, assumendus etiam medio die est: si non læditur, semel potius. Bibere huic assiduè vinum dilutum \*leue, quàm aquam magis expedit: vt cùm caput grauius esse cœperit, sit quod confugiat: ei que ex toto neque vinum, neque aqua semper vtilia sunt: medicamentum vtrumque est, cùm inuicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, vtrique post cœnam, postquam nec cogitatio quidem ei satis tuta est, maximè tamen vomitus alienus est.

*Aqua frigida capiti prodest.*

*\*leue,*

## COMMENTARIA.

**H**ÆC est tertia salubris artis sectio: qua neutrum, siue infirmum, nondum tamen ægrum, corpus firmat, ac imminetia vitia profligat; ac primum capitis, quia hæc præsertim philosophis ac literatis scripsit, quibus hoc propter intemperstium studium imbecille existit. Non libenter autem Galenus, perplexum imbecillitatis nomen audit, sed acceptius habet, calidum, humidum, frigidum, siccum; unde ipsa imbecillitas oritur: attamen ipse magnam intemperiem

subinde imbecillitatem appellat; aliquando & conualescentium corpora infirma, atque imbecilla nominat (tamen si nullam insignem hic intemperiem, ipso dicente, inuenias) quia scilicet modico sanguine & spiritu præditi sunt. Ita & hic Cornelius Celsus potius capiti vires reponit, quàm aliquam peculiariter temperaturam emendat. Fere autem is caput rarum est, quod & ab externis facile afficitur, & fluxionibus ab infernis partibus opportunum est. itaque hæc fere duo in

F

hoc



hoc prænidet: primò ut nihil ab infernis recipiat; secundo ut ipsum etiam contra externas iniurias bene denset: ubique verò rarefacientia reformidat. Ergo pileum damnat; nuditatem capitis commendat: videtur tamen id non solum contra nostrorum philosophorum consuetudinem, verum etiam Hippocratis, qui præ aliis philosophis tangebatur caput. natura ipsa ad exemplum nos inuitasse videtur; quando & ipsa caput pilis nobis studiosè obsepsit. fecit autem & alia multa natura, non solum ad utilitatem sed & ad decorem; quòd si utroque modo caput pilis circumsepsit, externo auxilio non eget, nisi ubi ipsa deficit. utroque modo Hippocrates excusari poterat, qui præcociter caluus erat. Sed quid de iis dices, qui bene densam adhuc casariam, non simplici sed duplici pileo onerant? non debent ipsi expectare redargutionem Aristotelis, dicentis, illos promptè canescere? nam ipsi diu ante canos sua incommoda experiuntur, dum perperuò caput molle, & effeminatum circumferunt. Eodem modo offenduntur qui aut felinas, aut leporinas pelles in pectore gerunt: neque dubito, quin hodie eiusmodi homines ostentatio potius quam sanitas promouet, nec minus eos damnabis, qui præter necessitatem caput aggrauant. Ego verò miror eiusmodi etiam non & faciem ipsam inuolueri. nec quisquam ista me perturbabit dicere derisionis causa: nam re verè plus periculi videtur imminere internis visceribus à frigido, quam externo capiti ab aère circumfluo: consuetudo tamen seruanda est, aut pedetentim relinquenda. Eadem ratione tonsio exquisitè periculosa est: nam quantum corpus rarefaciat, indicat sequuta pilorum fecunditas. Quòd autem promptius iniuria externa sese insinuet corpori raro, quam denso, nemo est qui ignoret. Sed & conualescentes id ipsum experti sunt, qui hac de causa sæpe fecerunt recidivam. Quòd si sacra prophantis cõparare liceat, & Sampson ille derso capite vires amisit; iterum comatus recuperavit: quantum mysterium in illo quoque loco subsit. Luna autem, præsertim in suo vigore, ut quando cum sole concur-

rit, siue quia caput rarefacit, siue quia sol ipsas humores eo pertrahit, quippe & externis sol plus dominatur: tamen & hunc à cibo cauere oportet, & caput potius ungere quam lauare, quoniam hoc quoque caput infirmius reddit, & plus quam vinctio rarefacit, hac enim sæpe densat. Quòd autem potius ad prunas quam flammam vinctio laudat, generale est; quia vinctio ad flammam melius insinuat, etenim flamma externa nimis citò astringit: tamen ex prunis lentum assum, quam ex lignis viuacem flammam vulgus magis veretur, atque capiti magis suspectum habet: iniquè meo iudicio; nisi assus minor fuerit & diuturnior. Sicuti autem motum à cibo cauere oportet; ita multo magis lectionem, studium aut alteram cogitationem, que maximam & præcipuam studiorum partem obtinet: etenim motus tantum leniter cibum in ventre perturbat, ac nonnunquam ad superiora mittit fumos; aliquando autem retrahit, si tantum lentus fuerit: cogitatio autem, hac sursum prouocat. Sed & balneum facile caput confundit, tamen si tum ipsum, tum ipsius aër, sæpe præsens remedium fuerit ubi ab infernis partibus præsertim ab vniuerso corpore corpus feritur: alioqui ipsum cauere oportet; aut (si forte ex consuetudine est) quam lenissimè aut citissimè relinquere.

### Capiti nihil æquè prodest atque aqua.

AQUA frigida, ut postea dicemus, non tantum capiti, sed & omnibus particulis frigidis per se obest: per accidens autem prodest; scilicet sanis, quos in eodem seruare volumus, inutilis; infirmis autem, quos mutare, utilis: ita enim melius est res ipsas quam nomina distinguere, ne audientem suspendamus: quemadmodum faciunt, qui priori distinctione aut hic aut alibi contenti non sunt. Condensat autem ipsum caput vehementer aqua: quapropter non iam tantum aduersus externas iniurias, sed & ab infernis quoque imperus bene repellit, compescit; nec tantum caput corroborat, sed oculos,

Scribonius Largus compositione 10. Prodest, inquit, cum diu caput dolet, ad eum tondere. Nec negandum est, quin, ut prima quartii ait ille, tonsura capitis poros aperiat, & q. ob id salubris existat: verum, cum rasura densam reddat cutem, prohibet, ne vapores exhalent.



oculos, ut antè diximus, si quis illos in ipsa frequenter imbuat.

**Bibere huic assidue vinum dilutum.**

DECEBAT autem in hac obseruatione, & victum præscribere: quapropter præter alia perpetuum vinum vetat, ne caput alius satis rentet; sed & aquam propter cruditatem reformidat. Itaque vinum dilutum ac lenè consulit, ut forte fortuna tandem contrariam capitis grauitatem, vino familiariter & citra incommodum, disiciat. etenim & dolores oculorum hoc modo Hippocrates

medicatur, & ex vino conceptam grauitatem hoc modo curat, ubi dicit: Quem læsit hesternæ vini potio, crastina curat; modò lenè hoc pondus sit, & citra corporis consensum. Veruntamen vinum molestè tempore aggritudinis ferret, qui ne antè lymphatum quidem bibit. hinc quidem mihi illius verba spectare videntur; nam paulo obscuriora sunt: quippe postea statim, nunc vinum nunc aquam permittit, eadem forte ratione, qua prius vinum dilutum commendat. Reliqua manifesta sunt, quippe quòd vomitus caput offendat; nisi forte ex ipso ventre capitis grauitas oborta sit, ex se patet, alioqui autem alienat.

## CAPUT V.

**De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisque laborant.**

NEQVE verò his solis, quos capitis imbecillitas torquet, vsus aquæ frigidaæ prodest: sed iis etiam, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillæque malè habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum est, sed os quoque multa frigida aqua fouendum est: præcipueq. omnibus, quibus hoc vtile auxilium est, eo vtendum est, ubi grauius cælum Austri reddiderunt. Cumque omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueuerunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam grauedines, destillationesque possunt, si quàm minimè eum (qui his opportunus est) aërem vel loca, aquasque mutet, si caput in se protegit, ne incendatur, nève subitum ex repentino nubilo frigus id moueat, si post concoctionem ieiunus caput radit, si post cibum neque legit, neque scribit.

## COMMENTARIA.

NOS quidem in multis aliis locis diximus contra quosdam ex neotericis, causam destillationis immediatam semper

esse frigidam; calidam autem nunquam: neque enim in aëre pluvia vngquam generatur (cui vni destillatio comparatur) nisi per aëris rigorem;

F 2



rigorem; nam quod aliquid vaporem indensare posset, præter frigus, non est intelligibile. Attamen nunc rationem velis refellere, & illis ex hoc Celsi loco patrocinari, qui audientibus omnibus frigidam laudat. sed non hæc suadet ille in his qui iam distillationem patiuntur, sed quod ab ea præseruare voluit. dictum enim prius est, quod frigida non solum aduersus externas, sed internas quoque iniurias caput pertinax faciat: quapropter vel sub aëstro hæc maxime obseruanda sunt, ubi caput repleti formidamus. Quod autem non his consulat qui iam pariuimus, sed quibus hi affectus reuertunt, tum ex aliis patet, tum ex eo ma-

xime quod omnem morborum curationem ad reliquos libros differt. & tamen per accidens quoque conferre frigida hic posset. Eadem ferè obseruatio est, ubi arteria laborat; quippe raucedine: nam & hæc una ex distillationis speciebus est, & de affectibus aliarum supernarum partium, oris atque similibus. Reliqua prius dicta sunt. Illud autem indistinctè, atque à precedente capite dissentire dictum est, quod vel post concoctionem ieiunio capitis rationem admittat, quippe plus omnino vetuit. si forè autem non simpliciter laudat, sed minus quam post cibum vituperat, ac facilius indulget; forè etiā tempore declinationis id ipsum intelligit.

## CAPVT VI.

*Ad solutam aluum remedia.*

**Q**UEM verò frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusque superiores partes exercere, dum ieiunus est ambulare, vitare solis nimium ardorem, continua balnea, vngi citra sudorem, non vti cibis variis, minimeque iurulentis, aut leguminibus, oleribusve his, quæ celeriter descendunt, omnia denique fugere quæ tardè concoquuntur. Venatio, duri que pisces, & ex domesticis animalibus asfa caro maximè iuuant. Nunquam vinum falsum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neque id ipsum peruetus. Si mulso vti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigida potiones ventrem eius non turbant, his vtendum potissimum est. Siquid offensæ in cœna sensit, vomere debet, idque postero quoque die facere, tertio modici ponderis panem ex vino esse, adiecta vua vel olea, vel ex defruto, similibusque aliis, deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neque intendere animum, neque ambulatione, quamuis leui, dimoueri.

Plin. lib.  
14. cap. 8.  
Tenne,  
Dulce,  
Austerum,  
Plenus.

## COMMENTARIA.

**M**IRVM est qua ratione hoc Caput Celsus hic ascripsit, nam prius aluum lubricum satis medicatus est: quod si ibidem

obiter fecit, satisfacere potuit, quod in secundo commentatus est. Omitto nunc literas & desinibibus (quibus hæc potissimum videntur.



videtur scripsisse) potius astringi ventrem, quam disfluere. Faciunt etiam caput quibusdam suspectum, ea quae de ardore solis dicuntur, & vntione circa sudorem: nam aestus solis potius omnem aliam euacuationem molitur, quam per sedem; nam hanc potius reuellit, dum sudorem pronocat. & propterea Hippocrates tempore aestatis magis vomitum quam deiectionem probat. Quod si ea ratione, qua virtutem, aliquando deicit, ventrem turbet; & hoc quoque frigori magis frequens est: atamen excusari potest; quemadmodum & illud; quod de vntione circa sudorem scriptum est: nam licet contra sudor deiectionem reuellit, forte ex ea vntione solutionem & emolliationem vniuersi corporis possit timere. Diuersa etiam ratio & consilium huius capitis esse potuit: quippe prius ventrem mollem in sanis medicatus est; hic in neutris, ubi magis suspectus est. Prosequamur ergo reliqua ab eo loco, ubi superiores partes exercere consulit, nam motus semper ad se reuellit: itaque & pila non est inutilis; quoniam neque haec tam aequè omnes partes exercet, quin superiores magis fatiget, ergo, è contrario, inferiorum partium motus cauendus est, nam facillimè totum onus quod in ventre est, deorsum traheret: quod si fortè nullum ibidem onus sit, iam non ipsum ventrem turbat, sed excccat, & aliis quibusdam rationibus; magis autem quia excrementa in ambitum corporis discedit, itaq. matutina deambulatio ventrem corroborat; pomeridiana & vespertina lubricat. nec minor huic debet esse victus observatio; etenim in primis omnem varietatem, saltem in vno mense, cauere debet, quoniam promptè hanc deiectionis ventris sequitur; aliquando etiam cholera: quippe varietas ista, ut non percoquitur, ita ab hepate non allicitur, sed in ventre moratur, corrumpitur autem haec varietas maxime, si quidem scilicet etiam praepostero ordine assumantur dura ac deinde lenia: neque tamen à corruptione vindicantur, si ordo seruetur, nam diuersa qualitate seipsa conficiunt: ac natura quoque, quae ea conficere deberet, nonnihil ab eo patitur.

Neque tantum varietatem ipsorum ferulorum vitare oportet, sed ipsius substantiae cruditatem: nam dum haec diutius in ventre atque intestinis morantur, oneratus, atque, ut ita dicam, dedignatus venter deorsum ea precipitat. Quod autem iurulentia, legumina, olera vitare oportet, prima ratione efficitur; quia ferè ea lubrica sunt; praeter paucissima olera, quae virtutem astringentiam habent, ut portulaca: & haec tamen ipsa dum viridis est, inter mollientia postea unneratur. Eadem ferè ratione contingit, quod brassica, sine crambe (iuxta prouerbium) bis cocta atque posita, ventrem stringat; semel, molliat: nam secunda coctione recens illi humiditas extracta est. Conferunt autem è contrario omnes siluestres carnes: quod haec perpetuò domesticis sicciores sunt; sic & pisces qui duram carnem habent, & friabilem, his qui mollem; solis enim siccis per se astringere enenit; calidis autem ac frigidis, per accidens. non operatur autem hanc siccitatem tantum rerum species, sed & ipsa concoctionis diuersitas. hac ratione & assa potius esse oportet, quam elixa. Neque minor debet esse in potu observatio: etenim studiosissime illius copiam vitare oportet: ubi verò bibendum est, non cernisia, non vinum tenue, ac dilutum, aut dulce, sed plenum, ac vinosum, anserum quoque bibendum est: nam illa omnia ventrem molliunt dum humectant. ita & vetera vina dum in acidam facultatem degenerauerunt, non aliter quam acetum ac cholera ipsa, ventrem vellicant. Ergo neque mulsam bibere oportet; id enim antiqui ferè ex musti partibus duabus, & mellis vna composuerunt, saltem mel perpetuò admixtum habet: quare si quis eo vti velit hoc tempore, erit satius ipsum ex melle prius cocto facere; ita enim minus flatulentum reddetur, ac lubricum. Nec tantum facultatem istorum spectare oportet; nam & hoc plurimum refert, sub qua qualitate exhibeas. confert autem semper his quaecunque quam frigidissimum bibere, etiamsi vinum fuerit, nisi venter facile turbetur: ut si quis ex natura frigidus, vltro, vel statu-



lentus est, non frigidissimum magis com-  
petit: numquam autem repidum, quamuis  
ita hodie abusus habet; emollit enim uniuersum  
ventrem. Potes etiam hoc loco per frigi-  
das potiones, & aquam intelligere; nam  
& hæc nonnihil ventrem aliquando corro-  
borare potest. quum autem prius ea quæ  
tarde coquantur, suspecta habuit, hinc nunc  
vomitus à cæna iis consulit, qui aliquid of-  
fense senserunt: scilicet siue ob multitudi-  
nem, siue ob cruditatem grauatus sit, ven-  
ter fluctuet, murmuret, tremat, vel aliter  
vacillet, aut solito plures ructus edat; quippe  
hæc omnia cruditatem indicant, aut malum  
ventris complexum. Verum igitur ne per  
ventrem, totum onus precipiteur, præstat  
in contrarium vomitu renellere, non sine ob-  
seruatione in sequentibus diebus: non enim  
subito à vomitu ad crapulam, & consuetu-  
dinem redendum est. sed & illo die, atque  
altero quoque frugaliter viuendum. vnicui-  
que iuxta discrimen consuetudinis: nam  
tanta sobrietas quantam hic præscribit, no-  
stratibus non conuenit; sed tantum iis qui

alioqui sobrii esse consueuerunt. Sed neque  
tertio die quemuis cibum assumere oportet,  
sed eum qui nonnihil facultatis astrictoria  
obinet: ut integram vnam passam, nam  
caro illius lubrica est. Consulta est & olea,  
si eam intelligas, quæ in muria seruatur &  
colymbadis nomen accepit; non autem dru-  
pam, nam hæc aut parum aut nihil astri-  
ctoria facultatis habet: sed & colymbades  
ventrem movent, non per se sed ratione con-  
dimenti. Ergo vnam hanc vel oleam po-  
tius ex defruto quam sapa accipere conue-  
nit: nam longè minus quam sapa lubricat,  
quoniam plus quam sapa ad dimidium de-  
coctum est; utrumque tamen ex musto fit.  
Quod in fine sequitur, obscuritatem non ha-  
bet; nisi quod animi intentio nihil incom-  
modare lubrico ventri videtur; nam contra  
potius renellit: attamen quatenus concessio-  
nem, ut prius diximus, interturbat, ventrem  
quoque nonnihil tandem mouere potest; nam  
quo minus venter coquit, eo magis diffinit.  
hoc (puto,) nec aliud, Cornelius noster in-  
tellexit.

## CAPVT VII.

*Remedia ad coli dolorem.*

**E**T SI laxius intestinum dolere consuevit (quod *κωλον*  
nominant) cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agen-  
dum est, ut concoquat aliquis, ut lectione, & aliis generibus  
exerceatur: utatur balneo calido, cibis quoque & potionibus  
calidis: denique omnimodo frigus cuitet, item dulcia omnia  
leguminaque, & quicquid inflare consuevit.

## COMMENTARIA.

**L**AXIVS nunc intestinum appella-  
uit colon, quod ceteris laxius sit. Con-  
sistit autem & in ileo similis dolor; mollior  
tamen ac breuior, quamquam suspicentur  
neoterici contrarium. sed & de his alibi  
multa. Duo tantum hic adicere oportet,  
ad præcautionem istorum dolorum non pa-  
rui conferentia, cinguli angustiam, atque

alii esum: nam iis duobus etiam restatur  
multos vicisse vehementissimos circumsus;  
non enim consueuerunt antiqui adeo prom-  
ptè ad solutinos clystres confugere, ut ho-  
die moris est. quippe & ipse Galenus solo  
clysteri acri, hoc est, incisivo, aut solo oleo  
rutaceo, in hoc morbo vti consuevit; de quo  
alibi.

## CAPVT



## CAPVT VIII.

*Quæ agenda sint stomacho laborantibus.*

**S**i quis verò stomacho laborat, legere clarè debet: post lectionem ambulare: tum pila, vel armis, aliòve quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri: non aquam, sed vinum calidum bibere ieiunus: tum cibum bis die assumere, sic tamen vt facilè concoquat: vti vino tenui, & austero, & post cibum frigidis potionibus potiùs. Stomachum autem infirmum indicant, pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in ieiuno dolor capitis. Quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum vtiq; nostris est, qui cùm in aduersa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniũ in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tardè concoquunt, & quorum ideo præcordia inflantur, quĩve propter ardorem aliquem noctu fitire consueuerunt, antè quàm conquescant, duos, trẽsve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam aduersus tardam concoctionem clarè legere, deinde ambulare, tum vel vngi, vel lauari assiduè, vinum frigidum bibere, & post cibum magnam potionem, sed (vt supra dixi) per siphonem, deinde omnes potiones aqua frigida intercludere. Cui verò cibus acefcit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, & vomere. At is cui ex hoc frequens deiectione incidit, quoties aluus ei constiterit, frigida potione potissimum vtatur.

## COMMENTARIA.

**I**n fine huius capituli, bis medicatur stomachum, hoc est ventrem: primo frigidum; secundo calidum. periculum ergo est, ne bis idem in eodem capite audiatur; nisi quispiã in principio capitis stomachum propriè pro superiore ventris osculo audiat. Fortè etiam in prima capitis parte dolorem discunt; in secunda verò ac tertia, concoctionem corrigi, prout frigido immutatur.

vel calido: ac qua in tota prima parte scribit, nisi quòd forte agere feret ipsum ieiunio indulgere vinum: potes autem coniectare, quòd antè respondimus; non enim subito vinum modicum articulos tentat, ed quòd tantumquam medicamentum recipiatur, sed immò dicunt. Maior est obscuritas in iis verbis: Neque credendum vtiq; nostris est, qui quum in aduersa valetudine,



dine, vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniū in accusationem non merentis stomachi habent. Videtur autem mihi eos breuiter recriminari, qui fortè ex intemperantia vitæ stomacho affecti, gementium stomachi intemperamentum male accusant pro ipsa incontinentia.

At qui tardè concoquunt &c:

HÆC est secunda huius capitis pars, qua frigidum stomachum emendat, ex quo (quod mirum est) ardor & sitis aliquando suboritur. itaque si modica ac toleranda est, superdormire oportet, inquit Hippocrates; si autem magna, theorema medicinale est, intemperiem ac defectum potu restringere. ita quidem Galenus consuluit. Quomodo bibendum esset, ipse Celsus adiecit: Per tenuem, inquit, fistulam vel siphonem, non affatim sed paulatim demittere. Videtur autem hoc pugnare cum eo quod prius

diximus, magnam sitim optimè in febris dilui vniuerso potu simul affuso. verum in febris vniuersum corpus incensum est; hæc autem sitis à supremo ventris osculo oritur: quod melius delinitur paulatim exucta vniuersa potione, quam affatim affusa. Lætionem etiam (matutinam scilicet, non autem pomeridianam,) ad concoctionem laudat; quia præsertim supremas partes exercet atque corroborat.

Cui verò cibus acescit, &c.

NOVISSIME ventrem calidum medicatur: sæpe enim cibos hic corrumpit; præsertim faciles ac calidos; idq; verbum acescit audire oportet pro, amarescit: nam si propriè audias, nihil tali ventri magis inutile quam aqua frigida. fortè verò ita verbo acescit vsus est, ex opinione antiquorum medicorum, qui acidum saporem per caliditatem fieri arbitrabantur: quos Galenus refellit libro quarto (si rectè memini) de simplicium facultatibus.

## CAPVT IX.

*Quid obseruandum sit dolore nervorum laborantibus.*

SI cui verò dolere nervi solent (quod in podagra, chira-græve esse consuevit) huic quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, obiciendumque labori & frigori, nisi cum dolor increuit. Sub \* dio quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio (sicut in omnibus corporis affectibus) necessaria est. Cruditas enim id maximè lædit, & quoties offensum corpus est, vitiosa pars maximè sentit. Vt concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui: vulneri, præcordiis, intestinis, vesicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus ossibus, dentibus, nervis, vuluæ, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores,



rores, tremoresque nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis, erectiorque mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua verò frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis, doloribusque qui sunt sine ulceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adiuuat omnia quæ frigus infestat. Item lippientes si nec dolor, nec lacrymæ sunt. Nervos quoque qui contrahuntur, præcipueque ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit, urinam mouet. Si nimius est, corpus effœminat, nervos emollit, stomachum soluit. Minimè verò aut frigus, aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolores, aliaque vitia: frigida aqua strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

## COMMENTARIA.

**PODAGRA**, chevagra, & similes articulorum morbi, ex his sunt qui literatis quoque aut certè urbanis supervenire consueverunt: etenim hi morbi non nisi molles & effœminatos sequuntur: nam qui ex penuria accedunt, nunquam peculiarem aliquem locum delignant, sed uniuersos simul articulos (dicente Galeno) ferè affligunt: podagra verò & chiragra ferè ob tres generatim causas eueniunt: intemperstiam Venerem, immodicam crapulam; aliquando autem ob articulorum aut genuinam, aut adscititiam imbecillitatem: quam non parum promouet otium; nam articuli sua natura frigidi sunt, ac ab hoc situ promptè languescunt. neque minùs partem infirmam, qui ipsam multis ouerant: nam reuera calorem exolunt, tantùm abest ut partem corroborent; quippe calor digerit, frigus vnit; ergo molliem tollere oportet. E contra, pars ipsa frigori subinde obliuenda; non eo quidem tempore quo languet, sed quo valet maximè exercenda: quod si fieri non licet, saltem frictio ex sale vel aqua ardente negligenda non est; nequaquam enim

calor iste, ut qui à multitudine vestium suscitatur, mollis est ac languidus, sed siccus. Quòd si præter hæc fastidita crapula sobrietatem seruare possit atque legitimam concoctionem; non dubium est quin raro paroxysmus recurrat: nam ferè in corpore euenit, quod in republica, ut semper onus aliarum partium detrudatur in viliorem atque imbecilliores. Sed raro paucissimi ex his præseruantur; quoniam non nisi effœminati ferè sunt, qui eiusmodi vitiis corripuntur: qui mallent singulis annis semel morbum atque dolorem pati, quam diu sobrie, ac frugaliter benèque vivere; digni profectò suo parui homines.

Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrat.

**CALIDI**, frigidi externi, atque interni commoda & incommoda satis late in Aphorismis demonstramus: etenim frigus inimicum est generatim omnibus frigidis, omnibus tenuibus, atque ulceratis; quia licet ab internis abstineat, ulcerata tamen mordet. ad concoctionem autem, ac deinceps

G.

omnia



omnia opera animalia; prodest si cauentur, hoc est non nisi modice admittatur: per accidens autem prodest, & articularum, & nervorum sine ulcere doloribus; dum calorem renocat, iuxta eas conditiones quas in Aphorismis & alibi praescripsimus. Circa corporis extrema varie sese habet; nam lenius frigus aut non admodum diuturnum, calorem subinde meliorem aduocat; alibi autem nunc pallidam, nunc lividam, aliquando nigram cutem reddit: pallidum autem appellat, non ut hodie recentiores, sed ut vulgus ipsum inaudit; sic & prius. Male vero hic legitur, Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant; pro eo quod suspicor (Item rubicundis inflammationibus si ulcere vacant;) nam & hoc consentit cum Hippocrate in quinto Aphorismorum, unde haec pleraque Cornelius Celsus desumpsit.

Calor autem adiuuat omnia.

Quæ de calore dicuntur, ex iis quæ de frigore diximus, manifesta sunt; excepto principio, ubi lippientius commendat si dolore quidæ ac lacrymis vacent, vocat autem lippitudinem non vulgariter, sed more medicorum, inflammationem in oculo: atque hæc duplex est; aliquando enim cum eidenti foras defluxu; aliquando vero sine eo: nam si rarius coöperculum, vel ex corporis vel ex circumstantiæ aeris natura obtigerit, ferè manifesta defluxio visitur. Igitur frigidum non admonebimus, veriti ne particulam ipsam plus satis astringamus. Cur autem & dolorem secludat, nescio; etenim citra dolorem, quomodo lippitudines ista esse possint? credo quod & hic sine ulcere legendum sit; nam hoc cum plurimo dolore esse solet: nos tamen integram lectionem retinere maluimus.

## CAPVT X.

### Observatio in pestilentia.

EST etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, nauigare. Vbi id non licet, gestari, ambulare sub diuo, ante æstum leniter, eodemque modo vngi, & ut supra comprehensum est, vitare fatigationem, \* crudelitatem, frigus, calorem, libidinem, multoque magis se continere, si qua grauitas in corpore est: tum neque manè surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum, neque ieiuno, neque cœnato vomendum est. Neque mouenda aluus, atque etiam si per se mota est, comprimenda est. Abstinendum potius, si plenius corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque antecessit, qui tamen semel die tunc commodius assumitur: insuper etiam modicus, ne crudelitatem moueat. Alternis diebus inuicem modò aqua, modò vinum bibendum est. Quibus seruatis, ex reli-

\* crudelitatem,



ex reliqua victus consuetudine, quàm minimum mutari debet. Cum verò hæc in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maximè, quam Austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, vbi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel vbi in graues regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit, vtique abstinere debebit. Atque ita ab vino ad aquam, ab hac ad vinum eo, qui suprà positus est, modo transitus ei esse.

## COMMENTARIA.

VTISSIMUM est ærem pestilentem quàm longissimè fugere: sed non nunc id suadet Celsus; sed diuersa exercitiorum genera, vt nulla pars relinquatur ociosa, quæ clam suo situ venenum alere possit. Secundò omnem excessum cauere oportet; maximè autem libidinis: quia hæc corpus maximè emollit, exoluit & putredini obnoxium reddit; quippe spiritum affatim euacuat, qui corpus regit, ac veges sustinet: videtis enim vt corpus destitutum spiritu, ac mortuum promptè corrumpatur. Neque multo minùs plenitudo cauenda est, ac cruditas; nam infissimam concoctionem observare oportet. Ergo neque nudis pedibus obambulandum est, quia hoc concoctionem infirmit: & si qua prius in corpore granitas fuit, domi sese continere oportet, donec cruditas ipsa perficiatur. quippe motus, vt diximus, concoctionem moratur. Confert igitur & sobrius esse, ne quid imperfectum relinquatur, & semel tantum in die cibum capere, quippe in cæna; ne fortè concoctio in die interrumpatur, vel alioqui alius excessus admittatur. Rectè igitur somnus meridianus (praesertim à cibo statim) interdicitur: nam, vt ante diximus, ipse quoque concoctionem corrumpit. & vitrumq. cum obseruatione hodierna pugnat: nam & hæc ientaculum habet, & cibum quàm plenissimam comprobatur; quoniam & Auicenna ipse dixit, Tantum euadunt qui viriliter bibunt, & comedunt. neque hoc multum abest à mente Galeni, vt alibi diximus, ne fortassis recentiorum Auicennam asperneris. Verùm hæc illorum præ-

cepta non ad ipsam obseruationem, ac præcautionem, sed præsentem affectum pertinent: neque etiam corpus integrum præter consuetudinem ientaculum desiderat; sed penuria affectum atque indigum: nam & id auidius omnem ærem allicit, etiam malum; quapropter ipsum replere oportet. Huc fortè pertinet quod vulgo dicitur, Quod intrus est prohibet extraneum: quippe interna mediocritas non facile admittit externam copiam. Magis autem ab omnibus his discedit, quàm phlebotomiam, purgationem, vomitum prohibet, atque etiam si quid horum vltro accesserit, astringit. nam in hac obseruatione hodie in his nihil est communis, quàm subinde singulis diebus pilulas aliquot deglutire, atque hos fortè postea non laudabimus: non tamen Galenum contemnere possumus, qui corpora humida exiccavit, sicca humectavit, plena euacuavit, & impura purgavit: quid ergo dicemus? quod Celsus ista, tanquam Asclepiades alter, temerè abstulit? nequaquam. nam illa in corporibus neutris ac insalubribus Galenus dumtaxat obit. Celsus verò integrum corpus accepit, quod nullam immutationem admittit. Verùm & si modicè plenum, aut impurum fuerit, neque hic neq. alibi (dicente Galeno in Therapentica,) statim ad phlebotomiam aut purgationem fugiendum est: Subinde enim, inquit, probè satis facit exercitium; aliquando inedia. quanto religiosius hic in euacuationibus sobrii esse debemus, vbi omnibus modis, viribus studendum est, quæ per euacuationes cum spiritu nonnihil exoluntur?



Macrobius  
vinum lim-  
phatū ideo  
commēdat,  
quod cor, ce-  
rebrum, he-  
par à quali-  
bet putrefa-  
ctione vene-  
nosa præfer-  
uat: & ut  
veneno ma-  
gis resistat,  
laminā au-  
reā in ipso  
exinguit.

Benè ergo & hic dictum est ab auctore no-  
stro, etiam abstinendum potius esse si  
corpus plenius fuerit, quam enacuan-  
dum. Eadem ratione & balneum veteretur,  
& sudoris profusum, atque his observatis,  
nihil in reliqua consuetudine variare per-  
mittit; nisi quod invicem modò aquam,  
modò vinum consulit: fortè tamen & di-  
lutum vinum permitteret; nam aqua conti-  
nua, cruditas; vinum verò perpetuum,  
caliditatis periculum minatur: contra verò  
vicissim maxime confirmat: nam vinum  
putredinem; aqua verò inflammationem  
discutit: ergo & vicissitudo ipsorum magis  
quam confusio expedit.

### Cum verò hæc in omni pestilentia.

Hæc est gravissima pestilentia: etenim  
multo mitior est quam tantum hominum  
afflatus attulit; quippe illa multo univer-  
saliore, neque tantum istam observationem  
præfens pestilentia desiderat, sed & quavis  
gravis constitutio, unde hæc imminet. Ma-  
ximè autem eam observare debet, qui sub eo  
ambulat, aut peregrinatur: nam is eiusmodi  
aërem nullo modo vitare potest; & is qui  
domi manet, domesticum aërem studio me-  
liorem reddere potest. Ergo & in gravibus  
regionibus (præsertim si quis recens in eas  
venerit) eadem cautio adhibenda est; atque  
eo modo invicem modò vinum, modò aquam  
bibere decet, & si quam gravitatem sense-  
rit, donec percocta fuerit, sese continere at-  
que abstinere. Talis est observatio tum in  
his tum in peste, quæ aliquando febrem con-  
iunctam habet, aliquando autem sine ea

contingit, & tamen nihilo priore mitior.  
Sed nondum cum neoterici diariam ali-  
quam febrem pestilentem ponimus: nam &  
contra Galenum est in libro primo De diffe-  
rentiis febrium; & contra rationem, quæ  
nihilò facilius diariam admittit inter pesti-  
lentes, quam inter putridas, ac nos de iis  
alibi. Nunc verò observationem quam cepi-  
mus, prosequi oportet. quæ otiosa, ieiuna, &  
admirabilis, ac omnino ridicula, iis (non du-  
bito) apparebit, qui in recentioribus Arabibus  
ac barbaris versati sunt: apud quos nihil  
magis audies, quam pilulas varias, amule-  
ta, alexipharmaca, quæ etiam bezearthica  
barbari appellant, quam salubriter verò hæc  
ab illis descripta sint, alij æstiment: omnia  
enim hæc eccellente quadam facultate do-  
tata sunt, quæ in mediocribus atque integris  
vehementer suspecta est, in quibus & quævis  
alium excessum atque mediocritatem prius  
verebamur; nedum hanc. Ergo nisi in  
impuris corporibus, aut iam sub venenato  
aëre versantibus, exhibenda sunt: nimirum  
quæ media sunt inter salubria, atque into-  
xicata, quibus opportunè accommodatur au-  
xilium, aliis autem venenum: quippe neque  
Galenus Armenum bolum (quantumcumque  
ab omni evidenti excessu semotum) aliis pro-  
pinat, quam iam laborantibus. Atque hæc  
precor mecum alij cogitent: ne fortè quos  
vindicare volumus, maiori officinas discri-  
mine. nam antiqui ista alexipharmaca non  
ignoraverunt: & tamen ad præfervationem  
in corporibus firmis, extra conditionem pe-  
stilentem, ea non commendaverunt; soli  
neoterici ista faciliatunt.

### Finis Commentariorum D. Hieremiæ Driuerij in primum Cornelij Celsi librum.



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
L I B E R S E C V N D V S ,  
D E C A V S I S S I G N I S Q V E  
C O M M V N I B V S E T A V X I L I I S ,

A B A L D V I N O R O N S S E O *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

P R O O E M I O N .



I N S T A N T I S autem aduersæ valetudinis  
signa complura sunt. In quibus explican-  
dis non dubitabo auctoritate antiquorum  
virorum uti, maximeque Hippocratis:  
cū recentiores quoque Medici, quam-  
uis quædam in curationibus mutarint,  
tamen hæc illum optimè præfagisse fa-  
teantur. Sed antequam dico, quibus præcedentibus mor-  
borum timor subsit, non alienum videtur exponere, quæ  
tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis,  
qualia corpora maximè tuta, vel periculis opportuna sint,  
quod genus aduersæ valetudinis in quoque timeri maximè  
possit. Non \*quòd non omni tempore, in omni tempestatum \*quòd  
genere, omnis ætatis, omnis habitus \*hominum per omnia \*homines  
genera morborum & ægrent, & moriantur: sed quòd fre-  
quentiùs tamen quædam eueniant. Ideoque vtile est scire  
vnumquemque, quid, & quando maximè caueat.

B A L D V I N I R O N S S E I

E N A R R A T I O .

C A P T A T Celsus hic non secus, ac in ipso statim initio sese dicturum pollicetur,  
præcedenti libro, per occupationem que quibusvis non solum vtilia, sed &  
quandam, auditoris beneuolentiam: atque cognitu necessaria sint: vtile est enim vnum-  
cui quodammodo attentum reddit, dum in quemque scire, ut dicit, quid & quando  
maximè

G 3



maximè caueat. & quum homini nihil vitiosius, nihilque magis expetendum sit, quàm ut omnia corporis munia quàm rectissimè obeantur; & si ea aliqua parte lesa sint, quàm fieri potest ocysimè restituantur; promittit se signa aduersa valetudinis futura enarraturum: ut iis cognitis, omnem nostram operam impendamus ad id quod deest restituendum, (est enim, ut postea ex Hippocrate docet, medicina additio, & subtrahitio) & quod superest demendum, subtrahendumque; ac proinde, valetudinem quàm longissimè seruare incolumem: & deinceps, si eo iam ventum sit, ut lesis functionibus naturalibus & animalibus, contingat hominem malè valere atque agrotare; tum demum, quæ stem, quæne metum polliceantur, sese dicturum spondet. Atque post omnia quibus modis ægrotis subueniendū sit, edocet: Siquidem chæurgicen, atque pharmaceuticen nobis ob oculos ponit, dum phlebotomia, frictionis, vntionis cucurbitularumque mentionem facit. Dieteticen autem ita absoluit, ut nihil melius, nihil exactius, nihilque quod in eà desiderare possis, reperiri queat. Nam præterquam quod clarè satis disseruerit, quando cibandum, ac rursum quando à cibo abstinendum, omnium etiam eduliorum facultates; insuper quæ multum, quæ parum nutrant, quæ ἐξόπεια, quæ

περὶ ὕπνου, quæ res stomacho amica, aut aliena sint, fusissimè explanat. Idg, se non ex vulgi aut quorumvis qui rem medicam profitentur opinione, sed ex antiquorum medicorum præcipuèque medicinæ parentis antiquissimi Hippocratis placitis facturum, ut maiorem dictis auctoritatem conciliet, pollicetur: ne videlicet, aut bullatas nugas aut aniles fabulas lectori proposuisse videatur. Nam quantumvis, inquit, recentiores nonnulli medici, sicuti Asclepiades, eiusque sequaces, relicta Hippocratis curatoria methodo, nouo quodam ordine Therapeuticen aggressi sunt: ad vnum tamen omnes in signis causisque salubribus insalubribusque Hippocrati subscribere coacti sunt; quod & verissima, & rationi quàm maximè consona dixerit. Quare quum Hippocratis potissimum auctoritate hoc secundo libro in signorum enarratione usus sit Celsus; id quoque nobis faciendum restat, ut ex eodem locum loco interpretemur: & si quando (quod frequentius quàm volumus nobis usu venit) senem illum Coum non satis reddiderit, atque ab illius sententia recesserit, virisque conciliandis studeamus, expunctis quæ calcographorum incuria redandabant, aut additis, quæ desiderabantur; aut pro substitutis quæ vera germanaque sunt, restitutis.

## CAPVT I.

*Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora vel tuta, vel morbis opportuna sint: & quod valetudinis genus in quoque timeri possit.*

**I**GITUR saluberrimum ver est, proxima deinde ab hoc hiems, periculosior æstas, autumnus longè periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimæ æquales sunt, siue frigida, siue calida: pessimæ, quæ variant maximè. Quod sit, ut Autumnus plurimos opprimat. Nam ferè meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis simulque etiam vespertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde meridianis



meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed  
 ut eo tempore id maximè sit, sic quandocumque euenit, no-  
 xium est. Vbi æqualitas autem est, tamen saluberrimi sunt  
 sereni dies, meliores pluuij, quàm tantùm nebulosi, aut  
 nubili, optimique hieme qui omni vento vacant: æstate qui-  
 bus Fauonij perflant. Si genus aliud ventorum est, salubrio-  
 res Septentrionales, quàm Subsolani, vel Austri sunt. Sic ta-  
 men, ut hæc interdum regionum sorte mutantur. Nam ferè  
 ventus ubique à mediterraneis regionibus veniens salubris, à  
 mari grauis est. Neque solum in bono tempestatum habitu  
 certior valetudo est, sed priores morbi quoque (si qui incide-  
 runt) leuiores sunt, & promptius finiuntur. Pessimum ergo  
 cælum est, quod ægrum fecit, adeo ut in id quoque genus,  
 quod natura peius est in hoc statu, salubris mutatio sit. Ætas  
 media tutissima est, quæ neque iuuentæ calore, neq. senectutis  
 frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adoles-  
 centia magis patet. Corpus autem habilissimum quadra-  
 tum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa statura,  
 ut in iuuenta decora est, sic matura senectute conficitur.  
 Gracile corpus, infirmum: obesum, hebes est. Vere tamen  
 maximè quæcunque humoris motu nouantur, in metu esse  
 consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustulæ, profusio san-  
 guinis, abscessus corporis, quæ ἀποσμήματα Græci nominant,  
 bilis atra, quam μάλα γχολίαν appellant, insania, morbus co-  
 mitialis, angina, grauedines, destillationes oriri solent. Hi  
 quoque morbi qui in articulis, neruisq. modò vrgent, modò  
 quiescunt, tum maximè & inchoantur & repetunt. At æstas  
 non quidem vacat plerisque ab his morbis, sed adiicit febres,  
 vel continuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alui de-  
 iectiones, auricularum dolores, vlcera oris, canculos, & in cæ-  
 teris quidem partibus, sed maximè obscœnis, & quicquid  
 sudore hominem resoluit. Vix quicquam ex his in autum-  
 num non incidit: sed oriuntur eo quoque tempore febres  
 incertæ, lienis dolor, aqua inter cutem, tabes, quam Græci  
 φθίσιν nominant: vrinæ difficultas, quam σφραγισίαν appel-  
 lant: tenuioris intestini morbus, quem εἰλεον nominant. Fit  
 item

Pluuij,  
 Nebulosi,  
 Nubili.

Corpus qua-  
 dratum.

Febres in-  
 certæ.



item lauitas intestinorum, quæ λειψτελα vocatur, coxæ dolores, morbi comitiales. Idemque tempus & diutinis malis fatigatos, & ab æstate tantum proxima oppressos interimit, & aliis nouis morbis conficit, & quosdam longissimis implicat, maximeque quartanis, quæ per hiemem quoque exerceant. Neque aliud magis tempus pestilentia patet, cuiuscunque ea generis est, quamuis variis rationibus nocet. Hiems autem capitis dolores, tussim, & quicquid in faucibus, in lateribus, in visceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim mouet, fauces exasperat, ventrem astringit, urinam supprimit, horrores excitat, item dolores lateris & pectoris. Sanum tamen corpus spissat, & mobilius, atque expeditius reddit. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum soluit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum. Cæteri venti quod vel huic vel illi propiores sunt, eo magis vicinos his illisve affectus faciunt. Denique omnis calor & iecur, & lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus modò neruorum distentionem, modò rigorem infert, illud πασμὸς, hoc τέτανος Græcè nominatur: nigritiem in vlceribus, horrorem in febribus excitat. In siccitatibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio neruorum, quam παρὰ λυσιν Græci nominant. Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales antè præcesserint. Si hiems sicca Septentrionales ventos habuit, ver autem Austros & pluuias exhibet, ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, ideoque præcipuè in mulieribus. Si verò Austri, pluuiæque hiemem occuparunt, ver autem frigidum & siccum est, grauidæ quidem <sup>matrum</sup> foeminae, quibus \* dum adest partus, abortu periclitantur. Hæ verò quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt. Cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, grauedines, atque destillationes malè habent. At si à prima hieme Austri ad vltimum ver continuarunt, laterum dolores & insania febricitantium,



citantium, quam *φρίγην* appellant, quàm celerrimè rapiunt. Vbi primò calor à primo vere orsus, æstatem quoque similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas Aquilones habuit, autumno verò imbres, Austrique sunt, tota hieme quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes, oriuntur. Sin autem autumnus quoque æquè siccus, iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit: Durioribus verò instare possunt & aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur. Quod ad ætates verò pertinet, pueri, proximique his, vere optimè valent, & æstate prima tutissimi sunt: Senes æstate, & autumnii prima parte: iuvenes hieme, quiq; inter iuuentam senectutemque sunt. Inimiciior senibus hiems, æstas adolescentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut infantes, tenerosq; adhuc pueros serpentia vlceratoris (quæ *αφθας* Græci nominant) vomitus, nocturnæ vigiliæ, aurium humor, circa vmbilicum inflammationes exerceant. Propriè etiam dentientium gingivarum exulcerationes, distentiones neruorum, febriculæ interdum, alui deiectiones, \* maximeque caninis dentibus orientibus malè habent. Quæ pericula plenissimi cuiusque sunt, & cui maximè venter adstrictus est. At vbi ætas paulum processit, glandulæ, & vertebrarum quæ in spina sunt, aliquæ inclinationes: strumæ, verrucarum quædam genera dolentia (*αρεγχόρδορας* Græci appellant) & plura alia tubercula oriuntur. Incipiente verò iam pube, ex iisdem multæ & longæ febres, sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis pueritia primum circa quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neque pubertate, neque primis coitibus, neque in fœmina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabique maximè obiecta est, fereque

H

iuuenes

\* maxil-  
læque



iuvenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, infania, sanguinis per quædam etiam velut ora venarum (*αιμορροϊδες* Græci appellant) profusio. In senectute spiritus & vrinæ difficultas, grauedo articulorum, & renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus (*καχεξια* Græci appellant) nocturnæ vigiliæ, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueque soluta aluus, & quæ sequuntur hanc tormina, vel læuitas intestinorum, cæteraque fusi ventris mala. Præter hæc graciles, tabes, deiectiones, destillationes. item viscerum & laterum dolores fatigant. Obesi plerunque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoque sæpe moriuntur. Quod in corpore tenuiore vix euenit.

## ENARRATIO.

## Saluberrimum ver est.

**C**LARIVS Hippocrates ver saluberrimum, ac morbis qui mortem afferant minimè obnoxium pronunciauit: nam alioqui, si quis saluberrimum simpliciter & citra exceptionem, ut Celsus noster, dixerit; ex professo sibi ipsi contradicere videbitur: nam paulo post, omnes quotquot sunt morbi, ex fusione non solum sanguinis, sed reliquorum deinceps humorum, atque eos qui hereditario iure soboles innadunt, statisque temporibus accessiones faciunt, verno potissimum tempore exacerbari dicit. Ita ut si aliis conseratur, Celso non rectè saluberrimum, hoc est, minimè morbiferum dictum videatur; nisi saluberrimū, minimè morbiferum, quemadmodum Hippocrates quoque interpretatur, intelligamus. quanquam, si quis simpliciter ver saluberrimum, hoc est, minimè morbiferum, dicere velit; citra calumniam id facile possit: quando ver (ut Galenus latius libro suo De temperamentis docet,) temperatum, neque sicut quidam suspicabantur, calidum & humidum, sit. Ac proinde, quum ad morbi generationem, alicuius intemperiei excessus requiratur; ver (quod omnis excessus ac dyscrasia expers sit)

nullos ex se procreaturum morbos; verum si quod tandem genus morborum sit, quod verno tempore innadere atque accessiones suas potissimum facere dicimus; id non tam veri, quam corpori quod sortitur male affectum & impurum, acceptum ferendum.

## Proxima deinde ab hoc hiems.

**C**ONSTITVIT veri proximā hiemem, quod videlicet calor innatus tunc plurimus est; cuius substantia, ut auctor est Hippocrates, tempore æstivo dissoluitur atque dissipatur. quod & voluit idem senex Aphorismorum primo, sententia xv. Ventres hieme & vere natura calidissimos definiens: quare per ea quoque tempora alimenta copiosiora exhibenda esse; calorem etenim innatum tunc plurimum esse. Per ventres non solum ventriculum intelligens, verum etiam cavitatem totam, in qua intestina & alia instrumenta concoctioni seruiunt, continentur. Quum igitur calor innatus, omnium operum naturalium causa sit, ut rectè monet Galenus, necessarium erit hyberno tempore in corpore animalis omnia rectè administrari. cibi enim in ventriculo optimè concoquuntur, quod calor innatus plurimus



plurimus sit, superfluitatēque in somnis longioribus expurgantur, quae quidem exquisitae extenuantur per cutem; quae vero in vapores convertuntur, per expirationem; quae vero sufficientem habent crassitudinem, per urinas: in his enim plus est sedimenti, quam per astatem; praeter id etiam, quod tota urinarum multitudine sufficienter augetur. Quae omnia quamvis quam maxime ita sese habeant, videtur tamen ex diametro hisce contradicere Aristoteles libro Problematon primo, eā videlicet Quaestione quā rogat, Cur per hiemem, minus quidem quam per astatem, sed perniciosius agrotatur: ubi hieme non nisi gravissimis quibusque de causis corpus affici dicit; astate autem lenissimis: & per consequens, quo causa graviores, eō morbos esse vehementiores; ac proinde quod tempus anni vehementiores morbos inferat, eō etiā periculosius dicendum. Verum quando aestivi morbi ferē acuti sint, atque a putredine originem suam magna ex parte trahant (quanquam sint pauci admodum, qui hieme perniciosius affligant) rectē tamen astatem hiemi postpositum Celsus: neque enim salutrem omnino definit hiemem, utpote quae in humiditate & frigidityate excedat; sed astatem tantum praetulit, quod videlicet calor innatus sub id tempus dissipetur ac dissolvatur. At autumnus, omnium periculosissimus est; idque sua inequalitate: nam meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis, simul etiam vespertinis frigus est: Quare non iniuriā Hippocrates, autumnum acutissimos simul & exitiales morbos fieri auctor est; idque vel ob antedictas causas, vel quod (ut docet Galenus) aestivum tempus subsequitur; in quo multis quidem humores absunt, praeterea vires debilitate: quibus omnibus cum autumnarum accedit, quod quum verno ac aestivo tempore humores ad cutem movebantur, ac dissolabantur; ab ambientis iam aeris frigidityate, ad interiora trahuntur pellunturque retrorūdi seroque suo spoliati a praecedente aestu.

Si genus aliquod ventorū est.

SALUBRITATEM aquiloni inter re-

liquos potissimum assignat ventos; quod quum frigidus sit & siccus, omnes corporis superfluitates consumat, roburque addat ipsis instrumentis; eō quod astringit ac in unum cogit, densando nimirum substantiam: quod voluit Hippocrates, eo Aphorismo quo dicit, Quotidianas constitutiones aquilonias, corpora densare, contendere, bene mobilia reddere, coloratiora & melius audientia facere. Nam & ventres hiberno tempore melius concoquunt, ac naturalia munia rectius obtinent, calore innato auctiore reddito ab aeris ambientis frigidityate; qui dum cutem constringit, naturalem calorem repellit, & in profundo corporis concludit, atque adeo eundem roborat atque auget. Austri autem, cum ex diametro cum aquilone pugnet, insaluberrimus ut sit necesse est: nam qualis qualis tandem sit, hoc est siue humidus siue siccus sit, corpus resoluit ac spiritus dissipat. humidus enim austri sua qualitate putredini corpora obnoxia reddit; calida namque atque humida constitutio in corporibus potissimum putredines inducit: unde & foetidi anhelitus causa Aristoteli Austri dicitur. Hippocrates quoque in Aphorismis ait, Austri auditum bebetantes, caliginosi, caput gravantes, pigri, ac dissolventes. Siccos vero austros humidis longe perniciosiores existimat Plinius, quod propter raritatem, animalium corpora desiccant; unde contingat animalia ipso spirante minus esurire, reseratis nimirum poris cutis calore austrino. Neque dissonat quod alibi scribit Hippocrates, Austri, inquit, de similis naturae locis spirat unde aquilo; videlicet de austrino polo; multaque niue & glacie, & gelu vexat loca, quae polis vicina existunt: quum verò per solis itinera, & per meridianam plagam transit, rarefcit desiccatus à sole, unde isthuc calidus & siccus necessariò peruenit, & proxima loca calescit & desiccatur necessariò; unde quae terra isthuc eduntur, siccescunt, clanculūque isthuc homines desiccant: quum enim de mari, neque de fluminibus ullum humorem capere possit, de animalibus, & de terra natis omnem humorem exigit. Qualis igitur tandem sit Austri, hoc est



hoc est suo naturalis, sine à temperie innata declinet, perniciosus omnino est, & periculo non vacat. atque ab hoc quum parum differat Subsolanus, ab eius quoque malitia non multum declinat: nam sicuti Eurus non raro in Notum, hoc est meridianum statum transit ob ipsam qualitatis calide similitudinem; ita frequenter eosdem quos Ausser, præsertim siccus, morbos inducit. Fauniorum autem cur hic non meminerit Celsus, admodum miror: præsertim quando hic nomen addubitandum sit, sit ne Aquilo an Zephyrus salubrior: quum Aristoteles Homerum secutus non vereatur Faunios ventorum omnium serenissimos & gratissimos vocare; quod nimirum ventorum omnium temperatissimi sint, & Vere maxime spirent; neque calidi sint, ut Ausser; neque frigidi, ut qui de septentrionibus eueniunt; sed medium calidiorum & frigidiorum statum obtineant: unde consequi videtur ventorum omnium saluberrimos esse, ac proinde non recte à Celfo prætermisissos; idque potissimum quum Subsolanus meminerit. Sed hoc studio quodam Celsus fecisse dicimus: quum enim inter calidum & frigidum temperati quodammodo sint Faunij, hac parte meliores aquilonibus sunt: atque ita iam ante eas æstates laudantur, quæ Zephyris quam maxime persentantur. inferiores tamen septentrionalibus ventis æstimantur, propter humiditatis excessum. Roborat igitur naturales functiones tum ob frigiditatem, tum siccitatem Boreas: huic quam proximè accedit Zephyrus; & quo serenior fuerit, eo quoque melior: hunc ordine sequitur Subsolanus; ultimas tenet Notus.

### Sic tamen ut hæc interdum regionum, &c.

EXISTIMAT Plinius à natura legem quandam ventis attributam; ita ut quidam certis statisque tantum temporibus, idque præscripto sine, spirent: quidam etiam provinciales tantum sint, ac vni tantum provincie communes. Sic Sciron loca tantum infestat circa Athenas; Iapyx Calabriam; Atabulus Apulia gravis peculiariter dici-

tur. Quidam etiam sunt, qui quum passim flant, in una tamen aliqua regione non percipiuntur, quemadmodum de Austro memoria proditum reliquit Fabianus, quem in Ægyptum penetrare negat. & (quod magis admirandum est) sunt qui uno loco calidi; alio sint frigidi: adeo mirum non est, ventorum salubritatem variari pro regionum sorte. Nam & austrini venti hieme si perslant Africam, ei non minùs frigidi sunt (si Aristoteli credimus) quam regioni nostrati aquilones: ac rursum Boream idem testatur in Byzantio clarum & salubrem esse; in Thessalia verò turbidum & pluviosum: illic enim perslant montes; hic arenas locaque calida. ergo sicut venti montibus aueruntur à quibusdam locis & civitatibus; ita etiam spiraculis aut cavernis quæ sunt in montibus, ipsorum qualitates alterantur, ita ut vel calidiores, vel frigidiores, leniores vel impetuosiores spirent: sic qui à mari spirat ventus, nubilus magna ex parte est gravisque; qui à mediterraneis, salubris ac serenus.

### At ætas media, &c.

ÆTATVM omnium iustissima media, quæ & consilens dicitur: est siquidem medio quodam loco posita inter omnes reliquarum ætatum excessus. Iuuenilis enim calere; senilis frigore excedit: quo fit etiam ut hæc longis frigidisque morbis magis obnoxia sit; illa acutis, febribus, pleuritidibus, & id genus aliis. Inter corporis autem constitutiones quadrata habilissima est, hæc est inter obesam gracilemque; inter longam & breuem media: cuiusmodi ferè temperata est; nam quæ intemperie aliqua infirma constat, circa mali alicuius suspensionem esse nequit: gracile enim corpus infirmum imbecilleque est; obesum hebes; hoc est ad actiones pigrum, nisi quis hebetudinem ad actiones animales quoque referre malit: quemadmodum Aristoteles Sanguineos magna ex parte stultos, stolidosque esse dicit. Longam autem staturam quum iuventa nec indecoram nec inutilem, maturam etiam senectute confici doceat; non video quæ Hippocratis senten-



sententiam secutus sit, qui eam senectū in-  
uilem, & paruitate deteriore definit:  
quod, ut docet Galenus, longi iam senescen-  
tes gibbi fiant, & vix possint onus porferre:  
quales cerē non admodum propriē maturē  
senescentes dicemus. Matura etenim senec-  
tus vocatur, quę omnino perfecta & de-  
bitum tempus assecuta est; qualem longi in-  
ter reliquas corporis constitutiones optimē  
consequuntur, quum temperiem calidam &  
humidam senectuti planē contrariam adepti  
sint: atque adeo tantum abest, ut aliquid  
vitiū huic longitudini ascribi possit, quin  
potius maximus annumerandum sit com-  
modis. Quanquam si quis Hippocratem cum  
auctore nostro conciliare studens, matram  
senectutem pro ea quę ante tempus sit,  
(quemadmodum Cicero etatem maturri-  
mam pro ea quę festinatissima est, dixit,)   
accipiat, per me quidem integrum erit.

Vere tamen quęcun-  
que, &c.

RECTE docuit Hippocrates, morbos  
omnes omnibus fieri temporibus; quosdam  
verō magis in quibusdam ipsorum excitari:  
siquidem quum aeris temperatura nō solum  
sit morborum causā, verum etiam ipsa vi-  
ctus ratio; omnes omnibus temporibus mor-  
bos fieri clarum est. Verum quum aer nos  
ambiens non parum faciat ad alterationem  
naturę, rectē statis temporibus, exempli cau-  
sa, veri, æstati, hiemi & autumno, pecu-  
liarē assignat morbos. Atque ij quidem, ut  
antē diximus, quos veri attribuit Celsus,  
non tam ratione veris, quā corporis quod  
fortitur malē affectum ac morbidum, con-  
tingunt. Si enim, ut ait Galenus, aliquod  
corpus bonos habens humores, verum tempus  
excipiat; hoc saluberrimum conseruat,  
nihil ex propria natura mutans. Compre-  
hendit autem breuiter, quotquot sunt, ver-  
nos morbos sub vno genere: quanquam, si  
numerum spectes, multi difficilēque esse vi-  
deantur, quum morbos quicumque humoris  
motu nouantur, in metu esse dicat. atque in-  
ter hos quidem frequentissima sunt profusio-  
nes, aut profusio sanguinis; sanguis enim

verno tempore maximē abundat, atque eo  
ipso tempore profunda corporis expurgantur  
a vitiosis humoribus, atque a paribus prin-  
cipalibus ad cutem propelluntur. sic quoque  
pustulas oriri dicit Celsus: Hippocrates quo-  
niam easdem æstati attribuit, vere plurimas  
easque ulcerosas infestare dicit, æstate verō  
pauciores. Celsus tamen breuius & apho-  
risticus, & æstatis tantum conuertit, omit-  
tens rō in æstate & in hieme: ut sub ijs  
etiam lepras, impetigines, vitiliginē Veri  
maximē familiares, quum ex fusione hu-  
morum oriantur, comprehendit. Nam  
pustula sortiuntur varia nomina pro humo-  
ris peccantis qualitate: siquidem psoa aut  
scabies dicitur, quum ex simplici cholera,  
aut pituita oriuntur pustule, heretq; in su-  
perficie cutis quiddam furfuris speciem refe-  
rens: penetrat enim bilis ad cutem exte-  
riorem, atque inibi pruritum facit, qui frictione  
sedatur. Qui verō a cholera adusta sit pru-  
ritus, scalpendo vix sedari potest, ac veluti  
squammam quiddam cuti adhæret. Dis-  
cernuntur autem biliose pustule a pituito-  
sis, quod in his pruritus minor adsit, ac in-  
latius fundantur; ille autem magis in altum  
attollantur: adhuc quod in pituitosis ani-  
malcula quædam nascantur, nonnullis Judæ-  
ica, aliis sirones dicti. Celsus tamen libro  
quinto Judæica pustula genus esse dicit  
durum ac subalicans. Quę linidiores sunt  
pustule, ex melancholia oriū habent; acriore  
verō ex bile; ut rubicundiores ex san-  
guine; suppalida latæque ex pituita. Atque  
hæc hætenus de pustulis: quę ideo in me-  
diū proferre volumus, quod ipse Celsus libro  
quinto cap. 28. pustulas quidem omnes ver-  
nis temporibus potissimum oriri dicat, quum  
earum plura sint genera, quę ordine recen-  
set. Ceterum furores, airæ biles, anginae,  
morbi comitiales, quamquam, ut docet Ga-  
lenus, morbi autumnales sint; tussis, & gra-  
nedines, hyemales: eas tamen anginas verno  
tempore potissimum molestas esse dicemus,  
quę ex pituita fiunt, ut autumno biliosas;  
atque ita deinceps de lunatico morbo, gra-  
uedine & deflillatione dicendum est. At ar-  
ticulorum dolores ex quibusvis humoribus  
sunt,



sunt, maximè tamen ex pituita bili commixta, innadunt autem verno tempore, quòd tum (ut diximus) sanguis & reliqui humores ad exteriora fundantur. Omnes igitur morbi quos hactenus Veri ascripsimus, corporis tantum exteriora petunt: atque eà fortè ratione inter atram bilem, hoc est morbos melancholicos, quartanas non numerant, quòd videlicet hæ magis sunt compactis quodammodo ad interiora, quàm fusis ad exteriora humoribus: sunt siquidem febres etiam ex repercussione ad interiora.

At quidem æstas non vacat, &c.

HIC Galenus eam æstatis partem, quæ ver excipit, intelligit; quum potius intelligendum sit, plerisque morbos veri ascriptos æstati proprios esse: cuiusmodi sunt omnes biliosi; ver enim omnibus temporibus communes habere diximus. Quotquot autem sunt æstivi morbi, quadrifariam possunt distinguì: nam aut ex bile fiunt, aut ex adustione; atque id aut in siccis aut in particulis humidis, quarum humor calore æstatis foras trahitur: sic genitaliū, aut obsecnarum partium puiredines annumerat. ubi Galenus miris modis sese torquet, hoc æstate humida adustinoque statu tantum contingere affirmans; quando Celsus (ut etiam Hippocrates) de naturalibus anni constitutionibus loquatur. Per febres autem continuas, ardentès, tertianas, biliosos omnes morbos intelligit; iisque Hippocrates quartanas adiecit, eas videlicet quæ à cholera adusta fiunt, sicut Celsus quoque caneros fieri docet. Vomitus etiam & alui profluvia, Galenus ad cholicos morbos refert: quum enim æstate bilis præsertim abundet, stomachum vellicando sursum lata vomitum; in intestinis verò detenta, acrimoniâ quâdam ad expulsiōem excitans, alui profluvia facit, non tamen diuturna sed brevia. Hippocrates eadem ratione lippitudines adiecit, siccās videlicet, & quæ cum ingenti fiant rubore. Auricularum autem dolores, Galenus capitis repletioni attribuit; nos ipsi loco potius acceptas ferendas censemus, quòd aures propria quâdam natura bi-

liosæ sint ac siccæ, biliosque excrementi receptacula: nam si quid acre in cerebro est, magna ex parte per aures expurgatur; quo fit ut biliosis morbis promptissimè corripiantur. Oris verò ulcera accidunt, quòd carne sint tenera, & quæ bilis acrimoniæ facillimè cedat; bilis nanque proprium est ulcerare, præsertim si crassior sit, tenuis enim cutis superficiem, leni quâdam inæqualitate fadat tantum; quemadmodum in herpete miliari accidit. Per sudamina autem biliosas & ulcerosas pustulas intelligit, quæ in corporis summa parte hærent.

Vix quicquam ex his.

AVTVMNVN sua inæqualitate morbum ferum diximus; certumque est eam autumnii partem quæ æstatem excipit, æstivis morbis obnoxiam esse. Est autem autumnus, ut latius Galenus, temperie siccus evidenter; calore verò & frigore inæquali contingunt; in eo non secus ac in æstate, quatuor morborum genera, ex cholera videlicet, ex cholera adusta, ex inæqualitate humorum, & eorundem corruptione. Erraticas igitur aut incertas febres, primo statim loco ponit, propter temperaturæ inæqualitatem, & victus erroneam rationem; intemperiem enim vitæ sequitur humorum & paroxysmorum inæqualitas. Degenerant autem hæ febres non rarò in quartanas; quarum origo atra bilis potissimum est; quo fit ut in longissimum quoque tempus protrahantur; quòd & antè Hippocrates docuit, æstivas quartanas breves vocans, autumnales verò longas, maximèque quæ hiemem attingant. Rectius ergo servasset ordinem Celsus, si febribus incertis, quartanas, frequentissimum in autumnio morbum, subiunxisset. Quos Celsus lienis dolores vocat, Hippocrates excrescentias lienum dicere maluit: nam ob bilis atræ superfluitatem lienēs excrescunt; unde & scirrhusi tumores generantur, iecinore videlicet eiusmodi humorem procreante, & ad splenem transmittente; vel potius liene ad se trahente, quum eo non secus ac proprio alimento delectetur nutriturque. Lienis tumorem sequitur corporis extenuatio, & nutri-



& nutritionis imbecillitas; quo fit ut statim post lienis dolores recenseat hydropises, quod ex videlicet scirrhusum lienis tumorem non raro concomitentur. Carcinoma autem cur omiserit, admodum miror, quum ex melancholico succo fiat, praesertim id quod nondum sit exulceratum; id enim autumno frequentissimum est. Tabi vero opportunissimus autumnus est; & si qui in eam inciderint, periculo non vacant: est enim autumnus tabidis malus, siccus siquidem est, calore & frigore inaequalis. quum igitur contrariorum contraria sint remedia, ad phthisin arceudam requirebatur anni constitutio calida & humida: per tabidos autem non intelligit marcidos, qui calidi & sicci sunt; quamquam & ab his non omnino liber sit autumnus. Urinae vero difficultas (ut Galenus docet) fit, quoties vesica inordinatis, atque iisdem repentinis ad calidum vel frigidum permutationibus refrigeratur, & quae ex malis sunt humoribus acredines, ipsam molestant; tum praesertim quum facta ad frigiditatem fuerit permutatio, eos qui haecenus disflabantur, & per sudores euacuabantur humores, ad vesicam conuerterit.

### Tenuioris intestini, &c.

VOLVULOS Galenus oriri credit, ab inflammatione alicuius partis intestinorum (voco autem voluulum aut eleon, ubi ciborum superfuitates, quae per aluum excerni solebant, retinentur.) Ego tamen, ni quid tanti viri obstat auctoritas, tam Celsum quam Hippocratem eos voluulos intellexisse crediderim, qui status comitari assolent. quae ratione sub hoc affectu etiam colicum dolorem frequentissimum autumno morbum comprehenderit. Nam quum autumnus, ut auctor est libro Symptomatum Galenus, inter reliqua anni tempora statum generationi maxime sit obnoxius; verisimile est Celsum eum eleonem qui statum copiam subsequitur, potius quam qui inflammationem, subintellexisse. siquidem eos voluulos qui inflammationem tenuiorum intestinorum subsequantur, subandiamus; rectius eos de aestate aut veri ascripserimus; quum iis re nporibus

sanguis & bilis efflorescere soleant; bilis inquam aestate, sanguis vere. Et quantumvis auctor noster dicat aestivos fere omnes morbos in autumnum incidere; non ob id inferendum est, biliosos aut inflammationem subsequentes eleos hic intelligi; quando (ut ante est dictum) statulenti voluuli frequentius multo incidant, quam alij quinis: nisi forte quis aestate ad exteriora; autumno ad interiora humores propelli dixerit. quae ratione post eleos, lenitates quoque intestinorum subinxisse videtur, excretionem videlicet per posticum sine aliqua ciborum transmutatione; idq; aut propter exulcerationem in summa parte ventriculi, aut intestinorum. Coxendicum autem dolores ex malignitate, & frigiditate materiae intelligit Galenus pulsus ad interiora: diximus etenim autumno proprium humores intro pellere; quemadmodum veri, ad exteriora trudere. atque hinc fit, ut veri podagricos; coxae autem dolores autumno attribuamus. Comitiales morbos à subita ad contraria transmutatione fieri putat Galenus: quanquam malim potius causam tribuere statulente materiae ventriculos cerebri occupanti; nam ob victus rationem erroneam fructuumque frequentem usum, autumnus status plurimos gignit; nec eos simplices tantum, sed & cum lentore quopiam dissoluti rebelles. Eodem referri potest quod dicit, Autumnus longis morbis pressos sua malignitate interimere. Quod autem pestifer sit autumnus, Hippocrates docuit; qui autumno morbos acutissimos, simul & exitiales, esse dixit, quod eodem die aliquando calorem, aliquando frigus obtineat; deinde quod aestivum sequitur tempus, quo virtus naturalis debilitata est; & quod humores qui primum ad exteriora cuiusque movebantur ac disflabantur, autumno ad interiora pellantur, inibique febres acutas, erraticas pestilencialesq; generent: quibus omnibus, tanquam auctuarium quoddam, accedit victus incontinentia.

### Hiems autem &c:

TRIA fere sunt morborum genera quae hiemi peculiaria esse dicit Celsus: unum ex multitudine



multitudine sanguinis, qui hieme copiosius generatur; alterum a frigidityte externa; tertium ex copia seu excessu humiditatis frigida, & pituitosa. Primo igitur capitis doleres infestos esse docet; idq; pituita sua quantitate caput gravante: unde & vertigines sunt, vapore multo cerebri ventriculos obsidente. Tussis autem sunt a frigidityte externa, membris respirationi inferuentibus lesis, humorumque fluxu a cerebro in fauces concitato. Per laterum dolores pleuritida intelligit: hyberno namque tempore, calor & sanguis innatus plurimus est; quo fit ut inflammationes promptissime oriantur: Galenus tamen lateritios dolores ex frigidityte intelligit. Per viscerum morbos, pulmonis (ni fallor) inflammationem seu peripneumoniam intelligit; quamquam reliquorum etiam viscerum inflammationes, non secus ac peripneumoniam, intelligere liceat. Hippocrates his omnibus adiecit apoplexias; quas auctor noster (vix etiam vertigines) sub capitis doloribus comprehendit: omisitq; animaliales aliquot morbos; quod ei suffecerat dixisse, astatem non vacare veris morbis.

#### Ex tempestatibus autem Aquilo &c.

I AM ad tempestatum differentias digredimur: ac primum de quotidiana aquilonia constitutione, mentionem facit. Illud enim semel praeponendum est, auctorem nostrum quoties mutationis aut tempestatum meninit, repentinas & vehementes tantum esse intelligendas; parvi siquidem excessus non tam facile in corpus nostrum agunt. Primum igitur de aquilonia constitutione sermonem instituit; quae, ut ante diximus, quemadmodum reliquis salubrior est, ita paucissimos quoque morbos gignit; & si quos procreat, eos non tam sua natura quam subiecti corporis quod impurum, vitiosisque succis plenum offendit, excuscat. Nam neque rursim per se mouet aquilo, neque fauces exasperat; verum, si eadem praecesserint, adauget: quod Hippocrates segmento vario Aphorismorum aphorismo 17 demonstrat,

Si pectus, inquit, dolor aliquis obsedit, augeat. adeo ut plus longe commodi expectandum sit ab aquilonia tempestate sano corpori, quam incommodi; corpus enim expectatius mobilisque redditur. Si tamen succi plenum corpus sit, superfluum illam humiditatem expurgare nititur exprimendo: unde tussis, fauciumque asperitates eboriuntur. Ventrem autem astringit, sua nimirum siccitate ventris humiditate exhausta: sic & urinam supprimit, vesica aquilonis flatu ob frigiditytem laesa: quum enim exsanguis sit, frigidis ex causis facillime laeditur, horroresque excitat corporis poris spissatis & obstructis.

#### Auster aures hebetat, &c.

Astrum esse temperatura calida & humida dictum est: sed ea commodissime se habet ut cerebrum humectet, organa visus & auditus offuscans; sunt enim tenuissima, & passionibus maxime obuia. Eadem quoque ratione tardat sensus; quod principia nervorum humectato necesse sit circa voluntarios motus pigritiam euenire, & veluti in seipso dissolutum hominem apparere, calore innato ab Austri flatibus rarefacto. alium autem soluit tota corporis constitutione humidior reddita.

#### Ceteri venti, &c.

POSVIT Aquilonem & Austrum tanquam exemplar & canonem ad quos aliorum ventorum tonitatem vel malignitatem expendamus. nam quum Eurus a Notu quam minimum differat, non raro in Notum degenerat, atque austrinis affectibus quam simillimos gignit: sic quoque de Eanonio & septentrionalibus ventis dictum volumus. Ceterum hic iure aliquis miretur, quum ventus nihil aliud sit, nisi mota in aere exhalatio, unde tam diuersae qualitatum differentias suscipiat: exhalatio enim quando semper sibi sit similis, est calida & sicca; ventique (ut dictum est) alij frigidi, alij humidi, alij calidi, alij sicci sunt. Quibus responsum volumus, alterationes illarum qualitatum ventis inesse accidentaliter: prout siquidem



siquidem loca calida, aut frigida, humida aut sicca, amana aut foetida perspiciunt; ita illorum qualitatibus afficiuntur, atque illas tanquam proprias recipiunt. De hoc præclare Ptolemæus 1. quadripart. cap. 11. Ipsi venti, inquit, quum à quatuor spirent cardinibus, ipsorum quoque cardinum qualitates suscipiunt: etenim angulum eum mundi qui ad orientem est, quum solem, qui caloris est auctor, singulis ad nos diebus afferat, calidum quidem; & quia sol inde asiduum venit, sic cum quoque esse par est. Adversum verò huic, adverso modo, humentem atque frigentem; quod solem ipsum terris auferat: è cuius abitu frigus sequi necesse est; cuius rei nox ipsa indicio est. Atque ut à calore diurno siccitas, sic nocturno à frigore humiditas sequatur necesse est. Subsolanus igitur qui ab oriente fiat cardine, perinde erit ut dies ipse, ut regio à qua fertur. huic contrarius Favonius, quod noctis naturam, quod occasus qualitatem sequitur, erit contrario modo affectus. ut enim aduentus solis ac præsentia calorem; sic recessus atque absentia, frigus facit; atque ut illius incrementis comes est siccitas; sic huius humiditas est focia. Septentrionalis autem cardo, ab utroque cardine surgentis atque cadentis solis singulas tantum qualitates sibi convenientes sumit: nam si ab eo sol abest cardine, frigescere admodum illum oportet, porro nimij frigoris comes est siccitas. ergo ab orientis solis cardine siccitatem, ab occiduo frigiditatem mutabitur. Ad oppositum verò huic cardinem, hoc est ad meridiem plagam, quam sol sit ei maxime familiaris, ob hanc ipsam solis familiaritatem, plaga vehementius concalescit; unde spirantes inde flatus, à finitimo cardine, atque à solis vicinia calorem accipiunt: quum autem parte ab altera hac ipsa plaga meridionalis declinet ad occasum; ab ipso quoque occasu mutuatur humiditas. Haec illi.

### Denique omnis calor.

Id potissimum sibi faciendum ob oculos hic posuit Celsus: ut quæ sparsim ac fusim alibi ab Hippocrate dicuntur, per capita qua-

dam cum locis communes distingueret. Postquam igitur singularum tempestatum morbos affectusque numeravit; nunc calidi frigidique incommoda enarrat, per frigidum aut calidum, balneum aut calentem frigentis aquam intelligens. Sic Hippocrates calidum, ubi quis eo utatur sæpius, carnum effaminationem, nervorum incontinentiam, mentis torporem, profluvia sanguinis, animique defectionem generare dicit. Mentem igitur hebetat balneum calidum; spiritus dissolvendo: & si verum est, quod quantum quisque habet humiditatis, tantum habeat & stultitia, procul dubio frequenti usu humidorum tepidorum, humectato cerebro spiritus dissoluntur, ac mens hebetatur. quo factum est ut sanguineos formososque solidos dixerit Aristoteles; melancholicos contrò ingeniosos. Sub mentis autem hebetudine nervorum incontinentiam comprehendit Celsus: nam quantumcunque balneum ea tantum dicatur elicere, quæ inter cutem & carnem sunt, eius tamen qualitas ad nervos quoque pertingit, quos sensim humectat, ac laxos dissolutosque reddit. spiritibus dissolutis. fit etiam nonnunquam ut anima deficiat: quanquam Galenus id paulo generalius intellexisse videatur, quum profusiones sanguinis defectus animi sequi doceret; eos nimirum defectus animi intelligens, qui ex nimio sanguinis fluore oriuntur: quod certe (vel Hippocrate & Celso tacente) quibus conicere posset; quum non solum ex nimio sanguinis profluvio, verum etiam alia quavis purgatione immodica, animus facile deficiat. Quod autem iecur & lienem calido dicit inflammari, clarius est quam ut longiore interpretatione egeat; nimirum calida qualitate balnei ad viscera penetrante: ac proinde quum calida à vicinis fove partibus alliciant humores, facile fiet ut sanguine ad alterutrum viscus repente, inflammatione corripitur. Verum quum aer cibique calidi corpus nostrum alterent, nolim negare quin hæc quoque ad cibos ac aërem referri possint. Nam & Hippocrates ipse aërem non solum corporis constitutionem, sed & mores quodammodo efformare auctor est. Sic in Asia



feliciora ingenia; in Europa fortiora corpora inueniri docet. In Asia enim aer præterquam quod calidus est, insigniter quoque siccus est: unde & cerebrum immodicis superfluitatibus expurgat, & ingenium acuit.

### Frigus modò neruorum distentionem, &c.

VIDETUR hic potius de balneo quam victu sermonem facere, quum veteribus ex balneo calido descenditibus mos fuerit in solium frigidum ire, ubi aqua frigida aspergebantur. Spasmodum tetano opponit Galenus, quod hic musculus extendentibus, ille contrahentibus affectis oriatur: verum quemadmodum calidum diximus resolvere nervos; ita frigidum quoque eosdem contrahere censuimus. Afficiuntur autem potissimum frigore, quæ natura frigida sunt & exanguia; nam (ut in Aphorismis Hippocrates) frigidum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medulle inimicum est. Nigritiam in ulceribus, aut (ut Hippocrates) liuores excitat frigus, introrsum frigida affusione regurgitante sanguine puriore. Eodem referri possunt horrores in febris: nam & qui rigent, liuidi magna ex parte efficiuntur; vel quod (ut auctor est Aristoteles) sanguis impulsu frigida gelascit, gelatusque nigrescit, propter caloris inopiam. Rectius ergo Hippocratem secutus Celsus non horrores, aut rigores qui in febris sunt (habent etenim hi vix plurimum causam calidam coniunctam) sed febriles, hoc est iis qui in febris sunt similes, dixisset. frequens enim est frigore nimio nos rigere, & præ horrore quodammodo concuti. quare, nisi quid obstat, & in febris commutari in & febrile n.

### In siccitatibus acuta, &c.

ANTE, ubi de ventorum natura egimus, satis dictum est siccitate superfluas humiditates dissolui; per imbres intra corpus collectas putrescere, nisi quis singulis diebus collectas exercitiis expurget: qua ratione etiam aquilonem omnium ventorum saluberrimum definimus. Nam & Hippocrates ex anni constitutionibus siccitates imbr-

bus salubriores, minusque mortiferas dixit; non tamen simpliciter à morbis pronuncians immunes, sed lippitudinibus (siccis videlicet) obnoxias, atque iis quæ ex reliquis sanguinis biliosi oriuntur. Sic etiam acuta febres, non ratione accidentium, sed motus humorum, infestant. Tormina autem siue difficultates intestinorum, ex corrosione bilis accidunt. Sicca enim constitutione bilis magis luxuriatur, quam quauis alia. Vocat autem Celsus, sicuti etiam Plinius, tormina, ea quæ Græci dysenterias nominant. Quod autem urina difficultatis dicit; Hippocrates strictius paulo stillicidia urina dicit, atque hic quidem, ut de torminibus, in causâ inquisitione admodum se torquet Galenus: dicit enim, urina stillicidia fieri, aut propter urina acrimoniam, aut propter vis expulsiue, quæ est in vesica, imbecillitatem; quæ rursus imbecillitas ex intemperie contingat: ac porro solam intemperiem siccam non generaturam stillicidium, nisi ea quoque calida fuerit. Quanquam, si rem propius intueamur, frigiditas siccitati coniuncta potior causa censenda sit, dictum enim difficile sit, frigidior ne an siccior (est enim neruea) sit vesica. Neque enim temere urina stillicidio articulorum dolores subiungit; sed quod ex eadem causâ (frigida nimirum & sicca intemperie) oriatur. Notus est satis superque Hippocratis Aphorismus, quo frigidum ossibus ac nervis inimicum dicit: ubi omnes totius corporis partes immodica intemperie affici docuit; frigidam præsertim à frigida, siccam à sicca. Sicca igitur constitutioni articulorum dolores, urinæque difficultates attribuit, vesica nimirum & articulis siccis ab intemperie sicca facile affectis. Non negauerim tamen articulorum dolores, urinæque stillicidia referri posse ad biliosos affectus, bilioso videlicet defluxu aut ad vesicam aut ad articulos lato. Atque hos quidem morbos, tanquam siccitatibus proprios & peculiare, auctori nostro enumerasse sat fuit: quum tamen unus ab Hippocrate inter alios recensitus, sit eidem constitutioni maxime familiaris: In siccitatibus animi, ait, tabitudines, lippitudines, articulorum



articulorum dolores &c: ubi statim inter initia tabundines enumerat, tanquam frequentissime accidentes, & periculosissime affligentes. Neque id ininria, quamvis Galenus hic miris sese excruciet modis, per tabem eam tabis speciem qua oculis infestat, intelligens. Corpora etenim sicca simili constitutione de facili offenduntur: sic iam ante antimum sua inaequalitate & siccitate tabidis malum esse diximus. quare si cui hic tabes lippitudinibus in hunc modum (In siccitatibus acutae febres, lippitudines, tabes, tormina &c.) libuerit subingere, parum ab Hippocratis sententia aberrarit.

### Per imbres longæ, &c.

Ex multitudine humiditatis febres longas fieri contendit Galenus. Mirum igitur minimè est, per imbres febres longas oriri: siquidem quum agrotis ad morbi solutionem cruditis concoctione opus sit, plures superfluitates, non nisi longo tempore concoqui poterunt. quibus accedit, quod frigidi ac pituitosi sint humores, qui in pluriarum multitudine generantur, sicuti in siccitatibus biliosi. Rectè ergo pluuio tempore longas febres, sicco acutas, hoc est breues, & quæ citò terminentur, ascripsit. Demum enim, exempli causa, duas esse febres eiusdem speciei pluuio cælo; in longius protrahentur tempus, quod corpus pluuie grauetur: adeo rectè Galenus naturas corporum patientium considerandas docet. Ceterum non oportet per imbres, aut aërem pluuium, intelligere quemvis aërem humidum; sed magnum tantum humiditatis excessum: nam & Hippocrates alibi Austrum pluuium & serenum distinxit. Alii autem profluvia, non secus ac longæ febres, à superflua oriuntur humiditate: pituitosus enim humor, & frigidus diarrhæam seu fluxum humoralem, ut vocant (de quo Celsus nunc est sermo) facit; protrahiturque nonnunquam hic morbus in longum tempus, idque quod materia peccans uberior sit. Per anginas, non quasuis, sed pituitosas tantum, intelligit: nam si eas quæ ex sanguine sunt putasset, addidisset etiam

pleuritides: sunt enim non raro ex superfluitatum copia ad fauces collecta angina; uti etiam frequenter ex fluxionibus seu catarrhis à capite ad fauces. Et quod fluxiones quæ quidem à capite sunt, plurius temporibus contingant potissimum, quauquam ex precedentibus satis clarum sit, nititur tamen tanquam exemplo quodam apertius redere, quum nervorum resolutiones, & morbos comitiales pluuio tempore in periculo esse dicit, quos ex cerebri & spinalis medulla intemperie humida, & pituitosa oriri ceruim est. Per cancos fortè putredines intellexit: sic ex Hippocrate Galenus ostendit humida cæli constitutione quibusdam carbunculos natos; & multis articulos decidisse.

### Si hiems sicca, &c.

BREVITER alterationes quæ in tempestatibus sunt edocet: ac primum quidem de hieme sicca & aquilonia, & vere pluuio & australi sermonem facit. quæ sanè alterationes proximè insequente æstate humiditas, tenerasque particulas, facile afficient; unde oculorum lippitudines dicit oriri Celsus: nam quum naturâ humidis sint oculi, Verisque pluuij præcedentis humiditate, humoris nonnihil eis accesserit, calore subsequenti æstatis facile inflammationem suscipient. Verum quoniam quæ hic Celsus, & in Aphorismis Hippocrates de Vere pluuio scribit, eadem in libro De aëre, aqua & locis fusissimè declarat idem senex; eius verba subiungam: Si, inquit, hiems quidem sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluuium & Australe, necesse est æstatem abundare febribus, & lippitudinibus, & difficultates intestinorum oriri. Quando enim æstate æstus repenti superuenient, & terra madida ex pluuiis vernalibus, & ab Austro fuerit, necesse est æstum duplicari, & à terra madida atque calente & à sole comburenti, non astrictis hominum ventribus, neque exsiccatō cerebro. Neque enim possibile est tali Vere existente, non putrefieri, & humectari corpus & carnem; unde febres accidunt non simplices, sed acutissimæ, tum reliquis omnibus, tum præcipuè mulieribus, & quibus corpora



corpora sunt laxiora, & pituitosiora. Verum quamvis quammaxime hac ita sese habeant, videtur tamen præter rationem tormina adieciſſe, idq; poſſimum, quod quum inteſtina ſicca quodammodo ſint & nervoſa, vera pluuio ſeſe optime habitura, ac proinde torminibus quam minime obnoxia futura ſint. Hinc Galenus, Non quoſuis, inquit, ſed feminas tantum & viros qui humidore conſtitutione præditi ſunt, tormina apprehendent, ſiquidem quantumvis temperie ſicca per ſe ſint, per accidens tamen, & continuum excrementorum diſfluxum humiditatem aliquam nanciſcuntur.

### Si verò auſtri pluuiæque.

INTELLIGIT hic, ſicut in præcedentibus quoque, mutationes hiemis & veris non ſubitas, ſed quæ ſenſim & paulatim ſiant: nam ſi de repentinis etiam ei ſermonem fuiſſe dicamus, non ſolum hos, ſed & quoſuis alios morbos produxerint. Notus eſt enim Hippocratis Aphoriſmus: Mutationes temporum poſſimum pariunt morbos, & in quibusdam temporibus magna mutationes aut frigoris, aut caloris aut alia pro ratione, eodem modo. Itaque quum moderata conſtitutio hiemis ſit, ut idem ſenex libro De aëre, aqua & locis docet, quæ mediocriter frigida & humida (dicit enim, Hiems frigore id quod opportunum eſt non excedat: & rurfus, Hiems moderata ſit, non valde ſicca, ſed mediocriter humida,) ver quoque temperatum eſſe iam plus ſatis inculcatum eſt, utriusque temporis, hoc eſt veris & hiemis contranaturales diſpoſitiones non paruas, ſed vehementes proponit; eas videlicet quæ hieme ad calorem, ac Vere ad ſiccitatem & frigiditatem declinent. Vnde gravidas quibus iam adeſt partus, abortu periclitari docet: coryledones etenim aut acetabula hiemis immodico humore relaxata, infantulum diutius retinere nequeunt. Neque id mirum, quum aëris temperiam corpusculi noſtri conſtitutio ſequatur: unde corpora noſtra aëris nos ambientis vitio corrumpi contingat, ac temporum quotidiana conſtitutioni velut compati. Sic hieme plu-

uia non ſolum coryledones relaxantur, ſed & matrix inſto humidior redditur, unde abortus periculum imminet; præſertim ſi ad intima penetrante verno frigore, embryo inſueti aëris frigore percuſus, pedibus ac manibus (ut Hippocratis verbis utar) calcitrans, ſacundus quam par eſt & molliores & laxiores diſrumpat, atque à coryledonibus (quibus non ſecus ac poma arboribus, utero alligabatur) decidit. Et quod aër quidem tenuiſſimus ſit partium, & quantumvis intima noſtri corporis penetrare poſſit, vel hinc clarum ſit, quod quum quis frigeat, ventre & inteſtinis doleat. Si quis ampliores abortus cauſas deſideret, centones noſtros conſulat. Ceterum ſi iam contingat gravidas ad legitimum uſque tempus ſatum utero continere ſtatque tempore parere, imbecilles & morboſos, aut qui ſtatim aliqui pereant infan- tulos excludunt; idq; aut quod non ferant ſubitam ad contraria tranſmutationem, aut propter dolores quos perpetuuntur dum in lucem prodeunt. Ceteros lippitudo arida in- feſtat, hoc eſt (ut vult Galenus) ea quæ ſine fluxu eſt: Par enim eſt, inquit, calidis & ſiccis naturis, in ſicca & frigida conſtitutione quæ calidam & humidam excipit, tales lippitudines fieri; caput enim prius repletum eſt calida & humida conſtitutione hiemis, frigisque Veris ſupervenientis, veluti manus quedam extrinſeca, capiens ac pre- mers (quandā veluti ſpongiam) cerebrum, exprimit illam quæ in ipſo continetur humiditatem: atque quum oculi ex natura ad patiendum ſint habiles, lippitudines accidunt; atque ea arida, quod ex ipſis nihil eſſuat ad exteriora, propter aëris ambientis frigiditatem denſantis ſuperficiem exteriori: & ſi ſeniores ſint, gravidines ac diſtillationes malè habent; per ſeniores valde ſenes, non tamen derrepitos, intelligens. Per diſtillationes autem non ſolum videtur intelligere deſluxus, qui à capite per aſperam arteriam ad pulmonem ſunt; ſed omnes alias quæ per venas ad partes inferiores delabuntur. Atque hoc eſt quod vult Hippocrates libro De aëre, aqua & locis, cum dicit: Valde ſenibus diſtillationes, propter raritatem &







longus sit: nam antequam id quod nocet, commodè expurgare possit, tum ob angustiam, tum ob longitudinem meatuum, iam iteratò in locum affectum recidit: quo fit ut à capite fluxionibus per tracheam arteriam latè ad pulmonem, in quibusdam tabes oriantur. Nolim tamen negare, huiusmodi anni temporumque constitutiones, non semper, neque necessariò, prædictos morbos inferre: nam, ut docet Galenus, par est non solum quosdam non incipere ægrotare talibus constitutionibus; verum & immodica siccitatis per æstatem habere remedium non mediocrem, eam quæ facta est in autumno humidam constitutionem.

### Sin autem autumnus, &c.

PER molliora corpora non solum multibria, sed & omnia pituitosa laxaque intelligit. Hæc igitur quum temperie humida sint, ex opposita temporis constitutione, quæ sicca est, in contrariam partem trahendo, ad medium bonumque habitum perducuntur. Eo igitur ipso tempore, ut ait Aristoteles, optimè valent, nisi quid ultro ipsi perperam agant, aut humidi ad hiemem ita denentiant, ut fomitem quendam & incitabulum frigori subministrant. Notus est in hanc sententiam Hippocratis Aphorismus: Si autumnus aquilonius & siccus fuerit, iis quidem qui humida sunt præditi temperie, & formis utilis est.

### Durioribus verò instare.

DURIORA corpora, compactiora, qualia sunt aut biliosa aut melancholica, vocat: hæc autem tantum abest ut aquilonio autumno bene habeant valeantq; , quum potius variis, atque iis gravibus morbis corripiantur; quòd videlicet corpus eorū ac temporis habitus ad idem vergant, atque ita velut ignis igni adiciatur: quum enim, ut ait Aristoteles, eorum corpora exsiccantur, quantumque in his dulcedinis erat sit evaporatum, atq. vehementer incalcescant; necesse est, ut dum humor consumitur, aride lippitudines oriantur; residuoque, quod biliosum est, remanente, atque eodem incalcescente, febres acutæ, (vix potè quæ ex hyæra

sunt bile) invadant. Quod si id quoque non solum recalescere, sed & aduri contingat, iam non acutæ sed longas, quales sunt potissimū quartanæ, febres pariet; sicuti etiam insanias aliosq; ex atra bile morbos. Ceterum hic annotandum est Celsum rō ægrotas, quod ad coryzas refert Hippocrates, rōis ægrotis non prorsus malè accommodasse, quum non solum acutæ, sed & longas febres tali constitutione in metu esse conveniat, ut ex Aristotele iam retulimus.

### Quod ad ætates verò, &c.

NYNC ad quas anni constitutiones optimè se ætates habeant, edocet: naturarum enim (ut habet Hippocrates) hæc quidem ad æstatem, hæc verò ad hiemem bene malè se habent: Morbi quoque alij ad alia bene malè se habent, & quædam ætates ad tempora, & loca & victus genera. Nam temperatura similes malè afficiuntur à similibus; contrariæ dissimiles à dissimilibus bene: sic calida natura malè se habent ad æstatem ac ad hiemem bene, frigidaq; modo contrario se gerunt. Sed neque hoc simpliciter citraque exceptionem aliquam sic intelligendum est: nam cholericis non semper æstate laborant; sit enim nonnunquam ut nati in regione calida, in eiusdem temperiei provincia rectius valeant; similia enim similibus servari plusquam ritum axioma est. verum quòd hic dicimus naturam dissimilibus bene affici, id intelligendum est de modo & qualitate, ut loquuntur; nam & omnes repentinæ mutationes pariunt morbos, & omnes magni excessus non vacant periculo: solentq; hoc Hippocratis & Celsi dictum ita limitari, ut sanitatem temperaturarum frigidarum solidiorem esse hieme dicant, apprehendi tamen facilius à morbis: alij temperaturam quidem bene se gerere simili anni constitutione, corpus verò nequaquam. Verum ut ut est, id tantum voluit Celsus, quòd frigide temperaturæ æstate minus à morbis imperantur. Sed hoc etsi quàm maximè ita esse concedamus; non tamen sequetur pueros, & qui hos sequuntur, Vere optimè valere, siquidem (ut Galenus auctor est) naturis, regionibus,



regionibus, & aetatibus optimè temperatis, ver, (ut quod in temperie aequalitatem servat) optimum est, quando enim quo praedita sunt habitum non permutari, sed conservari desiderant. Ac proinde quum puerilis aetas non omnino temperata, atque omnis excessus media sit, perperam aut saltem non satis appositè à Celsò dictum eandem aetatem verno tempore optimè se habere; praesertim quod qui aetate adhuc florent, & fortes vocantur, aut qui media aetate sunt, reliquis magis sunt temperati, ac proinde verno tempore optimè se habituri sint. Non negaverim tamen ea veris parte qua aetatem excipit, optimè valituros pueros, reliquisque omnibus aetatibus ac temperaturis ver indifferens (ut quod omnis excessus sit medium) futurum.

### Tum si qua imbecillitas, &c.

QUATVOR sunt genera morborum infantilium, seu recens natos pueros infestantium: Primum siquidem ex humiditate, alterum à cibi qualitate, tertium ab eiusdem quantitate sit, quantumque accidentale omnino est; sub quo vmbilici inflammationes aut inflationes comprehendere licet. Quum igitur lacte ad dentitionem usque nutriendi sint infantes, qualitates eiusdem inquirenda sunt: nam & qualitatem & quantitatem infantilium morborum causam diximus. Lac igitur omne triplicis est substantia: alia est butyrosa, alia caseosa, alia serosa; atque haec rursum bifariam dividitur, in eam videlicet qua biliosa est, atque eam qua aquosa est. Quum ergo diversis omnino qualitatibus, aut substantiis praeditum sit lac, merito diversorum symptomatum causa erit, inter quae & hoc statim annumerat, sic enim vocamus ulcuscula quae summam oris partem occupant, idque ob molliem instrumentorum, quae neque tactum neque lactis sustinent qualitatem; siquidem quum non parum serosae substantiae (quam aut biliosam aut aqueam esse diximus) contineat lac muliebre, sit ut, si quidem bilis acrimonia particeps sit, abstergendi exulcer-

randique facultatem non mediocrem obineat. Vomitiones autem sunt propter lactis, quod ingerunt, copiam. Per nocturnas vero vigilias nisi insomnia intelligamus, sensus non constabit, praesertim quando vigilia pueris parum sint assueta, ut qui maiorem temporis partem dormiant; nam & somni abundantia puerulis secundum naturam maximè adest, idque tum ob cerebri humiditatem, tum ob multitudinem cibi quem assumunt. Galenus autem eas vigilias fieri arbitratur ob pueriles morbos; qua ratione omnilis etiam aetatibus communes essent vigiliae. Rectius ergo insomnia intellexerimus: promptissimè enim idque ex natura, somniis pueri vexantur, idque quod lac corruptum aut nidorosum effectum iam, evaporationibus suis cerebrum quam occisimè petat. neque enim huic diffonat, quod Hippocrates vigiliis paiores statim subiunxit.

### circa vmbilicum inflammationes.

CELSVS hic Hippocratem secutus ἐμφύλου φλεγμονάς, hoc est, vmbilici inflammationes dicere maluit, quam inflationes: quanquam raro admodum & per se infantulis vmbilici inflammatio contingat: siquidem quum pueris sanguis omnis in nutritione cedat, non videtur is usque adeo abundare, ut inflammationem pariat; praesertim quum plus quam tritum sit, inflammationes omnes ex sanguine oriri. Inflationes autem vmbilici ut frequentes sunt, ita ex lenissima quavis aeris alteratione fiunt. Galenus vmbilicorum inflammationes non multò antè praeforum intelligit.

### Proprie etiam dentientium.

TRIPLEX vniuersim morborum genus dentientibus ascribitur: vnum ex molestia, quam prodeuntes dentes inferunt; alterum ex corruptione humorum; tertiumque ex humore collecto in partibus durioribus, quae antè molliores erant quam ut talem humorem susciperent. Gingivae igitur ulcerationes, aut, ut Hippocrates, dentium prurigin-



nes fieri intelligimus, sicuti Galenus umbilici inflammationes: siquidem perforata gingiva à dentibus prodeuntibus facile ulcerantur; idq; præcipuè, caninis dictis dentibus prodeuntibus, sunt enim hi reliquis acutiores. Sed neque solas pruriginis dentes orientes parvint, verum totum etiam corpus multis afficiunt incommodis; nervorum enim distentiones, seu (ut Hippocrates) convulsiones, in metu sunt; eæ videlicet, quæ unam aliquam partem tantum occupant, quas Galenus aut ob inflammationem, aut propter crudum alimentum, aut quod partes nervosæ nondum robustæ sunt, fieri dicit: ita enim noxium humorem de facili suscipient, & muscoli in tumorem exurgent. Per febriculas, diarias intelligit, dolor enim ex gingivarum prurigine concitatus, facile diariam fecerit. Alii autem deiectiones sunt non secus ac in priore etate vomitus: nam quum illic stomachus usque aded imbecillis esset, ut cibum nulla ratione ferre posset, per superiora eundem regurgitabat; iam autem aliquanto robustior effectus, ad inferiora excrementa remittit, alnque profluvia parit. quod voluit Galenus, quum dixit, alii profluvia fieri, quod citus non bene concoquatur ac distribuitur. Quod autem subinigit Celsus, pericula hæc plenissimo eninis, & qui astricta sit alno subesse; Galenus de convulsionibus, seu distentionibus nervorum intelligit.

### At ubi ætas paulum proceffit.

NUNC de morbis secunde pueritiæ sermo est: qui quum voraciores sunt, & quofnis, quantumvis solidos, cibos deglutiant, facillimè crassorum humorum coacervant multitudinem, qui plurimorum morborum causa existunt. Nam glandule, & vertebrarum inclinationes ex crasso & lento humore sunt; per glandulas eas quas Hippocrates Tonillas vocat, intelligens, quas Galenus tumores glandulosorum partium, inflammationesq; locorum isthmm tenentium esse dicit, inflammationis vocabulo improprie usus.

### Vertebrarum quæ in spina sunt, &c.

CELSVS vertebrarum quæ in spina sunt luxationes fieri dicit: quum tamè Hippocrates, luxationes earum quæ in occipitio sunt ad interiora posuerit. sed ita vitio transcribentis mihi factum videtur: eæ namque quæ in occipitio sunt vertebra, facillimè & lenissima quavis de causa afficiuntur; quæ verò in spina, non tam facile lesionem senserint: unde quæ in occipitio sunt, malim legere. Luxantur igitur vertebra fractæ aut à musculis inflammationem patientibus, aut tumoribus vicino loco natis. struma & verruca, ex crasso & pituitoso sanguine sunt, suntque vitiatæ multitudinis ad exteriora & cutem repentis germane passionis.

### Incipiente verò iam pube.

DVPLEX pueritæ ascribit morborum genus: prius ex acrimonia humorum, cuius generis sunt febres; alterum ex multitudine sanguinis, cuius enim sanguinis ex naribus, aut à copia aut tenuitate eiusdem oritur. Longas autem febres, non simpliciter longas, sed respectu earum quæ secunde pueritiæ accidunt, vocavit: nam Hippocrates τὸν τῆς τῆς πύξης, ὅς περ τοῦ γένους ἀδελφός, hoc est, & horum quidem nonnulla, & diuturna magis febres accidunt, inquit; ita ut non sine comparatione locutus fuisset videatur.

### Maximeque omnis pueritiæ.

OSTENDIT quomodo in pueritiæ diutinae passionis terminentur, aut quibus potissimum temporibus periclitentur: siquidem nonnulla passionis in quadraginta diebus, alia septem mensibus, nonnullæ etiam septennio indicantur; nam quod morbos longos intelligit, vel hinc clarum est, quod dies quadragimus, primus eorum est, ex quibus morbi diutini indicantur; ultimus autem illorum qui acutos ex incidentibus indicant. Quicunque verò hunc transcendunt numerum, secundum septi-



dum septimana rationem, habent iudicium; non quidem à septem diebus, sed primum à mensibus, deinde annis: & quidem quod qui hoc tempus transcendunt, ad decimum quantum annum perveniunt, manifestum est, ut docet Galenus.

### Si qua etiam genera morborum, &c.

QVOD si quos, inquit, contingat decimo quarto anno (tum enim magna ex parte puberes redduntur pueri) infantilibus morbis non solui, longum, & qui cum illis ferè senescat, ac tanquam hereditarium morbum incurrit: siquidem pubertatis tempore morbi magna ex parte solvuntur, quod natura tunc sese, quoad fieri potest, expurget, in mulieribus quidem per menstrua; in iuuenibus per pilos. Sic Hippocrates, Quicumque, inquit, iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione locorum, & temporum, & victuum quoque liberantur, quod videlicet humor crassus, calore iuuenili, loco & victus ratione calidiorè dissipetur.

### Adolescentia morbis acutis.

TRIA sunt morborum genera que adolescentia ascribit: primum quidem ab acrimonia humorum; alterum ab incidentibus; tertium à pravis succis. Per morbos igitur acutos, febres acutas intelligit, à sanguine bilioso ortas. Sanguinis autem spuitiones, ut arbitratur Galenus, ab accidente extraneo sunt, videlicet aut quia vulnerantur, aut quia salivæ frangunturque, aut clamant vehementer, aut propter aliquam huiusmodi causam: quamquam non inopè omnino ob plenitudinem, & sanguinis abundantiam vasis ruptis sanguinis spuitiones fieri posse dixerimus; atque hunc esse Celsi & Hippocratis genuinum sensum. Caterum quod iuvenes ferè esse dicit, qui sanguinem expiunt, ex sanguinis acrimonia hoc fieri intelligemus; nisi Celsum verbum verbo ex Hippocrate reddidisse dicamus, qui τοῖς δὲ νεώτεροις, iuvenes vertit: sub qua tamen dictione, idem senex adolescentia æquè ac iuventute comprehendisse videtur: siqui-

dem is segmento 5. Aphorism. aphorismo 9. Φθίσις, inquit, γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τῇσι ἀπὸ δεκάτης ἔτιων μὲν ἔξι πέντε καὶ τεσσαράκοντα: quod est, Tabes maximè sunt in iis etatibus, ab anno nimirum decimo octavo usque ad trigésimum quintum. Quo Aphorismo Hippocrates tam adolescentiam quam iuventutem complexus, utrique tabes in metu esse dixit: quemadmodum etiam de expuitione sanguinis censendum est. Iuvenes enim sanguinis acrimonia erosus vasis; adolescentes contrà, eiusdem copia gravati, eum expiunt: quare in adolescentibus potius, ac frequentius, hasce sanguinis reiectiones expectarim; ut in iuuenibus tabes, corpore videlicet exhausto à nimia sanguinis expuitione in adolescentia, & eiusdem acrimonià bronchiis pulmonis corrofis: Sanguinis igitur expuitiones subsequuntur tabes. Verum quod morbos comitiales ascribat, admodum mirandum videtur; præsertim quum iam antè dixerimus, multos morbos mutatione etatis terminari: è quorum numero, ex Hippocrate, comitiales quoque retulimus. atque hoc quidem quamvis ita se habeat, adolescentes tamen (ut qui ita intemperanter vivunt ut qui maximè) facili in comitiales inciderint; quando non tantum victus ratione erronea utantur, sed & aliis que ab ipsis aguntur operibus abutantur, dum humi cubant, & soli imbribusque se exponunt.

### Post hanc ætatem.

QVATVOR in summâ hîc recitat morborum genera: Primum à cholera, excipit enim consistens ætas iuventutem; alterum ex cholera adusta; tertium à succo melancholico; postremum à pituitoso humore. Primum igitur biliosos, seu ex sanguinis adustione, enumerat: cuiusmodi sunt, pleuritides, pulmonis dolores, dehinc eos qui his quam maximè oppositi sunt, qualis Letargus est, Veterum Latini dicunt; estque marcor quidam, & inexpugnabilis dormiendi necessitas, cum rerum omnium oblivione, originem à pituita trahens, que frigore nimio, ac humore cerebrum imbuat, &

K.

in somnum.



in somnum impellit. Per insaniam autem, & melancholiam & maniam complectitur, hoc est eam qua ex fece melancholica, & cholera adusta mentem occupante fit. Ex eadem quoque causa hemorrhoides sunt, iecinore sanguinem melancholicum & seculentum ad eas reponente. Cholera autem est morbus acutus admodum & anceps; estque ventriculi immodica perturbatio, infra & supra per vomitum facta, acciditque ob multam cruditatem, quae nonnunquam est magna alimentorum prauitate; interim ex vitiosorum humorum copia oboritur.

### In senectute spiritus.

PER senectutem extremum senium Galenus intelligi vult. haec autem quum insigniter sit frigida & sicca, similes procreabit morbos: sed nec hos tantum, verum etiam eos qui ex pituitoso humore sunt: nam quum innatus calor, & virtutes naturales debiles sint, quantumvis calidos & boni succi cibos assumant, in debitum alimentum non alterant, verum in excrementitium quid conuertunt, qua ratione pituitosos quoque morbos annumerat Celsus. Vnde quum cerebrum natura frigidum sit, si quid humidi in eo sit, exprimit, ac distillationes cum tussi facit; ex quibus rursum distillationibus asthma & crebri anhelitus oriū habent, quantum à proprio quodam humore, qui instrumenta respirationis obstruat, fieri possint. Haec igitur praedictae affectiones (sicuti etiam articulorum dolores) vrinae stillicidia, ac dis-

scultates, à frigidityte oriuntur. Malus autem habitus (quem ὀρεκτικὸς Graeci appellant) à virtutum naturalium debilitate fit, natura iustum alimentum non sortita. At alui vitia quae enumerat, à recrementitio & pituitoso humore generantur: siquidem quantumvis partes corporis in senibus sicciores fiant, multitudinem tamen superfusitatum pituitosam coacervant: atque haec si aggregentur, senes somnolentos efficiunt; sin minus, vigiles: nam vigiliae quas senes infestare dicit, à siccitate sunt.

### Præter hæc graciles.

VT nihil orationi deesset, postquam etatibus proprios morbos dixit, temperaturas quasdam bene vel male ad hos vel illos morbos se habere ostendit. Graciles enim, & qui stricto sunt pectore, hoc est biliosi, promptissimè in tabes ex ulcere pulmonis incidunt; quemadmodum etiam in distillationes, laterisque dolores. Obesi autem morbis acutis ferè periclitantur: angusta enim sunt eorum vena ac arterie; atque ob id paucū omnino sanguinem spiritumque habent: adeo ut quum etate procefferint, citissimè, atque leuissima quavis de causa calor innatus eos destituat, atque ita citò facileque strangulentur. Per acutos morbos, anginam, apoplexiam, & id genus alios, qui ratione accidentium potius quam materia, acuti dicuntur, intelligit. quod & Hippocrates innuit, quum dicit, naturā admodum crassam citius interire, quam graciles.

## CAPVT II.

\* notis

### De \* signis aduersæ valetudinis futuræ.

**A**NTE aduersam autem valetudinem (vt suprā dixi) quædam notæ oriuntur, quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atque consuevit, neque in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra



ultrà progredi possunt, ferè retro, quasi ruina quadam, reuol-  
uuntur. Peius tamen signum est, vbi aliquis contra consue-  
tudinem emacruit, & colorem decoremque amisit, quoniam  
in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ  
desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc pro-  
tinus timeri debet, si grauiora membra sunt, si crebra vlcera  
oriuntur, si corpus supra consuetudinem incaluit, si grauior  
somnus pressit, si tumultuosa somnia fuerunt, si sæpius exper-  
giscitur aliquis, quàm assuevit, deinde iterum soporatur, si  
corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudi-  
nem insudat, maximeq. circa pectus, aut ceruices, aut crura,  
vel genua, vel coxas. Item si marcet animus, si loqui & mo-  
ueri piget, si corpus torpet, si dolor præcordiorum est, aut to-  
tius pectoris, \* aut, qui in plurimis euenit, capitis: si saliuæ ple-  
num est os, si oculi cum dolore vertuntur, si tempora astricta  
sunt, si membra inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa  
frontem intentæ venæ mouentur, si frequentes oscitationes,  
si genua quasi fatigata sunt, totumve corpus lassitudinem sen-  
tit. Ex quibus sæpe plura, nunquam non aliqua, febrem an-  
tecedunt. In primis tamen illud considerandum est, nun-  
quid sæpius horum aliquid eueniat, ac ideo neque corporis  
vlla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates  
hominum, sine quarum noticia non facilè quicquam in fu-  
turum præfagiri potest. Facile itaque securus est in his ali-  
quis, quæ sæpe sine periculo euasit. Ille sollicitari debet, cui  
hæc noua sunt, aut qui ista nunquam sine custodia sui \* tuta  
habuit. \* tutò

\* alias, aut  
in plurimis  
venis capi-  
tis.

## ENARRATIO.

**H**OC & reliqua quæ de signis sequun-  
tur capita, auctor noster ex Hippocra-  
tis tum predictionibus virisque, tum quarto  
Aphorismorum desumpsit: quare si quis co-  
pioforem horum desideret interpretationem,  
ad Galenum recurrat; nobis sat erit breuiter  
locum loco per capita reddidisse, ac sicubi  
scrupulus aliquis orgeat, eum pro ingenio  
nostri modulo truisse, & si qua typogra-

phorum incuria vitata videbuntur, quàm  
poterimus maxime pristino restituisse nitore.  
Itaque quod omnes in peius vel melius mu-  
tationes suspecta sint, hic declarat, & antè  
ab Hippocrate definitum est, exemplo ab  
athletis sumpto. Athletarum enim consti-  
tutiones bonæ quum in extremo fuerint, pe-  
riculosa; neque enim possunt in eodem per-  
manere aut quiescere: quum verò non con-  
sistant.

K. 2.



sistant aut quiescant, iam in melius proficere haud possunt: reliquum est igitur, ut decendant in deterius. Sed de his latius Galenus. Ceterum quum facilius sit pleno corpori aliquid adimere, quam exhausto addere, hinc maius periculum imminere certum est.

### Præter hæc protinus, &c.

**Q**UÆ immodicas exercitationes excipit lassitudo, sanorum symptoma est; quæ verò sine his consistit, morbosum: lassitudines enim spontaneæ, ut inquit ille, prænuñtiant morbos. Fit autem triplex in lassitudine sensus, autore Galeno libro De Symptomatum causis: Ulcerosus est, quum ulcerum sensus per corpus transcurrere videtur; id verò motis magis accidit quam quiescentibus, nisi magna admodum fuerit lassitudo; ac putant ita affecti perinde se pungi, ac si complures ipsis acus sint infixæ, nam à rodente humore hoc symptoma nascitur. At cum tendi videtur corporis moles, citra aliquam manifestam causam, affectus huiusmodi lassitudo tensiva, spontanea nominatur, euenitque potissimum ob multitudinem continentes partes distendentem, adeo ut ipsam continere non possit. Per tertium autem lassitudinis genus, quo aiunt osium se fatione teneri, ne minimum quidem motum laborantes tolerare possunt, manifestusque in ipsis est caloris sensus, neque tensionis mordicationisve; quippe magna vitiatorum humorum copia per totum animalis corpus transmittitur. Prima igitur species lassitudinis, quum ex vitiatæ humoribus ortum habeat atque ex plenitudine, tertiæque ex utrisque simul mixtis; non mirum, sicuti accidant aduersam valetudinem prædicere. Ulcera autem suspecta esse contingit, tum propter qualitatem, tum quantitatem humoris peccantis. Et quæ quidem de ulceribus hic scribit Celsus, ex secundo Hippocratis Aphorismorum transsumpsisse videtur, ubi dicit: Sicubi fauces male habent, aut in corpore tubercula enascuntur, excrementa intruere conuenit: nam si biliosa fuerint, corpus simul agrotat; si verò sanis similia enascenti, liberum erit corpus nutrire. Celsus

quoniam omnes quæ in peius vel melius sunt mutationes suspectas habet, excrementorum ne meminisse quidem voluit, quæ alioqui consideranda monet Hippocrates.

### si corpus supra consuetudinem, &c.

**N**ON solum repentinus, & præter consuetudinem eueniens calor, suspectus est; sed etiam frigus: quemadmodum reliquæ ad unum omnes repentina mutationes; nam quum sanitas symmetria quedam sit, ac commoderatio calidi, frigidi, humidi & sicci, necessum erit eorundem excessum morbos parere, ac prænuñciare. sic Hippocrates qua parte corporis calor aut frigus sit, ibi iam morbum esse dicit. Per dictionem autem supra consuetudinem, intellexit excellentem aliquem aut ingentem excessum.

### si grauior somnus.

**P**ER grauem somnum, eum intellexit, quem Hippocrates laboriosum vocat: is autem quum in morbis malum sit signum, recte si ante eisdem contingat, futuros præsagiat. Naturalis autem somnus ac moderatus, fit ex enaporatione alimenti: siquidem vapor suavis & utilis ex nutrimento exhalans, cerebrum petit, & ab eodem refrigeratus & in humorem coactus, destitit in cerebro, & meatus sensuum & nervorum motuorum obstruit. Quum igitur somnus naturalis propter suaves halitus cerebrum petentes fiat, accidit ut in eo sensoria placide quiescant: intemperatus verò immoderatusque somnus quum ex mala cerebri intemperie, ac plus satis frigida ac humida oriatur, morbo us est; signum videlicet & causa morbi. Vigilia contra immoderatam siccitatem portendunt, tumultuosæque insomnia, acerbis & nidorosis vaporibus cerebrum perit indicio est.

### si corpus dormientis, &c.

**N**ON solum futurum morbum in aliqua parte corporis sudor, ut puta pectore, cervice, aut alia quavis parte, præsagiet: sed eum iam adesse significabit. notus est enim Hippocratis



procratis Aphorismus: Qua parte corporis sudor, ibi morbus. Verum auctor noster id in praesentiarum non videtur voluisse; sed quod alibi ab eodem sene dictum est, nempe quod sudor multus a somno factus absque causa manifesta, corpus vii pluri cibo significet: quodq; si cibum non accipienti hoc accidat; scire oportet quod euacuatione indigeat. Neque enim absre Celsus noster innuit: Hippocratem, corpus dormientis dixit; quippe quum naturales omnes facultates in somno sua munia obeant validius, atq; adeo inutilia ab utilibus separent, nihil mirum statim a somno quum sanguis & spiritus ad exteriora corporis reuertuntur, simul etiam excrementa ad cutim deferri, atque per sudorem expelli. Calor enim per somnum fortior factus, ad exteriora materiam per sudores idoneam secum facilius effert. Sudor igitur si multus fuerit, copia humorum corpus grauari significat: per sudorem etenim tenuia excrementa quum excernantur, crassiora in corpore manere consentaneum est. Oscitationes ac pandiculationes contentam aliquam in musculis humiditatem vel vaporem spiritum significant, quo grauati huiusmodi motus conciliant. Inhorrescunt autem membra prauis humoribus per cutim discurrentibus. Reliqua ferè quae subiicit, ex

his & antedictis peti possunt, praeterquam quod hic quoque transcribentium vitium esse videatur, qui corpus torquere pro torpere posuerint, & vii facilis lapsus fuit in literarum transpositione, sic melius quaderabit lectio, si corporis torporem marcori animi opponamus.

### Inprimis tamen illud considerandum.

CONSVETUDO Aristoteli Altera Natura dicta est: nam & Galenus ipse in idem ferè incidere Consuetudinem & Naturam dixit: sic libro Sanitatis tuende, Consuetudinem, assuetitiam acquisititiamque naturam in corporibus gignere docet, adeo ut Hippocratis oraculo quae longo tempore assuerit sint, etiam si deteriora sint, minus infieris, quantumuis melioribus, molestare didicerimus. Huc quoque respexit Galenus in secundum Prognosticorum comentario, Consuetum bonum, atque insuetum malum, pronuncians. Verum Celsus ipsam non solum consuetudinem considerandam monet, sed corporum etiam quorundam proprietates: sunt enim, ut inquit, quaedam proprietates hominum, quae quum talis sint maxime alienae, illis propriae ac familiares sunt quodam modo.

### CAPVT III.

#### Quae bona in egrotantibus signa sint.

**V**BI verò febris aliquem occupat, scire licet non periclitari, si in latus aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis: qui ferè sani quoque iacentis habitus est: si facile conuertitur, si noctu dormit, si interdiu vigilat, si ex facili spirat, si non conflictatur, si circa umbilicum & pubem cutis plana est: si praecordia eius sine vlllo sensu doloris aequaliter mollia in vtraq; parte sunt: quod si paulò tumidiora sunt, sed tamen digitis cedunt, & non dolent, haec valetudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque quod aequaliter molle & calidum est, quod-



que æqualiter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatem venit corpus. Sternutamentum etiam inter bona indicia est: & cupiditas cibi, vel à primo seruata, vel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidem, quæ quamuis longiore tempore euauit, tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit, sic ut corpus integrum quod εἰληκνὲς Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet, & in urina subsidere album, læue, æquale, sic ut etiam, si quæ quasi in nebula innatarint, in imum deferantur. At venter ei qui à periculo tutus est, reddit modò mollia, figurata, eodem ferè tempore, quo secunda valetudine assuevit: modò conuenientia his quæ assumuntur. Peior cita aluus est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & ruffa est, neque foeditate odoris similem aluum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum signum est. Sonus ventris inde ad inferiores partes euolutus, magisque etiam si sine difficultate cum stercore excessit.

## ENARRATIO.

**O**PTIMVS in agrotantibus habitus is est, qui valentibus quàm similis est: ut pessimus & exitialis, qui quàm maximè contrario similis. febriciens igitur si in latus dexterum, aut sinistrum, aut ut ipsi visum est, paulū reductis cruribus, cubet (qui ferè bene habentium dum cubant est habitus,) non periclitatur: neque enim poterit, aut in latus, aut ut ipsi visum fuerit cubare, citra robur facultatis per musculos firmantis corpus; atque ita quoque fiet ut facili conuertatur.

si noctu dormit:

HOC enim natura robur indicat, atque eam quàm minimè à naturali conditio-

ne recedere, dies enim vigiliis ut nox requiei data;

si ex facili spirat.

FACILIS spiratio, inquit Hippocrates, in omnibus acutis morbis, in quibus febris copulatur, quique intra quadraginta dies indicari solent, magnum ad salutem habet momentum: significat enim neque thoracem, neque cor ac pulmones, neque septum transversum doloris quandam habere affectionem; vti nec partes iis adiunctas, cuiusmodi sunt stomachus, lien, iecur: ex etenim aut inflammare, aut alio quouis modo affe-  
cte, dum per respirationem moventur, dolore afficiuntur.

si circa



si circa umbilicum, &c.

SIGNIFICAT enim refecti corpus; nam omnis extenuatio, ut alibi Hippocrates, laxat autem, deinde intendit; refectio contra. Rigoritas igitur corporis concidentis & extenuationem patientis; extensio vero refecti signum est.

si prae cordia eius.

QVOD videlicet omnis suspicio affecti hepatis aut lienis absit: nam si dextrum praecordium tendatur, ab hepate fluxiones sunt; si sinistrum, ad lienem. Notus in hanc sententiam primo Prognosticon Hippocratis locus: Praecordia saluberrima sunt, quum dolore vacant, si mollia & equalia sint dextera & sinistra parte. Quod si paulo tumidiora esse contingat, sed tamen digitis cedant, neque doleant; haec quidem valetudo ut spaciū aliquod habeat, sic tuta erit: quod videlicet, sicut inflammationem nullam subesse denotat, sic defluxum aliquem humorum qui quantitate magis quam qualitate peccent, eo defluxisse demonstrat. qui quidem humores ut omnis ferè extraneae qualitatē exortes sunt; ita nisi distendant praecordia, dolorem aliquem concitare nequeunt, quando ad doloris procreationem requiratur tensio alicuius particulae, aut acrimonia materiae peccantis. Porro humor hic quem ad alterum praecordium defluxisse dixi, licet extraneae alicuius qualitatē expers sit, iustum tamen ad eiusdem enacuationem spaciū requirit: quare auctor noster valetudinem hanc tutam quidem esse pronunciat; sed ita, ut spaciū aliquod habitura sit.

Corpus quoque, &c.

AQUALITER calidum corpus dici potest; quod circa intemperiem calidum est; id enim aqualiter, hoc est uniuersum erit calidum, quum procul mota omni caliditatis externa suspitione, insito calore corpus totum aqualiter caleat, ac proinde morbi omnem suspitionem amoueatur: ante enim dictum est, quod qua parte corporis calor aut frigus, ibi morbus est; particula videlicet illa intempe-

rie aliqua grauata. De sudoribus etiam dictum est. at quod ij boni sint à toto corpore, si febris eisdem soluitur, non semper verum est: nam qui criticis diebus contingunt, ut securitatem semper pollicentur; ita qui diebus parulis accidunt, morbum quidem soluere videntur, sed grauius periculum à recidua minantur; febricitantem enim nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidivare.

Sternutamentum etiam, &c.

STERNUTAMENTVM, bonum signum est, in morbis praesertim capitis, ut distillatione, gravedine, & similibus: fit autem sternutatio maximis inspirationibus praegressis, & efflatione celerrime subsequente: habet enim cerebrum has duas facultates, per quarum alteram superfluitates in anterioribus ventriculis excernit ad seipsum contrahit; per alteram vero nasi alas expandit, & spiritum attrahit: quum itaque à spiritibus grauatur, tunc ipsum excernit per contractionem sui; si vero in naribus viis obturatis, impeditur excernere grauantiem spiritum aut mucum, tunc violento motu ad sternutationem procedit, depellere conans ea quae meatu obturant, unde sternutationes in capitis affectibus non solum bona indicia dicimus, sed eosdem sanare, quemadmodum omnes ferè affectus circa cerebrum existentes. Sic Hippocrates mulieri quae uterinis molestat, aut quae difficulter parit, superuenientem sternutationem boni esse signum dixit: quia videlicet naturam ostendit, & propriarum meminisse actionum, & quae prius erat emorua, reminiscere atque excitari, quando aliquam eiicit superfluitatem.

& cupiditas cibi.

FAMES, ut docet Galenus, est suctionis sensus: perit vero sensus is, quum ventriculus nimio humore madens (crasso praesertim & lento) se inaniri minime percipit; vel tum etiam, quum per vehementes affectus sopita ac ferè prostrata est illius sensus vis, ut in vehementissimis intemperaturis & magnis



Et magnis fluxionibus plerumque accidere solet. At vero ipsa sectio fieri desinit, vel ob nimiam plenitudinem vasa occupantem; vel cum nimia sit parium dissolutio, paribus utique impleri minimè indigentibus, quare in morbis vel à primo servata, vel post fastidium orta cibi appetentia, bonum erit: quod ab Alexandro quoque Aphrodisco proditum est libro secundo Problematum: dicit enim, qui februnt, suture quidem ob febrilem calorem; famem vero non sentire, quoniam multam vitiosam materiam in stomacho continent: Convalescentes autem iam famere, quod febres late humores consumperint. Quanquam, si quis aphoristicas sternutamentum & cibi appetentiam accipiat; per hanc quidem naturalium facultatum consistentiam roburque (siquidem Galeno teste hæc tota actio quum non sit animalis sed naturalis, haud aliter in animalibus quam in plantis perficitur,) uti per illam animalium facultatum vim intelligemus.

### Neque terrere debet

ea febris, &c.

TACITE videtur hic intermittentes tum continuas conferre; quasi dicat: Intermittentes febres omnes, periculo magis vacant quam continuæ; atque inter has magis quæ ex toto ante alterum paroxysmum quiescunt. Atque, ut ad huius veram cognitionem deveniamus, continuarum & intermittentium discrimen enarrandum est. Interdum igitur in genere carnosum, (hoc est in meatibus & venulis per totam carnem dispersis) quum ibi solita corporis excrementa ob cutis asfrictionem deinentur, putrescunt: putrescunt enim quia non dissoluntur, perveniuntque febrem intermittentem; nam resolutio in prima accessione putri humore, & remanet velut focus quidam, in quo vel postero vel alio quovis sequente die rursus putrescat humor, qui partim relictus ex priore accessione erat, partim ex maioribus vasis in minora confuxerat, ob cutis videlicet constipationem derentus; fitque nova accessio serius ac tardius pro humorum conditione. In vasis vero aut aequaliter omnibus, aut in magnis

(cuiusmodi sunt iecoris, ventris, pulmonis, & quæ inter alas & inguina existunt) continuam febrem accendunt: ut meritis tum ratione loci affecti, tum humoris copia continua intermittentibus & seniores & periculosiores sint; quod ab Hippocrate quoque proditum est: Febres enim quacunque non intermittentes, inquit, tertia die fortiores sunt, magis periculosa; quocunque autem modo intermiserint, maius periculum abesse significant. Sed hic quoque difficultas oriri posset, quanam intermittentium periculo maximè vacet, cæne quæ quotidie, an quæ de quarto in quartum, an quæ de tertio in tertium accessiones suas faciat? De quotidiana quidem Galenus statim sententiam profert: Longa (inquit) est, & periculo non vacat, est autem non solum longa, quod in longius tempus producat, sed & quod longas habeat accessiones; atque eas quotidianas. Vnde de hac Celsum non fuisse locutum, satis constat: siquidem tum ob antedictas causas periculo non vacat; tum etiam quod habitum corporis refrigeret, ac calorem innatum extinguat, gignatque magnum recrementorum in corpore prouentum. At intermittentium brevissimam simul & tenuissimam, tertianam dicit Galenus; quartanam longissimam quidem, sed tantam quantum in se est; nam quamvis longissima sit, breviores tamen, puriores, & longiore intervallo repetitas accessiones facit quam quotidiana: quo fit, ut & natura tempus longissimum relinquatur, in quo concoctioni contumacium humorum, ac corpori alendo resarciendisque viribus vacet, quare si quis Celsum de quartanis locutum putet, per me sane integrum erit: quanquam de tertianis intelligere malim; eas etenim mansuetissimas rectè nominat Galenus, non quod graviter non infestent (urgent enim & caloris vehementia, & siti, & id genus aliis symptomatis,) sed quia omnino vacant periculo, & minus malignæ sunt; & quod ratione humoris peccantis à natura facile evinci possint. Quanquam sermo simpliciter sic intelligi posset, ut continuæ, cæteris paribus, intermittentibus periculo minus vacent: exempli



empli causa, quotidiana continua intermit-  
tentibus; continua tertiana iisdem intermit-  
tentibus; quartanaq; continua iisdem inter-  
polatis: siquidem propter continuos atque se-  
inmicem excipientes paroxysmos, non relin-  
quitur tempus ad morbi maturationem, ma-  
teriaque peccantis expulsionem, aut medi-  
camenti propinationem; dehinc quod acces-  
sionum ingi exacerbatione corpus atque vi-  
res aegri fatiscere atque deficere contingat.  
Quod de diariis febribus dicit, clarius est  
quam ut expositione egeat, quando ex in-  
guinum tumoribus febres orta omnes male  
sunt; sola autem diaria inter has periculo  
vacant.

### Si quis autem incidit vomitus.

SINCERÆ omnes deiectiones aut pur-  
gationes, mala sunt: appello autem sin-  
ceras, quæ duntaxat unum aliquem, qui  
excernitur, humorem ceteris impermixtum  
habent. quare rectè laudant Celsus vomit-  
tum, si quis incidat, qui ex bile & pituita  
mixtus sit: nam qui purè biliosus est, caloris  
copiam; pituitosus, frigoris maximam in-  
temperiem denotat.

### & in vrina subidere album, &c.

QUALITATIS aut quantitatis vrina  
non meminit, satis rarus contentorum men-  
tionem fecisse. Vrina igitur quæ absque  
contentis omnino visuntur, magnum defe-  
ctum concoctionis demonstrant. Sunt autem  
contenta, superfluitates quædam tertia con-  
coctionis, quod si igitur hæc minus inspiciantur,  
ostendunt concoctionem illam deficere;  
siquidem ubi sit concoctio, etiam superflui-  
tatis alicuius sequestratio obitur. Virtutem  
igitur sanam in tertia concoctione, contenta  
mediocriter alba, lenia, & aqualia, & quæ  
in unum deferantur, hoc est quæ cohæreant,  
demonstrant. Ratione enim cognitum est,  
ut ait Galenus, sanguinem ad album colo-  
rem verti, quum de colore suo mutatur le-  
gibus nature alteratur atque transuersus. at-  
que huius quoque rei fidem faciunt, tum lac

ipsum, tum semen; quæ de sanguine puriore  
in album transmutantur colorem. Verum,  
ut securitatem omnino polliceatur hyposta-  
sis, non requiritur intensa admodum albedo  
(eiusmodi enim imperfectam adhuc conco-  
ctionem, copiamq; crudi ac pituitosi humoris  
indicat: vocaturq; humorale sedimentum:) sed  
neceffe est, ut subalba sit; ut lauis, ut  
aqualis, ut sibi bene cohærens, cœ in pyra-  
midem asurgat, eamque semel atq; iterum  
ita apparuisse non suffecerit, quum reliquo  
morbi decursu crudum incoctumque ferè ap-  
paruerit lotium, crudum quendam humo-  
rem, hypostasi non dissimilem, in se conti-  
nens: sed ut toto morbi tempore præsertim  
à statu tale conspiciatur, quod voluit Hip-  
pocrates per eam particulam quam adiecit:  
per omne tempus, dum morbus  
iudicetur, tum enim securitatem pol-  
licetur, morbumque sine periculo esse, atque  
integrè exoluendum, ita ut non sit præterea  
repetiturus. Nubecularum aut eneorema-  
tum eadem est ratio. sunt enim hæc quoque  
ut de sedimento dictum est, superfluitates  
tertia concoctionis. si ergo nubecula quæ in  
vrina circumfertur, candida sit atque in  
unum deferatur, bona quidem est; sed mi-  
norem concoctionis elaborationem quàm hy-  
pостasis alba, significat. Omisit sedimen-  
subrubrum & læne in vrina subrubra; quod  
etiam salutare, sed diuturniorem morbum  
portendit Hippocrati: idq; forè quod quæ  
perfectam morbi solutionem atque concoctio-  
nem indicarent, Aphoristica breuitate con-  
tentus, satis dicta putaret.

### At venter ei qui à periculo tutus est, &c.

QUEMADMODUM facultatis quæ in  
iecinore & venis est indicia ex vrina su-  
muntur; ita facultatis quæ in ventre, ex iis  
quæ quotidie deiciuntur. Facit autem opti-  
ma deiectionis dignotionem, à qualitate &  
tempore quo eadem excernuntur, & ab as-  
sumptorum convenientia. Dictum est autem,  
omnem habitum qui à sanorum natura  
quàm minimè variat, salubrem esse. Ven-  
ter igitur ægroti si suo fungatur munere,  
ac talia

L



ac talia reddat, qualia sanis reddere solet, periculo vacat. huiusmodi autem sunt, non dura sed mollia, non tamen quæ extremè mollia sunt, sed quæ constantia permancant, debitoque tempore excernantur; & quorum copia ex ratione ingesti cibi sit; & in summa, quæ neque graviter oleant, neque adscitum quid habeant. Cita autem alius peior est, quod è iccore a: quæ liens fluxionem fieri ad ventrem denoter.

### Ac lumbricos quoque, &c.

LUMBRICI in febribus & citra febres, tum multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum temporibus differentes sunt: circa initia enim morborum generati, substantiam suam ex subiacente corruptione accipiunt; circa vigorem, ex morbi malitia; sicuti circa declinationem, ex permutatione omnium in melius: qui sanè citius separantur: Natura enim ipsos reliquorum excrementorum instar foras propellit: atque id voluisse Celsus videtur. Verum quum tres univèrsim sint lumbricorum differentia, an de una aliqua tantum, an de omnibus in genere dixerit, considerandum est. Omnes autem quotquot sunt ex cruda, crassa, pituitosaque materia originem habent, quæque putredini quàm maximè sit obnoxia: unde & pueros, & eos qui voraces natura sunt, contingit iisdem abundare. Lumbricus igitur qui latus appellatur, in febribus raro conspicuus est; in diuturnis longisque morbis, frequentius apparet. Est autem lumbricus latus (si ita dicere liceat,) permutatio adnata pellicula interioris intestinorum membrana in corpus quoddam vitium quod morsus infert, quod sæpè totum redditur incredibili longitudine; adeo ut interdum intestini totius longitudinem æquet, à quibusdam fasciæ (ob id quod his similes sint) tanique vocantur; frequentius tamen pars ipsius quàm totum excernitur. Verum auctor noster non videtur de istis verba fecisse; quanquam bonum quoque sit hos excernisse. At qui teretes dicuntur lumbrici, ut aliis omnibus sunt

frequentiores; ita formam omnibus conspiciam habent: consistuntque magna ex parte in gracilibus intestinis, atque superiores ventriculum subeunt: & ideo per os frequenter reiciuntur; quemadmodum nonnullis per nares etiam reddere contingit. Peculiare vitium infantibus admodum est, maximèque si febricula inuadat: ac de iis Celsus (sicut & Hippocratem) pronunciatum reliquisse verisimile est; quod videlicet lumbrici teretes, eunte in indicationem morbo si descenderint, idoneum bonumque sit: satius enim eos cum reliquis recrementis per anum expurgari quàm per vomitum reici.

### Si inflammatio in superioribus partibus.

OMNES tumores ex æquo quibus dolor feruorque adest, Inflammationes Latini vocant, Græci φλὴγμονας. Verum quum sanguis probus ac crassitie mediocris in partem aliquam univèrsim confluerit, ac propter copiam compactus haerit, inflammationes propriè nominata nascuntur; de quibus sub morbi finem apparentibus Celsus locutus videtur. Atqui cur eas in superioribus, quàm inferioribus magis probarit, nondum satis assequor: nisi per superiores partes, extrema aut superiora ipsius inflammationis intelligere libeat.

### Sonus ventris, &c.

SI flatu, inquit Hippocrates, sine sonitu, crepituque excernatur, optimus est; melius verò est quoties erumpit cum sonitu, quàm si condatur ac reuoluatur: sed is qui cum sonitu sit, aut prorsus copiam flatuosi spiritus, aut angustias orificiorum indicat. At verò quoties spiritus copia non admodum fuerit, & item orificia per quæ excernitur laxiora, tantisper sine sonitu in talibus flatibus excernatur oportet. Unde non tam bonum quàm malum signum Hippocrati ventris sonus videtur: nam optimum flatum, si sine crepitu sonituque excernatur, dixit; eum tamen qui cum sonitu emittitur, non simpli-

ter



citer bonum, sed meliorem eo quem pudore  
circumstantium intro recondimus atque re-  
uoluimus: nisi forte hinc bonum signum di-  
camus, quod à superioribus ad inferiores par-  
tes denotatur, atque adeo robur virtutum  
naturalium indicet.

## CAPVT IIII.

*Mala signa egrotantium.*

**C**ONTRA, grauis morbi periculum est, vbi supinus aeger ia-  
cet, porrectis manibus & cruribus, vbi residere vult, in  
ipso acuti morbi imperu, præcipueque pulmonibus laboran-  
tibus. Vbi nocturna vigilia premitur, etiam si interdiu som-  
nus accedit. Ex quo tamen peior est, qui inter quartam ho-  
ram & noctem, quam qui matutino tempore ad quartam.  
Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdiu  
accedit: id enim ferè sine continuo dolore esse non potest.  
Æquè verò signum malum est, etiam somno ultra debitum  
vrgeri, peiusque quo magis se sopor interdiu, noctuque con-  
tinuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer &  
crebrò spirare, à sexto die coepisse inhorrescere, pus expuere,  
vix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre  
morbum, iactare brachia & crura, sine voluntate lacrymare,  
habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem  
circa vmbilicum & pubem macram, præcordia inflammata,  
dolentia, dura, tumida, intenta: magisque si hæc dextra par-  
te, quam sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si venæ  
quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum  
est, nimis celeriter emacrescere, caput & pedes, manusque ca-  
lidas habere, ventre & lateribus frigentibus, aut frigidas ex-  
tremas partes acuto morbo virgente, aut post sudorem inhor-  
rescere, aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos,  
aut post cupiditatem cibi, postve longas febres hunc fastidi-  
re, aut multum sudare, maximeque frigido sudore: aut habe-  
re sudores non per totum corpus æquales, quique febrem non  
finiant, & eas febres quæ quotidie tempore eodem reuertan-  
tur, quæue semper pares accessiones habeant, neque tertio  
quoque die leuentur, quæue continuant, vel per accessiones \* ve-  
increscant,

L 2

increscant,



increſcant, per diſceſſiones tantum molliantur, nec vnquam integrum corpus dimittant. Peſſimum eſt, ſi ne leuatur quidem febris, ſed æquè concitata continuat. Periculoſum eſt etiam poſt arquatum morbum febrem oriri, vtique ſi præcordia dextra parte dura manſerunt, ac dolentibus his læua. Nulla acuta febris leuiter terrere eos debet: neque vnquam in acuta febre, vt à ſomno non eſt terribilis neruorum diſtention. Timere etiam ex ſomno, malè morbi eſt. Itemque in prima febre protinus mentem eſſe turbatam, membrumve aliquod eſſe reſolutum. Ex quo caſu quamuis vita redditur, tamen id ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculoſus eſt ſincera pituita, vel bilis, peiorque, ſi viridis, aut niger eſt. At mala vrina eſt, in qua ſubſidunt ſubrubra, aut liuida: deterior, in qua quaſi fila quædam tenuia, atque alba: peſſima ex his, ſi tanquam ex furfuribus factas nubeculas repræſentat: diluta quoque atque alba vitioſa eſt, ſed in phreneticis maximè. Aluus autem mala eſt ex toto ſuppreſſa. Periculoſa etiam quæ inter febres fluens, conquieſcere hominem in cubili non patitur: vtique ſi quod deſcendit eſt perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut ſpumans. Præter hæc periculum oſtendit id quod excernitur, ſi eſt exiguum, glutinoſum, læue, album, idemque ſubpallidum, vel ſi eſt aut liuidum, aut bilioſum, aut cruentum, aut peioris odoris, quam ex conſuetudine. Malum eſt etiam, quod poſt longas febres ſincrum eſt.

## ENARRATIO.

**H**IC (vt in aliis omnibus) lectorem admonitum oportet, ne quid remere pronunciet, niſi primum probè perſpectum habeat, ſi ne conſuetus ita cubare aut facere. Ante omnia autem mirari hic ſubuenit, cur Celſus ſupinam cubationem inter mala ſigna & ea quæ periculum minentur, nominariſ, quum Hippocrates non omnino malum aut bonum, ſed minus bonum tantum, reſpectu videlicet eius quæ in alterutrum latus fit cubationis, pronunciarit: dicit enim: Supinum cubare manibus & cruribus exten-

ris, minus bonum. ita vt talis iacentis habitus extremè bonis aut malis ſignis annumerandus non ſit, ſed neutrius: vt quæ nec ad ſanitatem vim habeant inſignem, nec ad mortem; ſed aut integrè media ſint, aut parum ad alterutrum tendentia. Rectius ergo Celſus minus bonam appellaret quàm periculoſam, quanquam ſi quis Celſi patrocinari velit, ſupinum decubitus malum dicere poſſet, quod ferè reſolutionem quampiam præ ſe ferre videatur.

dolorem



## dolorem habere continuum.

PRIORA hac magnitudinem morbi indicant; brachiorum autem & crurum iactationes, inquietationem (ut ait Hippocrates) significant: constantur enim quousque iacentis habitus, ita ut alium ex alio frequenter immutent. Non spontanea autem lachryma, citra exceptionem non omnino male sunt: siquidem quae a causis externis, ut si festuca aut aliud quippiam simile in oculum ceciderit; aut quae oculi palpebrarum asperitate contingunt, mali omnino nihil praesagunt. quae autem in febribus aut aliis morbis citra manifestam aliquam causam voluntaria oboruntur lachryma, mala sunt; praesertim si ob imbecillitatem facultatis reitricis acciderint: quod hinc fieri cognoscemus; si reliqua etiam signa perniciosa sint; nam aliqui sanguinis ex naribus profusum potius praesagirent, ut sexto Epidemion docet Hippocrates: dicit enim, Quibus in febribus lachryma, atque iis praesertim acutis & ardentibus, praeter voluntatem emanarint, his sanguinis ex naribus profusum expectandum: idque si reliqua se non male habuerint; in quibus vero male se habent, his non sanguinis eruptionem, sed mortem potius portendit.

## habere humorem glutinosum, &amp;c.

Hippocrates tum Aphorismorum quarto, tum sub finem quarti Epidemion, in febribus huiusmodi lentores circa dentes, augmentum aut fortitudinem febrium significare docet; quod videlicet (ut auctor est Galenus) lentores huiusmodi citra caloris multitudinem pituitosam humiditatem exiccantem nasci non possint. Philotheus tamen censet eos fieri propter humores frigidos in ventriculo contentos, à quibus vapores sursum & ad dentes delati concreverunt. Non tamen semper magnitudinem morbi circa dentes lentores huiusmodi significabunt; sed in febribus tantum, ut docet Hippocrates: nam citra febres etiam nonnumquam nascuntur, propter lactis, aut alienius cibi qui

dentibus adheret, usum, nihil mali praesertim unde periculum immineret) significantes.

## cutem circa umbilicum.

QUEMADMODUM praecordia saluberrima sunt, quae dolore vacant, mollisque & aequalia sunt dextra & sinistra parte; ita si aliqua parte temperiem exceperint, insalubria sunt. Quare si praecordia inflammantur, aut aliqui tumida, aut inuenta sunt, recte malum praesagire docet, ut quae à naturali temperie recedant atque declinent. Intenduntur autem, ut docet Galenus, sine inflammatione proprie vocata, aut propter vehementem siccitatem, non solum illa parte, sed etiam in septo transverso, costis, membranis, aut etiam propter inflammationem in ipsis membranis musculorum costis succingentium consistentem. Considerandum autem docet Celsus, in utra parte inaequaliter sint affecta: si enim in dextera parte sit, maius imminet periculum propter visceris subiecti, nempe iecinis, nobilitatem. Quod si & vena ipse in praecordiis vehementer agitentur, periculosum & id est: perturbationem enim (ut ait Hippocrates) aut delirium significat. Cutis autem circa umbilicum & pubem macra, humiditatis naturalis defectum denotat.

## Mali etiam morbi signum.

REPENTINAS omnes mutationes ante ex Hippocrate malas diximus. Non mirum igitur, si ex morbis corpus celeriter contabescens & macie correptum, mali & magni morbi signum sit: siquidem quum naturalis macies calidam & seccam temperiem significet, ea etiam quae in morbis celeriter evenit, magnum intemperiei excessum, aut aliqui virium imbecillitatem demonstrabit. Notus est in hanc sententiam Hippocratis Aphorismus: Eorum qui non omnino leniter febricitant, perstare, aut nihil comminui, aut magis quam ratio exposulat extenuari corpus, malum: alterum enim morbi diurnitatem; alterum virium imbecillitatem significat,



significat, qua magna ex parte cutis rarita-  
tem & humoris tenuitatem consequatur.

ventrem continentur, vix; exteriora algera  
contingit.

### Caput & pedes manús- que calidas, &c.

OPTIMUM omnino est, si corpus omne  
aque calidum molleque est: id enim opti-  
mam corporis indicat affectionem. At si  
peditus manibusque & capite calentibus;  
venter inus & thorax frigeat, malum  
omnino & exitiale signum: nam (ut  
secundo Prorethicon Hippocrates) sum-  
ma sine extrema corporis partes, si celeriter  
in utranque conditionem, hoc est calidum  
vel frigidum, permittentur, malum. Hæc  
autem permutatio contingit in malignis ad-  
modum morbis (Galeno teste) hora vnius  
spacio: efficitur autem, quum propriam non  
habuerint caliditatem, atque a febrili cale-  
fiant; qui a corporis medio incipiens, flam-  
maque similis, totum corpus depascens, con-  
fertim ad artus seu extrema, relictis interio-  
ribus, rapitur; atque ea calefacit, interiori-  
bus frigentibus.

### aut frigidas extremas.

EXTREMAS partes vocat, caput, pedes,  
manus, anres. Acuti autem morbi quot  
qualisque genere sunt, iam ante dictum est:  
sed de quibus pronuntiatum reliquit Celsus,  
considerandum est: nam & Hippocrates fri-  
giditatem extremarum partium (sicuti hic  
quoque Celsus) in morbis acutis malum di-  
xit: alio etiam loco clarius non nihil: Si,  
inquit, in febribus non intermittentibus, par-  
tes exteriores frigide; interiores vero uran-  
tur & sitim habeant, lethale. Vbi non sine  
adietione in omnibus acutis, sed febribus  
non intermittentibus tantum lethale; idque  
non in quibusvis continuis, sed in ardentibus  
periculosissimis tantum & lipyris: sunt enim  
hæc ex internarum partium viscerumve in-  
flammationibus. Malum igitur est signum,  
quod inflammationem viscera occupantem  
adeo adurentem, & vehementem significet,  
ut calore suo non secus ac cucurbitula que-  
dam, è toto corpore sanguinem irahat; unde  
interna, hoc est, ea que intra thoracem &

### aut post sudorem in- horrescere.

HYIUS rationem iam reddidimus, ubi  
rigores qui sexto die sunt, malos defini-  
mus: nam, ut recte docet Hippocrates se-  
cundo Epidemion, signa indicatoria non in-  
dicantia, nonnulla mortem, aliqua verò re-  
cidivam portendunt: in quorum albo horror  
sudorem subsequens ponendus est; siquidem  
materiam ante crisin nondum probe expur-  
gatam significat.

### aut post vomitum sin- gultum esse.

SEPTIMI segmenti Aphorismos aliquot  
ordine recenser: inter quos hic quoque unus  
est; nam illic a vomitu singultum & ocu-  
lorum ruborem malum definiuit: utrunque  
enim magnum, cerebri aut ventriculi in-  
flammationem significat; quamquam per se  
citraque ruborem oculorum, singultus vo-  
mitum subsequens malus censendus sit: nam  
& convulsiones ex inanitione, medicine illo  
parens antiquissimus, lethales declaravit.  
Singultus autem quum non secus ac convul-  
sio, ex repletione & inanitione fiat; non re-  
merè is qui vomitum sequitur, malus erit.  
Quare si quis Celsum sequutus, singultum à  
vomitu, aut ruborem oculorum malum di-  
xerit, à vero nihil aberrabit: quamquam si  
quis ex Hippocrate locum hunc restituere  
velit, pro disunctina copulatione ponens;  
per me quidem integrum erit: ita enim sen-  
tentia de sola inflammatione intelligetur; si-  
quidem rubri redduntur oculi dum mate-  
riam excipiunt: unde de ea potissimum in-  
flammatione intelligendum moniet Galenus  
que cerebrum obsedit.

### aut post cupiditatem cibi, &c.

CIBI fastidium, concoctricis faculta-  
tis imbecillitatem significat: atque hæc quum  
imbecilla sit, nutriti corpus non potest, sed  
indies magis magisque declinat, atque imbe-  
cillius



cellius redditur: quo fit, ut viribus destituti agri, morbi insulsum & longitudinem perferre nequeant. Sicut autem in hanc sententiam Hippocratis varij Aphorismi, difficultates intestinorum pro exemplo reliquorum morborum ponentis: In diuturnis enim intestinorum difficultatibus, inquit, cibi fastidia malum portendunt; atque si cum febre, peiora. & alio item loco: In diuturno morbo cibi fastidium & sincere deiectiones, mala. & sectione secunda Aphorismorum: Magna ex parte, inquit, omnes qui male se habent, initio cibum capientes, nec quicquam proficientes, in fine rursus non appetent, nec cibum capient: qui vero principio vehementer à cibo abhorrent, postea autem probe appetunt, & capiunt cibum, hi melius degunt. Recte ergo post cibi cupiditatem, aut post febres longas, fastidium per se malum dixit: nam, ut docet Galenus, in iis qui à talibus morbis sunt enasuri, contrarius affectus, hoc est ciborum appetentia, requiritur.

aut multum sudare, maximeque, &c.

ANTE quā parte corporis sudor sit, ibi morbum esse dictum est; nunc autem multum sudare malum in morbis signum: neque id perpetuo; eos etenim sudores bonos dicit, qui febrem finiant: quales sunt qui tertio die, quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vigesimo, vigesimo septimo, & trigesimo quarto fiunt; hi etenim sudores, ut ait Hippocrates, morbos indicant. Et rursus bonus sudor est (ut in prædictionibus docet,) qui ex toto manat corpore, facitque ut ager facilius ferat morbum: si vero nihil tale efficiat, inutilis est, atque malus; eoque deterior, quo fuerit copiosior; atque hoc rursus peior, si sudor qui prodit, frigidus sit; si quidem crassitiam materie, & qua non facile discui possit, aut calore riuici; præ se ferat, atque adeo longitudinem morbi præsegit. calidi contra sudores, ut vult Galenus, materiam calidam tenuemque, & qua facile discui possit, portendant; atque hac ratione Hippocratem fri-

gidos sudores, cum acuta quidem febre moritem; cum mitiore vero, morbi longitudinem significare dixisse in Aphorismis. Et in primo quoque Prædictionum: Pessimus, inquit, sudor est, si frigidus egrediatur, aut circa caput tantummodò, vultum, cernicem: hic enim cum acuta quidem febre, moritem; cum mitiore, morbi longitudinem significat: nam in acuta quidem febre, indicat ex nimia caloris febrilis aduisione, caloris innati extinctionem, unde sudor frigidus non solum unicam causam sibi vendicare, (nempe materie crassitiam) videtur, sed & aliam quandam accidentariam à calore febrili ortam: necessum est enim humoribus qui in vasibus sunt putrefactis, calore innato solida corpora gubernante iam extincto aut extinctioni proximo, quæ ex iis enascantur excrementa (ut sunt sudores) frigida esse.

& eas febres, quæ quotidie.

Hoc non tam perniciosum, quam morbi longitudinem (ut bene monet Galenus, & Philotheus indicat;) nam apud Hippocratem, unde auctor noster hac transtulit, dictio δὲ οὐράτος, non difficile malumque iudicium significat, sed idem quod δὲ οὐράτος sonat, hoc est quod difficulter atque tardè soluitur; morbi longitudinem, materieque peccantis lentorem ac tenacitatem hac dictione intelligens: siquidem si non frigida, saltem crassa erit materia, quæ eadem horâ paroxysmos concitabit, quanquam non dubitem Galenum dicere, id eò fieri, quod materia febrem faciens, fixa & stabilita quodammodò in loco sit: nam fixa & firmata, ut docet, magnam vim demolientem deponunt longo tempore, & per fortiora, & per plura facta auxilia; verum si ita intellexerimus, de continuis tantum locutus videbitur: nam quum in intermittentibus humor extra vasa pellatur, non poterit proprio in uno fixo loco vocari: unde si Galeno subscribamus, nec Celsus, nec Hippocrates de iis locutus sit; quum quibuscunque accessiones fiunt, quacunque hora febris dimiserit, si eadem



si eadem eras occupaverit, indicium habere difficile dicitur.

### neque tertio quoque die leventur.

NON videtur loens hic absque transferentium vitio legi; siquidem coherentia disinxit: Hippocrates enim, Quacumq. febres non intermittentes tertio quoque die validiores reddunt, periculose existunt; quoquo autem modo intermiserint, periculum abesse, significant: ita ut ex iam citato Aphorismo in hunc modum locus sit restituendus. neque tertio quoque die leventur, atque continent. Nam alioqui, ut recte docet Galenus, non absque ratione eas quae in quietem febre vacantem desinunt, esse absque periculo inquit Hippocrates; ut quae non ex inflammatione aliqua, aut maligna humorum putredine originem habeant. Igitur quales sint haec febres, quae & continent simul & tertio quoque die accessiones suas exacerbent, considerandum est: id namque omnibus peculiare non est, semitertianis certe frequens admodum (est enim ea, teste Galeno De februm differentia secundo, ex numero continuarum); nam quum ex tertiana intermittente, & quotidiana componatur, utriusq. accessiones ut imitur consequens est: unde & tertio quoque die accessiones exacerbari contingit, licet nunquam ad integritatem aut infebrecitationem (ut dicunt) perveniunt. quod clarissime ostendit Hippocrates primo Morborum vulgarium libro: Febres, inquit, horridae, continuae, acutae omnino, non intermittentes: forma autem erat semitertiana, uno die leviores, altero gravius innuadentes; & in summa acutiores euadentes. Non mirum igitur, si has (quum continue affligant, atque infebrecitatione non admittant, ac tertio quoque die exacerbentur) periculosas dixerit: tantum enim temporis, aut quietis natura non conceditur, ut collapsas vires restituere possit: quibus accedit, quod, ut monet Galenus, non solum stomachum & nervosam eius partem attingant, sed etiam lethargos & catochas interficiant.

### vel per accessiones crescant.

Hoc sane longitudinem tantum morbi significat, si in intermittentibus contingat: quemadmodum si in continuis, mortem; nam, ut ait Galenus, tanto longior est futurus morbus quanto eius accessio maior fuerit, quam tertiana exquisita.

### per discessiones tantum molliantur.

Hoc quoque morbi longitudinem omnino denotare videtur: siquidem humoribus qui morbum faciebant nondum probe purgatis, contingit nonnunquam lenari, atque discessiones moliri morbum; sed quum superfuitates aliqua adhuc reliquae sint, laborem conciliant, neque unquam corpus integrum relinquunt, atque adeo morbi longitudinem, aut abscessus futuros in parte dolorifica praesagiunt. Notus est in haec verba Hippocratis Aphorismus: Quibus resurgentibus ex morbis pars aliqua dolnerit, illic abscessus sunt.

### Pessimum est, si, &c.

ANTE continuas quae tertio quoque die ingrauescunt, periculosas dixit; nunc quae non leuantur, sed aquae concitata permanent, pessimas vocat. huiusmodi autem sunt exquisitae ardentes; haec etenim quum omnia alia seruent tertiana exquisita indicia, eo solo differunt, quod neque cum rigore innuadunt, neque ad infebrecitationem desinunt, ut auctor est Galenus secundo Crisium. At quod pessima periculosissimaque sint, vel hinc satis liquet, quod propter paroxysmorum sanitiam, non suppetat remediis tempus; & quod aut cito interimant, aut non raro in febres besticas, aut marasmodos migrent: quemadmodum insinuat Galenus 10. meth. Therap.

### Periculosum est etiam.

ARQVATVM nominat, quem alij Morbum regium, aut Anriginem; Graeci *ἰντεγρ* (a similitudine ad animalculum quod *ἰντεγρ*, id est, vinerra vel musceta *σινεστρίς* appellatur,



latur, quæ auricolores oculos habet) dicunt. Est autem duplex: aut enim à iecore fit, ubi per totum corpus flava bilis diffunditur; aut à liene; ubi uniuersum per venas dispersibile atque corporis miscella, atro quodam colore imbutur. Quod si igitur post febres orietur aurigo quum non semper periculosa sit; nam quæ septimo, nono, undecimo & decimoquarto superuenit, Hippocrato teste, bona est; magna etenim ex parte morbum soluit; quomodo periculosam à bona, nulla habita diuturnitate distinguere possumus (nam & Hippocrates arquatam qui ante septimum diem contingit, malum dixit) edocet; atque id ex alterius hypochondrij dolore aut duritie: nam si præcordia dextera parte dura fuerint; febre nimirum acuta præcedente, ac doluerint, hepatis inflammationem significabunt, nam aliqui etiam de eiusdem visceris obstructione, aut scirrroso tumore sententiam proferre licet: hi etenim affectus ut periculo omnino non vacant, ita etiam minus mali sunt, & remediis (si rectè adhibeantur) facile cedunt: adeo ut Plinius, & maledicus ille Auerrhois, Hippocratem criminari ausi fuerint, quod arquatam qui in febribus ante septimum diem accidit, malum (atque id cum maxima ratione) dixit; quum omnia signa indicatoria, imperfecte ac sine signis indicantia, iam plus satis dictum sit mala esse. Quod autem de inflammationibus locum hunc putem intelligendum, facit Celsus propria quadam atque usitata phrasibus; qui doloris, aut tumoris vocabulo non raro *φρυσσιν* Græcis dictam intelligit; atque ideo subiungit: ac dolentibus his læua; volens dolere simul, & dura esse, dextrique hypochondrij dolorem, durities læni & dextreri præcordij communem: ita ut tum demum à febre periculosus sit arquatam, si liene aut obstructo, aut in scirrhum obdurato, etiā inflammatione vexetur hepar. Nam aliqui qui ex sola lienis inflammatione contingit arquatam, nō usque adeo periculosus est: quanquam si cui hic mendum subesse videatur, per me sanè integrum est; facilis enim lapsus fuit pro disincta copulatinam ponere coniunctionem.

### Nulla acuta febris leuiter terrere.

ACVTI enim morbi præterquam quod celeriter indicant, magnitudinē etiam morbi adiunctam habent, & in omnibus seua acutis sunt febres continue coniuncte; præter eos tamen qui ex obstructione crassorum & lentorum humorum contingunt; quales angina, & ij quos apoplecticos vocamus, sunt. Ceterum sicuti illi paroxysmorum ingi imperu, atque vehementia, & morbi magnitudine nos meritis exterrant; ita hi dum tenacibus viscosissq; humoribus meatus infarciunt atque obstruunt, periculum suffocationis inferunt.

### neque vnquam in acuta febre, &c.

CONVULSIONES in acuta febre etiam si somnum non subsequantur, semper male sunt; siquidem satius est febrem conuulsioni superuenire, quam febri conuulsionem, quod videlicet magnam inanitionem nervosarum partium ac siccitatem significet: atque ideo alibi in acutis febribus Hippocrates conuulsiones, & circa viscera fortes dolores, malum dixit. verum si ex somnis in febribus conuulsiones oriri contingat, periculosum quidem & id est; sed non aequè: nam copiam humoris pituitosi ac lentis infarciētis cerebri ventriculos, significat.

### Timere etiam ex somno.

IN febribus ex somnis timores malum, inquit Hippocrates: indicat enim ingentem melancholicorum humorum copiam, caput per somnum grauatam ac repletam. Videtur autē Celsus paulo liberalius quam Hippocrates, omnes paiores qui somnos in morbis sequuntur, malos dixisse: nam is Aphorismo iam citato eos tantum malos dixit, qui febres, (atque eas non quasuis, sed acutas tantum) concomitantur: suntque hi periculosiores quam ij qui in aliis morbis accidunt; quanquam quales quales ij tandem sint, qui à somno in morbis sunt paiores, periculo non vacant: siquidem, ut iam dictum est, in quo morbo

M

morbo



morbo somnus laborem facit, malum. nam si is qui lenire ac lenire morbum deberet; corpus aggrauat; malum mehercules signum censendum est.

### Itemq. in prima febre, &c.

CONTRARIUM huic est quod Hippocrates dicit, In quouis morbo ratione ipsam constare atque valere, bonum est: & ubi somnus delirium sedat, bonum; id enim significat calorem naturam morbosas causas vicisse, atque adeo vires esse validas. Contra si in morbis mentem aut somno turbari, aut delirare contingat, id aut humorum prauitatem aut fluxiones ad cerebrum multiplicari, aut febres intendi, aut dolores excitari, aut crescere inflammationes, aut vires alioqui deficere indicat. Verum id in febribus potissimum periculosum est; atque ijs imprimis, quas arduas vocant, quod materiam furiosam admodum denotet. Nam, sicut Galenus primo De morbis vulgaribus docet, arduas febres oriuntur, ubi in ventris aut iecinis, aut pulmonis ventis bilis effervescat. haec igitur si quando ad solidas corporis particulas perveniat, atque eas permeet, rigores concitabit; sin in cerebrum eiusque membranas sit impacta, phrenitides inducet: verum priusquam inhaereat perfluens venas in iis sitas, non phrenitidas, ceterum quae in vigoribus sunt febrium, deliria efficit, ac proinde bilis quae primo arduis febris causa fuerat, ad cerebrum delata, phrenitidis aut delirii causa erit: unde non immerito inter pessima numeratur signa, atque protinus in principio febris; nam sicut Hippocrates in Praedictionibus auctor est, in febrium principiis si delirium accesserit, periturum hominem significat: nam praeterquam quod difficilem in statu fore indicationem minetur, materiam quoque admodum virulentam denotat: atque sic Hippocrates libro Epidemion plerosque febribus ardentibus laborantes, atque a phrenitide correptos, mortuos scribit.

### membrumque aliquid esse resolutum.

DE paraplegiis & hemiplexiis loqui

Celsum certum est: & quod ea in febribus omnibus male sint, iam ante dictum est, & auctoritate Hippocratis satis liquet, qui in principiis febrium siderationes mortales dixit. Accidunt autem paraplegia proprie dictae, si altera corporis parte crassius, lentius frigidisque humoribus nervos per quos motus voluntarii obveniunt, infarcientibus, obstructio orta fuerit: sitque interdum ut non totum latus, sed unam tantum aliquam particulam occupet. Sic Hippocrates attonito cuiusdam cruce enasisse memoria prodidit. Verum quemadmodum ita affecti vitam non raro recipiunt (si quidem origo mali ad animalium facultatum principium nondum pervenit, spinali tantum medulla affecta) sic non citra iacturam membri quod resolutum fuit, vitam deinceps transigunt.

### Vomitibus etiam periculosus est, &c.

POSSVMVS huc varias ex Hippocratis Aphorismis, Praedictionibus, Prorrheticisque sententias in medium proferre: nam 2. Prorrheticon, Vomitiones, inquit, syncerae atque implacidae, male: & Praedictionum 2. Vomitus vilissima, si pituita ac bile quam maxime permixta est, si non multa, si non crassa est: syncerior enim deterior est: si vero vomitus fuerit porraceus, aut humida & nigra, quicumque ex his fuerit color, malus censendus est: limida si male olet, citissimam habet abolitionem. Synceras autem vomitiones vocamus, quae dumtaxat unum qui excernitur humorem alius impermixtum habent; haec igitur quum magnum aliquem excessum, intemperiemque significant, exitiales merito dicuntur. Nam qui biliosus syncerus vomitus excernitur, caloris atque adeo bilis copiam; qui pituitosus, frigus denotat. Viridem autem colorem vocat eum, qui prasinus aut porraceus dicitur. gignitur si quidem in corpore, quemadmodum crocea bilis, per naturam habentibus; ita altera praeter naturam a porri similitudine porracea dicta, constatque: ut haec saepenumero in ventriculo gignatur, propter quorundam esculentorum cruditatem; ut sunt olera, brassica, beta,



fica, beta, porrum, cape; ac si hinc quidem huiusmodi vomitus consequi contingat, non usque aded inter perniciosos censendi sunt, quum potius robur virtutis expulsiua significant. Verum si eneniat talibus nequaquam ingestis, ratione egrotationis tales humores in venis gigni, ac decumbere in ventrem superiorem, perniciosum omnino signum; si quidem summum calorem significat, qui bilem quodammodo asser. Nigri vero vomitus non solius mali, sed plane lethales sunt. quare si quando tales contingant, a medicamentis abstinenti suadet Hippocrates: dicit enim, Nigra vomentes, cibos fastidientes, deliros, in pube parum dolentes, quibus oculus ferox clausisque, purgare non oportet: perniciosum enim est. In cuius sententia commento Galenus vel nigram vomitionem sufficere auctor est, quod inter perniciosissima censeatur signa; etiamsi aliis non admisceatur: ex adustione enim innati caloris extinctionem denotat.

### At mala vrina est.

CORPORIS omnia excrementa, quae *de anterioribus*, hoc est abeuntia, vocat sexto Epidemion senex ille medicina parens antiquissimus; unde nimirum ceperint, aut ubi cessarint, quatenus dissipant, colores quoque eorundem, caliditatem, salsuginem, tennitatem, dulcedinem, crassitudinem, equaliterque, an inequaliter sese habeant, cognoscenda monet, sub excrementis sudores, urinas, egestionis vomitionesque comprehendens; de vomitu, spitu, sudore hactenus, nunc de urinis pauca quidem, si verba numeres; multa si sensum spectes, dicturus. Sed ea, Galeno teste, non solum si naturalia instrumenta male affecta sunt, inspicienda; sed in omnibus etiam thoracis, ventris, pulmonis, animaliumque instrumentorum affectibus. Nam si bona appareant, multum valent ad salutem; ut si male, amplificant quoque acri periculum. Vocat autem eam urinam malam, in qua subsidunt subrubra, quam alibi Hippocrates non ut omnino malam vituperavit, sed ut salubrem commendavit, diuturnitatemque morbi portendere

tantum dixit. Si urina, dicit, fuerit subrubra, ac sedimentum subrubrum ac leue, diuturnior quidem hic morbus quam primus, sed admodum salutaris est. quo fit ut inter neutra seu mediocria signa potius annumerandum sit sedimen subrubrum, quam malum dicendum: nisi hic quoque mendum subesse suspicemur, ac pro subrubris, rubra legamus: ea enim passim apud Hippocratem in Prorrheticis suspecta sunt; atque aded aberrationem mentis, aut delirium renuntumque inflammationem portendere dicit. Linida autem tam vrina, quam contenta, ut post subrubra ponuntur, ita etiam peiora sunt: nam ab excessu frigidiaris, extinctionem seu consumptionem facultatis vinifica significant.

### deterior in qua quasi fila quaedam tenuia.

SIVE per fila capillos cum vrina excretos (sunt enim tennibus albisque filis similia) sine araneorum telis simile quid innatans intelligamus; parum refert: sed si hoc modo acceperimus, legendum erit: deterior in qua quasi fila quaedam tenuia atque alba desuper natant. tunc enim Hippocratis 32. Aphorismum libri Secundi Prædictionum imitatus videbitur. Si pingue desuper natans, araneorum speciem referat, damnandum est; indicat enim consumptionem: etsi de capillis qui una cum vrina redduntur, intelligere malim; idque quod non temere quicquam immutandum putemus, atque quod (Galeno De locis affectis auctore) indicent exulcerationem renum, atque aded materiam crassam & lentam renum cavitatibus infartam, calore præternaturali exustam: nam & Hippocrates ipse, huiusmodi filamenta a renibus excerni, auctor est.

### Pessima ex his est, si tanquam.

HOC quoque facit ut præcedentem sententiam de passione in qua tanquam capilli quidam albi (capillitium vocant) excernuntur, intelligamus: nam alioqui haec in qua

M

2

furfurea



furfurea subsidentia subsidunt, nihilo minus periculosa essent quam ea, quae araneorum telis simile quid innatans habent, quod, ut diximus, tabem quodammodo, aut colligationem corporis significant. Haec autem in quibus furfuræ, (hoc est speciem farinæ crassioris referentes) subsidentia apparent, quemadmodum imbecillioribus aegrotantibus, viribusque destitutis perniciose omnino sunt atque citò interimentes; ita viribus robustis, morbi dimittat diuturnitatem significant: sic Hippocrates libro Epidemion tertio, de eo qui in Dealcis orto iacebat, ita scriptum reliquit: Urinæ tenues, variae, habentes sublimamenta aut nabecculas instar farinæ crassioris &c: quadragesimo autem die indicatus est. Ceterum per hypostases furfureas non solum eas quae furfuri similes sunt, brevitati studens, intellexit: sed eas quoque quas orobæ ab orobi similitudine, aut lamineas, aut similaceas vocant; differunt enim haec omnes secundum maius & minus tantum. Quod si igitur in urina crassa, citraque febrem prodeant, Hippocrate teste, scabiem vesicae significant (crassam autem urinam hic vocamus, quae aliqua ex parte concocta sit & mediocri consistentia:); verum si eas excerni contingat in febre cum urina tenui, hoc est cruda, colligationem totius corporis atque citam mortem, non constantibus viribus, praesagunt. Excernuntur autem eiusmodi quod febris in habitum totius corporis transmigravit, quodque calore extraneo solida partes corporis depascantur.

#### diluta quoque atque alba vitiosa.

DILUTAM Hippocrates pellucidam; Plinius à crystalli similitudine, crystallinam vocat; alij aqueam dicunt. At quod haec semper mala sit, satis constat: nam virtutis concoctricis atque expultricis imbecillitatem crassitiemque, ac crudelitatem materiae peccantis significat; unde in quartanis non raro tenues, hoc est dilutae atque albae, urinae excerni videmus, humore melancholico sua crassitie meatus urinarios obstruente. In ardentibus febribus ut longe aliam originem

habet, ita maius periculum portendit: siquidem quum aëros ex bile originem trahat, consequens est vasa, atque adeo totum corpus bilioso humore affici, unde & urinae tingi & igneas in calido coagari fere usu venit: quod si minus id fiat, indicium est bilem lenitate sua relictis vasibus cerebrum petere, ac proinde, nisi iam adsit, omnino imminere phrenitidem; quemadmodum, si innaserit, mortis subesse periculum. neque enim sperandum est, naturam cerebri incolumem servatam iri, ut quae à bili graviter lacessatur, crucietur, eiusque acrimonia mordeatur. Non immerito igitur Celsus sequitur Hippocratem, urinas tenues in phreniticis exitiales dixit, atque perniciosas; nam omnino interimunt, nisi statim subsequatur tincta; ea enim (Aetuario teste) patientem liberat, alioqui periclitantem.

#### Aluus etiam mala est, &c.

ID enim siccam intemperiem, aut ieiunioris, aut meserae, aut ventris, vel ieiunii vel intestinorum, vel lienis (teste Galeno De ratione victus in morbis acutis) significat: quatenus ideo quoque intercepta aluus mala sit, quod retenta excrementa putrescunt, ut unde acres atque putres vapores superiora petentes, ventriculum nonnunquam subvertunt, capitis gravedinem invehunt, cordisque palpitacionem inducunt, atque in summa omnes quotquot sunt capitis affectiones afflicta aluus anget, & deteriores reddit, quantumcunque non sit signum affectionis cerebri. Sic Hippocrates, Capite dolentes, cum catocoe delirantes, intercepta alvus, fere in opisthotonum incidere, auctor est.

#### Periculosa etiam quae inter febres.

PERLIQVIDAM deiectione aut aluum, vocat eam quam Hippocrates aquosam: hac autem malam esse, 2. Praedictionum docet: Si, inquit, admodum aquosa deiciatur, aut candida aut admodum crocea, aut spumans deiciatur; haec omnia mala: siquidem aquosa deiectiones crudelitatem significant; concoctio enim (ut docet Galenus libro secundo De ratione



zione viſt. in morbis acutis) omnia cogit at-  
que increſcat: quo ſit ut corpulenta eſſe de-  
beat deiectione, qua morbo eunte in iudicatio-  
nem redditur. Albe autem ſeu candida  
deiectiones ſient, non deſtiente ex hepate in  
ventrem bile; aut propter aſtrictionem cana-  
lis eius qui bilem ad ventrem deſert, ſicuti  
uſu venire videmus iis qui regio morbo la-  
borant: aut propter vehementem ardorem,  
qui in ſuperioribus partibus iecinis exiſtens  
ſanguinem una cum bile ſurſum rapit; at-  
que ideo in Proſereticis Hippocrates albas  
deiectiones, non ſecus ac urinas pellucidas,  
in phreneticis malas eſſe dixit: & alibi, in  
acutis bilioſis, albicantes ſpumantesque de-  
iectiones reprobanit, atque in his hepar labo-  
rare docuit. At ea deiectione que ſemper ſluit,  
neque quietis tempus ullum admittit, mala  
eſt; nam (ut ait Hippocrates) deiectione ma-  
dens ex uſu eſt, ſi nec crebro neque paula-  
tim excernatur; frequens enim deſidendi la-  
bor inſomnium facit: at ſi vniuerſim, &  
ſepe deiciatur, periculum deiectionis anima  
imminet, ſpiritibus una cum deiectione exo-  
latis. Et libro De ratione viſtus acutorum:  
Quum aliquid in febris quinta die terriſi-  
cum fuerit, vel venter repente liquida deie-  
cerit, & anima defectus prehenderit, vel  
vocis priuatio, vel conuellatur aeger, vel ſin-  
guliat, ex his angi, grauitaque affici con-  
ſuevit, ſudoresque circa tum muſtaceum, tum  
faciem, tum cernicem ab occipitio eſſe con-  
ſueuerunt: qui autem hæc patiuntur, ſpiri-  
tuoſi paulo poſt moriuntur. Spumofa quo-  
que deiectione mala eſt; quod aut caloris co-  
piam indicet, aut ſpiritum flatuoſum humori  
permixtum eſſe, qui ſolutum quoque difficilis  
ſit: atque hinc Hippocratem deiectiones in  
ſpumofas ſyncerasque deſinentes exacerbare  
ſolitas, dixiſſe.

### Præter hæc periculum, &c.

HÆC que ſubiungit ſigna, exitioſa  
omnino ſunt, ac mortem iam pro foribus  
portendunt: nam, ut Hippocrates, exitioſior  
eſt deiectione ſi nigra, aut opima, aut fetida  
aut limida eſt. Nigra enim deiectione ab atra  
bile ſyncera tingitur, mortemque (eodem ſene-  
teſte) indicat: verum quam varia ſint nigre  
deiectionis ſpecies, Galeno De atra bile au-  
ctore, eo ſunt periculoſiores, quo qualitates  
magis intendi contigerit; alie ſiquidem ad  
nigram bilem proxime accedunt; alie neque  
erodunt in deiectionibus, neque odorem facti-  
dum præ ſe ferunt: nulla etiam in medio  
inter hæc ordine conſtituuntur. At glutino-  
ſa deiectione (quam opimam Hippocrates vo-  
cat) deiciatur, quoties pinguedo ab ignito  
calore abſumitur. Grauiolens conſummata  
putredinis nota eſt. Mera autem & ſyn-  
cera & bilioſa deiectiones, graues ſecum fe-  
runt offenſas: nam præcordiorum excitant  
ardorem, inquietationemque membrorum, &  
iactationem, brachiorum faciunt, ſedemque  
exulcerant.

### Malum eſt etiam, quod &c.

SYNCERAS deiectiones eas vocari dixi,  
que vnum aliquem reliquis impermixtum  
humorem in ſe continent: & quod hæ ſem-  
per mala ſint, non citra additionem intelli-  
gendum eſt: ſiquidem fieri poteſt, ut cocta  
paulatim affectione in qua talia excerneban-  
tur, conqueſcat aeger, atque adeo bonam  
criſim conſequatur: quo ſit ut poſt longas  
febres ſynceras deiectiones Cornelius noſter  
vituperet, quod copiam vnius alicuius hu-  
moris peccantis (que morbi longitudine pro-  
ſtratis ægri viribus euinci atque ſuperari ne-  
queat) ſignificent: ſic autem quoque in morbo  
longo ſaſtidium cibi & meracas deiectiones  
ex Hippocrate malas diximus.

M 3

CAPVT



## CAPUT V.

*De signis longæ valetudinis.*

POST hæc indicia, notum est longum morbum fieri. Sic enim necesse est, nisi occidit. Neque vlla alia spes in malis magnis est, quàm ut imperum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præstet. Protinus tamen signa quædam sunt, ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput tantum, & ceruices oritur: aut vbi febre non quiescente corpus insudat: aut vbi corpus modò frigidum, modò calidum est, & color alius ex alio fit: aut vbi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non peruenit: aut vbi æger pro spatio parum emacrescit. Item si vrina modò liquida & pura est, modò habet quædam subsidientia, si læuia, atque alba, rubræve sunt, quæ in ea subsidunt, aut si quædam quasi maculas repræsentat, aut si bullulas excitat.

Vrina.

## ENARRATIO.

PRÆCEDENTE capite quæ essent mala in ægrotantis signa, docuit: sed horum quædam magnitudinem morbi, aliæque crisi imperfectam; atque iterum nonnulla materia peccantis malignitatem; vti etiam multa cum virium robore eiusdem crassitiem atque lentorem, atque aded morbum longum, sed qui tandem soluitur, portendere diximus. At qualia tandem ea signa sint, quæ longam valetudinem, hoc est morbum longum (nam in viroque significato valetudinis nomen accipi satis notum est) indicent, iam explicare nititur, vniuscuiusque signi vim perdiscendâ monens: nam vnum aliquando signum forte atque fidum, plura signa non fida ac debilia vincit. Sic perniciofa præter rationem, hoc est sine signis criticis lenantia, mortem tamen significare dixit Hippocrates: & rursum non formidan-

da mala quæ præter rationem eueniunt: Neque enim statim tervere debet, si quis aut indicationem die, graviora accidentia patiat; id siquidem ferè perpetuum est, ut crises præcedens nox gravis sit: Nam quibus crisis sit, inquit Hippocrates, iis nox gravis ante accessionem; quæ verò subsequitur, magna ex parte lenior. siquidem quum crisis sit subita ad sanitatē, vel mortem permutatio, Galeno De crisis auctore, atq. ea fiat cum subitis quibusdam excretionibus, aut effatu dignis abscessibus, non immeritò symptomatum concursus atque vehementia, longitudo, ac exacerbatio accessionis, præcedentem crisin noctem gravem efficiunt: quod voluisse videtur Cornelius noster, quum dicit: Sic enim necesse est, nisi occidat: tanquam incertam omnino & insidam pronuncians acutorum morborum indicationem, qui



nam, qui non perfecte indicantur: hi enim si non interimunt, ferè in longum protrahuntur ac recidunt. notus est enim Hippocratis Aphorismus: Quæ relinquuntur in morbis à crisi, recidivas (seu reversiones, ut sequente libro auctor noster vocat) facere consueverunt: idè, idè, quod tum vel ipsa materia ad expulsionem fuit minus idonea, vel ipsa natura imbecilla admodum per morbum effecta, omnes humores noxios expellere non potuit.

### Neque vlla alia spes.

ACUTI morbi non ideo tantum periculosi sunt, quod vehementes sint; sed quod paroxysmorum se inuicem excipientium iugis assultu, exhibendorum remedium occassionem nullam prebeant: adeo rectè ab Hippocrate dictum est, Ocasio princeps. Quod si igitur in magnis morbis (quales sunt illi quos acutos vocari diximus, non ob citam in peius vel melius mutationem, sed potius ob morbi magnitudinem, atque paroxysmorum insultus vehementiam) statim, hoc est, in principio atque una cum morbis signa quadam infida atque imperfecta appareant, nisi interimant, indicationem protrahunt, in, longitudinemque morbi præagunt: ac proinde proposito metu, spem tamen vite aliquam superesse, quam curationi temporis nonnihil concedatur.

### Vbi frigidus sudor inter feb.

SVDOR, inquit Hippocrates, pessimum est, si frigidus egreditur, ac circa caput tantummodo, vultum ac cervicem: hoc enim cum acuta quidam febre mortem; cum mitiore verò, morbi longitudinem significat. Et, Frigidi sudores in acuta quidam febre facti mortem; cum mitiore autem, morbi longitudinem significant. Frigidos autem sudores appellamus, eos qui ad tactum quovismodis tales sentiantur, quique à corpore tales emanant, non ab accidente aliquo extraneo, frigefacti. verum unde generentur, & quod morbi longitudinem significant, iam ante dictum est.

### aut vbi febre non quiescente.

SVDOR multus, inquit in Prorethica Hippocrates, si cum febribus acutis fiat, inutiles. & in Aphorismis: Febricitanti si sudor sape accidit, febre non deficiente, malum: prorogatur enim morbus, humiditasque multam denotat; quæ ut dissolvatur, atque à natura emicatur, longius tempus requirit, unde si multum quoque sudare contingat, non solum longitudinem morbi, sed mortis quoque periculum portendit; exolutis agri viribus multo sudore.

### aut vbi corpus modò frigidum.

VBI vniverso corpore, inquit Hippocrates, mutationes sunt, & modò corpus frigescit, modò calefit, aut color alius ex alio fit, morbi longitudinem significat: hæc siquidem caloris atque frigoris vicissitudines, variarum in corpore dispositionum nota sunt; quas sanè esse diuturniores, quam quæ vnus sit modi satis constat, quum natura non possit brevi tempore varias dispositiones conficere: quomodo autem hæc alterationes calidi in frigidum fiant, perpendendum est; siquidem quantumcunque varij atque diversi humores (exempli gratia, bilis & pituita) eo loco sint, atque sibi inuicem innati, non statim varias se mutuo excipientes dispositiones, atque subitas calidi in frigidum, frigidique in calidum mutationes, sed confusas potius, & quæ mixtum quid ex virisque habeant, concitabunt. Sin autem diversos variosque humores separatim in corpore contineri contingat, tum demum singuli pro qualitate proprios exerent effectus; idè, potissimum si ab interioribus, hoc est, à venis ad exteriora ferantur: siquidem huiusmodi alterationes facilius concitabit materia agitata atque mota, quam quæta. Caterum quod subiicit: & color alius ex alio fit; id iam dictum non omnino dissimile est: nam variorum in corpore humorum dominum significat; humores enim superabundantes ex colore debemus coniectare,



clare, nisi in profundum rācesserint; color enim similis efflorescit humoribus, si non regurgitauerint.

### aut ubi quod inter febres.

NON solum si quod abscessit, ad sanitatem non pervenit, morbi longitudinem denotat; sed etiam si à febrilibus abscessus oriantur: Nam, ut Hippocrates, quibus febres longa, iis tubercula, vel labores in articulis sunt: siquidem quum in febrilibus adhuc vigeant vires, atque robustæ sint (si quidem hæ à multitudine, vel crassitie, vel frigidityte humorum fiant, neque probe à naturâ materia concoqui, aut dissipari possit) contingit non raro in eiusmodi à principalioribus membris, ad articulos atque ignobiliores particulas superfuitates decumbere, & tubercula seu abscessus oriri. Quando autem huiusmodi abscessus in febrilibus expectare debeamus, audiamus Hippocratem 4. De ratione victus acutorum loquentem. Consequerunt, inquit, febres hæ protrahi, in quibus inter initia urine tennes; atque abscessus habere, si aurium cernicisque inferne partes frigida fuerint; quod si frigida non fuerint, profecto mutationes habent. Quum igitur ex his iam satis constet, eas febres quæ in abscessus terminantur, longas esse; consequens quoque erit eas in longum tempus protrahi, si ortis abscessibus morbus non solvatur. nam & Hippocrates in febrilibus abscessus qui ad primas indicationes non solvunt, morbi longitudinem significare dixit. Abscessus autem hoc loco vocamus, quoties nulla præcedente phlegmone, humor aliquis in parte quapiam coalescit; Græci ἀποσφύσσειν vocant.

### aut ubi æger pro spacio, &c.

HUNC locum quia præcedente capite satis exposuimus, verbum non amplius unum.

### Item si vrina modò liquida.

LIQVIDAM vocat eam urinam, quam dilutam, aut aqueam dicunt. & quod hæc morbi longitudinem præfagiat, satis notum

est: quum ob humorum cruditatem talis excernatur. Puvam autem appellat, quæ syn-cera est: qualis erit, si intense rubra, aut tenuis, aut alba tenuisque sit; viraque enim hæc, quum cruditatis signa portendat, morbum quoque longum desinet, Hippocrate multis locis teste. At quid per maculas intelligat, dubium admodum est: ego sanè aut de nigris nebulis quæ in vrina non raro conspiciuntur, morbum solum difficilem (ut quæ ex humore melancholico fiant) significabilis intellexerim: aut de iis urinis, in quibus sedimina quedam crassioris farina similia conspiciuntur; ea etenim (ut vult Hippocrates) morbi duntaxatatem significant: aut potius de pingui in vrina desuper natante, aranearum speciem referente: didicimus enim ex Hippocrate id damnum; quando indicet consumptionem, si diu perseveret, morbi quoque longitudinem; ac vitalis facultatis debilitatem, si parumper tantum finat: id namque Celsum nostrum voluisse, omnino coniiciendum est; quando Galenus pingue id in lotio supernatans assimilet iis, quæ pinguioribus insculis refrigerascentibus innatent; Actuarius punctis quibusdā velut ex oleo iniectis: quæ viraque si in vrina superficie conspiciantur, maculas representabunt. Lania autem atque alba subsidentia, vocat tenuia, quæ nullam corpulentiam præ se ferant, spumæq; quodammodo similia sunt; generantur enim hæc à spiritu flatuoso permixto tenacius semicotto humorum excremento. Rubra verò hypostasies si lænes quoque & æquales sint; ut diuturnum morbum, ita salutarem omnino præfagiunt. monendus interim lector est, pro subrubris non satis rectè rubras hypostasies legi: rationem habes præcedente capite, ubi utramque hypostasim expendimus.

### aut si bullulas excitat.

QVIBVS in urinis, inquit Hippocrates, superstant bullæ; iis morbum renum, & longum fore significant: sunt autem huiusmodi bullæ, ut vult Galenus, ab humiditate quæ à spiritu flatuoso circumextenditur: unde si in vrina conspici bullas contingat, spi-

ritum



ritum flatuosum in causa esse constat; qui autem de iis quæ de urinis retulimus, ex-  
quum sit frigidus, ac solutu contumax, Atque iudicium requirat, secundum Aëtij  
morbum longum præfagiet. Quod si quis De iudiciis urinarum consulat.

## CAPVT VI.

*De iudiciis mortis.*

**S**ED inter hæc quidem proposito metu spes tamen superest.

Ad vltima verò iam ventum esse testantur, nares acutæ,  
collapsa tempora, oculi concaui, frigida languidaque aures, *Habes de his*  
& imis partibus leniter versæ, cutis circa frontem dura & in- *iudiciis Hip-*  
tenta, color aut niger, aut perpallidus, multoque magis si ita *pocrati ipsi*  
hæc sunt, vt neque vigilia præcesserit, neque ventris resolu- *in primo*  
tio, neque inedia. Ex quibus causis interdum hæc species ori- *Prognosti-*  
tur, sed vno die finitur. Itaque diutius durans mortis index *côn, vnde*  
est. Si verò in morbo vetere iam triduo talis est, in propinquo *hæc auctor*  
mors est: magisque si præter hæc oculi quoque lumen refu- *desumpsit,*  
giunt, & illacrymant, quæque in ijs alba esse debent, rubef- *vt alia mul-*  
cunt, atque in ijsdem venulæ pallent, pituitaque in ijs innatans *ta in hoc se-*  
nouissime angulis inhærescit, alterque ex his minor est, *cundo libro.*  
hi que aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt:  
perque somnum palpebræ non committuntur, sed inter has  
ex albo oculorum aliquid apparet: neque id fluens alius ex-  
pressit: eademque palpebræ pallent, & idem pallor labra &  
nares decolorat. Eademque labra & nares oculique & palpe-  
bræ & supercilia, aliquavē ex his peruertuntur, iisque propter  
imbecillitatem iam non audit, aut nō videt: eadem mors de-  
nuntiatur, vbi æger supinus cubat, ei que genua contracta  
sunt. Vbi deorsum ad pedes subinde delabitur. Vbi brachia  
& crura nudat, & inæquabiliter dispergit, neque his calor  
subest. Vbi hiat, vbi assidue dormit: vbi is qui mentis suæ  
non est, neque id facere sanus solet, dentibus stridet. Vbi vl-  
cus quod aut antè, aut in ipso morbo natum est, aridum, &  
aut pallidum, aut lividum factum est. Illa quoque mortis in-  
dicia sunt, yngues, digiti que pallidi, frigidus spiritus, aut si  
manibus qui in febre & acuto morbo vel infania, pulmo-

N

nīve

\* febre acu-  
to mor.



nīsve dolore, vel capitis, in veste floccos legit, fimbriāsve diducit, vel in adiuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Dolores etiam circa coxas & inferiores partes orti, si ad viscera transierunt, subitoque desierunt, mortem subesse testantur, magisque, si alia quoque signa accesserunt. Neque is seruari potest, qui sine villo\* tremore febricitans, subito strangulatur, aut deuorare saliuam suam non potest. Cuiue in eodem febris corporisque habitu ceruix conuertitur, sic vt deuorare æquè nihil possit. Aut cui simul & continua febris, & vltima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente, exterior pars friget, interior sic calet, vt etiam sitim faciat: aut qui febre æquè non quiescente simul & delirio, & spirandi difficultate vexatur: aut qui epoto veratro exceptus distentione neruorum est: aut qui ebrius obmutuit. Is enim febre, adiecta neruorum distentione consumitur, nisi aut febris\* accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debet, loqui cœpit. Mulier quoque grauida, acuto morbo faciliè consumitur: & is cui somnus dolorem auget, & cui protinus in recenti morbo bilis atra vel infra, vel supra se ostendit, cuiue alterutrum modò se prompsit, cum iam longo morbo corpus eiuisset extenuatum & affectum. Sputum etiam biliosum & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt, interitus periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem tale esse cœpit, proximum est, vt is circa quartumdecimum diem decedat, nisi alia signa meliora, peioraue accesserint: quæ quo leuiora, grauioraue subsecuta sunt, eò vel seriore mortem, vel maturiorem denuntiant. Sudor quoque frigidus in acuta febre pestiferus est, atque in omni morbo vomitus, qui varius, & multorum colorum est, præcipueque si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in febre vomuisse, pestiferum est. Vrina verò rubra, & tenuis\* in magna cruditate esse consuevit, & sæpe antequam spatio maturescat, hominem rapit. Itaque si talis diutius permanet, periculum mortis ostendit. Pessima tamen est, præcipueque mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris quidem & mulieribus talis deterrima est. In pueris verò quæ tenuis & diluta est. Alaus quoque

\* alij tu-  
more, alij  
timore

\* abscessit,

\* in ma-  
gna crudi-  
tate, suban-  
diendum est  
morbi.  
Sic in Pro-  
gnost. Hip-  
pocr. lib. 2.  
Vrina quo-  
ad ruffa te-  
nuisq. appa-  
ruerit, cru-  
dum mor-  
bum signi-  
ficat.



quoque varia pestifera est, quæ strigmentum, sanguinem, bilem viridem, aliquid modò diuersis temporibus, modò simul, & in mistura quadam, discretata tamen repræsentat. Sed hæc quidem potest paulo diutiùs trahere. In præcipiti verò iam esse denunciat quæliquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utique si magna foeditas odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio: Si certa futuræ mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis conualescant, quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus reuixisse? quinetiam vir iure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem vitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeò illud non reliquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quòd in vicino sæpe quædam notæ positæ, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt. quod Asclepiades funeri obuius intellexit, eum viuere, qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, siquod professoris sit. Illa tamen moderatius subiiciam: Coniecturalem artem esse medicinam, rationemque coniecturæ talem esse, ut cum sæpius aliquando responderit, interdum tamen fallat nos. Si quid itaque vix in millesimo corpore aliquando decipit, id notam non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idque non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico: sed in his quoque quæ salutaria. Siquidem etiam spes interdum frustratur, & moritur aliquis, de quo medicus securus primò fuit. Quæque mendi causa reperta sunt, nonnunquam in peius aliquid conuertunt. Neque id euitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius, perque multo plures ægros prodest. Neque tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse, & salutis & mortis.

Medicina:  
certitudo.

## ENARRATIO.

**N**ECESSE est, inquit Galenus, cuiusque signi naturam præcognoscere, ut ex vi uniuscuiusque, præcognitionem faciamus: nam & Hippocrates disciplinam tra-

didit, secundum vires eorum, nomina indens; alia bonis signis annumerans, alia rursus malis: perniciofa etiam & graviora signa dixit; ut etiam grauiora, graui-

N. 2.

stima;



simia; & minus graua, & magis graua; atque non raro, prauum, prauius, prauissimum, & mortiferum: quod Celsus noster initiatus, primum instantis morbi indicia, deinde qua bona in morbis essent signa, scribens: atque his statim subiungit qua difficilem morbum significarent: mox ea qua magnum longinque portendunt subiiciens. iam postremo pestifera, hoc est qua imminuentem iam mortem indicent, enumerat; ita ut cum de omnibus in genere morborum signis sermonem absoluerit, gradatim ad ea qua in quouis morbo figillatim bona malaue signa sunt progrediatur, hic sane, si non superior, saltem per omnia Hippocrati similis.

Ad vltima verò iam ventum esse, &c.

QVAE diximus ferè omnia signa spem aliquam pra se ferunt; sed qua iam enarrabimus, exigua admodum, aut nullam futurae salutis relinquunt, nisi sese ex insperato deus aliquis propitiis auxiliarem offerat. Talia autem sunt, nares acutae, collapsa tempora, aliisque deinceps testimonia, qua ex Hippocrate coningit; primum quidem rationem faciei habens: Nam (ut Hippocrates sexto Epidemion) si in magnis morbis facies bona sit, signum bonum; in paruis autem contraria bona significans malum: & libro Praedictionum primo (vnde haec auctor noster desumpsit) idem senex ita scriptum reliquit: Considerare conuenit per morbos acutos in hunc modum: Primum vultum egroti, siue similis bene valentium, potissimum sui; ita enim optimus erit: si verò contrarius quam maxime simili sit, exitiosissimus est: Nares compresse, oculi caui, astricta tempora, aures frigida contractae, & fibra earum versa, & item cutis circa frontem dura, intenta, arida, & color totius corporis viridis, aut niger. Si igitur talis inter initia fuerit vultus, necdum scrutari de aliis signis possibile sit; interrogare oportet, num vigilauerit homo, an alius soluta admodum fuerit, an fame affectus: & si quid horum comprobet, minori cum periculo est. indi-

cantur verò talia per diem & noctem, si ob has causas talis fuerit vultus. Si verò nullum horum dixerit, neque praedicto tempore desiterit, signum esse exitiosum admodum censendum est. Si verò in morbo vetere, iam triduo talis vultus fuerit, de iis interrogare oportet, quibus antea monui: alia quoque signa esse considerata qua in toto corpore, atque etiam oculis existant. Hactenus Hippocrates prolixè multisque verbis, praeter consuetudinem alioqui, declarans, quod Celsus noster breuiter & dilucidè expressit, dum inquit: multoque magis, si haec ita sunt, ut neque vigilia praecesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. siquidem ita affecti etsi non omnino periculo vacent; nequaquam tamen iam instantem mortem praesagient: nam ut perniciosum omnino dicamus, requiritur ut inter initia acutorum morborum, aut alioqui post longos morbos, biduum aut triduum continuo citra aliquam exteriorem causam, talis se exhibeat facies: quam sanè à sanorum accidentium concursu Hippocraticam nominare solent, quod indubitata omnino mortem praesagiat: significat enim principis alicuius partis affecta ob insignem quampiam intemperiem, facultatem imbecillam. Alioqui si in morbis acutis post principium apparet, acrem febris calorem portenderet: vnde qui exuperant in corpore tennes humores, per insensiles meatus expurgari contingit, ac corpus extenuari viribusque destitui. Igitur haec, quas in praesentiarum recenset, faciei constitutiones, facultates principes affectas (atque eam potissimum qua animalis dicitur) denotant: Nares siquidem acutae (ut rectè docet Galenus) in iis apparent, qui aut longiore morbo extenuantur, aut pra dolore consistantur, aut quouis modo exoluntur, aut animo alioqui deficiunt. Cutis autem circa frontem dura, hoc est sicca (est namque à sicco inseparabilis durities, siquidem Galenus libro De temperamentis, id quod siccum est durum prorsus esse testatur) immodico calore febrili omnem humorem exhaustum significat. Atque non solum si circa frontem cutis sit arida & intenta, mortis imminens



imminentis erit signum; sed etiam si universum per totum corpus circumtendatur cutis. notus siquidem est quintae sectionis Hippocratis Aphorismus: Quibus cutis obtenditur arida & sicca, sine sudore moriuntur; quibus vero rara & laxa, cum sudore intereunt. Et sexto morborum vulgarium idem senex in eadem verba huiusmodi protulit sententiam: Quibus, inquit, cutes circumtenduntur, aride & dura, sine sudore moriuntur. Verum hic tantum meminit cutis Celsus, qua circa frontem intenta esset, vel quod minimum carnis subiectum habeat, ac proinde in ipsis morborum principis ab excellentie aliqua intemperie consumpto humore, facile indurecat intendaturque; vel quod singula tantum qua in vultu perniciose sint, voluerit recensere. Eadem fere ratio est, cur tempora collabantur: haec enim quum reliquum caput carne caveat, sola reliqui capitis musculos habent; quos, quum parvi admodum sint, febrilis calor facile consumpsit. Oculi concavi eandem fere originem sortiuntur. Coloris autem in nigrum mutatio pessima est: ea enim contingit sanguine refrigerato, ac proinde calore naturali aut extincto, aut extinctioni proximo. Subiecit autem statim post nigrum, pallidum, quod is minus vitiosus sit; significat enim imperfectam adhuc extinctionem, aut consumptionem vitiis caloris. Vocat autem pallidum, quem veteres Graeci *χλωρόν*. siquidem (ut recte monet Galenus cum primo, tum secundo Predictionum) veteres ita nonnunquam viridem, nonnunquam etiam pallidum colorem nominare solebant; adeo ut το *χλωρόν*, & τὸ *πράσινον* non raro confunderent. Sic Hippocrates sexto Epidemion *ὁ πρὸ χλωροῦ καὶ πράσινου*, hoc est eos quibus flava seu pallida bilis permixta est cum atra, eosque qui pallide videntur, vocavit: & ὁ *πρὸ χλωροῦ* suppalidos, aut ut Celsus perpalidos, quasi *λεπτοχλωροὺς* dixit. Ceterum quod in morbo veteri huiusmodi facies in propinquo iam esse mortem indicet, satis clarum est: significat enim quicquid est caloris innati, morbi tum vehementia, tum longitudine exhaustum esse.

### Magisque si praeter haec oculi.

MULTA hic ordine ex primo Predictionum libro auctor noster transtulit. Verum ea qua de oculis nunc in medium proferri, summe considerata monet: siquidem summus ille medicus, Si oculi, inquit, tui peruersi sunt, reliquum etiam corpus noquam erit: tanquam ex oculis non solum temperiem, mores, constitutionemque totius corporis, verum etiam vires atque imbecillitatem conicere possimus: quod Epidemion libro Hippocrates aperite edocet: Nam oculi, inquit, ut robur habuerint, sic quoque corpus; color etiam in peius aut melius mutatur: instum est enim, ut quemadmodum se habuerit nutrimentum, ita & exteriora. Nam quum oculi, ceteris paribus, membris reliquis plus animalis spiritus contineant, nemo optico magnam concavitatem, in qua maxima eius copia contineri possit, sortito id demonstrante: consequens quoque erit, visoria facultate affecta, aut aliqui debilitata, reliqua quoque membra animali spiritu destitui atque debilitari. Itaque quod qui lucem effugiant oculi, perniciosi admodum sint, docet in Predictionibus Hippocrates: Si oculi, ait, lucem effugiant, aut nolentes illachryment, aut peruertantur, aut aliter altero fiat minor, aut candidum rubrum habeant; aut linides, aut nigras venulas; aut pituita appareat circa obtutum; aut sublimes tumidusve oculi vel tui admodum fuerint: vel totius color enarriet vultus: haec omnia mala esse, atque exitiosa admodum, censendum est. Et libro Epidemion: Lachryma, inquit, in acutis morbis male habentibus vltro manantes, bonum; non vltro vero, malum. Arque eandem sententiam eisdem fere verbis Aphorismorum quarto, tum Epidemion sectione quarta repetit, ac alibi quoque: Quibus in febribus acutis, ardentibus praesertim, praeter voluntatem lachryma manarint, his sanguinis ex naribus profuturum expectandum est, idque si reliqua se male non habuerint: in quibus vero male se habent, his non sanguinis missionem, sed mortem potius portendit. Porro



illachrymāt in acutis oculis, propter imbecillitatem reventis facultatis, lumenque refugunt, atque auersantur, propter debilitatem visoria facultatis ex se ipsa affecta. Color etiam in peius, hoc est in rubrum mutatur, id quod album esse debebat, sanguine cerebrum, eiusque membranas replente: quo fit ut aut qualitate aut quantitate molestus, venulas, atque adeo album oculorum rubidum reddat. Pallent autem venule (ita enim rursus τὸ πρᾶγμ᾽, vertit) aut liuent, extinctis spiritibus animalibus. At quæ in angulis pituita inhaerescit, accidit propter imbecillitatem naturalis facultatis regentis oculum. Et si iam alterum quoque oculum maiorem esse contingat, eandem facultatem extinctam prorsus & emortuam esse praesagit: sed hæc obiter. si quis interim ampliorum enarrationem desideret, Galenum ex professo fusiſſime hæc tractantem consulat.

### perque somnū palpebræ non committuntur, &c.

HIPPOCRATES in Prædictionibus, Considerare etiam oportet, inquit, suspensiones oculorum per somnum: si quid enim candidæ partis subapparet commissis palpebris, nec alui fluor, aut medicamentum in causa est, nec ita dormire assuevit, vitiosam indicium exitialeque omnino est: nam caloris innati facultatūque animalium & vitalium extinctionem indicat. Pallorem autem palpebrarum iam ante dictum est propter frigus accidere. Adiecit autem hic ex Hippocrate Celsus: neque id fluens aluius exprefsit: ut hæc signa citra ullam exteriorem causam ita apparentia indicemus: nam alioqui, propter immodicas evacuationes, vires exolui non raro contingit.

### Eademque labra & nares.

SI peruertatur, inquit in Prædictionibus Hippocrates, aut limba palpebra est, aut labrum, aut nasus cum aliquo alio signo, mortem propè esse censendum est. & quarto Aphorismorum: In febre non intermittente, si labrum vel palpebra, vel oculus, vel na-

sus, vel supercilium peruertatur, vel non videat, vel non audiat iam debili existente corpore, quicquid horum euenierit, mors proxima est. Et primo quoque Protheticon: In ardentibus febribus cum aliquantula perfrictione, deiectionibusque aquosæ bilis multisque oculorum peruersio, malum signum, tum aliàs, tum si catochi fiant. Et alio quoque loco: Hebetatus oculus, vitiosusque si fuerit ac concretus, immobilisque, ac tenebricosus, malum. Quum igitur partes prædictæ peruertuntur ac distorquentur, tensionem quandam convulsoriam, aut musculorum resolutionem esse oportet, Galeno testē, quorum hæc quidem imbecillitatem, illa duros tumores ac siccitates immodicasque frigiditates significat. Quod si ergo ex siccitate oriatur, sicuti in acutis morbis febrilibusque ardentibus (de quibus hætenus locutus auctor noster videtur) non raro contingit, exitiale omnino est: nam ea quæ inanitionem sequitur convulsio, lethalis est. atqui si ex frigidityte fiat, calore innato extincto, vires resumī nequeunt, unde perniciosum quoque esse constat.

### vbi ager supinus cubat.

SUPINUM decubitus per se non omnino malum desinit. Galenus, mediūque quodammodo ponit inter salubres & perniciosos, neutrisque (nisi alia quoque mala signa adsint) annumerat. Quod si igitur sic cubantem, genua quoque contrahere contingat, tensionem quandam convulsoriam significat, quæ exhausto humida radicali à calore febrili facta, quanquam si quis ad mentis alienationem, Galenum sequimur, eiusce modi decubitus referre velit; per me integrum est: atque tum idem quod Hippocrates in Prædictionibus dixit, Si crura supini cubantis admodum reducta districtaque sint, exitiosum.

### Vbi deorsum ad pedes.

HIPPOCRATES in Prædictionibus, Si verò proclivior est ac deorsum latitur, subinde ad pedes maiore cum periculo est; significat enim extinctionem regentis corpus facultatis.



oultatis, delirio, catochis, phreniticis mentēque laborantibus frequens admodum.

### Vbi brachia & crura.

HIPPOCRATES in Prædictionibus huius quoque causam subiicit: Nam si nudos, inquit, habeat pedes, nec admodum calidos; ac manus, collum, ac crura dispergat inæqualiter, malum est: significat enim inquietationem. consistantur namque quous iacentis habitu, aliumque ex alio mutant. Adiecit autem particulam, neque his calor subest; ut morbum denotaret: nam præcedente quoque capite, acuto morbo urgente, extremas corporis particulas frigidas, malas definimus: significant enim calore febrili principes partes depasci; unde etiam fiat, ut natura cum aestro quodam percita, statim priorem habitum ad alium transmutet: nam aliqui, nisi clausulam hanc addidisset, inter periculorum indicia prognosticon hoc tantum annumerandum esset, quum malitiam humoris tantum significet.

### Vbi hiat.

HIPPOCRATES in Prognosticis: Si vero hiante dormiat ore, exitiosum omnino est: id enim imbecillitatem facultatum animalium denotat; nam à debilitate claudens os musculorum oritur.

### vbi assidue dormit.

QUOD ultra modum somno urgeri malum sit, diximus: at quod in morbis acutis lethale sit magna ex parte, audies: quotquot enim sunt quorum in Epidemiis Hippocrates somno detentorum meminit, ad unum omnes interierunt. Nam hic affectus ferè sit ob vires imbecillas, atque adeo ferè emortuas, ut apertas genas seruare non possint.

### vbi is qui mentis suæ non est, &c.

HIPPOCRATES primo Prædictionum: Si quis frideat dentibus, non consuetus à pueritia id efficere; infania significatur, ac mors: sed in utrisque futurum prædicere periculum, est necesse: Si vero mentis com-

motus id efficiat, admodum exitiosum iam est. Et in Prorethetis: Dentium stridor quilibet non est sanitatis tempore assuetus, suffocatio quoque in his valde mala est. Celsus noster quoniam hoc capite instanti mortis signa enumerare tantum statuit, delirij in stridore dentium nullam facit mentionem, id tantum contentus dixisse, quod in deliris mortem iam imminuentem indicet; ostendit enim communem nervorum originem affectam, siquidem musculus masticatorius & temporalibus coniunctis sit stridor dentium.

### Vbi vlcus quod aut ante, &c.

QUEMADMODUM ante generatim colorem totius corporis inspicendum monuit, ut ex eo peccantem coniceremus humorem; ita nunc idem in vteribus ex Hippocrate observandum monet; siquidem is primo Prædictionum, Vlcus, inquit, si ante exiit, vel existat, in morbo considerandum est: si enim moriturus ager est, ante mortem, aut lividum, & siccum, aut pallidum & siccum erit; siccum autem, ut docet Galenus, evadet, quoties nutrens facultas debilis est; cui si biliosus humor ulcers causa efficiens accedat, pallidum quoque erit; quemadmodum si bilis atra, lividum.

### Illa quoque mortis indicia.

NON immeritò mortis instantis indicium erit, si summe corporis particule pallide sint, calore innato (siquidem huius interitum mortem appellamus) iam quasi exhaurito: nam si huius pars aliqua supersit adhuc, ad principes partes, potissimumque ad cor vitæ principium recurrit: quo fit, ut quum extrema particula eo destituantur, sanguine quoque qui innati huius caloris domicilium est, careant; unde fieri videmus, ut ungues inprimis (sunt enim hi inter reliquas corporis particulas maxime exangues) atque post hos digiti quoque, atque ita deinceps relique in extremis corporis constituta particule, palleant.

### Frigidus







febricitans, subito strangulatur, aut deuorare saluam suam non potest. Ita enim de anginâ quæ ex gutturis inflammatione oritur, intelligitur; ex qua plerumque ægros strangulati videmus: nam quum angustii admodum & præclusi quodammodo sint meatus per quos spiritus ducitur, sit ut si qui angustii animo linguant, statim intereant: quod Hippocrates in Prognosticis quoque declarat: Angina, inquit, gravissima est, ac celerrimè interimit, quacumque nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit; plurimum: verò doloris infert, ac spirationis difficultatem: hæc enim eodem die & secundo, & tertio, & quarto strangulat.

#### Cuius in eodem febris.

HÆC quoque sententia efflagitat, ut eo quo diximus modo legamus: nam Hippocrates in Aphorismis, Si à febre habito, inquit, collum peruerit, & vix potest deuorare sine ulla humore conspicuo, lethale est. Et alibi, Collum peruerit non posse & deglutire non posse, lethale est. significat enim, ut auctor est Galenus, magnum excessum febrilis caloris; qui exhausto humido innato excedentem siccitatem pariat; unde collum peruerit contingit, & deglutendi difficultas accedit.

#### Aut cui simul & continua febris.

ALLVDIT ad Hippocratis Aphorismum quartæ sectionis, ubi inquit, Si rigor incidit febre non desiciente, ægro iam debili, lethale. Neque mirum est desinito iam ferè viribus ægro acutum superuenientem morbum lethalem esse: nam quantamcumque robustos inuadunt, non omnino certa habent indicia salutis aut mortis, idque aut quod ingi inuasionum assultu, aut magnitudine alioqui morbi, materiaque peccantis malignitate vires quantumvis firmas prosterant, ac precipites agant.

#### aut cui febre non quiescente.

ANTE ex Hippocrate retulimus in non intermittentibus febribus si exteriores partes

frigida fuerint, interiores verò urantur, & sitim faciant, lethale esse; ac proinde eas febres esse eiusmodi, quæ aut ex internarum partium, viscerumve inflammatione oriuntur, quales lipprias, aut quæ ex pulmonis, ventriculi, aut iecoris, hoc est partium quæ inter thoracem & ventrem sita sunt, erysipelate nascuntur, ardentes perniciosissimas vocant. Sed & alio quoque loco vituperat Hippocrates mutationes celeres in utranque conditionem summarum partium, si sitis quoque his accedat. Id enim rebus caloris præternaturalis, imbecillitatemque natui significat.

#### aut qui febre æquè non quiescente.

DIFFICILEM spirationem vocat, quæ magna sit, multoque internallo exspiratur: hæc autem, Hippocrate in Prædictionibus auctore, delirium significat. Si igitur, febre non quiescente, magna & rara spiratio fiat, atque adsit delirium, exitiosum omnino signum: significat enim cerebrum & instrumenta respirationis, hoc est musculos pectorales læsos esse: atque adeo conuelli à nimia siccitate; unde raras quoque spiritus reddi consequens est.

#### Aut qui epoto veratro.

DIXIT aliàs Hippocrates elleborum album sanas carnes habentibus perniciosum: facit namque conuulsiones. & rursum, Conuulsionem quæ ex elleboro fiat, lethalem esse. quod quum duabus potissimum de causis fiat conuulsio, hoc est ab inanitione & repletione nervosorum corporum, hæc quidem ut purgatione eius quod redundat curatur; ita illa (quando facilius sit demere quam addere) difficilè admittit curationem, ferèque lethalis est; qualis quæ epoto veratro accidit est: ea namque oritur ob immodicam quam elleborus efficit vacationem; attractrice enim sua facultate, quæ in nervis est, ad se attrahit humiditatem, eorumque substantiam vehementius exsiccat; unde sic orta conuulsiones rectè lethales dicuntur: quemadmodum alibi quoque Hippocrates, ex superflua purgatione



gatione convulsiones, aut singultus superuenientes lethales dixit.

aut qui ebrius obmutuit.

HIC rursum ab Hippocratis sententia auctor nosse enariat: unde dubium remitti esse puto in iis, quæ hæcenus typis excusa extant, exemplaribus locum hunc corrupte mendoseque legi. siquidem præterquam quod Hippocratis sententiam non satis explicuerit, dissonantia etiam, neque satis coherencia dixisse videtur, nam et adiecta febre, à sciolo quodam suppositum videtur; siquidem statim subiungit: nisi aut febris accessit (cuius videlicet calore vapores dissolvantur) aut eo tempore quo ebrietas solui debet, loqui cœpit. Sic quinta sectionis Aphorismo quinto Hippocrates: Si quisquam ebrius de repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit qua solvuntur crapule, vocem recuperet. Et libro secundo De morbis: Si quis ex ebrietate voce priuetur & sanè febris ipsum corripiat, sanus sit; si verò non corripuerit, tertia die moritur. Obmutescunt autem ebrj ob vinum immodicè sumptum cerebri ventriculos replens; unde & convelluntur quoque. Nam quemadmodum Galenus libro De temperamenti auctor est, vinum ubi plus bibitur, quam ut vinci possit, tantum abest ut animal calefaciat, ut etiam frigidiora vitia gignat; quippe apoplexia, cari, convulsiones & tetani immodicum vini potum concomitantur: quare si ebrius quis obmutescat ac convellatur, nisi qualitate vini calida humores cerebri ventriculos insarcientes dissolvantur, hoc est nisi eo tempore quo crapula solui debet, loqui cœperit, aut si febris aliqui superveniens calore suo eosdem discutiat, periculum est ne distentione correptus moriatur, idq; suffocata animali facultate. Paulus Aegineta ad catochos nescio quam apposuit hunc Aphorismum libro tertio transferi: Qui ex ebrietate, inquit, vitium hoc contraxerint, crapula dissoluta humidioribus cibo tractandi sunt, qualis est prisana cremor: præterea caput inunctionibus congruis

inungetur, per astatem quidem frigidis; per hiemem egelidis: si nequaqua crapula solvatur, neque ad sobrietatem reditus est, tanquam deplorata valetudinis hominem vitare oportet.

Mulier quoque gravida, &c.

QUVM due sint indicationes in victu gravidarum, acuto morbo laborantium, altera videlicet quæ à foetu sumitur; altera quæ à morbo; illa quidem pleniorum victum prescribit, quo febris incrementum ac vires accipit, atque ægotans occiditur: hæc contra, cuius summa habenda est ratio, nisi matrem una cum foetu perimere mens sit, summe tenuem victum desiderat; unde media consumpto infantulo abortus ac vitæ periculum imminet. Recte igitur ex Hippocrate dixit, mulierem gravidam acuto aliquo morbo corripi, lethale esse. Quod autem somnus in declinatione morbi, præsertim dolorem faciens, lethalis sit, iam antè dictum est.

& cui protinus in recenti morbo.

IAM sæpius dictum est, quod perniciose imperfectè indicantia mala sint: sub quorum albo sunt, si cruda qualia fere in morborum principis sese exhibent non tam mori natura, quam malicie materia peccantis excerni contingat. quod voluit Hippocrates, dum dicit: Morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis infra vel supra exierit, lethale est: nam si per inferiora sese exerat, periculum est ne dysenteriam efficiat, ac acrimonia sua intestina corrodat; unde mortem subsequi certum est, quando ex quæ ab atra bile sunt dysenterie Hippocrati lethales dicantur. At si sursum feratur, idem quoque in ventriculo quod in intestinis, efficiet, cerebrumque ac gulam perat.

cui alterutrum modò

se prompsit.

OBSCVRE admodum quarta sectionis Aphorismum 23. cum brevitati studeat, Cel-

sus reddi-



sus reddidisse videtur: Quibuscumque mor-  
bis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus,  
sive quouis alio modo extenuatis nigra bilis,  
sive vii sanguis niger, exterius postridie mo-  
riantur. Nam acutorum morborum ne me-  
minit quidem, quod forte suspicaretur longos  
ferè esse mortos qui aut à cholera adusta aut  
à succo melancholico fierent. Nam qui à  
sanguine aut bile oriuntur, breues admo-  
dum sunt, qui ex pituita, in longius tempus  
protrahuntur; vii etiam illi qui ex melan-  
cholia, in longissimum. Quare Celsus bilis  
atra reiectiones, longo morto extenuato cor-  
pore, lethales dixit: est enim in talibus, ut  
vult Galenus, natura admodum imbecillis;  
adedo ut non possit concoquere, neque discer-  
nere, neq. excernere que ita prava existunt.  
Sub bile autem atra, melancholiam ex cho-  
lera adusta, & succum melancholicum (qui  
est qualis sanguis niger) complectitur: nam  
alterutrum ad rō infra vel supra  
se ostendit; meo quidem iudicio, referen-  
dum est.

### Sputum etiam biliosum & purulent.

HIPPOCRATES secundo Predictionum,  
Quæcumque, inquit, suppurantur dum screea-  
tio biliosa est, exitiosa admodum sunt, sive  
vicissim bilis ac pus, sive simul excernantur,  
potissimum verò quoties suppuratio excerni  
ab eiusmodi sitatione septimo die egrotatio-  
nis inceptit. sitentem verò talia, mori deci-  
moquarto die, sperandum est; nisi bonum  
aliquod illi acciderit. indicatur enim, ut in-  
quit Galenus, humor ferocissimus, qui na-  
tura ad concoctionem parata nō cedit. quod  
si igitur expunctiones tales septimo die fieri  
contingat, ferè decimoquarto intereunt:  
nam critica signa que critico die conti-  
nuant, nisi morbum leuent, atque una adsint  
alia perniciofa signa, mortem ferè præsa-  
gunt: quo fit ut si septimo die huiusmodi  
appareant, decimoquarto interimant; est  
enim septimus decimi quarti index.

### Sudor quoque frigidus.

QVID si frigidus sudor, aut unde oria-

tur, ante dictum est; & quod is lethalis sit  
in febribus morbisque acutis, ante quoque ex  
Hippocrate declaratum est: nam pessimum  
sudorem is dixit si frigidus egrediatur, &  
circa caput, tantummodo vultum & cerni-  
cem: hic enim cum acuta febre, mortem;  
cum mitiori, morbi longitudinem significat.

### atque in omni morbo vomitus, &c.

SI idem homo, inquit Hippocrates, om-  
nes vomat colores, exitiale admodum est.  
Vomitio linida si grane oler, ocyssimam ha-  
bet abolitionem; omnisque suppuris ac fœ-  
tidus odor in omni vomitione malus est. Et  
in Prorethicis: Vomitus cum varietate  
mali tum alias, tum si mutuo sese conse-  
quantur, varietas etenim multas in corpore  
variâque affectiones difficiles significat:  
que si grane quoque oleat, eò deterior est,  
quod his putredinem quoque adiunctam  
denotet.

### Ac sanguinem quoque in febre.

HIPPOCRATES tum quarta, tum septi-  
ma Aphorismorum sectione, non pestiferum,  
sed malum tantum dixit: nam illic inquit,  
Sanguis qualiscumq. sursum elatus, malum;  
si verò deorsum, bonum: hic verò, Quicum-  
que euomuerint sanguinem, si sine febre  
quidem, salutare est; si verò cum febre, ma-  
lum est: is siquidem sanguinis vomitus qui  
cum febre fit, inflammationem in iis parti-  
bus unde vomitus defertur, significat; que  
tantum abest ut minuat aut sibi similis  
maneant, quum calore febrili augeatur, ac  
foneatur, interioraque sensim depascat; unde  
mortem quoque consequi ratio postulat.

### Urina verò rubra ac tenuis.

TENVEM rubramque urinam non sim-  
pliciter perniciosam dixit; sed que temporis  
spatio (quum cruda sit, atque in morbi cru-  
ditate excernatur, atque adeo longitudinem  
temporis moramque ad concoctionem effla-  
get;) hominem consumat: præterber enim  
color



color tenuis;que substantia, cruditatem materie denotant: nam, ut Hippocrates, Dum urina ruffa fuerit ac tenuis, crudam significat agrotationem: ubi morbus diutius fuerit, urina verò talis excreuitur, periculum est ne eger durare possit quoad morbum conquatur.

### Pessima tamen est, præcipueque, &c.

EXITIOSIOR (inquit Hippocrates) est urina, si aquosa fœtida, nigra crassaque est. Quæ consistentia sit aquosa, colore alba, nullam omnino mentionem fecit Celsus, vel quod malam ante præsertimque in phreniticis dixisset, vel quod eam sub urina ruffa ac tenui comprehensam voluit, quando alba tenuis quàm ruffa tenui coniuncta maiorem cruditatem denotet. Græcolet autem urina propter putredinem, quæ à calido extraneo agente in humidum fit: Crassa verò redditur, tum ob humoris abundantiam, tum ob extinctionem caloris visifici: à frigore quidem, ut voluit, si lividus color precedat; à calore, si viridis.

### Atque in viris quidem & mulieribus.

IN mulieribus & viris, inquit in Prognosticis Hippocrates, urina nigra; in pueris aquosa, deterrima est. Nam quum pueri multam habeant naturalem humiditatem, calorémque nativum plurimum, ac multum edant, (sunt etenim voraces natura) consequens est eos secundum naturam lotium reddere parum à subaureo croceoque declinans, substantia crassum, hoc est consistens, atque cum multa hypostasi: cui quum maximè contrarium sit dilutum ac tenue, rectè inter perniciofa recensuit. Nigra autem urina,

sicuti Galenus docet, in omni etiam ætate pessima est.

### Aluus quoque varia pestifera, &c.

HIC iterum transcribentium lapsus fuit: siquidem rō viride, quod ad aliquid referri debebat, bili ascripserunt, non intelligentes omnes pericholas deiectiones periculo non vacare. Nam, ut Hippocrates de ratione victus acutorum, Deiectiones omnes pure, biliosæ, græves habent offensas, neque enim hypochondriorum extinguunt ardorem, sed excitant, inquietationemque, & membrorum iactationem faciunt, intestina enim sedemque exulcerant. Et in Prædictionibus: Exitiosior, inquit, est deiectio si livida aut nigra, aut opima est; si verò versicolor, diuturnior quidem, sed nihilominus exitialis: hæc strigmenta habebit, ac biliosa erit; cruenta, porracea nigraque, quæ nonnunquam simul interdum interpositis vicibus excrevuntur: Quas omnes qualitates, si rō viride ad aliquid referamus, sub bile biliosa atraque excrementa comprehendentes, clarè explicaverit Celsus: de quibus quoniam satis iam antè dictum est, ad alia progrediemur. Nam quæ ad finem usque capitis sequuntur, quoniam ad semeioticen parum conducunt, & per se ipsa clara satis sunt, volentes præterimus: satis enim superque à doctissimo viro Ioanne Manardo suis in Artem parvam commentariis demonstratum est sine scientia, an coniecturalis tantum ars medicina: de quo qui plura desiderat, aut Manardi doctissimos commentarios, aut Apomensis Conciliationes legat. At quod acutorum morborum non sunt omnino certa prænuntiationes salutis aut mortis, quando cum ceteri indicatione magnitudinem quoque morbi adiunctam habeant, antè quoque diximus.



## CAPVT VII.

*De notis, quas aliquis in singulis morborum  
generibus habere possit.*

Sed cum proposuerim signa quæ in omni aduersa valetudi-  
ne communia esse consueuerunt, \* ea quoque transibo, vt \* ad ea  
quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit  
notas, indicem. Quædam autem sunt, quæ ante febres,  
quædam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut venturum sit,  
ostendunt. Ante febres, si caput graue est, aut ex somno  
oculi caligant, aut frequentia sternutamenta sunt, circa ca-  
put aliquis pituitæ impetus timeri potest. Si sanguis aut ca-  
lor abundat, proximum est, vt aliqua parte profluuium san-  
guinis fiat. Si sine causa quis emacrescit, ne in malum habi-  
tum corpus eius recidat, metus est. Si præcordia dolent, aut  
inflammatio grauis est, aut non toto die concocta fertur vri-  
na, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color sine  
morbo regio malus est, hi vel capitis doloribus conflictantur,  
vel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam, & tu-  
midam, aut capite, aut visceribus, aut aluo laborant. Si in  
continua febre puero venter nihil reddit, mutaturque ei co-  
lor, nec somnus accedit, ploratque is assidue, metuenda ner-  
uorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore  
tenui longoque, tabem timendam esse testatur. Vbi pluri-  
bus diebus non descendit aluus, docet aut subitam deiectionem,  
aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, longæ de-  
iectiones sunt. Vbi dolor in imo ventre & in coxis est, aqua  
intercutem instat. Sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet.  
Idem propositum periculum est his, quibus voluntas desi-  
dendi est, venter nihil reddit, nisi & ægre & durum, tumor  
in pedibus est, idemque modò dextra, modò sinistra parte  
ventris inuicem oritur atque finitur: sed à iocinore id ma-  
lum proficisci videtur. Eiusdem morbi nota est, vbi circa  
umbilicum intestina torquentur (σποδὸν Græci nominant)

O 3

coxaque



coxaeque dolores manent, eaque neque tempore, neque remedijs soluuntur. Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manibusve, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur, aut si id membrum ex levi causa fatigatum aequè frigido calidoque offenditur, *ποδάγραν χρεδάγραν* ve, vel eius articuli in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desijt, hi vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graues habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus foeminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel qualibet alia pars morbo infestetur. Eademque his pericula sunt, quibus articulorum vitia, dolores, tumoresque sine podagra similibusque morbis oriuntur & desinunt. Vtique si saepe tempora iisdem dolent, noctuque corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier à partu vehementes dolores habet, neque alia praeterea signa mala sunt, circa vigesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicumque etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione cum finiet, magisque si iuuenis erit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem. Febris autem quae subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine & interdum & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque praecordiorum, neque tussis, neque vomitus, neque febricula praecesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus vlcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque causa apparet, vlcus in vulua est. *Vrina.* Urina autem crassa, ex qua quod desidet album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumque morbi esse. Eadem viridis aut viscerum dolorem tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut certè corpus integrum non esse testatur. At si sanguis aut pus in vrina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt. Si haec crassa carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, aut malè olet, & interdum quasi arenam, interdum quasi sanguinem trahit,



trahit, dolent autem coxæ, quæque inter has, superque pubem sunt, & accedunt frequentes ructus, interdum vomitus biliosus, extremæque partes frigescunt, urinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est aquæ simile, vel rufum, vel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, alius verò cum multo spiritu redditur, utique in renibus vitium est. Aut si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem vesica vitium est. *Calculosi.* Calculosi verò his indicijs cognoscuntur: Difficulus vrina redditur, paulatimque, interdum etiam sine voluntate destillat. Eadem arenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam resupinati; maximeque hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem leuant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu omni que motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ verò oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admouerunt ubi vesicæ ceruicem is vrget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa alius elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit. Duræ mammæ sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super vlcera subito esse desierunt, idque à tergo incidit, vel distentio neruorum vel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non



*Vrina.*

gari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore & vigilia est, atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lien tumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, aut quædam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala vlcera, & ex his nigra cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus eius est, his mens labat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, neque vllum signum malum accessit, supurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. Vrina quoque quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Hæc verò cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, vbi febris accessit, atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, vbi expeditior alicuius, quam sani fuit, sermo est: subitaque loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut vbi raro quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordijs duris & tumentibus. Oculorum quoque frequens motus, & in capitis dolore offusa oculis tenebræ, vel nullo dolore substantie somnus ereptus, continuataque nocte & die vigilia, vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit: item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniæ signa sunt. Si quid etiam abscessit, & antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua, vehementique, sæpe mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur, seniores tardius: quoniam neque æquæ magnas febres experiuntur, neque æquæ insaniunt: ita sustinent, dum is affectus intus versatur. Suffusa quoque sanguine mulieris mammae, furorem ven-



rem venturum esse testantur. Quibus autem longæ febres sunt, his abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idque sæpe intra septimum diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionem, tormina: Post hæc intestinorum læuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. Post lateris dolores, vitia pulmonum: post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, nervorum rigor aut distentio. Vbi caput vulneratum est, delirium. Vbi vigilia torset, nervorum distentio. Vbi vehementer venæ supra vlcera moventur, sanguinis profluvium erit. Suppuratio verò pluribus morbis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem id malum incumbit, in iunioribus tantum: in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt, sed cum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt, hæretque per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa\* vlcera non fluit, circa aures erumpit. Cumque omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet,\* magis eò tendit is, qui in præcordijs, quàm is, qui infra est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis, aliquid abscedit. Interdum quoque vrina tenuis & cruda, sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, exque eo casu, plerumque infra transuersum septum (quod *Διαφραγμα* Græci vocant) fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas\* interdum excitat, aut circa vigesimum diem, aut circa\* quadragesimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum.

\* viscera,  
al. initia

\* Alias,  
magis se  
tendit.

\* intus  
exci.

\* xxx,

P.

mum.



num. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem eius partis sensit. Sed hæ vomicæ modò à pulmone, modò à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolorem, inflammationemque concitat, ipsum calidius est: & si in partem suam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit, eaque interdum leuior est, noctu increfcit, multus sudor oritur, cupiditas tussendi est, & pæne nihil in tussi excreatur, oculi calui sunt, malæ rubent, venæ sub lingua inalbescunt, in manibus fiunt adunci vngues, digiti, maximeque summi\* pallent, in pedibus tumores sunt, spiritus difficilius trahitur, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa vigesimum diem erumpet. Si seriùs ista cœperint, necesse est quidem increfcant, sed quò minùs citò affecerint, eò tardiùs soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis vnguibusque nigrescere. Quòd si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit, pedes tamen decidunt.

\* calent,

#### ENARRATIO.

POSTQVAM instantis morbi signa, atque adeò eo urgente, quæ vel spem, vel metum significarent, explicauit, iam ad aliud genus signorum progreditur: ex quibus qualis tandem morbus sit futurus, liceat coniecturare; proximo ab hoc capite dicturus quæ cognitio iam initio, spem aut metum polliceantur.

Ante febres si caput graue est, &c.

NON eam capitis grauedinem aut oculorum caliginem intelligit, quæ in febribus precedente indicationem dæ; sed quæ ante paroxysmorum exacerbationes in ipso morbi principio fiat: tum enim huiusmodi accidentia impetum aliquem pituitæ deferri ad caput significabunt. Grauiatur namque caput

propter multitudinem pituitæ, unde contingat quoque transitum vaporum, & humorum obstruari: his accedit dolor ac tensio quædam panniculorum cerebri; quo fit ut violento motu natura ad sternutationem procedat, depellere tentans ea quæ meatibus obstruant. De caligatione autem dictum est.

Si sanguis aut calor abundat.

ANTEA ubi frigidi & calidi incommoda enarrauimus, inter reliqua quæ calorem subsequuntur, sanguinis profusio posuimus. Abundante autem sanguine, eadem quoque consequutura ratio efflagitat, vasorum oris apertis dum nimia copia grauiantur, atque distenduntur. Porro sanguinem redundare



redundare dicimus, si (quod ad aetates attinet) adulescens sit, tempusque verum, ac anni constitutio calida & humida, his quoque si adsit tensio vasorum omnium in oculis, atque manifesta pulsatio in temporibus, faciei & corporis reliqui color rubicundus, rosens, ac floridus ac splendens ex rubro atque albo mixtus.

### Si sine causa quis emacrescit.

NUTRITIO est perfecta assimilatio, vel vacuati repletio: sitque quoties is qui nutrit cibum corpori quod alit assimilatur. Ceterum quando id quod probe nutriri debet, (ut libro De symptomatibus vult Galenus) oportet ad se trahere peculiare propriumque alimentum, deinde retinere ipsum quousque alteratum sibi assimiletur, ac deinde excernere id quod redundat excrementum, necesse est, quum duplex sit excrementi genus (aut enim qualitate aut quantitate peccat eam omnino partem quae non alitur, aut in uno eorum quae dicta sunt, peccare, aut in pluribus: sic *ἀσπασμός*, quae *ὑπὸ τῶν ἀσπασμῶν* & *ἡδύμενος* dicitur, hydropis species, vitiosa corporis miscella in tumorem quempiam seu spongia attollitur, accidere solet: sic *ἀσπασμός*, ita enim vocant Graeci quando corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subuenientibus summa materies oboritur: sic malus corporis habitus (*κακὸς ἥθος* dicunt) quoties alimenta corrumpuntur, accidit: quod ferè sit, ut sequente libro auctor noster edocet, quoties longo morbo vitata corpora, etiam illo vacanti, refectioem non accipiunt: nam, ut Hippocrates Aphorismorum secundo, non pura corpora quanto plus nutrites, tanto magis laedes; corrumpitur enim adueniens alimentum (Galeno in Commento eiusdem loci teste) corpori malos humores habenti, ita quod ipse quidem quantitas augetur, qualitas verò seruetur: Fit autem hoc potissimum quando ventriculus visiosus quibusdam humoribus plenus fuerit.

### Si praecordia dolent, &c.

QUANQUAM sub doloris vocabulo non raro inflammationem intelligat, hic tamen distinxit praecordia dolentia ab inflammatione vexatis, quae *φλεγμαϊσμο* vocat Hippocrates; quod videlicet haec ferè à calida materia originem suam habeant, atque calidi morbi sint, cuiusmodi herpes sunt, erysipelates & carbunculi: illa autem, sicuti varios doloris sensus inferunt, sic varias quoque causas sortiuntur; nam si in alterutro latere obstructio sit, doloris sensus varios concitabit pro materia peccantis differentia. Siquidem si à vaporosis crassisque flatibus alterutrum hypochondrion, hepar dico aut lienem, contingat obstrui, non granitatis solum in altero praecordio sensus, sed & tensionis oborietur. At si à crassis, lentis, ac viscosis humoribus talis obstructio accadat, tum quoque pro humorum differentia cum dolore, granitatis, eiusque aut obtusa aut vehementis, sensum inferet; idque aut cum febre, aut sine febre. Per granem autem inflammationem eam intellexit, quae gravem doloris sensum inferret: cuiusmodi in principis exhibent ferè quotquot sunt inflammationes. Ceterum quod de urina cruda subiicit, facit ut potius de dextero praecordio dolente aut inflammato, quam sinistro locum hunc intelligam, idque gibba iecoris parte affecta: Nam quum gibbam iecoris diureticis rectius, quam catharticis obstructione liberaueris, consequens quoque est, ut eadem patiente, concoctionis aut cruditatis indicium ex loio faciamus. Quanquam ad utriusque visceris obstructiones rectè haec possint accommodari: nam Hippocrates *τὰ ἀσπασμῶν*, hoc est excrementa omnia in morbis consideranda monet: & Galenus, in thoracis, pectoris & reliquarum corporis partium morbis locum contemplandum asserit.

### Quibus diu color sine morbo regio.

COLOR in corporibus similis efflorescit humoribus: sic ubi flava bilis per uniuersum corpus effusa contingit, auriginis cer-



risima nota est: atque si ea non apparente color malus sit, exempli causa mixtus ex albo & limbo, aut plumbens idem appareat, limbus in summa cute emicet, crudos succos subesse argumento est: unde aut dolores capitis urgent, aut rerum secularum appetit, atque a natura abhorrentium, quales lapides, terra & carbones sunt, tenentur: quem admodum mulieres quoque quadragesimo a conceptu die pro varietate vitiosi humoris peccantis, varia ac peregrina edulia appetunt: nonnulla enim falsa, quaedam acida, alia terram, aliqua rursum testas, aut extinctos carbones estant; quem affectum picam aut citam vocare consueverunt. Ceterum quae de malo colore hic scribit Celsus, transsumsi ex secundo Prorethicon Hippocratis, ubi sic habet: Quibus colores dum iuvenes sunt, ad multum tempus pravi sunt, & continenter, non tamen regij morbi modo; hi siue viri sint, siue feminae, caput dolent, ac lapides ac terram comedunt, & hemorroides habent. Pallidi vero cum virore colores, qui diuturni sunt, & morbus regius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent: rerum pro lapidum ac terrae carbonumque esu, praecordis hi magis quam superioribus consistantur.

### Qui diu habent faciem pallidam.

Hic, ut in precedente paragrafo, multa ex Hippocrate succidit Celsus: siquidem illic tantum doloris capitis, aut quoddam terram edant, meminit; & quod hemorroides habeant, silentio praeteriit: hic autem singula distinguit, eaque quae coniunctim inuadere Hippocrates dicit, Cornelius noster figillatim tantum mensura dicit; siquidem iam citato loco inquit Hippocrates, Quicumque vero multo tempore pallidi apparuerint, & facies in tumorem eleuatas habent, eos dolere caput sciendum est, aut circa viscera dolorem aliquem habere, aut in sede malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparentibus plerisque non unum aliquod horum malorum apparet, sed plerumque multa, aut etiam omnia.

### Si in continua febre puero, &c.

PER pueritiam eam quae usque ad septimum annum protrahitur intelligemus: nam, ut Hippocrates tertio Praedictionum, Pueris accidit conuulsio, si febris acuta fuerit, nec alium deliciat, ac vigilent, paueant, lugeant, colorem mutent, & croceum aut limbum aut rubeum trahant. Hac igitur nuperrime editis pueris promptius accidunt ad septimum usque annum: Adultiores vero pueri virique non in febreprehenduntur conuulsione, nisi aliquod indicium extitit validissimum ac deterrimum, qualia per delirium accidunt. Neque enim mirum est, Galeno teste, lenissima quavis de causa nervorum distentione corripit pueros, quum una eademque sit omnibus victus ratio, nempe lac quod, quum sicuti non raro sua qualitate, ut si in isto crassius sit, ita etiam frequenter sua quantitate, ut si copiosius quam natura flagitat sumperint (sunt enim natura voraces pueri adeo ut etiam intempestine exhibitum cibum non respuant) molestum sit, sebre concitaret, atque adeo neruoso genere quod hac aetate imbecillissimum est, affectu conuulsiones excitat: cuius quidem futurae causa sunt, se paueant, vigilent, illachryment, atque alius nihil reddat, signum vero ad has causas, si color praeter naturam euariet, indicans humorum prauitatem, ex quibus conuelli soleant.

### Frequens autem destillatio.

SEQUENTE libro auctor noster tres tabis species ponit, quorum videlicet, *ἡ ἐξ ὀφθαλμοῦ*, & *ἡ ἐξ ὀφθαλμοῦ*: sed posteriores duae improprie tantum & per accidens, tabis nomen sortita sunt, quod in iis videlicet, non secus atque in phthisi, ex pulmonis ulcere corpus contabescat. Porro tabes, quae & phthisis dicitur, ferè oritur, quoties a capite in pulmonem, tenuis, acris, atque erodens humor distillat, qui sensim dum meatuum angustia per spiritum expelli non potest, pulmones exculcerat; unde & lenes quaedam febricula innadunt, quae etiam quum quiescerint, tamen post repetunt.



petunt. Si igitur in tenui longoque corpore diffillatio frequens sit, periculum tabis imminet: nam, ut ait Hippocrates, Qui a phibisi probe liberari vult, ut quam minime tenuis sit oportet, pectusque quadratum ac hirtum habeat, & os ipsius paruum sit, & robuste carnosum. Nam qui oblongo, atque eodem angusto strictoque sunt pectore, non tam facile pulmones dilatare possunt, noxiosque qui illapsi sunt humores expellere.

### Vbi pluribus diebus non.

NAM si alius plena multum quod affligit habeat, periculum est, ne ex ipso morbo aliquis fiat, si alicubi se firmet id quod affligit, aut ad laus, aut ad viscus, aut alicubi aliqua partem concalescat, quo quam primum sinus humorem illum turbet. Vnde si febrem, aut visceris alicuius inflammationem subterfugerint sic affecti, ex intestinorum cum flava bilis folliculo compressione, contingit fundi bilem, intestinisque bilis acrimonia iritatis fluxum subsequi.

### Vbi pedes turgent.

SI quid hic rursus mihi condoneatur, lectionem nonnihil immutauero, interposita unica dictione, videlicet: Vbi pedes turgent, vbi longae deiectiones sunt, vbi dolor in imo ventre & coxis est, aqua inter cutem instat. ita enim cum Hippocrate secundo Prædictionum concordabit: vbi sic scribit: Aqua inter cutem omnis si ex morbo acuto existat, mala est; non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert ac mortem, fereque incipit ex parte inani ac lumbis iecoreque. Si quibus ergo ex parte inani existit, pedes intumescunt, & alius diutius fluor sit, neque exolvens dolorem, qui ex inani parte afficit ac lumbis, neque molliens ventrem. Nam quod pedes intumescant, omni hydropi commune est; & quod dolor in imo ventrem infestet, in causa est inflammatio, ieiunum lactesq; infestans: quibus quum pena debiles sint, ut bene monet Galenus, per quas iecur ad se alimentum trahit, sit ut nequaquam visceri subferriant ad diductionem, neque maneat in

ieiuno tenuioribusque intestinis alimentum. Et si ab eo grauentur, utpote debiliores, id omne statim pellant deorsum, unde alii fluor longaq; deiectiones moleste sunt. Oritur autem hic morbus ex ilibus, siue ex taur. ac roror, verum per consensum coaffecto hepate: neque enim (sicuti arbitrabatur Erasistratus, ut secundo De naturalibus facultatibus admonet Galenus) ob solum hepatis scirrhum sit hydrops; sed vel ex diuturnis haemorrhoidibus suppressis, vel immodica exundem profusione, vel ex menstruae purgationis cessatione omnimoda, ac eiusdem superflua vacatione ad extremam frigiditatem hepatis temperiem ducentibus oriri solet: quemadmodum etiam hic auctor noster ex Hippocrate ab ilibus originem sumere dicit: Est tamen prima & continens hydropis causa, vbi sanguificationis officium intercidit; etenim, ut auctor est Galenus, sicuti in ventriculo concoquuntur esculenta, pari ratione in iecore & venis, præcoctum in ventriculo alimentum. Quinetiam ut in ventriculo interdum minus intercidit concoctionis officium, interdum magis, ita in iecore: nonnunquam enim iecur afficitur ex sua vi, sicuti etiam ventriculus per consensum aliarum partium, quibuscum societatem habet, propter communes nervos, venas, ac alia receptacula; unde fit ut quum intestinis, lien, ventriculoq; ex magnis venis copuletur, facillime iis laesis coafficiatur.

### Idem propositum periculum est.

QUANQUAM non nisi iecore affecto oriri possit hydrops, quædam tamen discrimina ponit, primariæ an per consensum laboret. Est autem, ut diximus, aqua intercut, vitata hepatis functio, quæ gignendo sanguini parum valet; quo fit ut in alienam quandam substantiam mutato succo, alendo corpori usui esse non possit: atque sic eodem reiecto in vastum tumorem uniuersam corporis miscellam attollit: ac primum quidem ignobiliores seu imbecilliores particulas, utputa pedes, occupat; deinde ventrem & viscera in magnam altitudinem attollit.



tollit. Sed his quibus à iecore aqua intercus incipit, ut docet Hippocrates, tussire quidem cupiditas est; verum nihil excreant commentatione dignum: pedesque intumescunt, ac venter non deiecit, nisi dura, ac pro necessitate: atque etiam circa ventrem tumores sunt, qui modò in dextra, modò in sinistra parte desinunt, consistuntque. Quam quidem sententiam ad verbum expressisset Celsus, nisi pro tussendi cupiditate, desidendi voluntatem substituisset: quod certe an rectè fecerit, indicent alij; ego tum Hippocrate & Galeno tussendi cupiditatem legere malim: nam hepate affecto solet ferè oriri exigua quaedam tussis, aliusque supprimi, nisi intestina inflammatione vexentur. Tumores autem qui in alterutra ventris parte innicem oriantur, & finiantur, Galenus referre videtur ad foveas quas digiti impressione efficiamus: nam si tumores bosce digito comprimamus, cedunt quidem, ac tanquam foveam quandam referunt, sed statim ad pristinam redeunt conditionem: unde innicem quoque oriri & finiri putat; vel quòd dum nondum absoluta, atque in fieri sit hydrops, tumores hi quidem incipientes consistant; saepenumero etiam finiantur, ita ut integrè desisse videantur, mox tamen reuertantur; atque ita variis vicissitudinibus hominem tandem consumant.

#### Eiusdem morbi nota est.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta: Quibus, inquit, torsiones, & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento neque aliter soluitur, in aquam intercutem siccam finitur: neque enim omnis in genere aqua intercutis futura praesagium afferent torsiones circa umbilicum, quae medicamenta respuunt; sed eius tantum quam siccam Hippocrates vocat, hoc est quae à sono ad tympani similitudinem tympanites dicitur; haec etenim aquoso humore aqualiculum totamque corporis compagem non dispendit, sed flatuoso quodam spiritu, in altum attollit. unde veterum quidam, sicuti Demetrius Erophili sectator, vanum atque intellectu carens esse sine ulla

humore superfino laborantem hydropem vocare, dixerunt: quòd alludens quodammodo Galenus, atque Hippocratem secutus, improprie vocari hydropem tympanitem arguit: nam sicuti nullus aquam siccam esse, & sine collatione alterius proprie loquendo dicere audeat; ita si proprietatem sermonis spectes, nemo rectè hydropem aut aquam intercutem, Tympanitem (vipula quae sicca sit & omnis ferè aquosi humoris expert) dixerit. Si tamen corporis eideam spectes, non absurde respectu aliarum, ascites videlicet, & anasarcae, siccam (ut quae flatulento spiritu non secus atque aliae in altam molem corpus subleuat) aquam intercutem vocaris: adde quòd non omnis humoris expert sit, solet enim flatibus humiditas quaedam accedere. Ceterum torsiones haec circa umbilicum quae remediis non leniantur, ob flatuosum spiritum qui exitum non habeant, sunt: atque hic, quidem circa initia tenuis est, ut omnes per se inflationes esse solent, sensim autem inspissantur, ac velut nubilus redditur: unde, sicut dixi, cum flatu nubilus quidam humor commiscetur, & magna oritur circumscriptio, (flatuoso videlicet humore intra peritoneum distam pelliculam & intestina collecto) tumorque ad femora usque & coxas protenditur.

#### Dolor autem articulorum.

SI quis ischiæ, podagrae, cheiragrae, gonagrae definitionem animo perpendat, quam sit planus hic locus facile percipiet, siquidem quum fluxione humorum nervosa partes, ad quas materia peccans delabitur, attollantur, consequens est, ut eo quoque loci nervi contrahantur, ac rursum, quum non semper eadem pendeant causa podagrae, & cheiragrae, sed variam fortiantur originem, in genere tamen potiorem causam humorum multitudinem sortite sint, sit ut hi non solum quantitate, sed & qualitate peccent, hoc est aut frigidi sint, aut calidi; unde & calido frigidoque tenuissime offenduntur; calido quidem ubi caliditas, frigido ubi frigiditas in causa est.

Quibus



### Quibus in pueritia sanguis.

QVAM sit sagax industriaque natura, vel hinc conicere licet, quod sponte sua superabundantem humorem pollat, atque expurget; idq; variis modis: nam si sanguis abundet, eundem redundantem per naves citra noxam aliquam euacuat; sin is magis melancholicus sit ac fœculentior, per hæmorrhoides dictas venas eundem reicit: fœmina etiam statis temporibus per menses expurgantur. Capiti quod fontem pituita quidam rectè dixerunt, colatoria quedam adiecit; per que si humore pituitoso grauetur, excrementa expurget, atque hinc non raro videmus, fluxiones à capite in naves, in oculos, aures, faucesque fieri. Ac postremo quoniam interdum usu venit uniuersum corpus molestari serosis quibusdam humoribus extra vasa pulsis, ne quid spontanea expurgationi deesset, toti corpori poros addidit, per quos exudaret, atque excerneret (tanquam per incerniculum) quicquid serosi illius humoris reliquum esset: ac proinde quum eiusmodi expurgationibus subleuetur homo, rationi consonum est cessantibus eisdem, ex meatuum obstructione naturam grauari, ac varios morbos in metu esse. Sic suppressis mensibus, sicuti paulo post dicitur, non vnum morborum genus in periculo erit, aliisque, quas sponte sua naturam moliri dixi, interceptis purgationibus, aliter in periculo esse corpus, prout quævis purgatio esse solet. Atque ita quum sanguis is qui in pueritia fluere solebat, sanguineam admodum temperiem denotet, par erat fluorem illum non suppressi ante quadragesimum annum, citra ingens aliquod periculum: Inuentus enim, (Hippocrate in Prædictionibus auctore) sanguinis fluori opportunissima est, tum propter sanguinis copiam, tum propter facultatem robustam atque calorem exuperantem. Si igitur in pueritia solitus fluere sanguis ante iuuentutem sistatur, fluereque desinat, ex sanguine morbos imminere periculum est, quales sunt capitis dolores, graues in articulis ortæ exulcerationes; sanguine videlicet illuc,

tanquam ad imbecilliores seu ignobiliores particulas, prorumpente.

### Quibus fœminis menstrua, &c.

MATRICE affecta propter affinitatem facile coarctatur stomachus: huic rursus caput, quo fit, ut obstructis vasorum oris, per que sanguis menstruus expurgari solebat, sursum regurgitentur humores, atque ventriculum petant, caputque acerbissimis doloribus grauent, ac siderationis periculum portendant. Necessum igitur est, ut suppressis mensibus caput affligatur, aut quævis alia pars morbo infestetur. Sic Hippocrates Aphorismorum sectione quinta Aphorismo 57. deficientibus mensibus ex vtero fieri morbos auctor est: quod, ut inquit in commento Galenus, compressis, ac obstructis venis per quas ad vterum sanguis menstruus ferri consueuerat, necesse sit, aut vterum inflammatione infestari, aut cancro, aut duro tumore, aut erysipellate, cui sensim totum compatiatur corpus.

### Eademque his pericula sunt.

AN articulorum dolores, tumoresque qui sine podagra, & similibus morbis oriuntur desinuntq; capitis dolorem portendant, vehementer dubito: at quod eisdem desinentibus, neque per suppurationem, neque alio quouis modo resolutis, necessarium sit aliò materiam recurrere, atque inibi morbum facere, notum cuius arbitror: quare cuiusvis potius visceris quàm capitis dolores hic expectabimus.

### Vtique si sæpè tempora.

PAVLO antè dictum est, Qua parte corporis dolor, ibi morbus: quod, ut docet Hippocrates, ab his que naturam mutant, atque corrumpunt, dolor excitatur. Plato in Timæo pathos præter naturam violentè & affatim incidens dolorem conciliare auctor est, atque huius communem esse causam; ac proinde quum circa tempora potissimum ac frontem dolores innaferint, consequens est materiam peccantem caput obsidere: cuius argumentum quoque exhibent nocturna exudationes, ac fron-



ae frontis pruritus; is etenim, sicuti in scabie quoque fieri videmus, à vitiosis salisque humoribus oritur, atque eam potissimum partem affligit, in quam materia peccans decubuit; cuiusmodi hic nobis cerebri anterior pars ob oculos ponitur: quæ dum sese expurgare nititur, ad oculos vispore viciniore, & imbecilliores quicquid est nocui transmittit: unde lippitudines, ex ingenti dolore, sanguinis affluxu factæ oriuntur.

### Si mulier à partu vehementes, &c.

NE SCIO an hunc locum ex tertio Prædictionum paululum censeam imminuendum, ita ut pro si mulier à partu, legamus similiter caput: sic enim de verbo ad verbum sententiam Hippocratis reddiderit; is enim loco iam citato ita habet: Capitis dolor vehemens, & continuus cum febre, si quod ex indicis extiterit vitiosis, lethalis admodum est; si vero sine talibus indicis fatigans dolor, vigesimum transeat diem, & febris detineat, expectare oportet sanguinis è naribus eruptionem, aut alium abscessum ad inferiores sedes: sed quoad dolor fuerit recens, expectare oportet sanguinis ex naribus eruptionem, aut suppurationem si dolor aliqui circa tempora, aut circa frontem affligat, hætenus ille. quanquam non negaverim priorem quoque lectionem constare posse: nam quæ dolores quæ gravidæ à partu molestant, à sanguine magna ex parte originem ducant, consentaneum est ut iidem, præsertim si circa tempora dolores sint, per sanguinis è naribus fluorem (nullis aliis existentibus lethalius signis) indicentur, aut aliqui puris per eadem loca, ac aures eruptionibus, aut etiam per abscessum ad infernas partes. Expectanda tamen magis erunt sanguinis eruptiones è naribus, si invenes sint, & circa tempora frontemque ingentibus doloribus excrucientur. neque enim mirum est à partu suppressis roxiolis, variis fuliginibus ac vaporibus peti caput; quibus sanguinis è naribus fluore (quanquam id tantum sit accidens) confestim lenabitur.

### Febris autem quæ subito, &c.

VBI de febribus quæ in abscessus terminantur loqueremur, omnino intactam reliquimus hanc sententiam: repetiturque variis locis ab Hippocrate: nam Aphorismorum secundo, Quæ relinquuntur in morbis post indicationem, recidivam facere consueverunt. itemque planius paulo sexto Epidemion: Quæ relinquuntur, inquit, post indicationem, recidivam faciunt. Primum itaque lienis tumor sit, nisi in articulos decumbat, aut sanguis ex naribus erumpat, vel dextri precordij distensio, nisi urina copiosa effluerit, hæc enim utrorumque est interceptio, ut recidiva merito fiant. Abscessus igitur eorum non factos fieri oportet; factos autem declinare. Eos vero qui tales, quales esse decet, & quæ oportet prospiciunt, excipere convenit: quicunque autem non satis exierint, eos inuare; qui vero prorsus inutiliter procedunt, hos anertere, maxime eos qui adhuc futuri sunt, consultum est: si vero non, saltem eos qui paulo antè cæperunt: hucusque Hippocrates nos aperit docens quæ imperfectam indicationem (de qua hic Celsus loquitur) subsequi soleant, lienis tumorem inter alia statim subsequuntur affirmans; nisi, aut deorsum tendentibus humoribus abscessus inibi faciant, aut maiore calore sursum sublevari, sanguinis eruptiones ex sinistra nare faciant.

### Cui fauces sanguine.

HIPPOCRATES non usque adeo manifeste vlcus, aut in naribus, aut in faucibus subesse dicit: sed videndum, an vlcus, aut hirudo in dictis locis appareat: nam, Quod si cuiquam, inquit, fauces implentur sanguine, sæpe singulis diebus, ac noctibus, cui neque caput antea doluit, & qui neque rufum habuit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec pectoris nec dorsi, huius consideranda sunt fauces, & nares, an vlcus aliquod habere compareat in hoc loco, an hircinam. Manifestum nanque est sanguinem huiusmodi, si non ex una aliqua prædictarum



prædictarum canfarum oriatur, ex apertione vene alicuius, aut in faucibus, aut in nari-  
bus fieri: quare ulceris in eisdem locis metum  
subesse auctor noster dicit, hirudinum men-  
tionem nullam faciens; vel quod indignum  
putaret, id quod cuius etiam manifestum est,  
ascribere (amens enim omnino sit, qui han-  
tam hirudinem faucibus naribusque inha-  
rentem exigentemque continuo sanguinem  
non sentiat) vel quod putaret continua in-  
gigue tractione ac vellicatione sufficulam  
aliquam suborituram.

### Si mulieri ex inguine febricula.

HIPPOCRATES Prædictionum aut  
Prorrheticon secundo, ubi fecunditatis steri-  
litasque signa enarrat, inter alia quæ con-  
ceptionem remorantur, vlcus in utero fa-  
ctum enumerat. Dicit autem, Quibus vlcus  
factum fuerit in utero, siue ex partu, siue  
ex tuberculo, siue ex alia quadam causa,  
his febres ac inguinum tumores succedere  
necesse est, & dolores in his locis: si verò  
& puerperij purgamenta fuerint simul in-  
tercepta, hæc mala si fuerint omnia, mera-  
ciora sunt, & diuturniora, & ad hæc præ-  
cordiorum & capitis dolores. Vlcere autem  
facto & sanato, locum hunc leniorem &  
duriorem fieri necesse est, & minus concipi-  
pere posse. Celsus quoniam de notis tantum,  
quas in singulis morborum generibus habere  
possumus, hic differit, reliquorum quæ Hip-  
pocrates commemorat obliuiscitur, febricula ex  
inguine orta nulla manifesta apparente cau-  
sa, vlcereque in vulua tantum mentionem  
facit.

### Vrina autem crassa.

QUONIAM præcedentibus capitibus,  
multa de urinis quæ huc referri possunt,  
dicta sunt; paucis tantum perstringemus  
quæ hic proponuntur. Urina igitur, ut se-  
cundo Prorrheticon Hippocrates, crassa al-  
bam subsidentiam habens, aut circa articulos  
dolorem aliquem, aut tumorem significat,  
indiciu enim est humoris crassi in corpore  
abundantis: qui si in articulos decumbat,

dolorem tumoremque conciliabit; si circa vis-  
cera, hoc est pulmonem, hepâr, lienem, hy-  
pochondria, intestina (ea enim solet Celsus  
viscera appellare) maiora ac tumentia red-  
duntur, ut docet Hippocrates: Nam quibus,  
ut inquit, circa articulos dolores fiunt, &  
tumores, & sedantur non podagrico modo;  
in his comperies viscera magna & substi-  
dentiam albam. Alio tamen loco idem senex,  
multam albam urinam & crassam absces-  
sum aliqui futurum ad articulos soluturam  
dicit. nam quarto Aphorismorum, Quibus,  
inquit, speratur abscessum futurum ad arti-  
culos, urina multa, crassa & alba facta,  
qualis in laboriosis febribus quibusdam in-  
cipit fieri, liberat: si verò ex naribus fluxe-  
rit sanguis, breui admodum solutio sit. quod  
famulo Amphigenis sexto Epidemion acci-  
disse memorat Hippocrates.

### Eadem viridis aut visce- rum dolorem, &c.

NON iniuria urina viridis viscerum  
dolorem cum periculo corporisq. non integrum  
esse testatur: sit enim talis à commissione  
pinguis colliquati, quod in oleaceum colorem  
mutatum est, à circumueniente febre aut  
calore extraneo.

### At si sanguis.

SANGVIS aut pus in urina, non sem-  
per indicium erit exulcerationum renum aut  
vesicæ, sed nonnunquam etiam (ut secundo  
Prædiction. monet Hippocrates) nihil mali  
significat; idque potissimum, quum circa do-  
lorem aliquem manifestum & febrem ex-  
cernitur. Nonnunquam etiam coniungit pus  
per lotium excerni disrupto abscessu in aliquo  
aliorum locorum; quare Galenus dicit consi-  
derandum (Aphorif. 73. sectionis quartæ)  
an multis diebus, ac mensibus pus aut san-  
guis, vel utraque simul in urina mingan-  
tur: tunc enim exulcerationem renum aut  
vesicæ omni dubio semoto significabunt. Ex-  
ulcerantur enim facile renes aliquæ uri-  
narij meatus à lapidis aspredine: atque ita  
intelligendum voluit Hippocrates Aphorif-  
mum, se sanguinem aut pus mingat, aut re-  
num;



num, aut vesica exulcerationem significat. Nam alioqui (ut recte monet Galenus, aut quicumq. auctor est libri De dignotione passionum quae in renibus sunt) quum urina excernitur cruenta, signum erit commune; quod videlicet, aut apertio vasorum sit, aut ruptio, aut erosio, aut imbecillitas, aut dilatio, aut aliud quicquam, quia ruptionem exquisiti, & confertim egesti sanguinis vacuatio sequitur.

### Si haec crassa.

SENTENTIAM hanc paulo ante, ubi de capillitia ageremus, explicauimus. Galenus autem de locis affectis libro sexto capite tertio, Efficacissima, inquit, exulceratorum renum coniectura est, si cum urina exiguae quaedam caruncula excernantur, vipote quas renum essentiae partes, easq. ob vehementem ulceris erosionem auulsas esse constet. Sic quoque Hippocrates quarto Aphorismorum, unde totam hanc perisodon desumpsit: Quibus in urina crassa existente, caruncula parua, aut veluti capilli una excernunt, iis a renibus excernitur.

### aut si bullat.

BVLLAE à frigido flatuofosq. spiritus sunt: ac proinde quum frigidi omnes morbi longi sint, longitudinem quoq. morbi praesagient, ut recte monet Hippocrates sectione septima Aphorismorum: Quibus in urinis superflant bullae, iis morbum renum, & longum fore significat.

### aut malè olet.

HINC satis constat, quanto studio nifus fuerit Celsus non satis coherentia, ex Hippocrate connectere: siquidem graueolentiam in urina renibus nequaquam acceptam fert Hippocrates, sed vesica potius; idq. quum vesica sit urinae receptaculum, sit ut quae in ea putrescant, grauiorem fetorem praeseferant, quanquam non negem in renum exulceratione, putidam nonnunquam excerni urinam: verum quum rarius id sit, atque ex vesica confertim, magisque graueolens pus emittatur, vesica potius ascribendam

putauimus putidam urinam; idq. Hippocratis quarto Aphorismorum auctoritate: Si sanguinem & pus & squamulas mingat, grauisque odor fuerit, vesica significat exulcerationem.

### & interdum quasi arenam.

HÆC potius ex sexto Epidemion quam Aphorismis transsumpsisse videtur: siquidem illic inquit, In renem dolor grauis, quando cibo replentur, pituitaemque vomunt: quum verò dolores superabundauerint, eruginosa, & leniores sunt, soluantur quum cibo vacuantur, arenulae ruffae subsident, cruentum mingunt, supor eius femoris quod è directo est. in Aphorismis autem vesica potius arenulas ascribit: quod Philotheus idem Hippocratem fecisse suspicatur, quod potius in ea propter capacitatem quam in renibus, generentur. Auctor tamen libri De dignotione affectuum, qui in renibus consistunt, signum proprium, & incommutabile esse dicit, quod sine medio affectum (nempe lapidem in renibus) ostendit, si arena in calice subsidant; tum enim exactè cognosci, quod lapis in renibus subsit. Est tamen discrimen aliquod arenularum, quae à renibus excernuntur, ab iis quae à vesica; siquidem si quae à renibus excernantur arenosa subsidentia, rubicundiores ferè sunt; quae à vesica, albiore. De sanguinolento lorio iam ante dictum est.

### dolent autem coxae, quaeque, &c.

HOC quoque ex iam citato Hippocratis loco desumpsit, stuporem cruris quod è directo est, in coxarum dolorem conueriens. Est autem ea ratio, quod vena & arteria à vena dicta caua, & magna arteria deferantur ad renes; quae rursum ab iis per femora ad crura coxaeque diducuntur: quo fit ut affectis renibus non solum crura, coxa, femoraque, sed & interfemineum totum per consensum coafficiatur.

### & accedunt frequentes.

HIC rursum Cornelius noster nusquam sibi dissimilis, ex Hippocrate pro pituita vomitu,



vomitum, ructus frequentes; & pro arginosa vomitione, biliosam subfinit: quam mirum minime sit ante arginosorum biliosorumve vomitionem frequentes esse ructus, acrimonia bilis vellicato stomachi orificio. Per biliosas autem vomitiones non eas intelligit quæ sincera atque ex mera bile sint, sed quæ arginis aut porri præ se similitudinem ferant: tales enim frequenter per superiora reiciuntur, quoniam in ventriculo potissimum generentur, tum ob inediam, tum ob vigilias corrupto cibo; siquidem & Galenus ipse tum alibi, tum libro De atra bile, porraceam arginosam, & vitelli speciem referentem bilem vocare solitus est.

### extremæque partes frigescent.

AN id proprium signum sit affectorum renum, alius indicet; ego certe, cuius etiam visceri affecto ac dolenti commune putarim, doloris videlicet vehementia calore innato ad interiora, atque adeo partem dolorificam, relictis extremis partibus, repente renum tamen inflammationi, quam aliis quibusvis eiusdem visceris affectibus, familiaris.

### urinæ crebra cupiditas.

ID sanè calculi in renibus indubitatissimum signum est: nam arenule quævis ad excretionem vellicant, obstruunt tamen melius urinarios: unde & urinam quoque circa obturationis principium, paucam, & aquosam excerni contingit; post verò, perfecta iam obstructione, omnino supprimitur: quod in principis quoque accidere frequenter, auctor est Trallianus.

### alvus verò cum multo spiritu.

NON citra difficultatem exoneratur alvus, lapide aut in renibus, aut in vesica contento, quod ex distensione viridum & vesicæ anus comprimatur: atque hinc quoque ante diximus ex Hippocrate, augeri quidem dolores quoties cibo impletur, solutique quæ eodem vacuantur, per cibum, ut docet

Galenus, ciborum excrementum in intestinis contentum intelligens.

### Aut si paulatim destillat.

LOCVS hic paululum immutandus videtur, ita ut in hunc modum legatur: At si paulatim destillat, & si sanguis per hanc editur, & in eo quadam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eisdem aut vesica vitium est. Nam Hippocrates Aphorismorum quarta sectione, Aphorismo octuagesimo; & septima, Aphorismo 39. Si quis, inquit, sanguinem mingat & grumos, & urina stillicidium habeat, dolorque ad anum ventrem, pectinem, & interfemineum incidat, ea quæ circa vesicam sunt, laborant. Neque enim, Galeno auctore, ita intelligendus est hic Aphorismus (sicut Celsus fecisse videtur) ut soli vesicæ congruere dicamus hos casus, sed potius communes esse omnibus quæ vesicæ seruiunt instrumentis, vesicæ, renibus urinariisque meatibus: quod sanè Hippocrates per hæc verba, τὰ περὶ τοῦ κόβου, hoc est ea quæ circa vesicam sunt, voluit: nam sectione quinta Aphorismorum, non solum renibus aut vesicæ affecta, urina stillicidium accidere dicit, sed etiam recto intestino aut utero inflammationem patientibus, idque facultate retentrice vesicæ imbecilliore reddita, tum ex tumore aliquo, tum ex intemperie prædictarum partium.

### Calculosi verò his indiciis, &c.

IAM antè, ubi de renum affectibus disseruimus, singula ferè expendimus: nam de urina stillicidio, idque nonnunquam præter voluntatē, de arenosis subsidentis, de cruento quoque lotio antè dictum est: illud tantum subiungendum est, quod arenosa quæ subsidunt non sunt semper vnius ac eiusdem coloris: alia namque ruffa, alia flava, alia rubra, aut nigra, aut alba sunt; idque tum ob caliditatem remissiore aut intensiore, tum etiam ob materia diversitatem.

Q 2

nonnun-



### nonnunquam aut sanguis aut cruentum.

Dictum ante est, non omnino proprium signum esse calculo laborantium renum, sanguinis mixtum; est enim commune signum (ut ex auctore libri De dignotione affectuum qui in renibus consistunt, retuli) vasorum videlicet apertionis, ruptionis, erosionis, vel dilationis, vel imbecillitatis, vel alterius cuiusque: Apertionis quidem, si paulatim feratur, & sanguis qui emanat cruentam urinam efficiat: imbecillitatis autem vasorum, si quocunque tempore & momento sanguis egeratur: dilationis verò, si una cum sanguine alia quoque crassitudines excernantur. Aquosus autem si promanet sanguis, manifestò certoque indicabit lapidem in renibus consistere. Porro in lithiasi excernitur sanguis aut pus, propter renum, aut vasorum exulcerationem à lapidis erosione. Varios autem hos meiendi habitus, quos hic describit Celsus, ex Coacis Hippocratis prænotionibus mutuatus est.

### Grauitatis quoque cuiusdam in ea parte.

Ex stupore cruris quod à rene secundum lumbum porrigitur, (inquit auctor libri De affect. renum) cognoscere poteris quis ren laboret: nam si dextrum cruris stupor occupabit, dexter ren agrotat; si laevum, sinister. Est verò stupor sentiendi & mouendi in aliqua parte difficultas, quæ in crure fit, quia vena quæ ad inferiora demissa est, triplici ramo dividitur: quorum unus cum arteriis ad testiculos & vasa seminalia vadit; alius renes ingreditur; tertius ad crura porrigitur. Quum igitur in renibus lapis generatur, una tum afficitur vena quæ ad crura descendit; sunt enim amba ab una sobole cana vena quam inferis partibus natura distribuit. Igitur vena quæ ad crura porrigitur, repletur: quæ turgente stringuntur nervus & musculus; quum stringitur nervus, animale spiritum ad crura non transmittit; unde sensu cruris priuatur, & provenit stupor. Hactenus ille: cuius integram periodon hic

ascriptam volui, quod ad loci explanationem plurimum facere putarem. Nam Celsus suo more grauitatis cuiusdam in ea parte sensum, pro stupore cruris quod è directo est, dixit.

### Fœminæ verò oras naturalium, &c.

Id famineo sexui, non secus quam virili, usui venit, quod dum lapis subest, creatur quedam veluti titillatio, naturæque ad eius quod molestat expulsionem stimulat; spiritus statim occurrunt: quibus irruentibus in fistulosam pudendorum partem, ipsam immaniter contendunt: atque hinc antè, nonnullos dum colem extendunt, doloris lenamen aliquod sentire, auctor est Celsus. Mulieres autem viris facilius lapidem vesicæ cernicemurgentem digito sentiunt, propter breuitatem & amplitudinem colli vesicæ.

### At qui spumantem sanguinem.

Hippocrates Aphorismorum sectione quinta, Quicumque spumantem sanguinem excreant, his de pulmone fiteductio: est enim, sicut Galenus docet, sanguis qui à pulmone educitur, spumans & visceri similis: nam & spumante quodam humore pulmo nutritur, qui carne eiusdem continetur, ut Commento 39. sectionis quinta Aphorismorum idem testatur. Caterum Celsus noster τὸ ἀνασφύτως, non expuunt, aut respuunt, verum excreant vertit; ut indicaret omnem eductionem quæ ex pulmone fit, vel cum leuicula tussi, vel cum secretionem fieri.

### Mulieri grauidæ sine modo.

Non solum alui fluxus, sed & omnes immodica vacationes abortum facient. sic Hippocrates Aphorismorum sectione quinta, Mulier, inquit, utero gereus, sanguine misso ex vena abortit; & magis si fœtus maior. & paulo post; Mulieri utero gerenti si alui plurimum profusum, periculum est ne abortiat.



tiar. Necessè est autem si sine modo fusa sit alius, hoc est in vehementibus alui profluentibus, abortus metum subesse, quod cibis, aliisque corporis alimentis, ad iecur reliquaque nutritioni inferuentia instrumenta non distribuuntur; unde consequens est ex alimenti defectu atque penuria, virium quoque imbecillitatem consequi: quarum in gravidis, si usque alibi, summa habenda est ratio. Ceterum quod ad textum attinet, pro elidere partum potest, solet legere malim.

### Eidem si lac ex mammis.

NON modò si lac ex mammis fluat, sed & si eadem præter consuetudinem flaccescant in gravidis, atque attenuentur, fœtus imbecillitatem atque adeò abortus periculum minantur. Nam, ut Hippocrates; Mulieri utero gerenti si mammae graciles repenti fiant, abortit: & si mulieri utero gerenti altera mamma fiat gracilis geminos habenti, alterum abortit. & si quidem dextera mamma gracilis fiat, marem; si sinistra, foeminam; idq; quod ob alimenti penuriam fœtus imbecillior reddatur, atque nonnunquam perimatur. Quæ autem de flore lactis ex mammis dicit, Galenus clarissimè explicat de usu partium libro decimoquarto. Nam contrariis, inquit, affectibus, necessarium est comprehendi mammas; replevi quidem lacte ante tempus in fœtus imbecillitate: ita enim Hippocrates dicebat, Mulieri gravis, ex mammis lac multum fluens, fœtum imbecillum denotat: cen. ad mammas superfluo universo ascendente quod in venis reliquit fœtus, non potens præ imbecillitate, quantum ei ad commodatam nutritionem erat satis, trahere.

### Duræ mammae.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectio quinta, Aphorismo 52. Mulieri gravis si lac ex mammis plurimum effluat, imbecillum esse fœtum significat: si vero solida mamma fuerint, saniores fœtus esse significant, ubi Celsus ἀντὶ τῶν σπέρματος μαστῶν nescio quàm propriè ὀξυπνὸς, hoc est duras

substituit: nam ὀξυπνὸς μαστῶν, hoc est solidas mammas, Galenus mediè quodammodo consistentie inter venientes propter nimiam repletionem; & molles ac laxas propter defectum sanguinis ponit; ὀξυπνὸς autem (quanquam fœtus robur denotent) nunquam citra mali alicuius suspicionem desinere: siquidem quum ob multitudinem sanguinis irruentis durecant, reponit rursum natura ad quasdam partes materiam inutilem: unde gravidas, dolores aut mammarum, aut oculorum, aut coxarum aut genuum infestare solent, auctore Hippocrate.

### Frequens singultus.

HIPPOCRATES Aphor. sect. quinta Aphor. 58. Recto intestino aut utero inflammationem patientibus, renibusque purulentis, urina stillicidium accidit: si vero iecur inflammatione laborat, singultus succedet. Accidit autem singultus hepate inflammationem patiente, propter ventriculi consensum (est enim hepar ventriculo connexum) & nervorum communicationem, non quidem semper; sed quando ad maximam attollitur inflammationem: atque idè alio loco Hippocrates, ex hepatis inflammatione singultum malum pronunciat.

### Si tumores super ulcera.

QUIBUS tumores, inquit Hippocrates Aphorismorum sect. quinta Apho. 65. in ulceribus apparent; & raro conuelluntur, neque insaniunt: si vero repenti evanescent, iis quidem quibus à tergo ulcera fuerint, conuulsiones & distentiones accidunt; quibus vero ex anterioribus partibus ulcera fuerint, mania aut lateris dolor acutus, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubri fuerint tumores. Celsus hic pro dysenteria alui profusionem, quæ antedictis accidentibus tutior sit, substituit, verius forè tormina dicere, vel quod hæc non citra falsi suspicionem tutiora reliquis dici posse putaret; vel quod Hippocratem aliud dysenteria genus (ut rectè etiam monet Galenus) subintellexisse putaret. Siquidem quum tres universim sint dysenteria differentie, non eam quæ propriè



prie sic dicitur (quam auctor noster cum Plinio tormina vocare solet) sed quæ sanguinea vocatur intellexit; regurgitante videlicet sanguine per venas ex rubicundis illis tumoribus ad intestina, atque eo absque aliqua exulceratione, tanquam per crisi vacuato (solent namque in morbis acutis vehementissimi etiam casus crises operari) sic difficultatem intestinorum à furore, bonum esse dicit: & alio loco lienosis dysenteriam superuenientem morbi solutionem polliceri auctor est Hippocrates. Rectè igitur Celsus reliquis tuius symptoma profluvium alii dixit. Ceterum nervorum distentiones (ita enim σπασμους seu convulsiones convertere maluit) & rigores, seu τρέσσοι posterioribus ulceratis, atque evanescentibus tumoribus potius accidunt, quod postica pars nervosa magis sit; materia videlicet ad principalem aliquam nervosarum partium lata. Si autem in anteriori parte id enenerit, lateris dolores acuti, hoc est, vera pleuritis (quæ nihil aliud est, quam membrana costas succingentis inflammatio) & insania accident: est namque anterior pars tum arteriosa, tum venosa; unde & inflammatio-nibus opportunissima est, si sanguis ad principales aliquas partes repat: lateris quidem, si ad thoracem; panniculorum cerebri, si ad caput. Quod autem dicit subito esse defierunt, hoc est, sine manifesta aliqua causa, ut indicet humorum ad alias corporis partes dilationem: solent enim nonnumquam sensim, & paulatim evanescere tumores, nihil alioqui mali ominantes; idque aut medicamento quod discutienti resoluendique potestate præditum sit, resolutis humoribus noxiis; aut alio quovis modo, ut sanguinis excretionem.

#### Si ora venarum, sanguinem solita, &c.

HIPPOCRATES Aphorif. sect. sexta Apho. 12. Diuturnas sananti hæmorrhoides, periculum est: aquam intercutem aut tabem succedere, nisi una servetur: tabem quidem, copia vitiosorum humorum à iecore ad pulmones propulsorum; aquam autem intercu-

tem, sanguinis generatione frustrata, hepate obstructo, ac calore innato suffocato atque extincto ob multitudinem humorum crassorum ac feculentorum retentorum, qui alioqui per hæmorrhoides (ora venarum vocat Celsus) expurgari solebant. Aëtius terrab. 4. Sermo. 2. cap. 5. paulo aliter hunc Aphorismum intellexisse videtur: neque enim requirit, ut post longas hæmorrhoides una reseruetur aperta, sed ut conveniente victus ratione, & opportuna missione sanguinis post omnino suppressas hæmorrhoides regatur patiens. Dicit autem, Conuenit igitur recta diæta, ac vena sectione præmissa hæmorrhoidum extirpationem moliri, & nullam penitus relinquere; quemadmodum quibusdam visum est: possibile est enim, incolumes evadere, optimamque finem curationis assequi post hæmorrhoidum extirpationem, eos qui opportuno tempore vena sectione, & conveniente diæta semper utuntur, quemadmodum Hippocrati placet: inquit enim, Hæmorrhoidas inveteratas sanant, si non adseruetur, periculum est tabem aut hydropem succedere. Non enim, velut quidam opinantur, Si non una fuerit adseruata hæmorrhoidis ad sanguinis excretionem; sed dixit, Si non adseruetur, hoc est, Si non conveniente utatur diæta. Quod autem sic velit Hippocrates, ipsa Aphorismi ostendit distinctio: ait enim, Hæmorrhoidas inveteratas sanant: est autem sanatio liberatio perfecta, & curatio legitima: quare, iuxta Hippocratem, non oportet aliquam hæmorrhoidem relinquere, sed omnes extinguere, & post perfectam ipsarum curationem, per convenientem, velut dictum est, diætam, ad naturalem statum corpus reducere, incidereque cubiti venam tempore opportuno, quo videlicet coaceruatis in corpore sanguis enacnetur. hæc Aëtius. Ceterum interpretatissime rectè fuerit, an ad suam sententiam magis torserit Hippocratem, indicent alij; ego sanè ad subterfugiendum aquæ intercutis & tabis periculum, unam hæmorrhoidem reservare cum conveniente diæta malim, ut feculentus ille sanguis natura duce expurgetur: neque enim frustra Hippocrates



ἀν μὴ μία διαφύλαξις, hoc est, nisi una adseruetur, dicit.

### Eadem tabes subit, si in lateris, &c.

QUICUNQUE, inquit Hippocrates, morbo laterali laborantes, in quatuordecim diebus non purgantur, ij ad suppurationem vertuntur: & qui iam à pleuritide suppurantur, si intra quadraginta dies à quo fit ruptio per superiora purgantur, lenantur: si verò non, in tabem abeunt. & in Coacis Praenotionibus: Quibus in pulmone tubercula sunt, pus educunt ad dies quadraginta post ruptionem: hos verò transgredientes, plerumque tabidi sunt, purulenta videlicet materia in pulmones delata, atque eosdem exedente & exulcerante.

### At si longa tristitia.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione sexta, Si meus & mæstitia longo tempore perdurauerint, melancholiam significant. neque enim mirandum est, ut monet Galenus libro De sympt. caus. quinto, quod atra bilis rationalis animæ arcem occupans, timorem, tristitiam & mortis expectationem inducat, quum videamus in rebus externis, nihil magis quam tenebras nos exterefacere. Si igitur quicquam simile tenebris rationali parti animæ circumfundatur, hominem semper timere necesse est, utpote qui semper timoris causam circumfert: quod enim extrinsecus nobis accidit, quum ambiens nos aer vastissimis tenebris fuerit obscuratus, id melancholicis ab intimo corpore erumpere videtur, occupante cerebrum, vel succo melancholico, vel atra bile: qua ratione Celsus noster vigilias quoque adiecisse videtur.

### Quibus sæpe ex naribus sanguis.

HIPPOCRATES secundo Prædict. Quicumque dum neque febricitant neque decolores sunt, sæpe & verticem & tempora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum in facie, aut graniter lo-

quantur, aut dentes doleant, his sanguinem erupturum per naves expectandum est: quibus verò ex naribus sanguis fluit, hi etsi alioqui sani esse videantur, hos autem, vel splenem in tumorem elatum habere comperies, vel caput dolere; & splendicans quidam ipsis ob oculos versatur. Plerisque verò horum simul & caput & splen hoc modo sese habent. Gingivæ vitiatæ, & ora graueolentia his sunt, quibus splenes magni. Quicumque verò habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neque oris graueolentia; horum tibiæ ulcera prava habent, & cicatrices nigras. hucusque Hippocrates. Sed hic non è quavis nave fluxor sanguinis aut dolorem capitis manifestabit, aut lienis alioqui tumorem: sed si è sinistra tantum nare is fluat, lienis affecti nota erit: ut si è dextera, hepatis. Quare unice considerandum monet Galenus, ex vira nare is fluat, ad loci adfecti cognitionem. Capitis autem dolores, vel ex vira nare fluens sanguis indicabit, idque aut propter plenitudinem osculis vasorum oneratis, aut propter eorundem imbecillitatem, aut acrem aliquam qualitatem eadem corrodentem: unde & quædam imagines ob oculos versantur, fuliginosis nimirum vaporibus à splene ad cerebrum per venas & arterias latis. Magnos autem lienes vocat non scirrhosos, aut ex intemperie humida frigidaque cum laxitate tumentes, (consuevit namque splen si humida admodum intemperie detineatur, adeo excrecere ut hepar & ventrem pertingat) sed ex sanguinis melancholici, qui ad eius nutritionem distribuitur copia, in tumorem citra duriciem, seu sensibilem aliquam magnitudinem distentos: substantia namque splenis laxa est & rara promptissimaque ad suscipiendum crassum humorem; etenim, ut de usu partium quarto Galenus, fecem, ac velut limum sanguinis ex hepate ad se trahit, hoc modo sanguinem repurgans: ex qua feci confecta & attenuata per magnas in ipso arterias & venas, seipsum nutrit. Quod si copia eundem distendi contingat, non raro per naves sanguis effunditur: quod si minus id succe-



id succedat, impuriore illa fece sanguinis (nam subtiliori melancholici humoris portione nutrirī dictum est) ad os & gingivas per communes venas regurgitante, gingivae aut male sunt, aut os graviter olet: ac si ne id quidem contingat, tum tibiārum ulcera maligna, cicatrices nigrae, melancholici humoris vestigia relinquentia, expectanda sunt: de quibus latius in commentariolo nostro De magnis Hippocratis lienibus, ubi ex professo locum hunc exposui.

### Quibus causa doloris.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione secunda Aphor. 6. Quicumque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non sentiunt, iis mens agrotat. Celsus non simpliciter dolentes, ut Hippocrates prior, sed quibus causa doloris est, inquit, intelligens magnam aliquam offensam: atque id Hippocratem quoque intellexisse auctor est Galenus in libro de Hippocratis & Platonis placitis: Nam dolentes, inquit, Hippocrates hic nominat eos, qui aliqua in parte ita offensi sunt vehementer, ut nisi delirio premerentur, dolerent.

### Si in ventrem sanguis.

HIPPOCRATES Aphorif. sect. sexta, Apho. 20. si in ventrem prater naturam sanguis effunditur, necesse est suppurari. Celsus Hippocratem sequutus, ventrem omnem cavitatem appellavit; ut recte tum in commento huius Aphorismi, tum Aphorismo 13. sectionis primae Galenus. & rursus tum idem & ubi religiose admodum (idque prater consuetudinem) in pus vertitur transtulit; neque omnino male: quanquam clarius paulo dixisset, si corrumpitur si ripsisset: nam sanguis qui extra vasa lapsus est, non solum suppuratur, sed & in aliam quamvis prater naturam qualitatem corrumpitur: ita namque idem & ubi Hippocrates (si Galeno commento 17. sectionis secundae Aphorismorum credimus) usurpat.

### Si à coxis & inf.

Hic Celsus mala signa omittens, quid dolores circa lumbos seu coxas incipientes,

ac ad septum transversum, seu superiores partes desinentes portendant, declarat. Nam si mala adsint signa, omnino periculo non vacant: siquidem, ut Prædictionum primo Hippocrates, Quibus circa lumbos tenues dolores diuturni, ad præcordium se revolventes, & ciborum fastidium inducentes una cum febre, his ad caput dolor intentus progressus repente convulsorio modo occidit. Et in Coacis prædictionibus: Quibus in febribus dolores circa lumbos & infernas partes fientes, septum transversum contingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt, tum alias, tum si aliud quoddam signum primum accedat: si verò alia signa non fuerint prava, suppuratum fore timor est.

### Quibus sine febre aliqua ex.

QVOD dum conficitur pus in aliqua parte, dolores intenduntur, auctor est Hippocrates: nam, Dum pus conficitur, inquit, dolores accidunt magis, quam in iam confecto. fit autem dolor exientia simul ac calefacta prater naturam inflammata particula: prurigo autem cum rubore, aut calore, ex quadam quasi ebullitione sanguinis atrii ac biliosi fit.

### Vrina quoque quæ in homine sano parum.

QVAM vocet liquidam urinam, antè dictum est: excernitur autem talis in diuturnis morbis (nam id quoque per parum sanum intellexisse videtur Celsus) ob imbecillitatem virium atque materia peccantis tum crassitiem, tum multitudinem: quam quum natura expellere nititur, absolutam crisin absolvere non potens (ut qua morbi longitudine prostrata sit) à principalioribus partibus ad aures, articulos, aut alias quasvis ignobiliores derivat; atque inibi abscessus facit: ad aures quidem, si supra septum transversum dolores, ac materia contenta fuerit; ad articulos autem, si infra septum: nam, ut Hippocrates in Coacis prædictionibus, Urina cruda multo manens tempore, alius signis



gnis salutaribus, abscessum, & dolorem significat, & magis in partibus sub septo transverso: si vero dolores in lumbis oberarint, ad coxam & in febre, & sine febre.

### Ergo protinus infania.

OMNIS præter consuetudinem subita feroxque mutatio mentem laesam indicat: adeo rectè ab Hippocrate dictum est: Præter morem aliquid facere, velut præponere sibi aliquid, aut expectare sibi aliquid prius non consuetum, aut è contrario, malum est, & mentis alienationi proximum. Rectè ergo infania metum subesse dicit, ubi expeditius solito quis loquitur, garrulique subitò sit; expeditum sermonem vocans eum, qui ab Hippocrate dicitur *αὐτὸς ὁ λόγος*, huiusmodi enim vox ubique mala est: nam interdum vesaniam, interdum etiam cum vehementi furore mortem portendit, ut Hermozugi uxori idem senex contigisse meminuit.

### & hæc ipsa solito audacior.

EX composito modestoque homine ferox responsio, mala est, inquit Hippocrates: & quibus vox acuta est, intro præcordia tracta sunt: Siquidem, ut commento eiusdem sententia auctor est Galenus, cui propria natura composita est, is non solum quia incompositus despicit, perniciosam habere affectionem demonstrat; verum quoque & cum ferocitate respondens propè ad phrenitidem accessit.

### aut ubi rarò quis & vehem.

IN Coacis Prænotionibus, magnus spiritus, & per multum tempus, delirium, aut convulsionem significat. in Præfagiis autem, Spiritus frequens, aut doloris, aut inflammationis supra septum transversum indicium est. Magna respiratio & ex longis intervallis, delirii indicium est. sit enim (ut in Commentariis De dyspnœa auctor est Galenus) spiritus rarus & magnus, propter offensionem mentis, quasi obliuiscite actionem ægro, ut nesciat quando cobitere eam, aut quando ansipicari debeat.

### venasque concitatas habet.

ADDVBITO vehementer rectène hætenus hic locus lectus fuerit; neque enim semper venæ concitate præcordiis duris, & tumentibus insaniam portendunt, nisi & crebrò oculi moueantur. quare frequentes oculorum motus citra disunctionem, cum duris præcordiis, venisque tumentibus coniungendos putàrim; atque sic legendum: ubi rarò quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordiis duris & tumentibus, oculorum quoque frequens motus adest. Nam Hippocrates libro Præfagiorum, talium oculos conspiciendos dicit: dicit enim: Si verò pulsus in præcordiis insit, perturbationem aut delirium significat: verum oculos talium conspici oportet; si enim crebrò obtutus mouetur, expectanda infania est. Et in Coacis Prænotionibus, Pulsus in præcordio cum tumultu, mentem eripi, & magis si oculi moueantur.

### & in capitis dolore offusæ.

IN capitis dolore offunduntur oculis tenebra, tum ob bilis acrimoniam exiccatas humoribus; tum ob eiusdem fuliginosos vapores redditus tanquam puluerulentis oculis. quod sane non solum insaniam portendere, sed & pessimum esse signum auctor est Hippocrates: Nam ex vomitu graui (inquit in Prædictionibus) fastidiosaque, vox clangorosa oculique concretum pulvisculum habentes, vesaniam ostendunt: & paulo post, Hebetatus oculus, vitiatique & concretus, immobilisque & tenebrosus si fuerit, malum.

### vel nullo dolore substante.

PESSIMUM, inquit in Præfagiis Hippocrates, si neque interdum, neque noctu dormiat: quod, ut docet Galenus, qui ex labore aut dolore contenduntur, ij neque interdum, neque noctu dormiunt; atque ij etiam qui delirare incipiunt: nam id quoque insomnium committit ob temperamenti in cerebro siccitatem. quare necessum est, ut ere-

R

pins



pius somnus, nullo substante dolore, vesaniam portendat.

continuataque nocte  
ac die.

RECTE continuatas vigilias dixit: siquidem non omnis statim vigilia insaniam portendit; sed ea tantum qua dies aliquot & noctes ita continuatur; idque tum quod cerebri temperies sicior reddatur, tum sanguis ipse seipso biliosior efficiatur. adeo recte in Aphorismis ab Hippocrate dictum est, In vigilia convulsio, vel desipientia. & in Prædictionibus, Quibus alius liquida, lassitudo, capitis dolor, sitis, vigilia, obscuritas & impotentia fuerit, hi ut mente moveantur spes est.

vel prostratum præter  
consuetudinem.

TALIS enim cubantium habitus absurdus omnino & à ratione alienus est: unde nisi dolor aliquis ventrem infestet, (eligunt namque egri talem decubitus figuram ad doloris lenamen) periculum est errare mentem, ac phrenitim & delirium imminere: sicut recte in Præfagiis Hippocrates: Si quis cubet in ventrem, nequaquam solitus ita dormire quo tempore sanus fuit, malo est; delirium enim aut dolor circa ventris sedes significatur.

item robusto adhuc cor-  
pore insol.

HIPPOCRATES in Coacis Prænotionibus, Dentes collidere ac stridere, quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est; si verò delirans hoc faciat, penitus lethale. Et in Præfagiis: Si quis strideat dentibus, non consuetus à pueritia ita efficeret, insaniam significatur ac mors; sed in virisque futurum prædicere periculum necesse est: si verò mente commotus ita efficiat, admodum exitiosum id est: strident enim dentes musculis masticatoriis & temporalibus convulsorio modo affectis; unde & principem anima sedem affici necesse est.

Si quid etiam abscessit,  
& antequam.

LOCVS hic propter male posita comata, & r. insolita, suspensos admodum diu nos tenuit: ita ut quid veller, aut unde tandem desumpisset, planè ignoravimus: nisi tandem in mentem venisset, aliis planè verbis paulo antè eandem sententiam repetitam: dicit enim, Si tumores super vlcera subito esse desierunt, idque à tergo incidit, vel distentio nervorum, vel rigor timeri potest. At si à priori parte id eueniat, vel lateris acutus dolor, vel insaniam expectanda est. Quare locum hunc paululum mutatis distinctionibus, ita legendum censuero: Si quid etiam abscessit, & antequam suppuraret, manente adhuc corpore in solita febre, subsedit, periculum affert primùm furoris, deinde interitus. Sic enim Hippocratis in Præfagiis sententiam planè expresserit, ubi sic habet: Si abscessus deleatur, ac rursus repetit, nequaquam secreta secretionem, ac febre detinente, difficilis morbus est; periculum enim delirii mortisque imminet.

Auris quoque dolor  
acutus.

CONSEVERVNT antiqui aurium dolorem nominare, auctore Galeno, quoties in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat; tantisper enim ipse afficitur auditorii nominatus meatus, non ex longo intervallo cerebro copulatus: unde factum est, ut Celsus noster sequitur Hippocratem non simpliciter quæmus aurium dolorem, sed eum tantum qui acutus, & cum febre vehementi sit (qualis magna ex parte ardens est, quæ tum ob alias causas, tum ob cerebri inflammationem fit) delirium portendere dicit; sicuti etiam passim Hippocrates, nam in Prædictionibus, Si in ardente febre aurium sonitus cum caligine fuerit, proueneritque in naribus grauitas, mente ex melancholia aberrant. & in Præfagiis: Aurium dolor acutus cum febre continua, ac vehementi,



menti, difficilis est: periculum enim delirii abolitionisque imminet. Quia igitur fallax hoc argumentum est, cito etiam animadvertere omnia alia testimonia à primo die necesse est. Natu iuniores septimo die, aut citius intereunt; natu vero maiores, multo tardius: febris enim ac delirium in eis infestant, & aures in eis ante suppurantur.

### Suffusa quoque sanguine.

GALENUS unum ex iis quæ raro accidunt, in commento Aphor. quarti, sectionis quintæ (Quibuscumque mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat) ac sese nunquam vidisse affirmat; & si quando contingat fieri ob sanguinem tum biliosum, tum feruentem, quem quum mamilla per adenes in lac transmutare non possint, diffunditur per venas in caput ac uniuersum corpus, unde & furoris causam præ se fert.

### Quibus autem longæ.

CAUSAM huius reddit Galenus Aphorismorum quarto, quod propter multitudinem vel crassitiam, aut frigiditatem humorum efficientium febres, in longum tempus morbi extendantur, quum longum tempus exigant ad concoctionem: par igitur esse, & tubercula fieri, & ad articulos superfluitatem decumbere.

### Quorum faucibus in febre.

IN febribus, inquit Hippocrates, spiratio subsistens, aut offendens alidensue, malo est; Conuulsionem enim significat; spirationem subsistentem, vel alidentem vocans, quæ in medio sui interrupta subsistit: significat autem imminere conuulsionem, quod oriatur musculis & nervis thoracem mouentibus calore febrili plus iusto exsiccatis.

### Si angina subito finita est.

ANGINA ob materia crassitiam, & frigiditatem subito resolui non potest. quare necessum est, si subito malum finiat, in pulmonem vitium decumbere: ac tum qui-

dem intra septimum diem agrum suffocari nonnunquam visu venit, quod si minus contingat, ad suppurationem veniat conueniens est. Transsumptus est locus hic ex decimo Aphorismo sectionis quintæ.

### Deinde post alui longam.

PER alui longam resolutionem, Diag-  
gōsac Græcis dictam intelligere videtur: siquidem (ut in septimo Aphorismorum Hippocrates) à diarrhæa dysenteria, hoc est tormina, superueniunt. & paulo antè, A syncera deiectione difficultas intestinorum malum. Subsequuntur autem tormina longam alui resolutionem abasis intestinorum acrimonia.

### Post hæc intestinorum læuitas.

A dysenteria seu difficultate intestinorum læuitas intestinorum seu lieuentia succedit; læsis siquidem intestinis (ut sexto Aphorismorum Galenus) à transitu vitiosorum humorum, & vis eorum laborat, & temperies natui caloris abolatur.

### Post nimias destillationes tabes.

SI destillationes quæ à capite in pulmonem fluunt, acres atque erodentes sint, pulmonem (nisi per sputum excreentur) exulcerant: qui quum in perpetuo motu sit, & non nisi per rictum expurgari possit, difficilem aut nullam admodum admittit curationem; sed sensim extenuato corpore mors subsequitur. quod ex Hippocrate Celsus noscitur voluit.

### Post lateris dolores.

HIPPOCRATES Aphorismorum septimo: A morbo laterali inflammatio pulmonis, & à pulmonis inflammatione phrenitis malum. diximus autem iam ante horum causam.

### Post magnos feruores capitis.

CONVULSIO & distentio, ut monet Hippocrates, aut à repletionem fieri, aut ab inanitione:



anitione: & ea quidem quæ à repletionem, curabilis; quæ verò inanitionem sequitur (qualis potissimum est quæ post magnos feriores corporis, exiccatis nervis fieri consuevit) lethalis magna ex parte est, quare clarius quàm Celsus noster, in Aphorismis Hippocrates locutus est, Ab astibus fortibus conuulsio & dislentio, malum est.

### Vbi caput vulneratum.

NISI quis synecdochicis hic continens pro contento accipiat, nescio quàm appositè Celsus noster in suam sententiam Hippocratis Aphorismum transtulerit: siquidem is non simpliciter in capitis ictu obstupescentiâ, aut desipientiam sequi docet, sed si ex capitis ictu alterutrum superveniat, malum esse. Neque enim quodvis capitis vulnus desipientiam pariet, sed quod cranio præfacto ad cerebrum usque peringat, quo fit ut rectius Hippocrates, ex capitis vulnere malum, quàm Cornelius noster ex capitis vulnere delirium subsequi dixerit.

### Vbi vigilia torfit.

HIPPOCRATES septimo Aphorismorum, In vigilia conuulsio, vel desipientia. Huius si quis ampliorem enarrationem desideret, antedicta consulat.

### Vbi vehementer venæ, &c.

MOTVM venarum super ulcera, pulsus vocat: nam ita quoque septimo Aphorismorum Hippocrates, A vehementi in ulceribus pulsu copiosam sanguinis eruptionem futuram præfagit. siquidem pulsus is vehementis, non in quibusvis ulceribus, sed in tantum quibus phlegmone accedit, excitatur.

### Suppuratio verò pluribus morbo.

LACONICUS admodum, atque abruptè multa Hippocratis verba complectitur; & si sensum spectes, nihil ab eo dissonat, nisi quod dum brevis esse laborat, obscurus fiat: Siquidem Hippocrates Præfagiorum libro primo, Si qua febris, inquit, prorogatur saluè affecto

homine, nec dolore detinente, nec ob inflammationem, aut ob aliquam causam evidentem, expectari oportet abscessum cum tumore, aut dolore, qui in articulos maximèque inferiores decumbat. Talis abscessus magis ac minore tempore evenit natu minoribus tricesimum annum agentibus. Considerandus statim abscessus est, virum vicefimum diem detinens febris transcendat. Natu verò maioribus per febres longiores, minus accidunt. Oportet autem expectari abscessum per febrem continuam, in quartanam verò discessuram, quoties intermittat, prehendantque errabilem modum, atque ita agendo autumno propinquet. Quemadmodum in minoribus natu tricesimum agentibus annum, abscessus consistunt: ita quartana potius annum agentibus quadragesimum, aut etiam senioribus accidunt. Hæc Hippocrates. Videndum hic est cur in febribus longis abscessum periculum potius quàm in aliis subesse dixerit. & ratio in promptu est, quod quum à materia crassitie, & frigidityte protrahantur, necesse est humores, quum lentore suo non facile subsequantur, ad ignobiliores partes propelli, si natura robustior sit, ut in iunioribus fere accidit: quare in iis quoque potius fieri abscessus dicitur: nam aliqui si vires imbecilliores sunt, sicut in senibus esse solent, in corpore vastisq; dum excernuntur, relinquuntur: quo fit ut dum tempus longum flagitent, in senioribus in quartanas abcedant.

### Eadem suppuratio fit, si.

LOCVS hic quum paulo obscurior sit, ac neque citra mendis suspicionem legi videatur, primum Hippocratis verba unde hæc motto sumpsit auctor noster, transcribemas; deinde singula quàm possimus brevissimè expendemus. Dicit autem in Præfagiis, Tumor in præcordiis durus ac dolens, pessimus est si in omnibus fatiget; si verò altera parte infestet, sinistra minori cam periculo est. Talis verò tumor ab initio brevis mortem fore significat: si verò tricesimum transcendat diem & febris detineat, & tumor non desistat, in suppurationem verti contingit.



tingit. Accidit his in prima circumsione sanguinis è naribus fluor, atque admodum inuat. Sed requirendum est num doluerint caput, an hebetudines subeant oculorum: si quid enim horum fuerit, eò tendit. Sanguinis fluorem in iunioribus potius quintum & tricesimum annum agentibus expectare oportet: si verò mollior tumor est, nec dolet, & pressis digitis cedit, diuturniorem efficit indicationem, ac minori cum periculo est: si verò praterat sexagesimum diem, & febris detinet, nec desistit tumor: fore suppurationem hoc in loco, & reliquo ventre, significat. Hucusque Hippocrates, nullam superiorum, aut inferiorum partium mentionem faciens, nisi quòd in molliore tumore, & qui sexagesimum transeat diem, in loco edematoso, & reliquo ventre suppurationem expectandam dicit: in altero verò, nempe duro, cui capitis quoque dolor, & hebetudo oculorum accedant, eò tendere, quasi dicat ad eas partes decumbere humores, ac inibi, nisi sanguinis è naribus fluor fiat, abscessus facere. quod & Celsus voluisse videtur, dum dixit: ac, si inter ipsa ulcera non fluit, circa aures erumpit: ulcera, ni quid me fallat, (quamquam non satis propriè) locum tumidum appellans. quare parua dictionum metathefi ita restituendum censuero hic Celsum nostrum: ut Hippocratem (unde sumpsisse ostendi) referat: Eadem suppuratio fit, si præcordia dura, dolentia, ante vicesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerint, sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera non fit, circa aures erumpit. Aut si præcordia dura tumore mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt, hæretq. omne id tempus febris, sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit. Non negauimus tamen in Coacis Prænotionibus Hippocratem abscessum in supernis par-

tibus timendos dicere, si præcordia molliora, & sine dolore persistant: in infernis autem, si circa eadem inflammatio satiget. verum si sic Celsum nostrum accipiamus, quorsum quæ de auribus dicit, referemus?

### Cumque omnis longus tumor.

RATIONEM huius reddidit Galenus, quòd præcordia ventre calidiora sint: quo fit ut quanto remotior à præcordiis locus fuerit, tanto difficilius suppuretur: quemadmodum de tumoribus quoque qui subter umbilicum sunt, videre licet. hi etenim raro in pus conuertuntur. Sunt autem qui loco tæo magis eò tendit, & is magis se tendat, legendum existimant.

### Si lassitudinis etiam sensus.

IN febribus in quibus lassitudinis sensus est, in articulis & maxillis (inquit quarto Aphorismorum Hippocrates) præcipue abscessus fiunt: & quibuscunque resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, illic abscessus fiunt. Accidit enim, ut nonnumquam humores morbum facientes, quum non satis fuerint expurgati, sed superfluitates quasdam reliquerint, eas ad ignobiliores particulas, quales sunt articuli, derudunt. quo fit ut quum latiora ipsorum spacia promptè se habeant ad eas, & neque possint ad alias corporis partes excrementa propellere, abscessum inibi faciant.

### Interdum quoque vrina cruda.

SENTENTIÆ huius passim meminit Hippocrates: nam in Coacis Prænotionibus, Vrina, inquit, cruda multo tempore manens, aliis signis salutaribus, abscessum & dolorem significat. & magis in partibus sub septo transuerso: si verò dolores in lumbis oberrarint ad coxam, & in febre & sine febre. Et in Prasagiis: Qui tenuem crudamque diutius urinam mingunt, si cætera ut in conualuturis indicia fuerint, in iis abscessum ad inferas præcordiorum sedes expectare



pectare oportet: necesse est enim, ut antecidat morbus (quod ferè sit, si alia etiam signa, urina existente cruda, non secundum rationem se habeant) aut in abscessum terminetur. Dixit autem Celsus Hippocratem sequutus, non simpliciter crudam; sed quæ tenuis quoque sit: nam alibi (ut antè quoque demonstratum est) idem serex urinam crassam, quibus sperabatur ad articulos abscessum futurum, liberare dicit.

### Dolor autem pulmonis.

QUICUNQUE, inquit in Prasagiis Hippocrates, dolor in pulmonis morbo costarumque vitis affligit, non desinens neque secretionis purgatione, neque ventris subductione, neque vena incisione, ac medicamento, ac vitæ ratione, in suppurationem verti sciendum est. Celsus hic pro purgatione, cucurbitulas substituit: quod an studio fecerit, verius medicamentorum purgantium qualitatem, an transcriberetini vitio factum sit, admodum dubito. Nam non sens atque aliquis catharticon interperiem calidam hic damnet; ita alius inflammationi vehementiori, & a materia biliosa oria, non temerè cucurbitulas (præsertim eas quæ cum copiosiora flamma assignuntur, propter excitationis periculum) admisit. sed de iis in subsequentibus latius. Notandum interim hic est nonnullos loco totum vomicas aliquas interdum excitat legere intus excitat: ita ut empyema aut similem aliquam vomicam subintelligere videantur.

### aut circa vicesimum diem, &c.

HIPPOCRATES in Prasagiis: Alia suppurationes ferè rumpuntur in vicesimo die, & tricesimo & quadragesimo, & ad sexagesimum deveniunt. Considerare oportet suppurationes fore, colligentes initium a die quo primum homo febricitavit, quo ve rigor eum prehendit: & si dixerit pro dolore sibi inesse pandus in loco in quo dolor afficiebatur; hæc enim accidunt inter initia suppurationis. Ex hoc igitur tempore, expectare puris fore eruptionem prædictis tem-

poribus oportet. Hæc ille. Rumpuntur autem alia tardius, alia cunctius, tum propter loci situm, tum propter ætates, tum propter humorum qualitates: ut si calidi frigidi, humidi aut siccissimi sint, crassi, lenti, rari, ac fluxiles. Hic etiam monendus lector est, inter se variare exemplaria: alia namque Hippocratem sequentia, ante quadragesimum, tricesimum ponunt.

### Quod suppurat.

SI suppuratio, inquit Hippocrates in Prasagiis, in alterutro latere tantummodo fuerit, vertere atque ediscere convenit in his, virum in altero habeat latere dolorem, & virum quam alterum calidius sit; atque eo in alterum cubante latus, requirere oportet num aliquid de super onus illi pendere videatur: si enim id fuerit, suppuratio in altero latere fatigat. Galenus rationem huius in commento abundè reddit.

### Omnis etiam suppurationis quæ, &c.

VIDES quam multa ordine quodam hoc & sequenti capite auctor noster ex Prasagiorum libro transtulerit; adeo ut totum ferè illum in duo hæc capita redeisse videatur: siquidem præcedenti sententia statim subiungitur: Omnes agnosci purulentos his indicibus convenit. Principio si febris non dimittit, sed interdum tenuior, noctu vehementior est: si copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas est, neque quicquam tamen dignum commentatione expiunt: si oculi cavi redduntur; maxillæ verò ruborem contrahunt, & ungues manuum curvantur, digiti verò, potissimum summi, calefcent; atque in pedibus tumores exsunt: neque cibum appetit, ac pustule circa corpus erumpunt. In Coacis quoque Prænotionibus iisdem ferè verbis eandem sententiam repetit: Qui suppurati, inquit, fiunt, maximeque ex plenitudo ac peripneumonia, eos calores comitantur; interdum tenues; noctu vehementiores: & nihil memoratu dignum expiunt: ac circa collum, & claviculam sudant: & oculi cavi fiunt; maxillæ verò rubent. Digiti summi.



summi deterius caleſcunt, ac aſperantur, ungues curvantur, ac perfrigerantur, & circa pedes tumores habent, & circa corpus puſulas, & abſtinent à cibis. In libro tamen De locis in homine, pedes ea parte magis intumefcere dicit, qua pus continetur: nam paulo ante dictum eſt, in alterutra tantum parte ſuppurari. Celfus noſter hic per omnia Hippocratem reddidit; niſi quòd ſpiritum difficilem (quem paulo poſt Hippocrates ſignum breui futura ſuppuratiſſis dicit) venasque albeſcentes ſub lingua, adiecit: quod ſane cur fecerit, nondum ſatis aſſequor; nam quum gene rubeant propter intemperiem calidam pulmonis, ac continuam tuſim, conſequens quoque eſt, eadem ratione, & venas ſub lingua naturalem ſervare calorem. Niſi forè quis albeſcere venas ideò dicat, quòd deſectis ſpiritibus & humoribus, calor febrilis ſolidas particulas exedat, atque depaſcatur: quod heſticis (de quibus, ut docet Galenus, hoc loco loquitur Hippocrates) familiare admodum eſt.

### Quòd ſi protinus initio dolor.

SVBIUNGIT ea quæ deinceps de ſuppuratiſſis in Preſagiis reliquit Hippocrates; dicit autem: Quæcunque ergo ſuppuratio citius ac tardius ruſpinitur, talibus cognoscatur ſignis oportet. Si dolor inter initia extitit,

& item difficultas ſpirandi, necnon tuſſedo, atque etiam ſcreatio perſeueret, viceſimo die, aut etiam antea expectari eruptionem oportet, ſi verò continentior fuerit dolor, & alia omnia in his fuerint ex ratione, poſtea expectari oportet eruptionem. ſed ſcire neceſſe eſt, & dolorem & ſpirandi difficultatem, & ſcreationem antequam pus excernatur. Celfus hic iterum difficultatis ſpiritus meminit; idq; non temere: neceſſe eſt enim ante ſuppurationem, ſive eruptionem puris, præcedere ſpirandi difficultatem, ſive ea treceſimo, ſive quadrageſimo, aut etiam ante fiat: ut recte, tum loco citato, tum in Coacis Preſcriptionibus monuit Hippocrates.

### Solent etiam in graui morbo, &c.

ET hoc quoque ex Preſagiis tranſiit: nam illic ſcriptum reliquit Hippocrates: Si corpus adeò grane eſt ut ungues quoque & digiti limi ſint, expectanda mors continuo eſt. Si digiti ac pedes omnino nigreſcant, minus peſtiferi ſunt quàm ſi lineant. Sed alia ſigna conſideranda ſunt: ſi enim facile ferre malum appareat, & ali-quod aliud fuerit ſalubre ſignum, morbum verti ſignificat ad abſceſſum; ita ut æger ſit conualiturus; corpori verò nigredo caſura. Indicat namque extinctam iam aut extinctioni proximam, facultatem vitalem.

## CAPVT VIII.

### Quæ nota in quoque morbi genere, vel ſpem, vel pericula oftendant.

SEQVITVR, ut in quoque morbi genere proprias notas explicem, quæ vel ſpem, vel periculum oftendant. Ex ve- VRINA. ſica dolente, ſi purulenta vrina proceſſit, inque ea læue & album ſubſedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, ſi ſputo ipſe leuatur dolor, quamuis id purulentum eſt, tamen æger facile ſpirat, facile excreat, morbum ipſum non difficulter fert, poteſt ei ſecunda valetudo contingere. Neque inter initia



\*federur.  
al. redda-  
tur.

initia terreri conuenit, si protinus sputum mistum est ruffo quodam & sanguine, dummodo statim\* edatur. Laterum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, finiuntur. Si in iocinore vomica est, & ex ea fertur pus purum & album, salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus verò, hæ tolerabiles sunt quæ in exteriorem partem feruntur & acuuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæ leuiiores, quæ contra se cutem non afficiunt, eamque & sine dolore esse, & eiusdem coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoque quacunque parte erumpit, si est læue, album, & vnius coloris, sine vilo metu est, & quo effuso, febris protinus conquieuit, defieruntque vrgeri cibi fastidium, & potionis desiderium: si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumque eiusdem factum pro ruffo purulentum est, periculi minus est.

Sputi indi-  
catio.

At in tabe eius qui saluus futurus est, sputum esse debet album, æquale totum, eiusdemque coloris, sine pituita, eique etiam simile esse oportet, si quid in nares à capite destillat. Longè optimum est febrem omnino non esse: secundum, est tantulum esse, vt neque cibum impediat, neque crebram sitim faciat. Alius in hac valetudine ea tuta est, quæ quotidie coacta, eaque conuenientia his, quæ assumuntur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, maximeque lati pectoris atque setosi est, cuiusque cartilago exigua, & carnosa est. Super tabem si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt, & circa pectus atque scapulas dolor mansit, subitoque sanguis erupit, leuari morbus solet. Nam & tussis minuitur, & sitis atque febriculæ desinunt. Sed iisdem ferè, nisi redit sanguis, vomica erumpit, quæ quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minimè terribilis est, quæ nullo antecedente morbo coepit, deinde quæ longo morbo superuenit. Vtique si firma viscera sunt, si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore corpus est, æqualiterque in extremis partibus macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nulla sitis, si lingua ne per somnum quidem inarescit, si cibi cupiditas est, si venter medicamentis mouetur, si per se excernit mollia, & figurata,

Alui indi-  
catio.



figurata, si extenuatur, si vrina & vini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & \* morbum facile sustinet. Siquidem in quo omnia <sup>\* motum</sup> hæc sunt, is ex toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum verò vitia, vt podagræ, chiragræque, si iuuenes tentarunt, neque callum induxerunt, solui possunt, maximeque torminibus leniuntur, & ex quocunque modo venter fluit. Item morbus comitalis ante pubertatem ortus, non agrè finitur, & in quo ab vna parte corporis venientis accessionis sensus incipit, optimum est à manibus pedibusve initium fieri, deinde à lateribus, pessimum inter hæc à capite. Atque in his quoque ea maximè profunt, quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine <sup>Deiectio sine vlla noxa.</sup> vlla noxa est, quæ sine febre est, si celeriter desinit, si contracto ventre nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur. Acræ tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum febris cæteræque accessiones huius morbi\* absint, ad eò vt etiam grauidæ mulier non solum reseruari possit, sed etiam partum reseruare. <sup>\* adfuit.</sup> Prodestq; in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorum læuitas facilius à teneris ætatibus depellitur, vtique si\* fieri vrina & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas <sup>\* ferri</sup> prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione neruorum. Ex quibus coxa si sine torpore est, si leuiter friget, quamuis magnos dolores habet, tamen & facile & mature sanatur, resolutumque membrum, si nihilominus aliter fieri sanum potest, oris resolutio etiam, aluo cita finitur. Omnisque deiectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atræ bilis solvuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones suppressit vomitus. Mulier sanguinem vomens profusis menstruis liberatur. Quæ menstruis non purgatur, si sanguinem ex naribus fudit, omni periculo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter partum edit, S sternuta-



sternutamento leuatur. Aestiuā quartana fere brevis est. Cui calor & tremor est, saluti delirium est. Lienosis bona tormina sunt. Denique ipsa febris (quod maximè mirum videri potest) sæpe præsidio est. Nam & præcordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit, & in iocinoris dolore succurrit, & neruorum distentionem rigoremque (si postea cœpit) ex toto tollit, & ex difficultate vrinæ morbū tenuioris intestini ortum, si vrinam per calorem mouet, leuat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis prurigine accedunt, sanguinis profusione vel fortuita, vel etiam petita summouentur. Si capitis ac frontis dolores ex vento, vel frigore, aut æstu sunt, grauedine & sternutamentis finiuntur. Febrem autem ardentem (quam Græci \* *χευσιώδη* vocant) subitus horror exoluit. Si in febre aures obtusæ sunt, si sanguis è naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem, quàm biliosa aluus potest. Quibus in fistula

\* *apices* vrinæ vti minuti \* abscessus (quos *φύματα* Græci vocant) esse cœperunt, ijs vbi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cūm pleraque per se proueniant, scire licet inter ea quoque\*, quæ ars adhibet, naturam plurimum posse. Contrà, si caput febre continenti dolet, neque quicquam reddit, malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit, periculosum est. Quantoque magis mistos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil peius est, quàm sincerum id edi, siue rufum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans: nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam (quod aliàs salutare habetur) sternutamentum. Periculosissimumque est, si hæc secuta subita deiectio est. Ferè verò quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueuerunt. Ex iocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pes-



hæ pessimæ sunt quæ intus tendunt, sic vt exteriorem quoque cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maximæ, quæque planissimæ sunt. Quodd si ne rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emissio febris quieuit, aut quamuis quieuerit, tamen repetit: Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est liuidum & pallidum, si nihil æger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabesputum mixtum purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testatur. Si <sup>Vrina</sup> quis etiam in eo morbo diutius traxit, vbi capilli fluunt, vbi vrina quædam araneis similia subsidencia ostendit, atque in his odor foedus est, maximeque vbi post hæc orta deiectio est, protinus moritur. Vtique si tempus autumnus est, quo ferè, qui cætera parte anni traxerunt, resoluuntur. Item pus exspuiffe in hoc morbo, deinde ex toto spuerè desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica, fistulæque oriri, quæ non facile sanescunt, nisi si multa signa bonæ valetudinis subsecuta sunt. Ex reliquis verò minimè facile sanantur virgines, aut hæ mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui verò sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic vt stertat, neque expergiscatur, intra septimum diem pereundum est: magis si eum alius cita non antecefferit. Si palpebræ dormientis non coeunt, si album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit, ad sanitatem rarè perducitur, vti que si contraria his quæ suprà posita sunt subsequuntur, æquè in ea quoque tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumque erupit, & aqua medium corpus impleuit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, quàm qui suprà comprehensi sunt, si attenduntur, sed ferè fiducia secundæ valetudinis opprimuntur. Illud



iure aliquis mirabitur, quomodo quædam simul & affligant nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit, siue in magno abscessu multum puris coijt, simul id omne effudisse æquè mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli verò qui sic dolent, vt super eos ex callo quædam tubercula innata sint, nunquam liberantur: quæque eorum vitia vel in senectute cœperunt, vel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, vt aliquando leniri possunt, sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitialis post annum quintum & vigesimum ortus agrè curatur: multoque acrius is, qui post quadragesimum annum cœpit: aded vt in ea ætate aliquid in natura spei, vix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur, neque antè in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque is ætatis est, vix sanescit. Si verò aut mens læsa est, aut neruorum facta resolutio, medicinæ locus non est. Deiectionibus quoque si febris accessit, si inflammatio iocinoris, aut præcordiorum, aut ventris, si immodica sitis, si longius tempus, si aluus varia, si cum dolore est, etiam mortis periculum subest, maximeque si inter hæc tormina vetera esse cœperunt. Isque morbus maximè pueros absumit vsque ad annum decimum. Cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa conualuit, partum tamen perdit. Quinetiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit, aut intestinorum læuitas. Periculosior est, si frequens deiectio est, si venter omnibus horis & cum somno, & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdum si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum, & præter id etiam læue, & mali odoris sit: si sitis vrget, si post potionem vrina non redditur, quod euenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit, si os exulceratur, si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur, si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus, si & cibi cupiditas non est.



est. Inter quæ cùm euidentis mors sit, multo euidentior est, si iam longum quoque id vitium est, maximeque si etiam in corpore senili est: si verò in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, neruorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato durum fieri lecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inuersa sunt, vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum læuitatem, vix vlla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est, inter septimum diem occidit. Mulier ex partu, si, cum febre, vehementibus etiam & assiduis capitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in ceruices ac scapulas transit, rursusque in caput reuertitur, aut à capite ad ceruices scapulasque peruenit, perniciosus est, nisi vomitum aliquam excitauit, sic ut pus extussiretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite multa prurigo, totòve corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est, vbi torpor atque prurigo peruagantur, modò per totum caput, modò in parte, aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est, eaque ad summam quoque linguam perueniunt. Et cùm in ijsdem abscessibus auxilium sit, eò difficilior sanitas est, quò minùs sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ verò doloribus si vehemens torpor est, frigescitque crus & coxa, aliudque nisi coacta non reddit, idque quod excernitur mucosum est, iamque ætas eius hominis quadagesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimeque annuus, neque finiri poterit, nisi aut vere aut autumnò. Difficilis æquè curatio est, in eadem ætate, vbi humerorum dolor, vel ad manus peruenit, vel ad scapulas tendit, torporemque & dolorem creat, neque bilis vomitu leuatur. Quacunque verò parte corporis membrum aliquod resolutum est, si neque mouetur, & emacrescit, in pristinum habitum non reuertitur, eoque minùs, quo vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omni que resolutioni neruorum ad me-

S 3

dicinam



\* parer,  
\* emarcue-  
runt,

dicinam non idonea tempora sunt, hyems, & autumnus: aliquid sperari potest vere & æstate. Isque morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ \* patet, qui sursum procedit. Mulieri gravidæ, si subito mammæ \* emarcuerunt, abortus periculum est. Quæ neque peperit, neque gravis est, si lac habet, à mensuris defecta est. Quartana æstiva brevis, autumnalis ferè longa est, maximeque quæ coepit hyeme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemque si medicamentis purgatum, & adhuc inanem, nervorum distentio oppressit, aut si in magno dolore extremæ partes frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Aluus nigra, sanguini atro similis, repentina, siue cum febre, siue etiam sine hac, perniciofa est.

## ENARRATIO.

**N**IMIS quàm brevis hic est Celsus nos-  
ter: nā quæ spem promittit, præter ca-  
pituli huius institutum tantum enunciat; quæque  
periculum portendunt, volens omis-  
sisse videtur. quod sanè ei condonandum foret, si ean-  
dem hic quàm in sequentibus methodum ac-  
dicendi rationem servasset: in illis enim stu-  
dio quodam convalescentiæ signa tantum  
enarrat; deinde longo intervallo, ordine sin-  
gula quæ securitatem adimant explicavit.  
Itaque quæ hic de vesica dolente ascripsit,  
sumpsisse videtur ex libro Præsigniorum Hip-  
pocratis: ubi is sic scriptum reliquit: Si ve-  
sica dura est, ac dolore vexatur, difficilis  
omnis ac exitialis est; exitiosissima verò  
quæcumque cum continua febre affligit: qui  
enim ex ipsa vesica affligit dolor, interimere  
hominem potest; & alius in talibus nil nisi  
durum, & pro necessitate excernit. Si verò  
mingitur urina purulenta, candidum ac leue  
obtinens sedimentum, solutio accedit & gro-  
tationis: Si verò neque concedat urina, ne-  
que vesica mollescat, ac febris continua fiat,  
primis circuitionibus morbi aboleri eam qui  
dolore afficitur, expectandum est. Hac for-

mula potissimum attingit pueros à septimo  
ad quatuordecim annum. Hactenus Hip-  
pocrates. Celsus neque ætatis (cuius post-  
modum non semel mentionem facit) neque  
duriciæ cum dolore, neque febris meminit:  
idque ea fortassis ratione ductus, quod quum  
quemcumque vesica dolorem ad hominis  
interfectionem sufficere Hippocrates dixerit;  
is explicandum tantum putet, quæ metum  
detrahant: qualis certè est urina purulenta,  
in qua leue & album subsedit, indicans ni-  
mirum inflammationem nonnihil remisisse,  
ac ad maturationem tendere: quando in  
urina & sedimento ipso, concoctionis quo-  
que indicia appareant.

## In pulmonis morbo.

**I**N omnibus purgationibus tam sponta-  
neis quàm arte factis summè intentus esse  
debet natura minister medicus, si leniter fe-  
rantur, atque circa difficultatem egri fiant;  
ita enim conferunt. Quod & Hippocrates,  
initio Aphorismorum, inculcatum voluit, de  
vomitibus & aliis spontè factis evacuationi-  
bus, & passim aliis locis, de reliquis quæ na-

TMTA



iura duce sunt excrementorum reiectionibus in eandem sententiam pronunciata reliquit. quod considerans auctor noster, in pulmonis morbo facilitatem spiritus atque excreationis, & ex eadem consequutum lenamen aliquod, ad salutem satis esse dicit; idque auctoritate Hippocratis, qui non uno loco in Prasagiis in hanc rem sententias reliquit: Siquidem omnis, inquit, creatio, mala est, quæ non sedat dolorem; quæ verò sedat dolorem, melior est. Et paulo antè: Spiratio nis facilitatem existimari oportet, perquam magnam vim habere ad salutem in omni morbo acuto, qui cum febre infestet, & quadragesimo die indicetur. Et rursum: Sreatio in omni dolore qui affligit circa pulmonem & costas, citò prompteque sreatur necesse est, permixta enim appareat flava bilis admodum sreatione oportet. Neque enim facilis potest esse spiritus, ubi cor, thorax, aut septum transversum dolore aliquo afficiantur: & iterum spiritum quod citò prompteque excreatur, non potest non citra omnem doloris suspicionem excerni; adeo ut dolorem minuat, & metum omnem eximat.

### Neque inter initia terri conuenit.

HIS quæ iam antè ex Hippocrate retulimus, non omnino dissonat quod hic subiungit; siquidem is citam sreationem vocat, quæ statim in morborum initio obitur, ut rectè monet Galenus. Quò respiciens Celsus noster, non solum inter initia, sed & dummodo protinus & statim edatur, dixit, appellantisque mixtum quoddam ex ruffo & sanguine, quod idem senex flauum cum modico sanguine (hoc est sreationem quæ ex sanguine & flava bile mixtis constat) vocauit. Dicit autem in Prasagiis Hippocrates: Sreatio flava non multo permixta sanguine, in pulmonis morbo, si inter initia excernitur, salutaris admodum est; si septimo die pigrius, ue, minus secunda est.

### Laterum dolores suppuratione facta, &c.

LATERALEM morbum vocat quem

Græci πλευρίτιν. hic autem acutus quum sit, decimoquarto die indicari solet. quod se minus accidat, in suppurationem vertitur: ac rursum si qui ex morbo laterali suppurantur, ut quinto Aphorismorum Hippocrates, si in quadraginta diebus purgantur à qua fit ruptio, liberantur: si verò non, ad tabem transeunt: nisi enim per spiritum purulenta materia exscreetur, sensim pulmonem ipsum coarctat, atque excedit: siquidem pulmo quum rarus, & laxus sit, facillimè à purridis noxiisque humoribus exulceratur atque eroditur, unde tabem consequi necessum est.

### Si in iecore vomica est.

QUI iecore suppurato, ut septimo Aphorismorum Hippocrates, vruntur, aut secantur, si quidem pus purum effluxerit veluti amurca est, intereunt: significat enim hoc alteratricem facultatem imbecillam esse, & corruptionem usque ad iecoris substantiam peruenisse. Purum autem albumque pus, ut rectè monet Philotheus, alteratricis virtutis robur indicat, & inflammationem extra iecur (nempe eius membranam quam peritonæum vocant) peruenisse.

### Ex suppurationibus verò.

SUPPURATIO, inquit in Prasagiis Hippocrates, ita consideranda est: quæ enim foras vertitur, optima est, si parua est, maximeque egreditur, & in sublime affurgit: si verò magna est & lata, minimeque in mucronem suæ gibbi subducitur, pessima est. Consentaneum est, ut docet Galenus, quod quæ natura studeat interdiu purulentam materiam, per idoneos quosdam meatus, cum aqueductus expellere: suppurationem eam & leniorem & indulgentiorem esse, quæ foras non intro tendit, atque ex his ipsis quæ non ampliorem sedem prehendant in latitudinem extenta, sed in gibbi formulam acutatur, atque in sublime feratur: id enim robur foras expellentiæ facultatis indicat.

### Et ex his quæ intus procedunt, hæc leuiorès.

QUAMVIS hæc sententia ab Hippo-  
crate



erat his verbis statim subiungatur. Quæ  
verò intro rumpatur, optima est, si cum  
exteriore sede nihil communicat, sed con-  
tacta est, nec dolet, & omnis exterior locus  
unicolor apparet. Tamen fuerint quæ ha-  
tenuis me suspensum habuerint; ita ut di-  
minandum hic potius mihi fuerit, quam certi  
aliquid pronunciandū, cū quid per rō con-  
tra se cutem non afficiant, nisi Oedipus  
quispiam recte non coniecerit: Nam quan-  
tumvis hic mendum subesse suspicemur, ta-  
men quid pro substitutis restituendum sit,  
nondum satis assequimur: quare ut amicam  
aliquam interpretationem comminisceremur  
erat necesse: Ita ut id Celsum voluisse di-  
camus per suppurationem quæ contra se-  
cutum non afficit, quod Hippocrates per  
eam quæ cum exteriori sede nihil commune  
habet: ita videlicet ut exteriora, & interiora  
contraria dicamus, atque ita si intellexerim-  
us, sententiam paulo planiorem, quam  
Hippocrates, reliquerit. Neque enim sup-  
puratio ea optima est, quæ cum exteriore  
sede nihil communicat: sed quum bona sit, de-  
terior tamē est, quam quæ foras rumpitur.  
quare appositè admodum leniores huiusmodi  
suppurationes vocavit Celsus.

#### Pus quoque quacunque parte erumpit.

HIPPOCRATES in Prasagiis, Pus opti-  
mum est si candidum, æquale lenegue, &  
quamminimè fœtidum est: maxime con-  
trarium huic, deterrimum est. Et paulo post:  
Ex purulentis ii potissimum supersunt, quos  
febris eodem dimiserit die, ac cibum cuius  
appetunt. nam quum pus omne ex sanguine  
qui feminalem habeat transmutationem, ori-  
um habeat, optimum erit quod semini pro-  
lisco quam simillimum erit, hoc est, quod  
lenè, album & æquale: & quamminimè  
graneolens sit, & quo emissio febris desinam;  
consumpta videlicet materia & ignea cali-  
ditate, quæ sanguini ebullienti (unde pus  
generari diximus) inerat.

#### si quando etiam suppuratio.

HIPPOCRATES in Prasagiis: Abscessus

si in cruribus erumpit in pulmonia vehe-  
menti, ac periculosa omnis utilis est: opti-  
mus verò si per screationis mutationem iam  
existat, & screation pro flana, purulenta ex-  
istat, ac foras excernatur; ita securissimè su-  
pererit homo, ac ita abscessus ocyssimè circa  
dolorem desisset. At si screation non rectè  
excernatur, nec vrina videatur habere bo-  
num sedimentum, periculum claudicatis in  
articulo, vel multum negotij imminet. At-  
que id quidem mirum minimè cuiquam vi-  
deri debet, quum idem senex Epidemion se-  
cundo inter bonos abscessus securissimos di-  
cat, si deorsum & quàm longissimè ab agro-  
tatione absistant; atque id potissimum si cum  
concoctionis signis statim erumpunt: Conco-  
ctio enim celerem indicationem, & securam  
sanitatem promittit: quod Cornelius nosler  
voluit dum dicit, sputumque eiusdem  
factum pro ruffo purulentum.

#### At in tabe eius qui sal- uus, &c.

HIPPOCRATES secundo Prædictio-  
num: De tabescentibus, quod ad spiritum, ac  
tussim attinet, eadem dico quæ de pectore  
suppuratis scripsi. Oportet enim eum qui  
prole liberari vult, facile spiritum per tussim  
deicere, & id esse album & æquale, &  
eiusdem coloris, & ab inflammatione alie-  
num. Quod verò a capite desinit, ad naves  
converti, febrem autem non innadere, ut, ne  
a canis prohibeatur, neque suat, venter  
autem egerat quotidie, & id quod egerat sit  
durum, copia pro ingestorum ciborum ra-  
tione. Hominem verò, quamminimè lenem  
esse oportet, quadrangulum & hirsutum, &  
os ipsius parvum sit, robuste carnosum: qui-  
cunque enim hæc omnia habuerit, superstes  
erit. Celsus omnia hæc fidelissimè reddidit,  
nisi quod inflammationis non meminit, quod  
eam sub febre comprehendisse satis putavit,  
& quod de desinzu qui a capite in subiectas  
partes sit, non satis pronuntiatum reliquerit;  
siquidem Hippocrates necesse esse dicit, ut si  
quid a capite desinat, per naves id expurgetur:  
nam aliqui si in fauces aut pulmonem  
decumberet, non citra summum periculum  
id fieret.



id fieret: quod Celsus noster non videtur animadvertisse, dum si quid à capite destillat, album aequaleque ut sit, opus esse dicit; quasi dicat distillationes, non solum quæ à capite in nares, sed etiam quæ in fauces fiunt, tabidos liberare, dummodo similes sint bonæ per spiritum excretioni. quare hic quoque legere malim eique etiam simile esse oportet siquid à capite destillat, idque in nares fluat.

### Super tabem si mulieri quoque supp.

Hic dum breuitati nimis studeat, obscurus admodum est, neque satis Hippocratis sententiam reddidit: siquidem is paulo post iam citatum locum, in hunc modum scripsit: Ceterum ex aliis minus superstitres manent, & virgines & mulieres quibus ex suppressis mensibus tabes oborta est. Si vero aliqua virgo, aut mulier enasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide ac pure apparere, aut nulla spes est. Qui vero ex sanguinis eruptione pectore suppurati fiunt, & viri & mulieres & virgines non minus euadunt, verum sanis omnibus tum suppuratorum, tum tabescentium collectis, & superstitum futurum, & perituum prædicere oportet. Maxime vero euadunt ex sanguinis eruptione hi quibus dolores sunt atrabilarij, & in dorso, & in pectore, & qui post eruptionem minus dolent: nam & tusses non valde insuper accedunt, & febres pleraque persuerant sitim facile ferentes. At reuersiones eruptionis sanguinis maxime fiunt his, si non abscessus succedunt, optimi sunt abscessus sanguinolentissimi. Celsus dum vltima primis connectit, tabem quæ ex menstruum defectu, cum ea quæ ex sanguinis eruptione fit, ac muliebrem cum virili affectu confundit; idque quam rectè, penes alios in dicium esto.

### Aqua autem inter cutem.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum, Eum qui ab hydropse, sine aqua inter cutem correptus est, & superstes esse volet,

bonis visceribus esse oportet; ita ut natura sese exerat, simulque facile concoquat, & bene spiret, sique sine dolore, & totum corpus equaliter tepidum habeat, & non circa extremas partes colligatum. Melius est autem ut tumores potius habeat in extremis partibus: Optimum vero est neutrum horum habere; nam molles ac graciles esse conuenit extremas partes, itemque ventrem ad contactum mollem. Tussim vero non adesse oportet, neque sitim neque linguam resiccari, tum reliquo tempore, tum post somnum, quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere oportet, & ubi multum satietis comedit, non affligi. Alium vero ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem tempore egerere recrementum molle efformatum. Urinam autem apparere conuenit, pro studiorum ratione & vinorum mutatione transeuntem. Laborem vero ferre oportet facile, & lassitudinis exortem esse: ac optimum quidem est, hominem per omnia ita dispositum esse. & sic securissimè sanus quidem fieri poterit, si minis, plurima ex his habeat, nam spes erit ut superstes euadat. Quæ quum Celsus breuiter & dilucidè reddiderit, non est quod diutius immoremur. Nam quod dicit lenissimam eam esse aquam intercutem quæ nulli præsertim acuto morbo subit, ex subsequentibus clarè euadet.

### Articulorum verò vitia.

DE podagricis, inquit in Prædictionibus Hippocrates, hæc dico: Quicumque aut senes sunt, aut circa articulos callos rosaceos concretos habent, aut arummosè vident, aut siccam aluum habent, hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quantum ego noui. Sanant quidem hos optimè dysenteria, si successerint; sed & aliæ eliquationes valde profunt, si ad inferiores locos repunt. Qui verò iuuenis est, & circa articulos rosaceos callos concretos nondum habet, & accuratè vinit, & laboris amans est, & aluum bonam habet studiorum ratione, hic sanè medicum intelligentiam habentem auctus, sanus fieri poterit. Celsus neque victus rationis, neque exercitij laborisne, quæ tum ad discutiendos

T



disentiendos hosce callos, tum precauendos non parum momenti habent, ne meminit quidem, sed torminibus aut alio quouis ventris fluxu articularum dolores leniri dixit, materia videlicet peccante ad alium locum delata: quanquam podagricis tormina fluxu alius frustra supernenerit, si improba victus ratione immoderatoque exercitio utatur aeger.

### Item morbus comitialis.

MORBUS comitialis qui ante pubertatem ortus est, facilis solutus est, idque variis modis: nam, ut sectione secunda Aphorismorum ait Hippocrates, Pueros qui comitiali morbo laborant, mutationes potissimum ætatis, victus, & locorum liberant. & primo Morborum vulgarium: Puerorum morbi comitiales una cum pubertate mutationes habent. & alias: Siquidem qui facer morbus à frigida lentaque potissimum causa originem trahat, mirum minimè videri debeat, si quum huiusmodi materia fons sit victus intemperantia, huius mutatione ad meliorem statum redacta, sensim materiam resoluat, atque à morbo liberari: quod etiam accidit mutationibus ætatis puerilis in iuuentutem, quæ calida & sicca est; & locorum frigidorum in siccos.

### & in quo ab vna parte corporis.

QUANQVAM in sacro morbo affectus locus sit cerebrum eiusdemque ventriculi, contingit tamen interdum primario; sapenumerò etiam per consensum ipsa affici: sicuti puero cuidam, libro De locis affectis, accidisse meminit Galenus: qui quum ceu lentè quandam auram à genu sensim superiora petentem sentiret, tandem in comitalem incidit: Non parum igitur discrimen est primario-ne ac per se, an per accidens afficiatur cerebrum; nam quanto nobilior est membrum à quo mali origo serpit, tanto etiam maius periculum conuehere solet. Quod ex Hippocrate hic ostensum voluit Celsus: siquidem in libro Prædictionum, Comitiales, inquit, morbi si à capite initium capere videntur,

aut à latere, aut à manu, aut à pede, facilius curantur: verum differunt etiam hæc morbi genera. Qui enim à capite initium sumunt, ex his gravissimi sunt: deinde qui à latere: qui autem à manibus & pedibus, maximè sanari possunt. Ceterum curam agredi oportet medicum, qui medendi modum novit, si homines fuerint imenes & laboris amantes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis stupore aliquo attonito sideratus fuerit: nam hæc irascibilia mentis amotiones non sunt conducibiles. Alij verò qui ad infernas partes conuertuntur abscessus, boni sunt; longè verò optimi hi sunt qui sanguinolentissimi. Celsus pro abscessibus non omnino malè deiectiones substituit: æque enim materia peccans à loco affecto per purgationem educitur, ac per abscessus.

### Ipsa autem deiectio.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum, Alui profluvia quæ sine febre sunt, & brevi tempore durant, & mitia existunt: aut enim eluta sedabuntur, aut spontè. Prædicere autem oportet excretionem subito erumpentem desitutam esse, quum tangenti ventrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis stans penetrarit.

### Actria tormina quidem periculosa.

SECUNDO Prædictionum Hippocrates: At quæ dysenterie commode sunt, hæc mala non inducunt; verum sanguine & ramentis egestis deserunt septimo die, aut decimo-quarto, aut vigesimo, aut quadragesimo, aut intra hæc tempora. Huiusmodi enim egestionis etiam eos qui prius sunt in corporibus morbi sanant; antiquiores quidem diutius tempore, recentiores autem in paucis diebus removere possunt. Nam & quæ ventrem gestant, & ipsæ etiam enadunt superstitres, ad partum, & ex partu, & sætus conseruant, sanguine & ramentis egestis. etiam per multos menses, nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signum. Hactenus Hippocrates, senilis ætatis (quam summè in hoc morbo prodesse auctor noster docet)



docet) nullam faciens mentionem : quod tamen non cura rationem fecisse videtur ; siquidem si (ut paulo antè inquit idem senex) ex dysenteria maxime moriuntur pueri quinquennales, & seniores adhuc decennes, reliqueque etates minus, non parum momenti attulerit in dysenteria ad sanitatis recuperationem senilis etas.

### Contrà intestinorum leuitas.

LIENTERIA seu intestinorum leuitas grauiſſimus morbus est ſenioribus, ut ſecundo Prædictionum inquit Hippocrates. vehemens etiam viris. reliquis autem etatibus minus. Quisquis autem neque in etatibus his est, quas malè tractari ab hoc morbo dixi, & pauiſſima ex ſignis habet quæ mala ſcripſi, hic ſecuriſſimè depoſitus eſt. Indiget autem euacuatione hic morbus, donec urina pro ratione eius quod acceptum eſt procedat, & corpus ab ingeſtis cibis augmentum capiat, & à malis coloribus liberatum fuerit. Celsus neque euacuationis neque mutationis coloris ad meliorem ſtatum ullam facit mentionem, quod perfectam nutritionem corporis, etiam color bonus ſubſequi ſoleat; ſicuti imperfectam deprauatus, quemadmodum in atrophis videre licet. Pueri autem non oſque adeo ſuſpecta eſt intestinorum leuitas, quanquam ob nimiam voracitatem frequentius in eam incidere ſoleant, quod videlicet calore innato plurimum vigeant, qui euacuata materia peccante facile ad priſtinum habitum naturam reduxerit. Dysenteria contrà eiſdem perniciosa eſt, quod ob caloris copiam, & humoris redundantiã, non ſolum leuamen aliquod non conſequantur, ſed multo maius periculum hinc imminet.

### Eadem ætas prodeſt, &c.

COXENDICVM morbus à quadrageſimo anno uſque ad ſexageſimum maxime affligit : atque de eo ita conſiderationem facere oportet, inquit Hippocrates : Nam iuuenibus non minus quidem doloris inducit, quam ſenibus coxendicum morbus ; verum breuior eſt : nam quadrageſimo die liberan-

tur ; ſed neque torpores vehementes accedunt, neque perfrigerationes crurum ac lumborum. Quilus autem hic morbus eſt quidem in lumbis ac cruribus, non autem affligit adeo ut decumbat, conſiderare oportet an alicubi ſint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur ; ſi enim ambo hæc habet, diuturnior ſit morbus. Interrogandum etiam eſt, an in femore torpores inſint, & ad poplitem progrediatur : & hoc ſi conſiteantur, rurſum interrogandum an & per tibiã ad ſummum pedem procedant. Quicumque enim pleraque horum conſeſſi fuerint, his dicendum eſt quod crura iſſis aliquando calida, aliquando frigida ſint. Quod ſi morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes vertatur, eos conſidentes eſſe iube. Celsus præterquam quod omnia exactè ſatis reddidit, non citra rationem nervorum reſolutiones adiecit : nam quum affectus hic conſtet à multis craſſis iſſque viſcidis humoribus, nervos per quos motus voluntarij obeuntur obſurantibus, calore inueniuntur optime diſſoluantur.

### reſolutumque membrum.

QVOD alii deiectione reſoluta omnia membra qualia tandem ſint, ſi medicas aliqui admittant manus, inueniuntur, ex antedictis ſatis manifeſtum eſt. Nam quum ex multitudine humorum fiat reſolutio, ſubueniet ſtatim eorundem purgatio, aut ſpontè proneniens, aut medicamento purgante irritata : quod voluiſſe videtur Hippocrates dum ait : At verò in facie diſtorſiones, ſi nulli alij corporis parti communicent, citò ſedantur, aut ſua ſpontè, aut ad neceſſitatem coactæ : Coactas vocans eas, quæ aut natura duce aut arte expurgatis humoribus peccantibus in iſtam debitamque formam redigantur. Quod & alluſiſſe Celſum veriſimile eſt : illi ſiquidem nonnum handquaquam eſt, dum ſub umbra Hippocratis deſiſcit, ſua ſtudioſius inſerere.

### Omniſque deiectione lip- pienti prodeſt.

LIPPIENTEM alii proſuſio corripit bonum eſt

T 2



num est, ut sexto Aphorismorum Hippocrates; quod videlicet biliosis humoribus sanguini mixtis, qui sepe inflammationis oculorum causa est, ad inferiora delabitur, ac per alium expurgatur.

#### Aut varix ortus.

HIPPOCRATES sectione sexta Aphorismorum, Aphorismo XI. Melancholicis & remum malis affectis, hemorrhoides succedentes bonum sunt. & XXI. eiusdem sectionis: Insanientibus si varices, aut hemorrhoides superuenerint, melancholia solutio fit: Insanientes vocans illos, ut docet Galenus, quos Graeci proprie *μαλακχολους* vocant; non illos qui ex bile in furorem rapiuntur. Ac quod in his hemorrhoides aequè ac varices solutionem morbi polliceantur (sunt enim varices quum in femoribus & cruribus, ex humore melancholico vena latiores sunt) perspicuum cuius est; quum per has humor peccans & purgeitur. & in aliam partem decumbat. Atque hac etiam ratione insanientibus superuenientia tormina auctor noster prodesse dicit: de quibus etiam septimo Aphorismorum ita scriptum reliquit Hippocrates, A furore difficultas intestinorum, vel aqua inter cutem vel mentis alienatio, bonum.

#### Humerorum dolores qui ad scapulas.

HIPPOCRATES in Prædictionibus, Dolores in humeris fientes, qui quidem ad manus descendunt, torporem ac dolores inducunt; his abscessus non succedunt, verum nigram bilem vomentes sanantur; qui verò isthic in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediuntur, eos puris aut atra bilis vomitu effugiunt. Verum de his ita considerationem facere oportet; si quidem enim facile spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos vomituros spes est: si verò difficilius spirauerint, & in faciem ipsi color incipit qui prius non erat, sine rubicundus, sine niger, eos magis puri spirituros esse sperandum est. Ad hæc verò etiam considerandum est, an in pedibus tumores sint:

nam & hoc signum in his consensit. Atque hic mortuus viris vehementissimus esse solet à quadragésimo anno ad sexagesimum. Celsius neque expuitionis puris, neque aliorum signorum quæ consideranda monet Hippocrates, mentionem ullam facit; idq; fortassis ideo, quod quum illi antea sermo fuisset de iis quæ atra bilis expurgatione soluantur, de illis etiam quæ eiusdem vomitu curantur, dicendum putaret: quanquam melius fuisset (ut Hippocrates fecit) singulas ad amissum notas explicuisse; nam dum subiungit: Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est, id ex abrupto quodammodo fecisse videtur: siquidem quum iam antea frequentius id ab eo inculcatum sit, frustra hic (ubi, si usquam alibi, nimisquam breuitati studuit) eandem cantilenam, cuculi in morem, sæpius cecinerit. Quare dum de iis qui sursum tendunt doloribus loquitur, referendum ad antedicta arbitror; ita ut humerorum dolores qui ad scapulas vel manus tendunt, sanabiliores sint si deorsum vergant.

#### Singultus sternutamento finitur.

SINGULTVS, sicuti etiam conuulsio, ex inanitione aequè fit ac repletione; & qui ex inanitione fit, aut incurabilis est, aut curatu admodum difficilis: qui autem à repletione fit, sternutamento potissimum soluitur; nam sternutando non solum cerebrum, sed & ventriculus ob nervos qui à cerebro ad stomachum derivantur, vehementer concutitur: quo fit ut violento hoc motu agitati humores peccantes euacuentur. auctor est huius sententia Aphorismorum sectione sexta Hippocrates: Singultienti si superueniant sternutamenta, tollunt singultum.

#### Longas deiectiones superprimit vomitus.

LONGAS deiectiones vocat eas quas Graeci *διαγέρας*: atque quod his spontè superueniens vomitus salutaris sit, atque ab alii profusio liberet; auctor est Hippocrates sectionis sextæ Aphorismorum Aphorismo XV. idq; non



idq; non tantum quod materiam peccantem alio renellat; sed etiam quod indicet naturam sibi constare, atque ad sese iam redire, atque adeo retentricum intestinorum virtutem qua hactenus debilis fuerat, roborari.

### Mulier sanguinem vomens.

MULIERI sanguinem vomenti (inquit XXXII. Aphorismorum sectionis quinta Hippocrates) si menstrua eruperint, mali solutio fit; idq; auersione ad contraria loca facta: quare passim monet Galenus, ut naturam ducem sequentes, mulieres hac passione laborantes, misso ex vena sanguine curemus. vide librum De sang. missione.

### Quæ menstruis non purgatur.

NATURA ita constitutum est mulieribus, ut statis temporibus singulis mensibus sanguine quodam impuro ac quodammodo saculento purgentur: quod si quando minus fiat quam pro consuetudine solebat, variis affectibus ob impuri sanguinis fuliginem, principem animæ sedem atque adeo uniuersum corpus ledi contingit: quare quum natura de possibilibus, ut ait Philosophus, id quod melius est operetur, ac per debitos & a natura constitutos meatus abundantes illum sanguinem expurgare non possit, per alia maxime conuenientia loca, id efficere conatur, atque huic quidem negotio opportunissime se habent nares; post has hemorrhoides: nonnunquam etiam quoties neutrum horum satis succedit, impuro illo sanguine, per vomitum sese exonerat: & quod magis mireris: Nonnus Farnis municipio Flandriae Occidua, anno 1548. mulierem: cui quum forte fortuna elusus dens esset, mensisque subito præter consuetudinem suppresseretur, illinc tanquam ex gurgite quodam multis repetitis vicibus, (atque id eo potissimum tempore, quo menstrua purgatione exonerari solebat) sanguis copiosissimus effluxit, cui quum primis diebus nequiquam operam nostram impenderemus, indicauimus, ut postmodum euentus docuit, huiusmodi fluxum

purgationem criticam esse, atque quam minime irritandum: quare quum consideramus, quem esset habiturus finem sanguinis hic fluxor, percepimus singulis mensibus reperere, idq; certis non solum diebus, sed & horis, finiri pro menstrua purgationis ratione. Atque hoc quidem quoniam quam maxime a natura alienum esse (nisi ipse præsens animaduertissem & vidissem) putauit, asseribendum ratus sum; idq; potissimum quod locus iste hoc quoque efflagitare videtur: nam & Galenus in Commento Aphorismi XXXII. sectionis quinta, Hippocratem quanquam dicat sanguinis e naribus fluxorem bonum deficientibus mensibus (sicuti etiam hoc loco auctor noster) non tamen negare quin alia quæ natura finit duce purgationes, aut reiectiones profutur.

### Quæ locis laborat.

LOCOS non vocat eas quas secundas Latini, Græci *ῥεῖον* appellant (quanquam & iis a partu retentis, non inconueniens sit sterminatio) sed vterum: nam, ut Plinius libro XI. cap. XXXVII. Feminis, inquit, eadem omnia, præterque vesicæ iunctus, utriculus, unde dictus vterus: quod alio nomine Locos appellant, hoc in reliquis animalibus vuluam. Atque ita quidem Hippocratem retulerit Celsus, qui sectione quinta Aphorismorum Aphorismo XXXV. ita scripsit: Mulieri quæ vterinis molestat, aut difficulter parit, sterminatio bonum: Per locos laborantes vterinam affectionem intelligens, ut docet Galenus eam quæ strangulationem ab utero nominant. Indicat autem sterminamentum virium robur: & quemadmodum paulo antè diximus, quæ fixius corpori adhaerebat, vehementiore cocussione excernuntur.

### Æstiuæ quartana fere breuis est.

ÆSTIVÆ quartana, ut secundo Aphorismorum Hippocrates, magna ex parte breues sunt; autumnales vero longæ, maxime quæ hiemem attingunt, quod videlicet, ut auctor est Galenus, æstare fere breues morbi accidunt, calore nimium ambientis aeris redundantes



dundantes humores per uniuersum corpus diffundente, ac meatibus corporis (quos πύλες Græci nominant) patefactis, quam ocysimè discutiente. Autumnales uero longiores sunt, quod æstatis calore vires imbecilliores sunt factæ, neque ad expellendos humores noxios satis habiles, tum quod humores in uniuersum corpus non ferantur, tum quod ob autumnalis aeris inæqualitatem, ac ad frigoris proclinitatem, pori obstrui incipiant. Hieme uero longissima sunt quartana, tum ob meatuum conspationem, tum ob humorum cruditatem.

### Cui calor & tremor est, salutis delirium est.

QVAM sit hæc sententia uero consona, ego dubito: siquidem est Hippocrates Aphor. sect. sexta Aphor. XXVI. Ορόσσιος οὖ τοῖσι καύσσιος τῶμοι γίνονται, καὶ ἐκ τῆς χόλης, hoc est, Quibus in ardentibus febribus tremores sunt, iis delirium succedit, aut delirio solvuntur: non dixit tamen senex ille, delirium illis salutis esse; sed ex ardenti febre subsequi delirium: quod cerè ut non minus periculi, quam ardens febris secum affert, ita non possit quisquam rectè dicere, delirium ardenti febre superueniens salutis esse. Neque enim mirum est Celsum hic lapsum esse, quum τὸ χόλεϊν, amplam illi occasionem præbuerit: siquidem quum Hippocrates hæc dictione non raro omnimodam morbi solutionem intelligere soleat, nonnunquam etiam (ut rectè Galenus monet) morbi in aliam affectionem transmutationem, ut hoc quoque loco fecit: Celsus maiorem rationem habens humoris noxii qui ab una parte in aliam feratur, quam partis affectu, quando delirio corripuntur homines, τὸ χόλεϊν, tanquam salutiferum interpretatus est; quum potius Hippocrates tremores seu τῶμοις signum quodammodo instantis delirii posuerit, materia uidelicet peccante quæ in febribus ardentibus intra uasa continetur, ad nervos translata: quo fit ut quum nervosum genus affectum sit, lenissima quaque de causa, nervorum principium (quod omnes uno ore crebrum esse færentur) coafficiatur; idq; potius

sumum, quod sua leuitate vel subtilitate bilis facillimo superiora petat, unde & in ardentibus febribus, si tremores superueniant, deliria comitari consueverunt.

### Lienosis bona tormina sunt.

GENERALIUS nonnihil quam Hippocrates Celsus de torminibus quæ superueniunt lienosis, pronuntiatum reliquit: siquidem ille dysenteriam longam lienosis superuenientem suspectam adeo habuit, ut & mortis periculum portendere crederet. Dicit enim Aphorismorum sectione sexta Aphor. XLIII. Quicumque lienosi difficultate intestinorum corripuntur, iis longa difficultate intestinorum facta, aut aqua inter cæcæ, aut intestinorum leuitas succedit, & moriuntur: quod uidelicet naturalia omnia munia ob hepatum imbecillitatem pessum eant: breuem uero dysenteriam adeo commendauit, ut morbi suspicionem omnem auferre diceret, expurgato nimirum humore lienem grauante. inquit autem tum in Aphorismis, tum in Coacis prænotionibus Hippocrates, Dysenteria non longa splenicis utilis est, longa uero mala.

### Denique ipsa febris (quod maxime mirum, &c.

FEBRIS, sicuti corpori plurima incommoda affert, ita nonnulla etiam habet commoda: nam calore suo nonnunquam crassos ac lentos humores incidit; quemadmodum iam antè de sideratione ex Hippocrate retuli, & in præsentiarum quoque auditor noster dicit, atque hac ratione præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, lenit: nam, ut sexto Aphorismorum Hippocrates, quibus dolor circa præcordia sit absque inflammatione, febris superueniens soluit. Cæterum hypochondriaci huiusmodi dolores, qui febre succedente sanantur, genere triplices sunt, ut in Commento docet Galenus: aut enim ab obstructione, aut à spiritu stultento, aut frigida aliqua inæquali temperie fiunt. Eodem referre potes, quæ de iecinoris dolore Celsus ascribit.

& ner-



## &amp; neruorum distentionem.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta, Quicunque convulsione, aut distentione affligitur, si febris succedit, morbum soluit: & sectione secunda, Melius est convulsioni febrem succedere, quam febrī convulsionem. Convulsioni etenim superuenientes febres, superfluum dissolunt humiditatem, frigiditatemque, quæ viræque medicis sunt remedium intentiones.

## &amp; ex difficultate urinae.

QUEM Græci eleon vocant, Celsus renitioris intestini morbum periphrasticas nominat: verum hic præter morem clarus admodum est; nam præterquam quod Hippocratis sententiam planissime reddidit, rationem quoque eiusdem quam potest brevis, sine explicat, dum dicit, si urinam per calorem mouet. nā Hippocrates febrem quidem lenare dicit; at qua ratione id faciat, subicit: dicit enim, Quibus a stillicidio urinae eleos superuenit, intra septimum diem moriuntur, nisi febre succedente urina satis effluat. Galenus certe quum neque ratio, neque experientia eorum quæ in hoc Aphorismo scribit Hippocrates indicet, veritatem ingenue fateitur se ignorare; præsertim quum febris eleos seu volumulo intestinis inflammationem patientibus nullo modo prodesse possit. Quare Leonavius Euchsius intelligendum Aphorismum arbitratur ita, ut si eleos urinae stillicidio non succedat; tum demum superueniente febrem morbum solvere: quod certe nec Celsus, nec Græci Hippocratis lectio voluisse videtur, quæ ita habet: Ολότως δὲ εἰς τὸν ἑπταήμερον ἔτι ζῶντες, ἐὰν ἐπὶ τῇ πυρετῇ ἐκείνῃ, ἢ μὴ πυρετοῦ ἐπιγινώσκοντες ἴδωσι τὸ αὐτὸ πρῶτον, quæ sit, ut pitem Hippocratem & Celsum existimasse aliquem esse voluulum, qui non ab inflammatione, sed à materia frigida originem trahat, atque huic (confert enim febris morbis qui vel ex frigiditate sunt aut sola, aut cum humoribus crudis, &

pituitosis mixta, atque iis qui à spiritibus flatuosis sunt) rectè mederi dixerint.

## At dolores capitis.

HIPPOCRATES in Predictionibus: Primum quidem ex capitis doloribus aliqui sentiunt leues; aliqui multo grauioribus: utrosque verò hoc modo considerare oportet. Quicunque hebetem visum habent, & rubor quidem ipse sit in oculis, & pruritus faciem vexat, his sanguis sua sponte manans opitulatur: atque hic modus necessariò simplex; neque id mirum est, quum & oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis pruriginē, sanguinis abundantis certa admodum signa sint.

## Si capitis ac frontis dolores.

IAM recitata sententia statim subiungit Hippocrates, Quibus verò dolores circa caput & frontem ex magnis ventis sunt, & ex frigore, quum vehementer calefacti fuerint, eos grauedines quidem, quam maxime perfectè liberant. Presunt autem & sterutationes, & mucti in naribus sistentes, magis quidem sua sponte, si minus coacti. Celsus nescio quàm rectè à frigore & aestu indifferenter grauedine aut sterutatione capitis dolores sanari dicit; Hippocrates ex frigore tantum, quum vehementer calefacti fuerint: quare id aut aestu in id ab aestu commutari, quasi dicat post aestum: ac sic rectè constabit sententia, & cuius satis obuia erit, necessum est enim pituitosis humoribus expurgatis, dolores quoque minui.

## Febrem autem ardentem.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta, A febre ardente habito rigore superueniente, solutio. quem Aphorismum libro De indicationibus secundo ita interpretatur Galenus. In ardentibus, inquit, febribus singulæ accessiones ad integritatem non perueniunt, quoniam qui earum est causa humor, haud expurgatur, sed una cum sanguine in venis continetur: verum quando in iis bilis vehementius agitur ac veluti effervesceat,



effruescit, quinque à natura impellitur, tum rigor superveniet, & soluitur febris.

### Si in febre aures obtusæ sunt.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta Apho. IX. Quibus in febrili aures obsurduerunt, iis sanguis è naribus profluens, aut alius turbata morbum soluit. Et eadem sectione Aphorismo XXVIII. Quibus biliosa deiectiones sunt, iis surditate superveniente desinunt; & quibus surditas præcedit, iis deiectionibus fluentibus finitur. Nam quum aurium dolor, à biliosa materia fiat, rationi consonum est, ea expurgata surditates quoque fini. Ceterum studio quodam biliosæ deiectionis, & ventris resoluti mentionem fecisse videtur Celsus; idq; ut doceret non solum diarrhæa, sed & torminibus, & aliis quibusvis ventris biliosis deiectionibus surditates compesci: nam ut in indicationibus ait Hippocrates: Quibus in febrilibus aures surdesunt, si necessariò febre non discussa delirant: quod quidem delirium sanguis è naribus fluens soluit, vel si venter solutus biliosa dimittat, vel si difficultas intestinorum supervenerit, vel coxendicium, vel genuum dolor.

### Quibus in fistula urinæ.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quarta: Quibus in urinaria fistula tuberculum oritur, iis suppuratione facta, aut eruptione, mali solutio fit. Fit autem solutio, aut (ut Celsus loquitur) sanitas redditur, sedato dolore, & urina profluente: solent enim huiusmodi tubercula, ut rectè monent Galenus & Philotheus, dolores excitare, & urinam propter tumorem suppressere; unde consequens est solutionem fieri post urinæ eruptionem. Alij abscessus loco apices hic legere malunt.

### Contrà, si caput febre continentidolet.

DIGREDITUR iam ad aliud signorum genus, id videlicet, quod in quovis morbo

periculum instans præagiat, ac statim inter initia, indissolubilem quendam cœu Gordium nobis reliquit; adeò ut dum interpretationi studeremus, ac locum loco redde conaremur, quid tandem in medium proferremus, hæsitandi subisterimus: nam quantumvis ea quæ de dolore capitis citra ullam excretionem variis locis Hippocratis applicari queant, ea tamen quæ de ataitis adiungit, iisdem nulla ratione accommodari possunt. Nam quod Hippocrates in indicationibus dicat, Puris per nares, aut aures eruptione capitis dolores solvi, mirum non est: quum idem eosdem ex bile in initio statim fieri dixerit, ac quod capite dolentes periculo non vacant, nisi aliquo modo expurgentur, tum alibi, tum libro quem De morbis inscripsit manifestum fecit: quod ut clarius fiat, unum aut alterum exemplum subiungemus. Dicit autem: Si vena circa cerebrum sanguinem eumnerint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & sinuiput, & posteriorem capitis partem, & aures immittit, & flatu implentur, & nihil audit, & anxius est, & seipsum præ dolore iactat: hic sexta aut quinta die moritur. Quum sic habuerit, caput ipsius calefacito; si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortem effugit. Et paulo ante de alio morbo: Dolor, inquit, caput corripit, & si paululum moneatur, bilem euomet; quandoque etiam difficulter urinam emittit, & desipit; quandoque septima die moritur, & vixit quoque & undecima septimam transgressus, si non eruperit per nares, aut aures; si verò eruperit, enadit: fuit autem aqua subbiliosa; deinde temporis progressu purrefacta, pus fit. Quod Celsum nostrum omnino voluisse credere, nisi atatis puerilis meminisset, quod nusquam Hippocratem fecisse conperimus: quare aut mendum his subesse suspicamur, aut Celsum pueris huiusmodi periculum ascripsisse, quod per victus incontinentiam, in biliosos potissimum morbos incidunt: quales sunt, & febres continentes, & capitis dolores. qui nisi bilis purgatione solvantur, lethales admodum sunt, & quam ocyssimè interierint.

In pul-



## In pulmonis morbo.

DICTVM autē est, screationem quæ citò inter iniuria sit, atque leuiter ferunt, bonam esse; malāmque quæ ei contraria sit, hoc est quæ post principia, puta post septimum diem fiet, & quæ cum difficultate excernatur, qualis ea quoque est quæ iussim monet.

## Quantoque magis mixtos.

HIC varietatem excreationis vituperat, ac deteriorem dicit quo magis mixtos colores, neque inter se diuisos præ se ferat, quòd videlicet talis non solum materiæ malitiam, sed & cum varietate multitudinem quandam denotet, ad cuius concoctionem & excreationem vix vires suffecerint, quum omnes ex æquo humores peccent.

## Et tamen nihil peius est.

HIC aliud longè inferre videtur, quàm iam antè pronunciauit: quum, si quis rem penitus inspiciat, hæc cum antedictis maxime conueniant: nam quamuis excreationes eò peiores iam antè dixerit, quo magis mixtos colores, neque inter se diuiductos aut separatos habeant, non sequitur tamen Celsum iam cōtrarium asserere, quum omnium pessimas sinceras dicit: nam quæ mixtæ sunt, neque vnum aliquem præ se ferunt colorem, quantumcunque varietatem humorum peccantium denotent; non tamen vnius alicuius humoris in summo excessum, quod sincera faciunt, portendent. Appellatur enim sincera tum deiectiones, tum excreationes, Galeno teste, quæ vnum aliquem duntaxat, qui excernitur, humorem ceteris impermixtum habent: ac quòd hæc mala sint, passim docet Hippocrates; nam deiectiones, inquit, in sinceras spumosasque desinentes, exacerbant. & in Prædictionibus: Screatione flaua si sincera est, cum periculo est: nam quiniis alius humor præter sanguinem, si sincerus fuerit, prauam indicat affectionem, quæ à flammido calore obtrineat generationem.

## Siue ruffum est, siue cruentum.

QUONIAM hæc periculus ex Hippocrate, ut totus ferè hic Celsi liber, transumpta est; senis Cei verba, ut hæcenus feci, ascribam: verum quoniam ne sic quidem satis clara reddetur sententia, breuiter ex Galeno enarrationem subiiciam. Inquit autem in Prædictionibus Hippocrates: Si quis longè post principium doloris expuerit quod flauum est, aut fulvum, aut quod multam iussim inducat, & non valde permixtum est, deterius est: nam & flauum meracum periculosum est; & album, & viscosum, & rotundum inutile est: malum est & quod viride valde est: itémque pallidum & spumofum. Si verò ita fuerit meracum, ut etiam nigrum appareat, hoc etiam deterius est quàm illa. Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emittat, pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis, & antecessisse & succedere malum est. at in aliis morbis leuissimis sternutationes prosunt. Omnia sputa sunt mala quæ dolorem non sedant; pessima verò sunt nigra. Hæcenus Hippocrates: quem auctor noster dum reddere studet, nonnulla inuerit, ac alia quodammodo suo more confundit: nam pro non admodum permixtis excreationibus, valde permixtas reddidit; idq; qua ratione, iam antè dictum est: quanquam si quis hic mendum subesse puer, ac tò magis mixtos, in tò minùs mixtos, Hippocratem secutus, conuertere malit, per me integrum est. Sed neque contentus hoc loco ab Hippocrate descivisse Celsus, album, ruffum, glutinosum, pallidumque spumum sine ullo discrimine eodem habuit loco; quum Hippocrates in his maximum discrimen statuerit: siquidem ut sanguinea ac pituitosa affectiones modestissime se habent, ac agrotationes quæ ab atra aut pallida sunt bile difficiliores; ita (quod ad periculum attinet,) merito primas obtinuerint atrabilaria, ac biliosa, quales nigra sunt ac flaua: post hæc pituitosa, in quo albo glutinosa ac candida sunt.

V

At quod



At quod ad horum colorum causas attinet, ut in Commento docet Galenus, flavus redditur ubi serofus ipse humor assatur, quo permixto croceus ipse apparet: rubiginosus verò ubi vehementer assatur: niger verò, aut quoties ipse vehementer assatur (quæ sanè deterrima & quammaximè derodens atra bilis est) aut ubi crassus sanguis similiter exsiccat, aut ubi calor naturalis exstinguitur, ac refrigerationis periculum imminet; unde non immeritò pessimas omnium nigras excreationes vocat. Spumantes autem excreationes, quauquam per se inutiles sint, uti pituitose omnes expuitiones, si tamen tantummodò parum spumaverint, inter exitiosas omnino non veniunt numerande: siquidem quum fiant ex aëria & glutinosa substantia pariter mixtis, facile resolventur, nisi & pituita crassior fuerit, & nebulosam turbulentamque materiam continuerit, unde spumam quæ & vehemens sit, & quæ difficulter resoluitur longumque tempus duret, consequi ratio est. Siernitamentum verò quum aliis morbis salutare sit, hic malum ominatur, quod & distillationes magna ex parte subsequatur, quæ malis humoribus pulmonem repleat, & quod quum eo vehementer concutitur thorax, pulmonem vitiet atque ad distillationes suscipiendas habiliorem reddat.

### Periculosissimumque est, si hæc, &c.

NON omne alui profluuium pleuritidis ac peripneumonix succedens malum dicendum est. Est namque quum in mediocri pulmonia, aut morbo laterali alius turbata bono sit, idque si materia peccans expurgetur, & concoctionis aliqua signa appareant. In vehementi tamen pleuritide, aut peripneumonia superveniens diarrhoea est lethalis admodum, atque exitialis, ut docet Hippocrates Aphorismorum sectione sexta Aphor. XVII. quod significet membrum spiritibus laesis naturalia obire posse. Quare verisimile quoque est Celsum nostrum non de quavis pulmonia, sed vehementi tantum locutum: nam

& ea quoque quæ hucusque retulimus, magnitudinem morbi indicabant.

### Ex iocinore si pus cruentum.

SENTENTIA hæc paulo antè, capitis huius videlicet § quinto, explicata est, desumptaque ex sectionis septima Aphor. VII.

### At ex suppuracionibus.

HÆC accommodare potes quæ § sexto & septimo huius capitis retulimus.

### Atque ex his quidem sup- purationibus.

DE utrisque ætatibus scriptum reliquit Hippocrates: nam in Prædictionibus, Qui purulenti, inquit, ex pulmonia sunt, si maiores natu fuerint, citius intereunt; per alias verò suppuraciones minores natu potius moriuntur: nam ad sanationem peripneumonix, opus est viribus robustis ad excreationem, quæ in ætate declinantibus etiam declinant; in iunioribus autem adhuc valide sunt. Alia autem suppuraciones iunioribus potissimum suspecta sunt, quod quum magna ex parte calidi ac biliosi sint natura, ad febres ac deliria opportuniùs sese habeant: ac de iis quidem in iisdem Prænotionibus ita scriptum reliquit Hippocrates: Animum dolor acutus cum febre continua ac vehementi difficilis est; periculum enim delirij, abolitionisque imminet. quia igitur fallax hic locus est, citò etiam animadvertere omnia alia indicia à primo die necesse est, natu minores septimo die, aut citius, ab hoc morbo intereuntur; natu verò maiores multo tardius.

### At in tabe sputum mixtum.

QUÆ suppurantur, inquit in Prædictionibus Hippocrates, dum creatio biliosa est, exitiosa admodum sunt, siue vicissim bilis ac pus, siue simul excreantur: quod Celsus per sputum mixtum ac purulentum voluisse verisimile est. Quæ subiungit de febre, siti, tenuique corporis constitutione si contraria omnia



omnia ad tabidorum sanationem facere diximus, hæc plurimum obesse necessarium est.

### Si quis etiam in eo morbo.

**V**IDES quanta breuitate multas in unum Hippocratis sententias cogat: nam sectionis quinta Aphorismum undecimum & duodecimum, & secundi libri Prognosticorum Aphorismum xxxv. complectitur: siquidem hic ita scriptum reliquit Hippocrates: Pingue telis avanearum simile in urinae superficie natans, damnandum est; indicat enim consumptionem. In Aphorismis autem: Qui tabe molestantur, si sputum quod extussum, graueolet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt, lethale est: & quibuscunque tabe laborantibus capilli à capite defluunt, iis alui superueniente profluvio moriuntur. Et xliii. eiusdem sectionis: A tabe habito profluvium alui superueniens lethale est. Hæc enim omnia maximam naturæ imbecillitatem denotant. Nam capillorum defluuium, citra maximum alimenti defectum aut humorum corruptionem fieri non potest; alui autem profluvium virium imbecillitatem comitari solet.

### Vtique si tempus autumnus est.

**Q**UANTUM autumnum exquisitè inequalis dicatur, non possumus tamen negare, quin ad frigidum & siccum tendat. Quare quum æstatis præcedentis calore, corpus nostrum rarum ac perspiratum facile redditum sit, ab autumnus tum inequalitate, tum frigiditate, tum etiam siccitate, exhaustum exsuccumque tabidorum corpus, tenuissima de causa afficitur: quo fit ut non solum autumnus in Epidemici tabidis malum dixerit Hippocrates; sed & ver, quando ficus folia cornicis pedibus similia habet, hoc est ipso veris principio, quando videlicet hiemem aliqua ex parte refert, & quando minimè constans ac temperatum est.

### Item pus expuisse in hoc morbo.

**H**IPPOCRATES sectione septima,

Aphorismo xvi. A puris sputo tabes & fluor: quum verò sputum retinetur, moriuntur; quia videlicet significat facultatem expultricem imbecillam adeo esse, ut pulmonem per secretionem amplius liberare non possit: unde periculum est interceptionis spiritus, & suffocationis.

### Solent etiam in adolescentibus.

**H**IPPOCRATES secundo Prædictionum: Quicumque verò pectore suppurati facti fuerint, dum iuvenes sunt, ex humorum illapsu aut fistula, aut alio quopiam huiusmodi, aut ab abscessu recursu, hi non evadunt nisi multa bona signa ipsis accesserint: pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex aliis morbis longis plerique ad hoc tempus maximè moriuntur. Ceterum ex aliis minimè superstites manent, & virgines, & mulieres, quibus ex suppressis mensibus tabes orta est. Si verò aliqua virgo aut mulier evasura est, & aliorum signorum bona multa accedere oportet, & menses splendide ac purè apparere, aut nulla spes est. Quæ virginibus tam Celsus quam Hippocrates ascribunt, antè dixi. verum Celsus hic, ut antè quoque, super tabem mensivna suppressi dicere maluit, quàm cum Hippocrate, à suppressis mensibus tabem oriri; id quod præsentissimum remedium censuerit mulieribus, aut virginibus tabe laborantibus, puram splendidamque mensium purgationem.

### Cui verò fano subitus dolor capitis.

**H**IPPOCRATES sectionis sextæ Aphorismis li. & lii. Si quibus bene valentibus dolores capitis repente accidunt, statimque obmutescunt & stertunt, intra septem dies pereunt, nisi febris apprehendat. Considerare verò oportet oculorum per somnum suspensiones: si quid enim candida partis commissis palpebris apparet, neque ex alui profluvio, neque ex purgantis medicamenti portione istud contingat, prævium est signum, & admodum exitiale. Quos Aphorismos, metathesi



metathesi quadam verborum usus auctor coniunxisse videtur. Est autem illi sermo de apoplexia, quam (ut ante iam dictum est) vehemens febris igneo suo calore dissolvere poterit, crassis nervis & pituitosis humoribus extenuatis.

### At aqua inter cutem si ex acuto morbo.

HIPPOCRATES in Prognosticis, Aqua inter cutem omnis, si ex acuto morbo existit, mala est: non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert, ac mortem, ferèque incipit ex parte inani, ac lumbis iecorèque.

### æquè in ea quoque tussis spem tollit.

AQUA inter cutem laborantibus, inquit Hippocrates sectione sexta Aphor. XXXIII. Si insis supervenerit, malum est: nam significat aquosum humorem ita adanctum, ut iam asperam etiam arteriam occupet, atque adeo suffocationis periculum immineat. Nam & quum tussendi cupiditas sit (ut in Prasagiis Hippocrates) nihil excreant commentatione dignum, destitenti videlicet facultatibus naturalibus, quum earum origo iecur affectum sit.

### Item si sanguis sursum deorsumque.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum, Cui verò multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est: atque hic hydrops brevisissimi temporis est, ut ex quo paucissimi evadunt. verum de hoc alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores facti emarcescunt, ac rursus attolluntur; hi magis convalescunt, quam illi qui ex sanguinis eruptione implentur: verum fallunt hi hydropes ipsos aegrotos, faciuntque, ut ipsi à medicis discedant, atque pereant. Ceterum quæ à sanguinis illa eruptione oritur hydrops, ut impeditam sanguificationem ab universi corporis refrigeratione ac caloris innati omnimoda extin-

ctione significat; ita etiam maximum periculum indicat.

### Illud iure aliquis mirabitur.

QVI suppurati (inquit Hippocrates sexta Aphorismorum sectione XXVI. Aphorismo) aut aqua inter cutem correpti videntur, si pus aut aqua confertim effluxerit, omnino intereunt: idè quod copiosa hæc puris aut aquæ enactio spiritus vitales exsolvat, atque deliquium animi inducat: sicuti fieri videmus, ut ait Celsus, in iis qui quum sani sint, ex vulnere exangues fiunt.

### Articuli verò qui sic dolent.

SECUNDO Prædictionum Hippocrates: Quicumque, aut senes sunt, aut circa articulos callos tophaceos concretos habent, aut erummosè vivunt, aut siccam aluum habent, hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quantum ego novi. Sanant quidem hos optimè dysenteria, si successerint. Celsus leniri quidem, ceterum ex toto solvi non posse dicit, neque ullam erummosa vita aut sicca alui mentionem facit; quod, ut habet ille, solvere nodosam necit medicina podagram: quanquam ad tophaceos illos callos in iunioribus remedia satis multa, eaque efficacia, tum veteres tum recentiores excogitarint.

### Morbus quoque comitialis.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum: Ex his porro qui à sacro morbo corripuntur, difficillimè quidem liberantur hi quibus à puero contingit morbus, & simul ad virilem ætatem pervenit; deinde hi quibus corpore in vigore ætatis constituto factus est, & fuerit à viginti quinque annis ad quadragesimum quintum. Post hos autem quibus factus fuerit morbus, nullam significationem præbens, ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capite initium capere videtur, aut à latere, aut à manu, aut à pede, facilius curantur. Poteris huc accommodare



commodare quæ iam antè de convulsiuis epilepticis diximus, ubi horum serè omnium rationem reddidimus.

Si verò aut mens læsa est.

ELEGANTI periphrasi fortem siderationem (apoplexiam Græci vocant) expreſſerit, si tò aut in & commutatis: in ea enim & mens læditur, & quum animalis facultas ventriculis cerebri obstructis intercipiatur, nervorum resolutio sequitur; ita ut non raro auctor noster, per nervorum resolutionem, simplicem, atque parvam apoplexiam intelligat. Atque quod huiusmodi sideratio pernicioſa sit, neque curationem admittat, docet Hippocrates XLII. Aphorismo sectionis secundæ: Apoplexiam solvere fortem impossibile &c: verum quoniam in sequentibus eundem Aphorismum repetit, ne *πρωτοδονίας* accusandus veniat Celsus, paulo aliter hic locus interpretandus videtur, ita ut mentis alienationem, ac nervorum resolutionem in omni morbo malam dicamus. sic eiusdem sectionis Aphorismo XXXIII. In quoniam morbo, inquit Hippocrates, mente constare, & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum; contrà verò se habere, malum: quod videlicet significet cerebrum ipsiusque membranas affectas.

Deiectionibus quoque si febris accessit.

HIPPOCRATES secundo Predictionum: Dysenteria si quidem cum febre invaserint, aut variis alui egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut precordij aut ventris, aut quæ dolorosa fuerint, aut cibos intercipiunt, sitimque inducunt, hæc omnes male sunt, & quæ sanè plurima horum malorum habuerint, citissimè peribit; cui verò paucissima talium fuerint, huic plurima spes sunt. Morimur autem ex hoc morbo maxime pueri, qui quinquennes; & seniores adhuc decennes: reliquæ ætates minus. Repatitur hæc sententia, tum epidemion VI. part. VII. Aphorif. I. tum Aphorismorum sectione VI. Aphorif. III. in hunc modum: In diuturnis intestinorum

difficultatibus cibi fastidia malum portendunt, & si cum febre accendant, peiora. Neque enim singula hæc enumerata mala exitium statim portendent, nisi longas dysenterias comitentur; nam alioqui nisi multa concurrant, spei aliquid reliquum erit. Quod autem de varia alio dicit, hoc est de variis alui egestionibus, etiam si Aphorismorum sectione secunda Hippocrates in alui praefluviis excrementorum mutationes innuere dicat, nisi ad mala fiat mutatio: non tamen temerè id fecisse videtur; præsertim quum verisimile sit, in tanta pravorum signorum syndrome, excrementorum etiam mutationes ad malum fieri: atque sic quidem quàm maxime periculum augebunt, quod nimirum varietatè materie peccantis devorent. Nam (ut quarto Aphorismorum Hippocrates) Deiectiones nigre, qualis est sanguis niger, spontè venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessima: & quanto colores magis pravi fuerint plures, peius; cum medicamento verò, melius; & quanto colores plures non pravi.

Mulier quoque grauida.

HIPPOCRATES paulo post in Predictionibus iam citatum locum: Quæ, inquit, & vterum gestant, etiam superflites magis enadunt ad partum, & ex partu, & foetus conservant, sanguine & ramentis egestis, etiam per multos menses, nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signum, ex his quæ in dysenteris fieri scripsi, accesserit. Si verò aliquod illorum apparuerit, & foetui perniciem significat, & prægnanti periculum, si non post foetus effugium, & secunde exolutionem ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat.

Quinetiam tormina ab atra.

DYSENTERIÆ si ab atra bile inciperint, inquit Hippocrates Aphorismorum III. Aphor. XXI. lethalis est, quod, ut docet Galenus, à cancro ulcerato quam minimum differat: sincera autem nigra deiectiones



non solum in extenuatis corporibus à tormi-  
nibus periculosa sunt, sed in omnibus ex  
aquo morbis, quod atra bilis dominium  
portendunt.

### aut intestinorum læuitas.

QUAMVIS hæc possint etiam de tor-  
minibus accipi, sicut quotquot hodie typis  
excusa exemplaria extantia, indicare videntur,  
ita ut si lienteria dysenteris succedat  
(dictum est enim abrais intestinis longis, ab  
intestinorum difficultate, eorundem læuita-  
tes superuenire) ut boni secum nihil affert,  
ita si simplex sit, non omnino exitiosa est,  
& non nisi aliis malis signis concurrentibus  
mortem præ se feribis ostendit; cuius generis  
sunt quæ hic enumerat Celsus. Tamen quoniam  
Hippocrates secundo Prædictionum  
(unde hæc desumpsisse Celsum certum est)  
læuitatis intestinorum, quæ & diutina fue-  
rit, & continua, & huiusmodi prava acci-  
dentia coniuncta habet, meminit: Læuitates  
intestinorum à torminibus separatim intelli-  
gere visum fuit, ut rō aut, in at, mutatis  
distinctionibus conuertatur, expuncto nimi-  
rum colo ante rō periculosior. Dicit  
autem in Prædictionibus Hippocrates, Læui-  
tates porro intestinorum lienteriaque Græcis  
nominata, quæ quidē sunt continuæ, & diu-  
turnæ, & per omnem horam, & cū strepiti-  
bus, & sine strepitibus exturbantur, & simi-  
liter noctu & interdum incumbentes, & ege-  
ssione subante aut valde cruda, aut nigra  
& leni & graueolente, hæc omnes mala sunt;  
nam & sitim inducunt, & potum non ad  
vesicam promouent, ut per urinam eiicia-  
tur; & os exulcerant, & ruborem eleua-  
tum in facie efficiunt, & maculas solares  
varios colores habentes: simul autem &  
ventres emollitos & sordidos, & rugosos  
reddunt. Ex talibus autem homines impo-  
tentes sunt ad cibum capiendum, ad deam-  
bulandum, ad faciendum alia quæ facere de-  
bent: estq; morbus hic grauisimus seniori-  
bus; vehemens etiam viris; reliquis autem  
atratibus multo minor. hucusq; Hippocrates.  
Neque mirum est concurrentibus huiusmodi  
signis lethalem esse lienteriam, quum ab ex-

ulceratione summæ partes occupante oriri  
certum sit; quando & sitim inducant, &  
ruborem in facie eleuatum efficiant: &c. si-  
quidem malè affectus ventriculus non solum  
non recte naturalia obit munia, verum etiam  
nonnunquam maximè contraria operatur;  
sic ab infernis particulis interdum aliquid ad  
se se allicit, unde contingit faciem varicolo-  
ribus tingi maculis, ut abundè de sympto-  
matum causis Galenus.

### si verò in tenuiore intestino.

MORBVM tenuioris intestini vocat eum  
quem aleon, chordapson, aut voluulum vo-  
care solemus: est autem lethalis, ac (ut paulo  
pōt inferi Celsus) fere septimo die interimit.  
Ceterum qui voluulo afficiuntur, nihil per  
inferiora excernunt, estq; hoc proprium &  
inseparabile huic passioni (ut docet Galenus)  
ut nihil ad inferiora descendat. Sed neque  
vomitus semper & necessario aleum con-  
comitatur, sed tum demum quando is exitia-  
lis est, & si quando vehementius distor-  
quentur, sterqus ipsis ad superiora feritur,  
atque singultunt: quidam etiam desipiunt  
conuallescentesque, nervorum principio com-  
patiente stomachi affectui. quare rectè ex  
Hippocratis Aphorismorum septimo, Ab aleo  
vomitum, singultum, desipientiam, nervo-  
rumq; distentionem malum esse dixit Celsus.

### At in morbo arquato.

HIPPOCRATES sexto Aphorismorum  
Aphorismo XLIII. Morbo regio correptis  
iecur durum effiei malum est: significat enim  
iecinoris durities, vel inflammationem in  
ipso esse vel durum tumorem, quorum  
utrumque malum est & lethale.

### Quos lienes malè habent.

HIPPOCRATES Aphorismorum se-  
ctione sexta, Aphorismo XLIII. quicun-  
que lienosi à difficultate intestinorum corri-  
piuntur, iis longa difficultate intestinorum  
facta, aut aqua inter citem, aut læuitas in-  
testinorum subit, & moriuntur. Celsus per  
omnia Hippocratem reddidit, nisi quod lon-  
gitudinis



gitudinis torminum non meminerit, satis mali lienosis asferre suspicatus, si tormina, vel in aquam intercitem, vel lienteriam conuertantur: neque enim in lienteriam commutabuntur, nisi abrafis prius intestinis; neque in aquam intercitem, nisi abolita temperie innati caloris, compallentibus simul hepate, liene, venosque in uniuersum genere cum intestinis.

### Morbus intestini tenuioris.

QUANQVAM acutus admodum, ac fere lethalis sit intestini tenuioris morbus quem eleon vocari diximus; non tamen intra septimum diem semper occidit: est enim quum a pituita frigida, quam viueam Praxagoras appellat, generetur, atque hac quidem in longum producit tempus. Quare an recte hic dixerit, videant alij: ego certe Celsum puto voluisse XLIIII. Aphorismum sectionis sexta explicare, praefertim quum iam duos ordine Aphorismos recensuerit: verum quando ab hoc quam maxime variet, nescio aut quomodo cum Hippocrate componi possit, aut quomodo id quod de suo in medium protulit, explicandum sit; potissimum quum ea qua scribit non cohaereant satis: nam quod dicit nisi resolutus est, videtur velle innuere potiore elei causam esse frigiditatem qua calore aut alio quouis modo resoluitur: quum, ut ait Galenus libro De naturalibus facultatibus, inflammationes magis pariant voluuli: qui quantumvis mali sunt, non tamen semper intra septimum interiment: est tamen ubi praesens secum asferant periculum; videlicet quoties ex urina stillicidio oriuntur. Nam, ut in Aphorismis Hippocrates, Quibusque ex urina stillicidio voluulus accedit, ij intra septem dies perent, si non febre orta, satis urina profuxerit.

### Mulier ex partu si cum febre.

QUANQVAM ex suo deprompserit hac promptuario Celsus, non tamen citra omnem rationem dicta sunt: nam quum mulieres a partu non probe purgatae in febres aut capitis dolores acutissimos incidunt, materia sursum

repente, non iniuria mortis periculum incurrent: idque imprimis, quum & partes doloribus exagitata viribus imbecillioribus fiat, & continuis capitis doloribus & febribus vehementibus detineantur.

### Si dolor atque inflammatio est.

HIPPOCRATES in Prognosticis, crebram spirationem, dolorem aut inflammationem qua supra praecordia fatiget, significare dicit: hic autem malum signum dicit Celsus, si thorace inflammato, aut dolente, crebrior atque idem repetitus spiritus reddatur: cuius rationem iam ante reddidimus; quare recte huc accommodaueris, qua de spiritu raro in medium protulimus.

### Si sine causa longus dolor capitis.

HIPPOCRATES in Predictionibus: Quibus autem dolores sine manifestis causis sunt, & diurni, & in toto capite, suntque ipsi & graciles, & debiles; his praedicendum est, morbum longe grauiorem priore esse. si vero etiam ad collum, & ad dorsum descendat caput relinquens, ac rursus ad caput recurrat, adhuc grauior sit: verum omnium horum grauissimus est, si ex capite ad collum, ac dorsum tendat. Utilitates autem his ex abscessibus fore expectandum est, aut ubi pus per tussim reiecerint, aut haemorrhoides habent, aut pustulas in corporibus enatas; confert etiam caput surfures habens. Torpores & punctura pruriginosa, velut ab urtica, quibus per caput discurrunt, aliquando per totum, aliquando per aliquam partem, saepe vero & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur velut per caput discurrere; hos etiam interrogare oportet, an etiam ad summam linguam punctura illa procedat: si enim hoc fecerit, perfectus morbus sit, & qui difficilis submoueri possit; verum absque hoc facilius est. Modi vero utilitatum consequendarum ex abscessibus contingent velut ante scriptum est: sed tamen abscessus in his minus succedunt, quam in illis. Quoscumque vero una cum doloribus

verrigines



vertigines corripunt, malum agri exolubile ac furiosum existit; senibus autem maxime hic modus fit. Quæ omnia Celsus accuratissimè reddidit; nisi quod pro capitis fursuribus, pruriginem nescio quàm apposuè translationes, quæ Hippocrates seungit, confuderit; ad hæc quod hamorrhoidum non meminerit, & quod vertigines cum dolore, exitiale omnino malum, præterierit.

### In coxæ verò doloribus.

HIPPOCRATES secundo Prædictionum: De coxendicæ morbo sic considerationem facere oportet. Quibuscumque senioribus torpores vehementissimi fuerint, perfrigerationes tum lumborum, tum crurum, & qui pudendum arrigere non possunt, & qui alius non egerit nisi ad necessitatem coacta, & prodiit ipsis multus stercoraceus mucus, hæc maxime diuturnus morbus erit; prædicendumque est annum ut minimùm duraturum morbum esse ab eo tempore quo incepit, & opem ad verè æstatem expectandam esse. Celsus hic iterum arrectionis pudendi mentionem nullam facit, cuius certè inter reliqua meminisse debebat, quod videlicet morbi magnitudinem, si quod aliud, portendat; significat enim vesicam, atque adeo spermatica vasa, reliquaque genitalis inferuentia ex nimio dolore molestiam aliquam transsumpsisse. Præterea Cornelius nosse vere ac autumno morbum solui dicit; Hippocrates vere ac æstate, resolutis nimium humoribus frigidis qui dolorem conciliabam æstatis calore: quare, nisi quid obftet, pro ætate autumno, & æstate legere malim; quum certum sit affectionem hanc non solum non autumno finire, sed tunc potissimum accessiones suas facere, atque exacerbare.

### Difficilis æquè curationis est.

DIXIMVS autè ex secundo Prædictionum, dolores humerorum si ad manus perueniant, solui vomitu puris, aut atra bilis: nunc autem ex hoc inseri Celsus, exitiosos

esse huiusmodi morbos, nisi puris aut bilis atra vomitu leuentur.

### Quacunque verò parte corporis.

HIPPOCRATES in secundo Prædictionum, Quibus una cum hoc quod mouere non possunt, morbosa corporis pars extenuatur, hi in sanitatem restitui non possunt: quibus autem colliquationes non accesserint, hi euadent. Colliquatum enim aut emacrescens membrum nutritione planè destituitur.

### Omnique resolutioni neruorum.

NON solum resolutioni, sed & omnibus aliis morbis autumno malus est (ut aibi testatur Hippocrates) sua inæqualitate: hiems etiam sua frigiditate & humiditate paralyti, aut siderationi admodum infesta est; æstas contra calore suo aut siccitate eandem resoluit. Reliqua iam antè diximus. Nam notus aliqui per se satis est Hippocratis Aphorismus: Soluere morbum quem apoplexiam vocant, fortem, impossibile; debilem verò, non facile.

### Mulieri grauidæ.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione quinta Aphor. xxxvi, & xxxvii. Mulieri viro gerenti si mammae repente graciles fiant geminos habenti, alterum abortit: & si quidem mamma dextera gracilis fiat, marem; si verò sinistra, feminam: quod videlicet gracilescentes mammae ostendant fœtū alimentum deficere. Nam quum communes quedam venæ sint mammis & vteris, fit ut quando in venis parum contineatur sanguinis, gracilescent ubera, unde inedia pernici fœtus contingit.

### Quæ neque peperit.

HIPPOCRATES quinto Aphorismorum Aphorismo xxxix. Si mulier quæ neque peperit, neque grauida est, lac habet; huic menstrua defecerunt: nam quum, ut dixi, communes venæ sint mammis & vterio, contingit puriorem menstrui sanguinis portionem,



tionem, quem alioqui natura duce per matricem expurgari conueniebat, ad mamillas regurgitare, atque inibi in lac conuerii.

### Quartana æstiuæ brevis.

HVC accommodare potes quæ ex Aphorismis hoc capite in hanc sententiam protulimus.

### Si sanguis profluxit.

HIPPOCRATES septimo Aphorismo. A profusio sanguinis desipientia ac conuulsio malum; & a vehementi sanguinis profusio conuulsio, malum: oritur enim conuulsio huiusmodi ab inanitione; quare & lethalis est. Delirium autem à siccitate membranarum cerebri fit.

### Itemque si medicamentis purgatum.

EIVSDEM planè argumenti cum iam dicta est hæc sententia, repetiturque ab Hippocrate multis locis: nam Aphorismorum quinto, Aphorismo quarto, ex superflua purgatione conuulsio aut sine ultius superueniēs, malum est. & primo eiusdem sectionis: Conuulsio ab heileboro lethalis est. & rursum sectione septima Aphorismo xxv. A purgantis medicamenti potione conuulsio lethalis est.

### aur si in magno dolore.

HIPPOCRATES septimo Aphorismo.

rum Aphor. 26, in vehementi ventris dolore frigiditas partium extremarum, malum significat. Celsus hinc ventris non meminit, vel quod putaret in omni ventris dolore, malam esse extremarum partium frigiditatem, vel quod magna ex parte inflammationem interiorum partium denotet. Sic alibi quoque in acutis morbis extremarum partium frigiditatem vituperat.

### Neque is ad vitam redit.

HIPPOCRATES Aphorismorum secundo, Aphorif. xlii. Qui strangulati ac dissoluti nondum mortui, non referuntur quibus spuma circa os fuerit, quod videlicet spuma hæc violentiam pulmonis ac spirituum partium denotet.

### Aluus nigra sanguini atro similis.

HIPPOCRATES Aphor. sectione quarta Aphor. xxi. Deiectiones nigra, qualis est sanguis niger, sponte venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessima: & quanto colores magis prani fuerint plures, peius. Celsus varicolores deiectiones hic omisit, quod arte eorum meminerit. Reliqua ex antecedentibus clara sunt; multa namque hoc capite, tanquam per transennam, transcurrimus, quod iam antè aliqua ex parte enarrata essent.

## CAPITULUM IX.

### De morborum curationibus.

COGNITIS indicijs, quæ nos vel spe consolentur, vel metu terreat, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis. Antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent: quædam in aduersa tantum valetudine adhibentur. Omne verò au-

X

xilium



xilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adijcit, aut euocat, aut reprimat, aut refrigerat, aut calefacit, simulque aut durat, aut mollit. Quædam non vno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia, sanguinis detractio, cucurbitula, deiectione, vomitu, frictione, gestatione, omni que exercitatione corporis, abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

## ENARRATIO.

SECUNDVS hic Celsi liber in duas potissimum partes dividitur: In priori enim de communibus signis, salubribus videlicet, & insalubribus edisserit: In posteriori communia auxilia enarrat; & quoniam varia sunt auxiliorum genera, in varia etiam capita distinguunt. Est enim quum pharmacorum aut medicamentorum propinatione corpus subleuamus, morbosque propulsumus; *ὑπερμαχον* vocant: & rursus manuali actione (*χειρουργία*) appellant) ægrotis profusum, dum quod redundat rescindimus, adurimus, aut alio quouis modo auferimus. Frequenter etiam victus rationem idoneam præscribendo (*διαίτησις*) nominant) corpori pleno aut demimus aliquid, cibi abstinentiam iniungendo, aut attenuantem victus rationem præscribendo; aut idem exhaustum iam exuccumque sensim rescimus ac vegetamus. Celsus ita hæc auxiliorum genera sub duobus complectitur, dum omne auxilium corpori aut demere, aut addere aliquid dicit. Nam sanguinis missio, cucurbitula, hirudines, purgationes, sudores, media corpori demunt: victus collapsum corpus ferè restaurat, reparatque, frictio nec addentibus nec dementibus recte annumerari potest: nam si vehementer sit, corpus durat: si lenis, mollit; si multa, minuit: si modica, implet. sic de balneo, exercitio, unctionibusque indicandum est: quare media inter dementia & impletoria censenda sunt: quod Celsus quoque fecisse videtur, dum inter auferentia & addentia tamquam medio quodam loco posuit.

## Omne verò auxilium.

MEDICINA, inquit Hippocrates, est additio & subtractio; additio quidem deficientis, ablatio superantis in hominum corporibus. Deficiunt autem redundantque quædam in qualitate, quædam in quantitate, ut auctor est Galenus xlii. Methodi. In quantitate, quoties sanguis immodicè est actus, aut rursus minor redditus: in qualitate, quum vel calidus vel frigidus, vel crassus vel tenuis plus in isto, minusve est effectus. Quum igitur additio & subtractio medicinam constituat, rectè auctor noster omne auxilium corpori aut demere, aut addere, aliquid docet: quum quoscunque morbos creat enacuatio, curet resectio; & vice versa quæ ex repletionem sunt, curentur inanitione. Videtur tamen Celsus, medicinæ partes omnes paulo exactius perpenderit, quum omnes particulatim medicamentorum differentias ac energias quodammodo recenser. Dicit enim præter ea quæ addant aut demant, alia reprimere, alia contra foras euocare, alia rursus refrigerare, atque alia calefacere, simulque aut durare aut mollire, quasi sub his omnium tam simplicium quam compositorum morborum, tum causas, tum curationes comprehenderit. Neque enim solam inanitionem aut repletionem cõtentus est morborum causam dixisse, nisi calorem ac frigus immodicum, meatuum aut laxitatem aut constrictionem, densitatemve, mollietatem aut duriciem corporis addiderit. Et quoniam non raro impliciti sunt affectus, addit esse nonnulla



nouum illa auxilia quæ non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrariis adiuuent: quemadmodum emetibulas, sudores, & omnia reuulsoria medicamenta foras simul euocare, & aliquid materia pe-

cantis deuere dicimus, balnea & calefacere simul & foras euocare. frictio autem sibi ipsi contraria, ut suo loco dicitur, operatur: nam durat, molit, demit, atque addit.

## CAPVT X.

*De sanguinis detractione per venas.*

**S**ANGVINEM incisa vena mitti, nouum non est: sed nullum penè morbum esse, in quo non mittatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & fœminis yterum non gerentibus, vetus est. In pueris verò idem experiri, & in senioribus, & in grandis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus iudicabant, persuaserantque sibi mulierem gravidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea verò vsus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque

\* porius

attributo

X 2

nent,



nent, celeriusque ea, si nimium est pinguis, aliquis affligitur. Ideoque vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie aestimatur. Neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbigenus, quod sit. Vtrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia surmale habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenæque venæ tument, sanguinis detractionem requirit. Item viscerum morbi, nervorumque resolutio, & rigor, & distensio, quicquid denique fauces difficultate spiritus strangulat, quicquid subito supprimit vocem, quicquid intolerabilis dolor est, & quacunque de causa, ruptum aliquid intus atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo (ut supra dixi) non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusque sit, qui laborat, nisi temeraria quoque via fuerit adiutus, in hoc statu boni medici est ostendere, quam nulla spes sine sanguinis detractione sit, faterique quantus in hac ipsa re sit metus. Et tum demum si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi re non oportet. Satius est enim, anceps auxilium experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti sunt. Vbi subito aliquis obmutuit. Vbi angina strangulatur. Vbi prioris febris accessio penè confecit, paremque subsequi verisimile est, neque eandem videntur sustinere ægri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. Neque enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamvis paulo ante sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patiatur, tum demum nulla

cruditis



eruditatis \*suspensione remanente id fiet. Ideoque ei rei vi-  
 detur aptissimus aduersæ valetudinis dies secundus aut ter-  
 tius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere  
 necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum  
 iam spatio ipso materia \* & exhausta est, \* & corpus corrup-  
 pit, ut detractio imbecillum id facere possit, non possit inte-  
 grum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu eius  
 sanguinem mittere, hominem iugulare est. Expectanda er-  
 go remissio est, si non decrescit, sed crescere desijt, neque  
 speratur remissio, tunc quoque quamvis peior, sola tamen  
 occasio non omittenda est. Fere etiam ista medicina ubi ne-  
 cessaria est, in biduum diuidenda est. Satius est enim pri-  
 mum leuare ægrum, deinde perpurgare, quam simul omni  
 vi effusa fortasse præcipitare. Quod si in cura quoque aquæ,  
 quæ inter cutem est, \* ita respondet, quanto magis necesse  
 est in sanguine respondeat? Mitti verò is debet, si totius cor-  
 poris causa sit, ex brachio: si partis alicuius, ex ea ipsa parte,  
 aut certe quàm proxima, quia non ubique mitti potest, sed  
 in temporibus, in brachijs, iuxta talos. Neque ignoro quos-  
 dam dicere, quàm longissimè sanguinem inde, ubi lædit, esse  
 mittendum: sic enim auerti materiæ cursum: at illo modo in  
 id ipsum quod grauatur, euocari. Sed id ipsum falsum est.  
 Proximum enim locum primo \* exhaurit. Ex vltioribus  
 autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, ubi is  
 suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur  
 tamen vsus ipse docuisse, si caput factum est, ex brachio po-  
 tius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero vitium  
 est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, op-  
 portuniore hæ partes iniuriæ sunt, quàm quæ iam malè ha-  
 bent. Auertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte pro-  
 rumpens, alia emittitur. Desinit enim fluere quæ volu-  
 mus, inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mitte-  
 re autem sanguinem cum sit expeditissimum, vsu habenti-  
 tum ignaro difficillimum est. Iuncta enim est vena ar-  
 terijs, his nerui. Ita si neruum scalpellus attingit, sequitur  
 neruorum distentio, \* ea quæ hominem crudeliter consumit.

\* suspicio-  
ne\* vel  
\* vel

\* ista

\* exaruit.

\* tamen

\* eaque



At arteria incisa neque coit neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venæ, si fortè præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timidè scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiam calatet, neque facillè reperitur. Ita multæ res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est. Ideoque utiliter effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. Eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat, protinusque is supprimendus est. Sed id evenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut æquè niger assidue ac primo die profluat. Quod quamvis ita est, tamen si iam satis fluxit, supprimendus est. Semperque antè finis faciendus est, quàm anima deficiat. Deligandumque brachium superimposito expresso ex aqua frigida penicillo, & postero die aduerso medio digito vena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, iterumque sanguinem fundat. Siue autem primo, siue secundo die sanguis, qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere & pellucere cœpit, satis materiæ detractum est, atque quod superest, sincerum est. Ideoque protinus brachium deligandum, habendumque ita est, donec valens cicatricula sit, quæ celerrimè in vena confirmatur.

\* aliàs: & postero die aduerso medio digito, non autem scalpello, vena ferienda.

#### ENARRATIO.

**Q**UVM sanguine non solum animalis partes alantur, sed & nativus calor in eodem quasi delitescens consistat, ac mansionem, ut sic dicam, faciat, quemadmodum testatur Galenus; non immerito à πύφωσθ' ille Erasistratus eiusque sequaces, à venæ sectione usque adeo abhorrebant, quod suspicarentur nativum calorem dissilari unà imminuique. Verum quum non raro contingat, ut sanguis aut qualitate, aut quantitate peccans intemperiem suam cordi

communicet, statim is in initio incisa, vena evacuandus est. Miri igitur sanguinem incisa vena nonnum non est, sed nullum penè esse morbum in quo non mittatur, nonum est. Nam Galenus libro Quos purgare & quibus id medicamenti oporteat, sanguinis missione eos tantum morbos curari auctor est, qui ab humorum copia (πύφωσθ' vocant) creantur, reliquos qui ab eorum corruptione fiunt, purgatione indigere. Atque ea etià ratione, si præveniantur, articu-  
lorum



lorum tophaceam duriciem, morbum comitalem, apoplexiam & id genus alios prohibuisse, qui certis alioqui statisque temporibus solebant innuadere, atque hoc iam hominibus ipsa experientia compertum esse, non in se ipsis tantum, sed & iumentis, alio testatur loco Galenus: siquidem ante aetatis initium circa ultimam veris partem, & sibi & illis sanguinem detrahunt, quoniam ad memoriam reuocant quibus capiuntur morbis, quando repente calor aestius supervenerit, hic enim amplius sanguinem extendit, atque diffundit, & quodammodo effervere facit. Sic Galenus libro De sanguinis missione, si reliquorum, inquit, morborum alicui obnoxium esse perspectum habuerimus, verbi gratia, aut peripneumonia, aut pleuritide, aut angina, committendum non est ut expectemus dum evidens pleuritidis aliquod symptomata appareat, sed avertere sanguinis missione praestat. Atque haec haec de morborum praecautio. Verum sicuti hic momenti non parum affert sanguinis missio; ita quoque si iam intraferunt, sola venae sectione lenantur: Sic synchos ad animi deliquium missio sanguine non raro curatas memoria proditum est, & indies usu venire videmus: sic omnes quotquot sunt morbi qui ex sanguine, hoc est plenitudine vel ad vires, vel ad vasorum humores continentiam capacitatem, inflammatione, erysipellate originem habent: sic quoque qui alio quovis modo acuti dicuntur, ut synanche, fideratio, sanguinis missione, si quo alio, innantur. Est praeterea ubi non tam purgandi quam venellendi gratia venam tundimus; ut etiam nonnunquam errorumque rationem habemus: quemadmodum in hemorrhoidibus & mensibus suppressis fieri consuevit.

### In pueris vero idem experiri.

PVERI quantumvis vitali facultate valent, sanguinis missionem non sustinent, quod eorundem substantia nimis ob humiditatem, nimis ob temperamenti caliditatem erysipelate dischitatur. Sedes autem evacuationationis quae per venae sectionem fit, nullo modo

admittunt, propter virium imbecillitatem, atque hoc est quod Galenus dicit, Senum aetatem sub hypothese quae à viribus sumitur comprehendere posse, quum nullis qui in ea aetate constituti sunt, robur adsit; pueris autem vires adesse libro Sanitatis tuenda idem aperire declarat, quum infantes functionibus naturalibus, puta aëctione, concoctione, distributione, ceteris plane aetatibus praestare dicat. Quo forte argumento motus Arabs ille Abenzoar, aut morbi alioqui vehementia impulsus, puero septennali venam incidit, quum tamen Galenus passim sub virium robore pueros nulla ratione comprehendere asserat; nisi quis Galenum de pleniore, veteribusque consueta purgatione locutum dicat; moderatam enim quae tum viribus, tum plenitudini aut par aut inferior sit, & senes & pueri facile ferunt. Sic etiam Rhazes in aetate decrepita, quae gravi & urgente pleuritide vel peripneumonia vrgeretur, sanguinem emisit.

### persuaserantque sibi mulierem gravidam.

CORPVS valens non vocat id quod sanum sit, sed quod etiam si iam quammaxime à sanitate deviauerit, viribus polleat. Mittendique sanguinis scopos inquirat, primumque inter eos obtinere locum dicit, virium robur: nam non solum in sanguinis missione, verum etiam quavis alia vaccinatione, vires egroti attendere oportet, ac donec tolerat, & nondum laborat, tentandum est exuperantem humorem educere; quum vero dissoluantur, etiam si supersint supernachia, cauere eorundem vaccinationem conuenit; virium enim imbecillitas adiectionem potius quam deiectionem requirit. Tantum igitur virium robori attendendum est, ut etiam si quam maxime relique mittendi sanguinem hypotheses debortentur, si vires constent, atque morbus id ipsum flagitet, venam tundamus. Atque sic quavis Hippocrates in gravidis temperandum à sanguinis missione doceat (quod missio ex vena sanguine abortire soleant) tamen si vires constet, non formidabimus phlebotomia: praesertim quum idem



idem senex alio loco mensibus qui tertio & octavo interponuntur, gravidis cacochymia laborantibus purgationem qua medicamento purgante obeatur, admittat. nam quum omnibus notum sit plus nocuienti gravidis accessurum ex medicamento purgantis sumptione, quam a sanguinis missione; si non ultimis fiat mensibus, tunc eadem non minus quam fiet. Et sane quamvis iam grandior factus infans, maiori opus habeat alimento, tamen certe vel ultimo mense, tutius praegnantem adhibetur phlebotomia, quam purgans medicamentum, quod cathartica omnia exagitatione sua violenta, fortui admodum officiant, & quod immodico suo calore, atque perniciofa substantia, venenata existant. Bene igitur subiungit, postea usum docuisse, nihil ex his esse perpetuum: nam quum extremis morbis extremis exquisita remedia optima sunt, experientia & longo verum usu didicimus, praegnantem infra octavum mensem in morbo, nullo factus incommodo, venam aperuisse, sit enim ut tanta sit copia in venis, ut modum excedat, matris foetuique alendo idoneum, ita ut copia abortus periculum adducat: hic igitur nihil periculi expectandum erit, si resurgata vena sanguinem modice minuamus, natura ipsa interdum sponte, supernaculi illius effusionem viriliterque moliente, aut per vterum, aut per nares, aut hemorrhoides. Nam & in nonnullis primis tantum mensibus, in aliis toto etiam impregnationis decursu, menses temporis statis salubriter effluunt. Et si in plethora natura duce liceat id nobis, cur in acutis morbis quos praegnantibus lethales definit Hippocrates, anceps (si ita vis) periculum non aggrediemur? praesertim si inflammatio aliqua superiora occupet, ut in pleuritide, ubi vena cubiti caesa, non solum foetus nihil incommodabimus, sed & affectam partem multo pondere subleuamus, & matrem foetumque periculo subtrahimus. Inferiores autem praegnantium venas secare minimè tutum est, quod impetu deorsum conuerso menses immodicè regurgitent, atque precipitentur foetus. Itaque si praegnas conflictetur morbo graviore, sitq; valentibus

viribus, & animo forti, nec metu perturbetur, & vasa plena sint, nec inedia inanita, unam aliquam ex superioribus venam tunc secabimus, ex qua sanguis sensim elabatur.

### Tenuioribus magis sanguis.

POSTEAQVAM inter ea quae vena sectionem aut suadeant, aut dissuadeant, primum esse virium robur, demonstravit; iam unde potissimum id colligatur edocet; idque potius ex venis, quam specie totius corporis aestimari dicit: nam quum sanguinem natini caloris atque vitalis roboris domicilium dixerimus, rectè cum qui eo abundaverit, viribus pollere, ut cum qui hunc parciorem habuerit, iisdem quodammodo deficere, indicauerimus. neque enim, ut ante dixit, obsum corpus valens, aut tenue infirmum aestimamus; nam tenuioribus magis sanguis, hoc est cum sanguine virium robur, abundat. Verum hic inquirendum est, quid per tenuiores & pleniores intelligat: nam non simpliciter dicendum est graciliores plenioribus sanguine magis abundare; sunt enim, ut docet Galenus, nonnulli, qui cum graciles sint, venas parvas habeant, & si ex iis quempiam incidas, adeps effluet, quam constat cuti ad internam eius membranam adnasci: ceterum id raro admodum in viris conspicitur; in mulieribus vero sapissimè, est etenim tum frigidioris naturae, tum desidiose vite nota: magna tamen ex parte, & per se, gracilioribus sanguis magis inest, habentque venas latiores: rationabiliter enim in idem fere incidit, venarum angustia cum pingui habitu ac crassiore, gracilis habitus cum venarum laxitate; nam & vene calore dilatantur, statuque distenduntur, & gracilitas temperamenti calidi nota est.

### plenioribus magis caro abundat.

PLENIORES non obesos (quod videlicet sanguinis minimum, adipisque plurimum habeant, atque quam celerrimè ex sanguinis missione affligantur) sed corpulentos, & carnosos, quos Gracilioribus vocant,



cant, intelligit: siquidem si vii carne abundant, ita sanguine non omnino destituntur; quando, ut docet Galenus, sanguinis copia corpulentia origo sit, atque non infrequens sit, ut qui graciles alioqui natura fuerint, ex ociosa & delicata vita, temperamento in humidius mutato, carnosiores redantur; habeantque & venas laxiores & ampliores graciliter. Quare an rectè dixerit Celsus, graciles plenioribus sanguine magis abundare, non immeritò dubitet quis; praesertim quum vis atque adeo sanguinis copia, ut hic quoque subiungit Cornelius nosler, melius ex venis quam corporis specie aestimetur. Nam contingit non raro corpulentos non solum carnis quoque plus, sed & sanguinis habere quam graciles, quod venas tumentiores turgentioresque habeant. Quod si quis autem plenum corpus, & temperatum, & obesum, & carnosum velit intelligere, sicut doctissimus quidam, de re medica optime meritis *εὐαγγέλιος* (non enim possum verbum verbo reddere melius) apud Hippocratem & Galenum passim accipi dicit; per me quidem integrum est: ego tamen eos hac dictione intellexero, qui natura corpulenti sunt, adeo ut mirer perspicacissimi alioqui ingenij virum eo devenisse, ut Galenum & Hippocratem τὸ *πλεονέχον* in ea significatione passim usurpasse crediderit; quum aliàs, aut *πλεονέχης σφόδρα*, aut *σφοδρότερος*, aut *πλεονέχης* dicat. sed neque contentus hac *πλεονέχον* significatione *ἀντὶ τοῦ πλεονέχον* secundo Aphorismorum apud eosdem intelligi dicit, quum bene carnosos *πλοῦτος αἷματος* vocari scribat. Atque hac hactenus: non ut doctissimum virum, & cui in hisce nostris commentariis plurimum debemus, cavillemur; sed ne confuso temperamentorum ordine, carnosos cum temperatis atque pinguibus confundamus. Igitur ne diutius his immoremur, Graciles & plurimum sanguinem qui in venis continentur, & spiritum qui eadem calore dilatat, habere dicimus; ut corpulentos seu pleniores plus carnis, adipis, & obesos: & quanquam usu veniat sanguinem esse carnosos & copiosum & venas amplas; gracilioribus tamen easdem turgi-

diores & pleniores non immeritò pronunciamus.

### Neque enim solum hæc.

HYPOTHESIVM quæ in sanguinis missione sumuntur, primum locum attributum virum robori iam plus satis dictum est: ac proinde ne temerarij admodum finis in eius detractio, si materia integra est (est enim corpus sanum exlex, ut precedente libro docet Celsus) ab ea temperandum movet, atque si corpus sanitatis limites excesserit, considerandum morbi genus: nam si ab inanitione est, abstinendum esse; quum quos creaverit morbos inanitio, curet resectio: & si ex plenitudine (*πληρότης* vocant) originem traxerit, vena missionem efflagitare; idque non citra exceptionem: Requiritur enim ut aut suo genere sit magnus morbus, & vehementis; aut eius causa qua humoribus inest multam accreuerit, aut symptomatis cuiusdam semita presserit. Magnus autem ac vehementis morbus intelligitur ex genere: nam cuiuscunque partis phlegmone sit, gravior deteriorque censetur, quam simplex illius intemperies. dicitur etiam magnus ex partis usu, vel prestantia; praterea etiā ex eandem partium situ, quarum alia principibus affinitate iunguntur, ut pulmo, latera, ventriculus. In summa, vehementis etiam morbus censetur ex partis sensu, qui aut acer, acutus, aut hebes gravisque est. Verum etsi omnia hæc concurrant, morbi videlicet magnitudo, causa efficientis multitudo, symptomatumque severitas; non erit tamen tundenda vena, nisi probè constantibus viribus: adeo magna habenda est ratio virum, ut non immeritò primas in missione sanguinis obtineat.

### At si vel copia sui malè habet.

SANGVINIS plenitudo duplici modo capitur: prior corporis gravitate aestimatur, ad vires dicta; altera tum venarum extensione, tum quod ille plena tument, agnoscitur, nostri plenitudinem ad vasa, Græci κατὰ τὸ *εὐχρηστόν* vocant. Vtraque autem plenitudo



plenitudo necessariam vacationem indicat; quod in hac quidem vasa quæ sanguinem continent, in alia pondus id transfundere spectentur; & quantumvis natura hoc pondere non grauetur, non raro tamen vasa rumpantur; unde ex venarum commerciis sanguinis spuitiones sequuntur. In ea autem quæ ad vires dicta est plenitudine, quantumvis vena non tumeant, nec plena appareant, statim infirmatur homo & viribus destituitur, natura enim ad graue aliquod omni ferendum impotente.

vel corrupta est, nullo modo, &c.

QUVM sanguis qualitate æque ac quantitate peccet, Galeno de sang. missione teste, materiam, hoc est sanguinem, corruptam vena sectione optime curari posse demonstrat. Et quanquam sub dictione corrupta est, eam plenitudinis speciem quæ ad vires dicitur, tantum comprehendere possumus, ut eam quæ ad vasa sub copia, tamen quoniam illa corpore nondum agrotante, neque sanguine adhucdum inflammato accidere potest, per verbum corrupta est, sanguinem qualitate peccantem, qualem in inflammationibus, febribusque, & id genus aliis videre contingit, intelligemus: est autem eiusmodi aut biliosus, aut adustus, aut putrefactus. Ei porro nullo modo melius succurritur quam vena sectione; quum primum vena sectionis consilium sit, ut sanguis qui aut qualitate aut quantitate redundat euacuetur. Si tamen alicui libeat per se, corrupta est, plenitudinem quam ad vires vocamus, intelligere, non omnino male fecerit; quando ea (teste Galeno) promptissime in putredinem incidat, & nonnunquam etiam in partes quasdam impetu quodam prorumpat, atque inibi tumores præter naturam faciat, sanguinemque corrumpat.

Ergo vehemens febris.

BREVITER enarrat morbos quotquot sunt, qui sanguinis missionem requirant: sunt autem eiusmodi, qui ex sanguinis ubertate, & affluentia (ut diximus) aut ex qua-

vis illius eruptione ortum habent: eius tamen generis maxime sunt, & originis suæ causam inde sortiuntur, febris synochus, tum ea quæ citra putredinem ex sola sit sanguinis effervescentia, tum ea quæ ex putrescente accenditur; quales Celsus hic intellexisse videtur. Neque omnes puride cuiuscunque sunt ordinis febres, vena sectione curantur; sed ea tantum quarum obstructio ex multitudine, & immodica copia proficiscitur; in eiusmodi enim febribus non continuus modus, sed & intermittens Galenus saluberrimum esse ait venam incidere.

Item viscerum morbi.

PER viscerum morbos omnium inter-  
norum inflammationes (Πύρεσες Græci dicunt) intelligit: appellantur enim viscera omnia interiora quæ pelle teguntur; ut iecur, cor, pulmo, præcordia, ilia.

neruorumque resolutio,  
& rigor, &c.

SVB rigore omnem conuulsionis speciem intelligit; quanquam particulariter alibi rigorem Græcis τένεσος dictum vocet: oritur autem conuulsio (Galeno XII. methodi auctore) ex repletionem nervorum partium (qua ratione eos quos magna phlegmone premit adurit) vel ex ardenti & tenui humore, vel ex ingenti frigore, quod tale quippiam quale gelu efficit. Admittunt autem hæ tres conuulsionis species varias curationes: siquidem interdum per vena sectionem, aliàs per enematum infusionem, aut purgantium exhibitionem; nonnunquam etiam per vnguenta, leniendi, laxandi, & discutiendi vi prædita. Est & alia conuulsionis species quæ ex inanitione fiat, quæ magna ex parte lethalis est, neque medicas admittit manus. Sub neruorum autem resolutione aphoristicis apoplexiam intelligit; eam nimirum, quæ ex fluxu sanguinis ortum habet: nam non raro contingit, ut sanguinis multitudo antequam putrescat, in unam aliquam corporis partem confertim decumbat, & tunc eiusdem actionem penitus aboleat, aut saltem noxam hand contemnendam



nendum inferat; atque ubi in cerebrum confertim irruit, apoplexiam facit. Igitur in nervorum resolutione, ubi plenitudinis indicia fuerint, a sanguinis missione curatio aufpicienda erit. Oportet tamen in eiusmodi morbis detractionem esse moderatam, ne corpus refrigeretur, sanguisque è latere incolmio re educendus est. Ex genere quæ fances subitò strangulant, est angina, (quam ἐπὶ τῶν ἀγγείων quæ suspendia vocant, a suspendij similitudine quod non aliter quàm laqueus prefocatus interficiat, ἀγγέων nominarunt) & quoniam ea frequenter canes apprehenderentur, ἀγγέων dicere maluerunt, nonnulli quod lupis frequens esset vinum ἀγγέων appellarunt. Est autem propriè inflammatio, quæ in faucibus vel in gutture fit; atque quoniam ex cumulatâ confertim quæ facta enacuatione sanguinis animo facile desicerent, atque adeò suffocationis periculum immineret, non confertim, sed parè pluribus interpactis vicibus auferendus sanguis est. Ac proinde quemadmodum nervorum resolutione sanguinis detractione rectè curari dixi; ita aphonis eodem auxilij genere rectè medebimur, quum ex iisdem causis, & eodem principio lesio oriantur. Fiunt enim aphonis, aut, vel Celsus, subita vocis suppressiones, lesio nervorum principio, hoc est, cerebro, unde ad nervos vocales, vel alias partes vocis infernientes, materia multitudo, aut humorum qualitas defluit; atque inibi aut tensionem vehementem, vel exolutionem, & laxamentum tam nervorum, quàm musculorum vociferorum facit.

& quacunque de causa  
ruptum.

PARTIM ut materiam peccantem renellamus, ne phlegmonem pariat; partim ut inflammationem iam factam amoliamur.

Item malus corporis  
habitus.

EST quando ex longo morbo malus habitus corporis oriatur : atque hîc quidem quoniam longitudine morbi collapsæ sunt vires, non admodum accommodata erit vena

fectio. Nonnunquam etiam ex viscere in  
scirrhum indurato potissimumque hepate, &  
liene, consequitur: Interdum etiam suppres-  
sis hæmorrhoidibus, aut non probe fluentibus  
menstruis oritur: atque huius quidem gene-  
ris cachexia, ut docet Paulus, auxiliatur  
sanguinis detractio, nisi quid obstat; quæ  
paulatim, ad tertium quartumve diem pro-  
ducitur.

omnesque acuti morbi.

QVI sint acuti vehementesque morbi,  
ante definitum est: at qui sint ij qui non  
infirmiunt, sed onere grauent, inquirendum  
est; primique inter hos occurrunt, qui aut  
strangulant aut suffocant, in his enim vi-  
talis facilis non tan infirmatur, quam  
suffocatur.

Fieri tamen potest.

DVOS esse præcipuos scopos mittendi sanguinem, virium robur, morbiq; magnitudinem, diximus. Galenus videtur virium robur in acutis morbis esse sola vitali facultate æstimare: atque ita-quanquam naturalis vel animalis facultas ex functionum læsione, sibi non satis constare videretur, si tamen vnius vitalis munus integrum ex pulsu deprehenderit, virium statum satis firmum, nec debilem esse putat; atque in eo sanguinis missione audacter decernit, quod nullum vitæ discrimen ex aliarum functionum offensione impendeat, nisi hæc ipsa vitalis detrimentum acceperit. Iubet igitur, pulsui, tanquam signo minime fallaci, attendere esse de virium robore indicaturos: & si quidem imbecilliores esse pulsum contingat, morbiq; ratio sanguinis eductionem efflagitet, tum quidem est mittendus sanguis, non pro morbi magnitudine, sed virium ratione: admonendique æstantes sunt quantum periculi iam impendat si venam tundere procrastinemus; & rursus quam anceps remedium sit in sanguinis missione. verum quoniam, ut docet Galenus, satius sit anceps experiri remedium, quam nullum, constantibus viribus quantum & morbi ratio, & virium robur efflagitat, emittemus: Debili

constrà



contra existente corpore, virtutis tantum rationem habebimus; atque quantumvis morbus copiosam sanguinis missionem requirat, si pulsus parvus, obscurus debilisque, atque respiratio difficilis, parva & crebra sit, cum voce exili, & languida, que neque viro pulmonis, neque pectoris orta sit; parum, & quantum vires ferre possunt, sanguinis detrahemus.

### Sed si nullum tamen appareat.

IN peracutis simpliciter (perperacutos vocant) morbis, anceps potius remedium quam nullum experiendum esse dicit, summis enim morbis, summe exquisitè remedia optima sunt: in his etenim tardare, ut inquit Hippocrates, malum est, quod quoque Aeginetiam voluisse verisimile est, quum precipit in morborum initis usu id ipsum exigente, sanguinem nonnunquam mittendum, sola in ventriculo ciborum concoctione, aut etiam perfecta in iecinore sanguinis elaboratione facta.

### Cum sit autem minimè crudo.

IN omnibus morbis, quales quales tandem sint, si ferat occasio, à sanguinis missione temperandum est, dum ventriculus, primæque vena nulla humorum corruptela, aut cruditate, aut cibo semicotta confarcta sint; idque ne crudi adhuc cibi, aut parum rectè concocti rapiantur in venas totumque corporis habitum. Cavendum etiam est ne excrementis intestinum, aut vesica lotio distendatur: quare si quando in acutis etiam morbis (exempli causa, pleuritide) mittendus esset sanguis, atque asstrictior esset alvus, statim enemate injecto, eandem eluere solebant, atque ita protinus in ipso principio ab injecto clystere sanguinem mittere. Quam forte veterum probatissimam consuetudinem considerans, neque satis intelligens Arabs ille Avicenna, eiusque sequaces, contra Hippocratis ac Galeni mentem, in morborum omnium principiis à phlebotomia abstinendum prorsus præcepit, & concoctionem non

solum in primis venis sed dum morbus principium statumque præterierit, expectandam, atque sub id tempus tantum phlebotomiam rectè administrari posse asseruit. Dicunt enim per initia, præcisam venam noxios humores extenuare, easque per corpus quoque versum propellere, sanguinique puro, & sincero permisceri; nonnunquam etiam nos expectatione nostra adeo decipi, ut cum salubri nihil prorsus vinosi educatur: consultum igitur multo esse incisionem vene deferre, dum morbus principium ac statum præterierit. Quæ sanè est prima fronte magnum quid præ se ferre videantur; tamen si quis cum Hippocratis Galenique placitis, atque adeo cum ipsa ratione consuleret, quam sint absurda atque à ratione aliena facile consequetur: nam si, ut dixi, primus scopus sit virium robur, eo certè egrum destitui contingeret, in morbis præsertim acutis, antequam morbus principium statumque præterierit. Et si in morbis qui plethoræ subsequuntur, concoctionem, seu maturationem materis expectemus, tantum abest ut optatum finem aliquando consequamur, quum periculum sit, ne qui quantitate tantum peccabat, spatio temporis etiam qualitate molestus sit: atque sic Galenus protinus in principio in synochis antequam putrescant sanguinem demit. Nam & Hippocrates, quum morbi inchoant, si quid moue dum videtur, mouet, atque iisdem quiescentibus quierem adhibet. Male igitur post statum quiescentibus morbis, tundetur vena ex Arabum sententia, quum neque noxios humores exagitet sanguinis missio, ut asserunt (demit enim multitudinem que perturbationum & morbi causa fuerat) neque eosdem extenuet, (tenuis enim humor crasso expeditius & celerius emanat:); quare sanguinem & puriorem, & crassiorum reddi consequens est.

### At si morbi ratio patiat.

ACVTORVM morborum quum non omnino similes sint exacerbationes, neque celeriter æquè ad vigorem properet, varij etiam sunt remedium scopi; siquidem peracuti statim,



statim, hoc est ipso etiam quarto die, vel ad saltem, vel ad mortem terminantur: in his igitur prima die non expectata concoctione, trahendam venam dixi. At acuti simpliciter, & qui ex decedentia vocantur, seu, ut Hippocrates, qui in quadraginta diebus iudicantur (quum non usque adeo vehementes habeant paroxysmos, eamque calidam vehementiam) intermissionem vnius aut alterius diei facile admiserint: sed ut in longum tempus sanguinis missio differatur, non facile conceperint: præsertim qui Hippocrati, & Galeno acuti simpliciter vominantur; quod videlicet morbi magnitudinem vires cito prosternantur, quarum in sanguinis missione magna habenda ratio est. Verum in his morbis qui aut quadagesimo die indicantur, aut corporis malum habitum concomitantur, ut post quartum vena tunc non trahatur, fieri non potest ut credam: quum in his vires non tam subito prosternantur, neque sanguis tam sit vitiosus, ut confectum totius corporis miscellam corrumpat: in his etenim non raro ultra quartam etiam diem cruditatis aliqua suspicio adhuc subest. Sed & in acutis etiam morbis imperfecte indicatis, maturam sepe numero inuare expedit, aut purgatione aut vacuatione; ne quod reliquum est, in morbis, recidivam pariat. Adde quod Galenus nono methodi Therapeutice, in continuis febribus cum plethora non dierum numero sed virium robori attendendum dicat: Optimum, inquit, factum est, in huiusmodi febribus non statim numero dierum, sed virium robori attentum esse; quippe quod si servatum est, non solum sexto, septimove, sed etiam sequentibus diebus est mittendus sanguis.

### Quod si vehemens febris urget.

UT vniuersalium temporum, ita etiam particularium, & dierum quibus morbi recurrant, delectum habendum docet: idque in his potissimum morbis, quorum certa est remissio vel intermissio; nam in accessionibus a vacuationibus omnino temperandum est, quod humores sub id tempus maxime estner,

incidenter, ac perturbati permisceantur, omnes etiam vacuationes vires lacestant: quare vix tuto in paroxysmorum agitatione obiri possunt. Videant igitur quam obseruent methodum Therapeutice, qui statim ante febrium accessionem mittendum sanguinem (multiplici sua experientia edocti ut dicunt) astruunt, atque hinc discant quam sit mancum citra rationem experimentum.

### Fere etiam ista medicina.

IAM de iterata aut repetita sanguinis missione sermonem facit: hic igitur, ut Galenus docet, obervandum id est, ut in quibus vacuare simpliciter mens sit, eadem die reiterata detractio fiat: in quibus contra reuelere præstat, ut post duos dies fiat: & quibus quidem multa opus est euacuatione, vires autem non sunt fortes, in his vacuationem reservare oporteat, & prima detractio defectu nosse facta, rursus iterato detrudere, aut si velis tertium.

### Quod si in cura quoque aquæ.

QUAMVIS Celsus sequente libro in cura hydropis vena sectionis nullam faciat mentionem; Galenus tamen tum alibi, tum libro De sanguinis missione adversus Erasistratum, consultationem & aquam inter cutem sanguinis missione se subtrahere curasse dicit; idque, ubi vitium originem traxerit, a mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis. Sic Hippocrates sanguinem euacuare præcipit, siue in tremorem, siue in aquam inter cutem, siue aliud quodvis frigidum vitium, aut vir ex hæmorrhoidum suppressione, aut mulier ex mensum retentione inciderit. Caterum hic aliud longè curandi genus intellexisse indicant, tantum abest ut de hac hydropum curatione Celsum locutum existimem. Nam hydropum opus erat trahere aquam inter cutem sanguinis missionem efflagitare, quum ante malum corporis habitum, cuius illa fere comes est, idem remedium requirere pronuntiavit? Quocirca hæc mihi videtur sententia, quod quemadmodum aquam inter cutem (quantumvis aliena sit natura nostra)

Y 3



stra) neque medicamentis elicientibus, neque chirurgi opera confertim unoque impetu citra acri discrimen educimus; ita sanguinem qui naturæ nostræ familiaris est, & in quo nativus calor habitat, non tam precipitanter atque confertim exhauriri æquum est: sed, ut antè diximus, reuerenda est detractio. Quò fortè respiciens Arabs Auenennas, in synochi principio etiam constanter viribus parce sanguinem mittit; post statum autem copiosius eundem educit, non contentus Hippocratis & Galeni dogmatibus, qui in huiusmodi statim ad animi deliquium mittunt, in principiis enim morborum vires adhuc probe sibi constant, quæ sensum tum morbi sentitia, tum materię peccantis pondere labascunt. Sanguinis igitur missione ad lipothymiam usque facta facultas vitalis aliquantum licet lesa videatur; natura tamen noxiarum humorum pondere expedita (quæ veluti sarcina premebatur) priores vires facile recuperabit, & quicquid spiritibus, & immato calori detractum est, resarcit. Quare verisimile quoque est, Celsum, hic neque de synochis neque continuis ardentibus locutum esse, sed de iis tantum morbis in quibus vires imbecilliores sunt, & quibus non imminet maius periculum ex sanguinis abundantia, quam animi deliquio. Nam & Galenus ipse confertim factas evacuationes cauendas docet; nec nisi magna urgente necessitate obeundas esse.

**Mitti verò is debet,  
si totius.**

IN venarum incisione delectum habendum docet: sunt enim hæc varia, & multiplices. Si igitur totius corporis causa fiat phlebotomia, rescanda sunt vena brachij, quod nimirum ampliores sunt. Exit autem hic opere precium explicasse, cuius nam brachij vena tundenda sit, pro plenitudinis corporis grauantis differentia. Plenitudinem igitur, cui nulla partis affectio asistit, unaquælibet citra delectum incisa vena curat, modo illius angustia fluxum non remouetur: & quoniam rationi omnino consentaneum est, in vasorum omnium plenitudine, illinc plu-

rimum exhaurire, ubi fons, & origo humorum est, commodissime præcideretur vena cubiti dextera interior; validissime enim ea, & à cava dicta vena, & à iecore attrahit. Quòd si plenitudo etiam bilioso humore labefacteretur, eadem quoque rescanda erit, quemadmodum si melancholico sinistri brachij interior, idq; respectu habito ad lienem.

**si partis alicuius ex ea  
ipsa parte.**

QUANQUAM locus hic multa de reuulsione quæ ex directo, aut quæ in contrarium fiat, flagitet; tamen quoniam de iis ab aliis satis superque dictum est, paucis quid Celsus noster voluerit, & quid sentiamus, enarrabimus. Est igitur reuulsio procumbentis, & illabentis humoris tractus in contrarium: Contraria autem vocamus quæ in eodem genere plurimum distant; sitque contraria dicimus, quæ vnus & eiusdem recta linea extrema tenent, ad quæ & motus facti; contrarij nomine insigniuntur. Ea igitur quæ in eiusdem venæ processu recto quàm longissime distita sunt, contraria vocantur. sic plenitudo dextre, nequaquam contrarium esse censemus latius sinistrum; quum è dextro latere nulla vena rectis fibris in sinistrum procedat: atque hoc est quod tum Hippocrates, tum Galenus passim inculcant, qui non solum in dextra plenitudo, sed iecoris etiam inflammatione interiorem dexteri cubiti venam rescant: quæ si fortè non compareat, mediani aperiunt; & si neque hæc sese proferat, ad humeralem confugere malunt, quàm ad interiorem diuersi brachij, quum tamen, ut antè diximus, iecori venæ omnes societate inungantur, tantam scilicet vim attribuunt reuulsioni quæ è directo lateri affecto sit. Nam reuulsio, ait Galenus, è directo facta euidentis subsidium celeriter affert; at è transuerso nequaquam: nam quæ in aduersa parte obitur, tantum abest ut morbum adimat, sed noxium humorem in inflammata parte relinquit, vel puro venarum sanguini permiscet, aut (quod frequentissime contingit) aduersæ partis plenitudinem



videm iniebit. Verum quod auctor noster dicit quàm longissimè sanguinè mittendum esse, inde ubi lædit, intelligendum est omnia contraria verè longinqua esse, neque solum extrema extremis, sed media mediis, & extrema mediis opponi. quo fit ut si reuellendo vacuare voluerimus, liceat omnem in directo cursu venā refecare; alias quidem in extremis, alias circa mediū, alias propinquo, alias distante loco. Sic Hippocrates libro De ossium natura, Operam, inquit, dare oportet, ut quàm longissimè a locis ubi dolores fieri solent, ac sanguis colligi, venam secemus; sic enim minimè mutatio magna de repente fiet, & consuetudinem transuleris, ut ne amplius in eundem locum colligatur. Atque hæc quidem in parvis leuibusque inflammationibus, locum aliquo modo habere possint: atqui ubi acris & vehemens inflammatio molesta est, è directo ampla vena loco vicino rufa citius & valentius à loco affecto & retrahit, & vacuat; ut quæ quàm maxime distante præcisa vena sit reuulsio, noxium humorem ignauius tardiusque concitat, neque affectam sedem ab hoc liberat, aut cerè benigni sanguinis exuperantiam primum tollit, vitiosam autem materiam è propria sede raptam cum salubri vilique permiscet. Neque dubito Hippocratem, & Galenum passim inculcare reuulsionem ad longinqua fieri debere: verum iidem præcipiunt habendam rationem magnitudinis phlegmones: nam celer & ingens humorum fluxio, præcepit remedium flagitat, quod per humorum antispasum in propinquam partem suggeritur. Parua verò ac tarda, longiorem curationis moram sine noxa sustinet, qualis ea fuit cuius ex Hippocrate memini.

### Videtur tamen vsus ipse docuisse.

**AVERSIONIS** varios modos declarat, capite confracto ex brachio sanguinem mittendum docens; naribus sanguinis fluore laborantibus, brachij è directo lateri affecto correspondenti incisam venam plurimum conferre: seruanda enim est, ut docet Aëtius,

in enacuando locorum affinitas, rectitudine fibrarum obseruata. At quod subiungit quod humero affecto, vsus docuerit in alio brachio mittendum sanguinem, quod iniuria oportunior sit; ut in sideratis locum habet atque resolutis, ita in aliis non semper.

### Mittere autem sanguinem.

**IAM** quæ in vene sectione chæurgo cauenda sunt explicat: neq. enim citra omne periculum inciduntur; quum vena aut arteria inuncta sint aut nervi subiaceant. sub interiore enim, quæ basilica dicitur, fere comes arteria delitescit; & sub mediâ nervus: virisque autem fere musculorum tendones subternuntur. Cephalica licet difficilior sit, omnium tamen solet esse tutissima. Ex nervo igitur, aut tendone puncto, dolor ingens, stupor, & resolutio, & brachij conuulsio cum tumore eueniunt: atque huius quidem suspicio si qua fuerit, vulnus ne coalescat inhibetur, dum ab impendente phlegmone vindicatum fuerit, & dies duo tresve intercesserint: id autem commodissimè fiet foris repentis olei. Arteria autem aperta sanguis emanat tenuis rubicundus, igneus & quasi pulsu quodam exiliens; egrèque compescitur, illiusque magna vi effusa, sequitur virium exolutio.

### At si timidè scalpellus demittitur.

**QUONIAM** Ioannes Fernellius libro De vacuandi ratione, plurima quæ ad locum hunc & alios nonnullos facere videbantur, doctissimè simul & clarissimè explicat; eius non solum sententias, sed & periodos integras ascribere libuit, idque semel commonescere placuit, ne illum suo defraudemus honore: Chæurgus igitur ut probe venam secet, scalpellum habeat, cuius mucro sit acerrimus, quem visu perspicaci, manique valida summis digitis apprehendet, nec plus mucronis proferet, quàm ad penetrandum sit satis, manu altera membrum, eiusque pollice venam stabiliet, seu sim nullaque festinatione, quod satis est, suauiter impellens. Arme autem



autem conficiuntur, dum incallescant, & proxime supraque enim locum in quem scalpellus adigerit artius vinciatur, ut sanguine collecto, vena tumens in conspectu se det. Infra quoque alligari mos non minus quam est, quod tremula inconstansque vena ad phlebotomi quemvis impulsum refugit, aut e sede sua profilit. His autem quibus angusta vena sunt, aut in alium demersa, & quibus cutis densa est, multo artius vinculum iniicitur, quam in qui contraria constitutione sunt. Si autem vena lateant, ut docet Celsus, aut non facile reperiuntur, manus, aut pedes, si eo loci secare animus sit, in calentem aquam demittimus: & si ne sic quidem sese prodant, eam, quo loco esse solet, digiti impulsu percontabimur, dum sanguinis affluxu illius exploretur sedes; adeo facile est perito venam secare.

### Incidenda ad medium vena est.

QUVM sint tres sectionis figura, transversa, recta non pungens, sed findens venam in directum, & inter has media quae appellatur obliqua; sufficit Celso dixisse venas in medio incidendas. Transversa igitur videntur est in quibus detractionem omnino reperere non volumus, incurvato enim cubito oscula fissura componuntur: & commoda est hac incisio ubi magnam fissuram facere voluerimus. Obliqua autem fissura utilis est, in quibus retractio repetenda est, & eo quod a vase non aberramus dum sic secamus; sed etiam sanguinis eiectio ex obliqua fissura pulchrior est aspectu videntibus, dum velut obtorquetur & obvolvitur sanguis in saltu. Oblonga vero in directum fissura, commoda est his in quibus non solum eadem die sectionem reiteramus; sed etiam post unum aut duos dies. incurvato enim cubito disparantur oscula fissurae. Commoda est etiam fissura in directum his in quibus praenavatio labiorum solet fieri. Vena igitur quae in articulis, in brachij flexu, in poplite extant, in rectum diffusa tardius coalescunt, quod articulorum frequenti agitatione, vulnusculi labra quodammodo debis-

cant: verum quae extra articulos sunt venae, ut in capite, in pedibus, in manibus, diversam secandi rationem efflagitant, ut quae in rectum fissae, cicatricem celerius admittant; labra enim semper inter se coeunt. Rursus, quod ad sectionis modum atinet, si crassus aut viscosus sanguis, qualis melancholicis inesse putabitur, aut si aeris constitutio frigida sit, ampla, si tenuis & aquosus sanguis fuerit, aut ipsa calis constitutio calida, angustior tamen demum fissura fiet. Ceterum iam erumpente sanguine, qualitas eius statim consideranda est: nam si omnibus partibus probe sibi constet, cohibendus fluxus erit; talis autem est qui nec crassus, nec niger, sed rubens ac pellucidus sit. At si vitiosus is est qui effluit sanguis, praesertim si virium robur (quod ex pulsus facile deprehenditur) atque phlegmone adsit, si aeger etate vigeat, ac aeris constitutio sit temperata, sanguinis immutatio est expectanda; siquidem mutatio index est sanguinem ex inflammata sede, in qua is est a reliquo dispar, evelli. In iis tamen quibus imbecilliores vires sunt, nec tantam vacationem quam coloris sanguinis mutatio sequitur, ferre possunt; & quibus phlegmone adeo maligna est, ut de sanguinis mutatione nihil concedat, non erit expectanda sanguinis mutatio: sed quum alij scopi sint sistendi sanguinem, ut docet Galenus, libro De sanguinis missione, illis attentum medicum esse oportet: nam si sanguis minore impetu quam antea ferebatur, effluat, signum est iam satis esse detractum. Signo autem quod ex pulsuum immutatione sumitur, maxime attendendum monet Galenus, quod nequaquam mendaci indicio, confestim quiescendum a sanguinis detractione, ubi vel in magnitudine, vel in quantis inaequalitate is mutatus fuerit, indicet.

### Semperque ante finis faciendus est.

QUOD si simpliciter ad animi deliquium, non mittendum sanguinem dicat, non video qui excusari possit: verum si ita intelligamus, ut aegro debiliore existente, finis mittendi sanguinem faciendus sit ante lipothy-



lipothymiam, cum Galeni, & Hippocratis theaematis omnino conveniet. Nam, ut in Aphorismis Hippocrates, ubi ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si aeger possit tolerare. Sic Galenus nono Methodi, Aufero, inquit, sanguinem de industria ab homine quoad animo linquatur. Convenit autem eiusmodi evacuatio, ut ante contra Auicennam diximus, in continentibus, & ardentissimis febribus; idque si vires consent: quare in iis in principio veni-  
tundenda est, quod vires adhuc integre sint. Phlebotomia enim statim ad animi usque deliquium facta, refrigeratur totius corporis habitus, & febres extinguuntur, & plurimis etiam aliis citatur, & bilis enomitur: quas res statim a toto corpore madores sudoresve excipiunt. Sic Galenus libro nono Methodi, Eorum, inquit, qui ex sola obstru-  
tione febricitant, nemo in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinem miserat: quin ubi valida virtus est, & aetas permittit, usque ad animi defectum mittere expedit; ubi horum alterum non satis respondet, tutius est quantum visum satis fuerit, tantum principio detrachere, quod defuit, iteratione supplere: etenim hoc praesidio omisso, qui ita febricitant, in summum discrimen veniunt, nisi eos vel virium robur, vel largum sanguinis profusum, vel sudor copiosus ex manifesta pernicie eripiat. Sic quoque Galenus in carbunculis (sunt enim febre coniuncti febribus) idem remedium experitur, quod corpus in contrarium statum celerrime agatur, sanguinis missione ad lipothymiam refrigeratum. Neque dubito hoc & alia medica-  
menta eiusmodi esse facultate praedita, ut si eis immoderate aut intempestive utaris, vi-  
tam adimant: siquidem, ut Galenus nono Methodi ait, in sanguinis missione, (quam usque ad animi defectionem faciendam paulo ante diximus, quod flamma in continentibus ex meatuum clausura in febribus extingue-  
retur) non paruum merito subsequitur incommodum, nisi opportuno tempore, aut debita mensura fiat: si namque abundantia paulo viribus superior fuerit, utique ex mo-  
deratione adeo nullum accedet viribus in-

commodum, ut etiam maximum compare-  
tur commodum, quod eas premebat sublato. In quo affectus sanetur multa vacatione est opus, resoluatur autem ex tanta inanitione virtus, non modo rursus homini non prodi-  
derit, sed maximum etiam illi afferet pericu-  
lum. Igitur in febribus aut aliis morbis qui ex corruptela humorum incidunt, quanquam id quod corruptum est, a natura omnino alienum sit, & se auferendum dicitur, si ta-  
men corruptela illa cum virium imbecilli-  
tate sit, paulatim quod vitiosum est evacua-  
bimus, sensumque pro eo quod salubre est re-  
ponemus; siquidem immodicas aut quae con-  
fertim sunt vacationes, aut purgationes vires imbecille non ferunt. In eiusmodi igitur morbis, in quibus quod affectus reme-  
dium est, cum virtutis custodia pugnat, Celsus vacationes modoratas praecipit, & quae ad animi usque deliquium non fiant: nam & Galenus ipse has vacationes con-  
fertim factas vitandas ac fugiendas monet, nisi magna quadam necessitas ut id faciamus inbeat. Quin etiam revulsio ipsa non leue existens auxilium per sanguinis quoque mis-  
sionem saepius factam, quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficacior fit. Ita enim natura toties irritata per particulares has detractiones sanguinis quae ad partem male affectam con-  
fluunt, maiore cum impetu in contrarium locum reponere, ac retrudere assuescit, ut hoc nomine necesse sit, auersionem quae per sanguinis missionem saepe iteratam sit, multo esse praestantior, quam eam quae conser-  
tim fieri solet.

### Ideoque protinus brachium.

SANGVINE, ut morbi magnitudo & vires aegroti ferebant, misso, vinculum solven-  
dum est, vulnusque excicandum, ne concre-  
cente sanguine, madens, aut non coalescat, aut abscessus metum inferat. Detersum vul-  
nus linteis obsignandum, vel rosaceo, vel dulci aqua imbuto, aut etiam oleo si fundere san-  
guinem iterum consilium sit, fasciisque linteum deninciendum, quae nec arctiores sint, nec cutim vulnerisque labra distorqueant.

Z

CAPVT



*De sanguinis detractiōe per cucurbitulas.*

**C**UCURBITULARVM verò duo genera sunt, æneum, & corneum. Aenea altera parte patet, altera clausa est. Cornea altera parte æquè patens, altera foramen habet exiguum. In æneam linamentum ardens conijcitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturque, donec inhæreat. Cornea per se corpori imponitur, deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superq. cera cauum id clausum est, æquè inhærescit. Vtraque non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet alio rectè fit. At si cætera defecerunt, caliculus quoque aut pultarius oris compressioris, ei rei commodè aptatur. Vbi inhæsit, si concisa antè scalpello cutis est, sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Ergo ubi materia quæ intus est lædit, illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet. Vfus autem cucurbitulæ præcipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quæ iam læsa est, esse mittendum, quod nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eò auertit, sed ei ipsi quæ dolet quæque liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis, \* quamuis & ijs iam spatium aliquod accessit, siue corrupta materia, siue spiritu malè habente. In acutis quoque quibusdam, si & leuari corpus debet, & ex vena sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idque auxilium vt minus vehemens, ita magis tutum. Neque vnquam periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceptis periculum est, \* aut si in parte corporis etiam vitium est, huc potius confugiendum est. Cum eo tamen, vt sciamus, hinc vt nullum periculum, ita leuius præsidium esse, nec posse vehementi malo, nisi æquè vehemens auxilium succurrere.

\* aliàs,  
quāmus  
etiam spa-  
tium

\* & si in  
nobili p.

ENAR-



## ENARRATIO.

**D**VO antiquis cucurbitularum genera fuisse tradit Celsus; eorum unum, alterum corneum: neque ex his tantum materia generibus, sed & ex alio quouis recte constari. nam vitreas commenti sunt; idque ideo ut sanguinis qui euacuatur qualitas, & quantitas in euacuando pellisceret: sed haec quum flammam copiosorem non sustineant, aeneis longe sunt inefficaces. Argenteorum quoque usus aliquando fuit: sed quoniam vehementius igneuntur, reiecit antiquitas. De figura earundem ne attigit quidem Celsus, quum tamen eadem plurimum inter se differant; & praesertim aeneae, ut auctor est Oribasius. Altiores enim, ut inquit, magis quam humiliores trahunt; quaeque humiliores sunt, quia non vehementer attrahunt, capiti sunt accommodatiores: Quae habent plana labia, corporibus latis; quarum labia resina sunt, corporibus curvis & gracilibus aptius accommodantur: Quae acutum os habent, iis conueniunt, in quibus non scarificamus, sed vehementi impositione cucurbitularum, quas leues affigimus, attrahere volumus, quum acumen labiorum ad violentum attractum faciat. quae labra habent obtusa, cum in aliis, tum vel maxime in capite utimur. At quoties admoturi sumus cucurbitulas particula in reatum figuratae, ex latere eandem affigimus; si enim (ut docet Paulus ex Aegina medicus) iacentibus ipsis desuper linamentum cum flamma ex lucerna inducamus; ex cute decedit illa, graniter adurit, usu hoc ipsum postulante.

### Cornea per se corpori imponitur.

**CORNEARVM** usus summe commendabatur, ubi excitationis subesset periculum: siquidem quantumvis aeneis minus trahant, vicinas tamen partes non exurunt, vel quoties vix anelli posse sufficio esset, ut in capite, aut si timidior sit patiens, nec flammam sustinere possit, cui affigenda sit.

### Vbi inhæsit.

**AFFIGVNTVR** cucurbitula, aut cum scarificatione, aut sine eadem, sed quæ citra scarificatum applicatur, aut cum igne, ut dixi, admonetur, aut cum aqua tepida, in qua decocta sint herba emollientes: atque huiusmodi in plenitudine summe commendabatur antiquitus, quod & spiritus citra noxam attraheret, & poros laxiores redderet.

### Ergo vbi materia quæ intus est lædit.

**SCARIFICAMVS**, ut docet Galenus, partes corporis aut phlegmone vexatas, aut fluxione, quæ iam firmata est, tentatas, aut tensas, aut induratas, aut dolore aliquo gravatas, aut ubi materiam ex aliis partibus in alias traducere volumus. Hic autem subiungere locus postulat, quantam diligentiam veteres illi, in divisionum mensura, & qualitate, & ordine obseruauerint; nam pro loci affecti varietate, divisionum discrimina variabant: siquidem cruribus, dorso, abdomini, thoraci, cernici, per rectitudinem scarificabant; at in capite pro situ capillorum, in fronte obliquas faciebant. Præterea partes quæ scarificanda erant, prius lauabant, si modo fieri posset; sin minus, aqua tepida perfundebant, usque dum rubescerent: aut spongiis aliqui fovebant, & si quando à carnosissimis partibus detractione molirentur, primum cutim scalpello exasperabant, ita ut incisiones æquales inter sese magnitudine, atque æqualia essent quæ inter eas sunt interstalla, initium scarificationis ab inferioribus partibus semper summentes, deinde cucurbitam imponentes: At si excarnis esset, lenem prius cucurbitulam affigebant, atque ubi in tumorem particula elenata esset, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodabant, ac pro quantitate materia quam euacuare cogitabant, divisiones paucas, aut multas faciebant. Hodie contra nulla horum ratione habita, carnosissimæ ac excarnissimæ partibus ante scarificationem



tionem cucurbitulas affigimus, neque quasuis tantum, sed eas solum quæ magnitudine reliquas excellunt, idq; cum uberiore flamma, ut quàm plurimum noxi aut humoris aut spiritus peccantis ad se trahant. Alij exaetiorem quandam methodum sibi pollicentes, prius admovent scyas; in ablatis in tumorem loca redacta circumspiciunt; ac si quæ sint quæ colore aliquo extraneo varient, aut aliqui admodum extuberent, scalpello cutim exasperant; sin minus, contra. Terminum autem diuisionum moderate altitudinis solum cutis crassitiem statuunt. Igitur quæ cum scarificati adhibentur cucurbitula, efficacius humores, & spiritus per halium egerunt, sensibilibus ea quæ nocent ex alto elicientes: nam non modò sanguinem, sed & alios quoque humores vacuant, præsertim cum flamma copiosiore glutinata.

#### vbi inflatio, hoc imponi solet.

LEVIS cucurbitula, inquit Paulus, inflatione discuit, distillationes in stomachum suspendit, sanguinem extrahit, & profluentem rursus sistit, obiectis partibus admota; & quod aliè conditum est, in summa rursus educit. Celsus inflationibus tantum imponi dicit, quòd videlicet his ten præsentissimum remedium adhibeantur, quemadmodum docet Galenus Therapeutices XI. libro, dicit autem: Dolor qui spiritum flatuosum comitatur, propriam quandam curationem sortitur est ex cucurbitula cum flamma copiosa multoties admota, videbiturque præsidium hoc in huiusmodi morbis incantamenti cuiuspiam quid simile efficere, siue in intestinis, siue in quavis corporis particula sine excitati, illico enim cucurbitula admota qui spiritus flatuoso cruciantur, tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur.

#### Vfus autem cucurbitulae præcipuus.

QUIBUS affectibus cucurbitula rectè adhibeantur, Celsus dixisse sufficit: at quo tempore eandem vsum conueniat, subiicit, vel quod clariùs putauit quàm ut dici de-

beat, vniuersalia dicta remedia anteire particularia, vel quòd sientes adhuc morbos, ut loquitur Galenus, intellexerit, in quibus non expectata purgatione cucurbitulas ad reuolendum adhibemus; vsum enim earum est, mouere aliquid, agitare, & foras euocare.

#### Opus etiam esse cucurbitula.

LONGIS æquè ac acutis morbis scarificationem prodesse dicit: sic Galenus diuturnis oculorum fluxionibus vexatis conuenire, & capitis affectibus, malisque thoraci & dorso accidentibus rectè applicari auctor est: sic hæmorrhoidibus, mensibusque suppressis subuenit, fluxionem à partibus nobilioribus ad ignobiliores derivans.

#### In acutis quoque quibusdam.

Huius generis sunt angina, quòd humores sensum eliciat, ac euacuet, atque eadem ratione pleuritis (ubi videlicet locus affectus humorum fluxione iam non amplius grauetur, corpusque ritè purgatum est) in hypochondriis rectè adhibentur; ac si res exigat, sæpiùs reiteranda erunt.

#### & ex vena sanguinem mitti, vires.

VIDETUR Celsus cucurbitularum vsum omnino periculo liberum pronnari; quum tamen Aëcius longè aliter sentire videatur, præsertim si ante totius corporis euacuationem fiat. Dicit autem in hunc modum: Illud porro nosse expedit, quòd non solum localis venæ sectio detrimento est, antequam vniuersum corpus euacuetur, per affectas partes sanguinem detrahens; sed etiam cucurbitula. Et venæ quidem sectio minis periculosa est; pro ratione enim allationis materie, etiam sanguinis excretionem facit: cucurbitula verò tum impetu affixionis violenter materiam attrahens, tum multum locum occupans, & tamen neque vasis sensibilem fissuram faciens, attrahit quidem memorabilem materiam, non euacuat autè pro ratione attracta; & præcordiis



& prae cordis quidem intempestivè affixa, praesertim in continetibus febribus, & semitertianis, & maximè etiam si mens agri fuerit turbata, & sensus sit obtusus, strangulatum & mortem eadem die inducit. Capiti vero intempestivè admodum, leihargos, & corporis & mentis stuporem, & oculos procius facit; quibus autem contigerit ut haec effugiant, hi omnino in diuturnum aliquem capitis affectum hinc incidunt. Hactenus ille, neque ab hoc dissonat canon Anicenna, qui sensum & intellectum hebetari dicit, si sinapiti adhibeantur; si occipitio, obliuionem inducere. Verum etsi haec quammaximè sic se habeant; tamen si ignobilioribus partibus affigantur, ut ferè fieri assolet, sanguinis missione periculi minus afferunt; praesertim ubi plethora aliqua morbi suspicionem nobis infert, neque viscera, quae in toto corpore insunt, vasa immoderatè re-

pleta sunt, neque distendantur, tum enim periculum id quod à nimia attractione metuendum dicit Aetius, facile subterfugimus: ac in iis quoque qui ex virium imbecillitate phlebotomiam non admittunt, tutiores sunt cucurbita, ut rectè infert Celsus, aut aliqui si saepe in anno reiteranda sit phlebotomia, quod cum sanguine copioso, & vena vitalis excernatur spiritus, eo autem copiosius exhausto, vniuersa corporis moles refrigeretur, omniaque munia naturalia deterius obeantur. Si quando tamen necessitas urgeat, ut non ignobilioribus, sed principalibus, aut nervosis aliqui quae facile contraherentur, aut conuellerentur partibus affigenda sint cucurbitula, reputa capiti, hypochondriis &c. tunc damnum, ut noxam omnem, quoad fieri potest, evitemus, cornu affigimus; ex eis enim ore sugentes trahimus, unde & minor quoque earum est attractio.

## CAPVT XII.

## De Deiectione.

**D**EIECTIONEM autem antiqui varijs medicamentis, crebraque alui ductione in omnibus ferè morbis moliebantur, dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam æris, quam *λεπιδόχαλον* Græci vocant, aut lactucæ marinæ lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat, aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, cuique salis paulum adijciebant, decoquebantque id, & sublatis his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum ferè lædunt. Ideoque omnibus cathartice aloë miscenda est. Aluus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmit. Ergo nunquam in aduersa valetudine medicamentum eius rei causa rectè datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut iis quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est eius rei causa cibos, potionesque assumere, qui



qui simul & alant, & ventrem molliant. Suntque valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio conuenit. Plerunque vero aluus \* potius \* potionibus ducenda est, quod ab Asclepiade quoque sic \* temperatum, ut tamen seruatum sit, video plerunque seculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus videtur, aptissima: ut neque \* sæpe ea medicina tentetur, & tamen semel sumptum vel bis non omittatur. Si caput graue est: si oculi caligant: si morbus maioris intestini est, quod Græci κώλον nominant: si in imo ventre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachum quædam biliosa concurrunt, vel etiam pituita eò se, humôrve aliquis aquæ similis confert: si spiritus difficilius redditur: si nihil per se venter excernit, utique si iuxta quoque stercus est, & intus remanet: aut si stercoreis odorem, nihil deiiciens, æger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excernitur: aut si prima inedia febrem non sustulit: aut si sanguinem mitti, cum opus sit, vires non patiuntur, tempusve eius rei præterijt: aut si multum ante morbum aliquis \* potauit: aut si is qui sæpe vel sponte, vel casu purgatus est, subito habet aluum suppressam. Seruanda verò illa sunt, ne ante diem tertium ducatur, ne vlla cruditate substante, ne in corpore infirmo, \* diuque in aduersa valetudine exhausto, ne in eo, cui satis aluus reddit quotidie, quæ eam liquidam habeat, ne in ipso accessionis impetu, quia quod tum infusum est, aluo continetur, regestumque in caput, multo grauius periculum efficit. Prædie verò abstinere debet æger, ut aptus tali curationi sit. Eodem die ante aliquot horas aquam calidam bibere, ut superiores eius partes madescant, tum \* deiicienda aluus est, si leui medicina contenti sumus, pura aqua: si paulò valentiori, mulla: si leni, ex aqua, in qua scœnum Græcum, vel prisana, vel malua decocta sit. Si reprimendi causa, ex verbenis. Acris autem est marina aqua, vel alia sale adiecto, atque utraque decocta commodior est. Acrior fit adiecto vel oleo, vel nitro, vel inelle quoque. Si acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neque calidum, ne alterutro modo lædat.

Cùm



Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in letulo debet æger, nec primæ cupiditati deiectionis protinus cedere. Vbi necesse est, tum demum \* desidere. Fereque \*residere. eo modo dempta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum \* molliat. Cum verò quoties res coëgit, desiden- \* tollit. do aliquis se exhaust, paulisper debet conquiescere, & ne vires deficiant, utique eo die cibum assumere: qui plenior an exiguus sit dandus, ex ratione eius accessionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

## ENARRATIO.

PRISCIS illis antiquisque medicis mos fuit in omnibus ferè morbis quales quales tandem essent seu cacochymiam, seu plethoram subsequerentur, alium medicamento purgante sollicitare; idq; variis, iisq; vehementissimis, medicamentis, quæ non citra virium iacturam exhibebantur. Nam si quod malum in metu esset, statim ad helleboros, iithymallos, scammonium, idque citra ullam commisionem, concurrebant; & si non pro voto fluere alius (quod aut ob ægrotantis hominis proprietatem naturæ, aut ob sterus densatum, atque in intestino aliquo exiccatum, aut natura ad urinam vergente, impediensque medicamenti purgantis operationem, accidere solet) tum demum variis medicamentorum modis, eandem sollicitabant; ut puta enematis, glandibus, epitheimatis, oleis & inunctionibus, quæ omnia Celsus noster præterit, solarum purgationum & enematum mentionem faciens. Verum quoniam in omnibus morbis adhiberi solitam dicit purgationem, quamvis paulo post enarret, qui morbi eandem requirant, breuibus tamen ante capitis enarrationem perstringemus purgandi alium scopos. Utimur igitur purgatorio medicamento ad corporis temperamentum transmutandum, ut in diuturnis febribus, quartanis & quotidianis, insania, lepra, scabie, & similibus; præterea materie remouende causa, ut in cephalæa, vertigine, comitiali morbo, podagra, nephritide,

arthritide; adhuc ad fluxiones, assiduas cohibendas, ut si aures, os, nares, oculos, stomachum, aut totam corporis superficiem infestauerint, neque reficentur ab aliis auxiliis aut alia quauis ratione fisti possint. Damus etiam medicamenta purgantia, ad antiquas affectiones amouendas, atque expurgandas, quemadmodum in atrophæa, sideratione, torpore, sopore, & in summa ad circumscriptum, & infestantem humorem educendum, ut in aqua inter cutem, & regio morbo. Verum ut quis medicamento purgante tunc uti possit, requiritur, non secus ac in sanguinis missione, virium robur: quare nec senes, nec pueri, quum eorum substantia ocysimè dissoluitur, commodè purgationem tolerabunt. sed neque calidis temporibus tunc eadem adhibetur, quod tum calor innatus, atque adeo virtus insita dissoluitur; sub Cane enim & ante Canem (ut ait Hippocrates) difficiles sunt medicationes.

dabantque aut nigrum  
veratrum.

DVÆ sunt hellebori species: alter enim albus est, alter niger; vterque, ut auctor est Galenus, extergentis & calefacientis facultatis; hic autem gustu calidior, ille amarior: suntq; in tertio ordine excalefacientium, & desiccantium. Albus, ut ait Dioscorides, vomitione varios protrahit humores; de quo in sequentibus latius: Niger contra, teste Aetio,

arrani



atram flammamque bilem ex toto corpore attrahit, ac infernè citra molestiam expurgat, quapropter febrientibus etiam per circuitum, & diu ipsum exhibuit. Datur & furiosis & hemicranicis, & diuturno capitis dolore afflictis; in quibus laborantiū maximo commodo & nos quoque usi sumus. Maxime verò idoneus est visceribus, aut utero, si purgatorio medicamento opus habent, Melampodi cognomen sortitus est, quod Melampus Amithaonis filius, furens Præti filias hoc purgasse dicatur: Dioscorides phlegmagogum dicit, adiecto scammonio: Mesues sanguinem etiam puriorem reddere testatur, attrahendo scilicet è venis excrementa sanguini mixta, non à solis cavitatibus partium, sed à toto corpore, ac etiam remotis partibus, & cuncte ipsa. nam & Manardus quoque hominum memoria doctissimus, ac celeberrimus medicus, veratri nigri ꝑ. i. exhibuit, cum scammonij preparati (dactydiū nominant) grannis 2. minusque & lenius purgare dicit; quam iusta dosi catapotiū quæ aggregatū vocant: Albo usus non est; ex Italis tamen robustos posse ferre putat. Mesues cerè nigrum albo salubrius dicit: nam & album (inquit) terribilia minatur symptomata; nigrum contrà incolume, & velut inuenile corpus tuerit. & quum omnium consensu nigrum exhibendum dicat, robustis tantum & animosis verno tempore, id quod natura & arte correctum sit, propinat; atque in iis & temperamentum melius, & probatiores mores, & inueniliū florentiusque corpus pollicetur. Acrius diuersimodè exhiberi solitum veratrum auctor est: alij enim decoctum veratri dabant; alij cremorem, alij ipsam eius substantiam, & alij sercipe in ramenta confectum ipsum exhibebant, alique tritum & cribratum, idq; pro virum, ætatis ac morbi ratione. nam quibus vires imbecilliores erant, ut pueri, & senes, & quibus morbus facile solubilis esset, cremorem in quo materatum esset veratrum, dabant; & qui maiori molimine, ac exagitatione opus haberent, & qui confidentiores robustioreque essent, ramenta concisa dabant. Hippocrates pleniticos quoties infer-

nas partes dolor infestaret, hellebero purgat; quandoque helleborum per se, interim etiam peplio admixtum prebens, atque eiusdem usum summopere commendauit. Hodie arte chemica veratrum extrahunt: cognique in crassiusculum succum; idque variis excoctis modis, ex quo paucillum veluti ꝑ. 3. plus aut minus pro extractionis ipsius intentione ex iure aliquo, aut vino albo maximo cum successu propinant.

### aut filiculam aut squamam æris.

PER filiculam, polypodium seu ἀρρόπητιον hic cum Plinio Naturalis historiae libro XXVI. cap. octauo, non ἀρρόπητιον intellexero; siquidem polypodium, teste Dioscoride, purgandi vim habet, humores lentos ac crassos terget, digerit, siccit, bilem atram & pituitam, vel crassam, vel lentam purgat; etiam à iuncturis: affectionibus ob hoc melancholicis prodest, ut quartanis; præsertim cum mulla, teste Mesueo, aut cum epithymo, etiam colico dolori, & splenis duriciei quouis modo usurpatum. Verum hic admonitum oportuit lectorem, alterius longè fuisse facultatis, Græcorum polypodium, quod ἀζύ ad aureos quatuor tantum, tuto posse exhiberi credebant, quàm nostrum, cuius vel integra uncia parum, & citra molestiam purget. Quod autem ad æris squamam attinet, quamvis tam æris quàm ferri, stomatitique squamma, & omnes quotquot sint desiccant atque astrictiōis quid adipiscantur, atque in hoc tantum differant, quod alia magis, alia minus id præsent, helictisque (quam ἀνδροζαλας vocari dicit Celsus) principem in desiccando obineat locum; Galenus tamen tertio Simplicium, duplicem qualitatem in æris squamma prædicat: ac proinde, sicut duplex ei qualitas inest, ita gemina quoque facultate prædita est; nam & astringit, & mordicat. quare astrictiōe quidem siccitas ulceratarum carnum partes cicatrice obducit, mordicatione verò præhumidas colliquat: quod si inrò in corpus sumatur, purgat quidem ventrem, verum non cohibet, vincitur enim ea astringendi facultas,



facultas, ab acri purgatoriâque potentia, tanquam si ibi succum scammonij commiscas: nam quod ex asibolus commixtum erit, soluet ventrem, haud silet, licet gustu austeritas exuperet. Educit aquosa: quare & hydropicis conuenit, satisque est 3 ij ex cocto melle in catapotia redactas sumere, aut ex aqua malsa bibere.

### aut lactucæ marinæ lac.

TITHYMALORVM genera septem recenset Dioscorides: quorum is qui characias, id est vallis dicitur, principem obtinet locum. habent autem omnes vincentem acrimenque caliditatem: suntque ex quarto calefacientium ordine. Characia liquor vim habet aluum per inferna ducendi, pituitam & bilem purgans duorum obolorum pondere ex posca sumptus, cum melierato autem vomitum cit. Galeus validissimum liquorem dicit, secundum locum tenere semen, & solia radicemque earundem facultatum partem esse: sed non ex æquo. Tradunt (inquit Plinius) tones purgari hydropicos scio sumpta, quot guttas lactis characia exceperit. Orbasius insillatum caricis liquorem, probe & circa molestiam purgare, auctor est.

### Aut lac vel asini- num vel.

DVPLEX lactis est utilitas: una, ut alimentis; altera, ut medicamentis. Saluberimum est purum sincerumque, nec acridinis, nec acrimonia, aut aciditatis, aut sal- sedinis, aut febris participes. Omne autem lacti triplici constat substantia, caseosa, ferosa, ac pingui, quam copiosissimam obtinet bubulum: equinum, vti & asinum, magis alio secedit, quod pinguis succi minimum possideat. Caprillum, ut docet Aëtius, moderatam compagem obtinet, & ad purgandum bubulo debilius est, de cætero æque commo- dum, & multum nutriens. Mesues contra ad aluum ducendam sero lactis caprini vti- tur: Optimum enim est, inquit, capra- rum nigratum (nigriora enim in brutis sero

fortiora sunt, quod & carnes ipsorum te- stantur, sunt enim iocundioris saporis, quem- admodum alba, imbecilliora) bonis pabulis nutritarum, recens fetarum, recens, boni & iocundi odoris, & saporis. Rhabarbarum etiam efficacius agere dicit, sumptum ex sero lactis, præsertim caprini. Secundum in bo- nitate ouillum ponit: Aëtius contra ouillum & suillum ineptum ad discernendum serum dicit. Fit autem serum ex lacte ebulyrato, seu à quo est pingue innatans secretum, quando lubricitatis causam ex partibus ex- cretoriis auferre volumus, & ex lacte non ebulyrato quoties partes eas lenire magis & lubricare studium est. Cæterum præparandi illius modum docet Aëtius: Lac, inquit, in ollam funditur, coquiturque igne concita- tiore, & asidue ac equaliter mouetur, & ubi effebuerit, à motu cessatur, & ubi ad- huc amplius effebuerit, aqua frigida in promptu sit in profundiore quodam vasculo sita, in quam olla in qua lac coquitur im- mittitur: statim enim sedatur; sedato au- tem seruire rursus coquitur: & ubi effe- rescit, acetum mulsam, aut aqua malsa bis aut ter irroratur: quo facto caseus à sero statim disparatur: serum igitur max per pan- niculum, aut discemiculum excolatur. Vbi igitur crassus ac pituitosus materias abun- dare suspicatus fueris, aceti mulsam irro- ras; ubi acres & biliosos, aquam mulsam. Quin & immisso in ollam, postquam lac bis aut ter effebuerit, vase frigidissima aquam habente, fissuram ac secretionem facimus. Utendum est sero ad debiles ac cibos auer- santes: oportet autem sero quod primo bibi- tur, salem admiscere; ubi vero purgare cæ- perit, citra salem dare, atque hoc per inter- ualla facere, donec æger satis purgatus fuerit. Mesues alia ad huius præparationem metho- do vti- tur. Habet autem serum lactis vim exterforiam, ut docet Galenus, ac subducendi ventris gratia sumitur, tum in potu, tum per clysterem immisum, nam acrimoniam intestinorum citra mordacitatem abluat, & abstergit, estque calidum & secum gradu primo usque ad secundum, teste Mesueo.

a

Sed



### Sed medicamenta stomachum fere.

MEDICAMENTVM, teste Galeno, omne id dicimus, quod naturam nostram alterare potest; sicut nutrimentum, quicquid substantiam augere. Sunt autem genere diuersa, alia composita, alia simplicia: omnia stomacho inimica, sed hæc magis; illorum enim malignitas si non auferatur, saltem obtrunditur, & quibus fieri potest modis corrigitur, partim malitiam simplicium, & excessum frangentibus, partim salubrem aliquam facultatem afferentibus. Inimica autem stomacho sunt, atque eius potissimum ori, quia dum familiarem sibi humorem trahunt, fit ut exoluantur aut alio quouis modo afficiantur.

### Idcoque omnibus cathartico aloë.

ALOE medicamentorum omnium purgantium præstantissima est, & ob suam quandam prærogatam excellentissima; quum enim cetera purgantia, ut dictum est, partes nostras principes, & ex his cœu fontibus facultates corpus nostrum dispensantes, vel actionis vehementia ledant, vel nihil inueniunt, aloë sola eas partes roborat, & ad functiones suas reducit, & medicamentis quæ actione sua corpus dissolvere solent addita, ipsa corrigit, & noxam eorundem aufert. Quare Oribasius quotidie a cœna cum maximo emolumento sumi posse auctor est: Subducitur enim, inquit, & ciborum vim non hebetat: præterea sitim non inducit, & hominem ad cibos sumendos facit promptiorem. Est enim, ut auctor est Galenus, medicamentum; si quod aliud stomacho gratum; neque totum purgat corpus, verum sitam tantum in stomacho, ventre, & intestinis bilem citra molestiam ac placidè unâ cum subiectis excrementis educit. Quapropter quum ventrem tantum subducatur, ex numero eorum medicamentorum esse dicunt, quæ ἰσχυρὰ καὶ ὀσμώδη Græci dicunt; nō enim rectè quis ἰσχυρὰν dixerit. Tutior tamen est frigidis humidisque corporibus: nam Galenus siccis, ut biliosis inue-

nibus, & senibus suspectam videtur habere, quòd usu crebro & multo iisdem noxia esse soleat propter exiccationis periculum quòd adferre consuevit, nisi plus prosit vacuabile, quàm ledat, calefacto & siccato magis corpore. Verum de his plura in nostris Miscellaneis.

### Aluus si vehementius fluit.

HYPERCATHARSIS, hoc est à medicamento purgante vacuatio immodica, fit aut ratione sumentis, aut medicamenti; aut accidentium virique superuenientium. Ratione sumentis, quòd is excrementis ad fluendum paratissimis abundet; vel quòd venarum facultate retentrice sit imbecilla; vel quòd earundem orificia sint ampla. Medicamenti quidem ratione, quoniam id qualitatem habet alienam, aut deleteriam, aut quòd largius sumptum sit, vel portione sui ventriculi & intestinorum villis adheret, aut venarum ora pungit, mordet, aperit, aut alioqui cor intemperantius reddit. At ratione quæ virisque superueniunt, si australis sit constitutio; ea enim aperit, & rarefacit, Galeno teste, ac humores ad fluendum idoneos reddit. Idipsum quoque præstat Boreas, sed diuersa ratione; siquidem comprimendo atque exprimendo fluxiones excitat, ut antè satis dictum est. Qui igitur tunc promptè fluxionibus tentantur, à cathartico abstineant. Subsequuntur autem immodicas alui fluxiones, febres, diarrhœæ, stomachi subuersiones, vertigines, & id genus alia, de quibus abunde Ioan. Mesuemus.

### Ergo nunquam in aduersa valetudine.

FEBRES medicamentum purgans non ferunt, quòd plus mali quàm boni secum afferat purgatio; calore enim medicamenti purgantis febrilis calor accenditur. Intelligimus autem hic per febres, non quasius, sed acutas, & equidas: in acutis enim passionibus, Hippocrate teste, raro & in principis medicinis purgantibus vii. & hoc cum præmeditatione faciendum: neque enim periculum



riculum minimum, auctore Galeno, in morbo acuto vii medicamento purgante, quum omnia id genus sunt potestate calida; febris verò quatenus febris est, & sui ratione, non calefacientibus, & exiccantibus, sed potius contrariis, hoc est humectantibus & refrigerantibus egeat. In febribus verò longis, ut quartanis & quotidianis, ad temperamenti mutationem & amouendam morbi causam purgationes concedi diximus. Acutè igitur febrientes satius est cibos potionesque assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant: atque huiusmodi quidem eorumque attritiones vocare solet Hippocrates. Quamquam & vitus humidus per se, eodem teste, febrientibus conueniat, quum & humectet, & facillimè concoquatur, atque ocysimè disribatur, ac per aluum secernatur, eamque quoad fieri potest subducatur.

### At ubi febres sunt, satius.

SYMPTVS hic locus est ex quarto De ratione vitus in morbis acutis, ubi in causa sorbitiones attractorias dat; per sorbitiones attractorias eas intelligens (ni quid me fallat opinio) quæ & nutriant simul, & aluum citra molestiam subducant, & corpus nonnihil humectent: quale est infusulum galli; idque aut simplex, & per se, aut una cum prunis damascenis, aut mercuriali, aut malua, aut silicula, aut simili aliquo decoctum: pitisana etiam in qua radix polydij, cnici semen, aut brassica marina decocta sit. Huiusmodi etenim sorbitiones, etsi non manifestè humorem peccantem attrahunt, tamen eò quod meatus nonnihil aperiunt, atque ventrem fluidum faciunt, attractorias rectè appellaueris, quod mixta quodammodo sint facultatis, inter medicamenta & nutrimentum.

### Suntque valetudinis genera.

ANTE simpliciter serum lactis purgatricem vim habere ostendit; nunc autem quosdam esse morbos qui id requirant. Sunt autem eiusmodi, teste Mesueo, mania, me-

lancholia, impetigo, pruritus, lepra, ulcera maligna, morbi que omnes obstructions sequentes: quales sunt hydrops, ac icterus, febres item a putrida bile, tumores lienis, & id genus alij; & si quidem per se sumptum non satis efficax fore putamus, alia in eodem pro vsu exigentia maceramus.

### Plerumque verò aluus potius.

LIBRO tertio capite quarto hanc Asclepiadis moderationem paulo apertius describit auctor noster. Ante omnia, inquit, quaeritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quod cruditatem maximè horrebant: deinde eam materiam quæ lædere videbatur, ducendo sæpius aluum, subtrahabant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit: Febre verò ipsa præcipuè se ad eius remedium uti professus est. Conuellendas enim ægri vires putauit luce, vigilia, siti ingenti: sic ut ne os quidem primis diebus elui sineret. hæc Celsus. Quæ commodatio præsertim in febribus, mihi, nec Celsus ipsi alibi, satis probatur; præsertim quum in febribus non ideo ducamus aluum ut vires conuellamus (hinc enim maximum immineret periculum) sed potius, ut docet Galenus, ad evacuationem noxiorum humorum: nam eam tantum admittit, ubi utilitatis plus (quod ferè euenit) quam detrimenti ex medicamento purgatorio æger consequatur.

### si morbus maioris intestini.

IN colico dolore medicamenta purgantia parum probari, vel hinc constat, quod magna sua vi attractrice, noxios humores ad ventriculum primum, deinde ad intestina trahant; unde & ea distendunt nonnunquam, & dolores aliquando augent & exacerbant. Coningit enim frequenter dolo-



res eo esse vehementiores, quo obstrutio est maior. Clysteribus igitur ante medicamentum propinationem alenda est alvus, ac deinde, si res exigat, cathartici mouenda.

aut si sanguinem  
mitti, cum.

Nisi hic adderet, tempusve eius rei praeferret; nescio quam recte dixisset, facilius tolerari purgationem sanguinis missione; quum cuius etiam notum sit, plus exagitari vires, atque adeo totam corporis missionem distrabi purgantis medicamenti portione; quam moderata sanguinis detractione. Non negamus tamen esse, quin, si quando post principium vocatus medicus, cum plethora coniunctam cacochymiam videat, dimissa sanguinis missione, sola medicamenti lenientis aluum portione contentus esse possit; quod Celsum voluisse suspicio est.

Seruanda verò illa sunt.

POSTEAQVAM dixit quibus recte accommodentur medicamenta purgantia, iam quae eandem prohibeant enumerat: ac primum ante diem tertium, aut ante concoctionis signa, aluum irritari prohibet; per diem tertium, morbi principium intelligens: si quidem trifariam morbi principium dicimus, proprie enim impertibilis illa ac indissolubilis primi morbi impetus inuasio, in qua victus homo decubuit, principium appellatur; quemadmodum principium febrilis exacerbationis dicimus contractionem extremarum partium; ac praecipue nasi; & quandoque etiam frigiditatem, oscillationem, & pandulationem totius corporis; nonnunquam etiam insidulam leniter irritantem, una cum frigiditate irruentem. Principium etiam dicitur, quod per dilatationem nominant, quod usque ad tertium diem extenditur. Principium etiam dicitur proprium ac necessarium, quod velut partem totius morbi nominamus, quod sanè non dierum numero, sed exacerbatione, qualitate & concomitantium accidentium lenitate aestimatur; siquidem quo ea fuerint mitiora, eo concoctio, aut, si maior, maturatio perfectior obitur.

Sic Galenus augmentum, statum, declinationem, ab accidentibus, & concoctione metitur, ut tamisper totius morbi principium dicatur, donec apparuerint manifesta & perfecta concoctionis signa. In principis autem non esse medicandum, satis docet Hippocrates tum aliàs, tum inprimis libro primo Aphorismorum: Concocta, inquit, medicari & mouere, non cruda, modo non iurgant; plurima verò non iurgent, tum quarto De victu in morbis acutis. Quicumque enim, dicit, statim inter morbi initia phlegmone obsessas partes medicamento soluere conantur, hi à parte interna inflammationemque nihil auferunt; affectus enim quod crudus est non cedit, quae verò morbo resistere possunt, & sana sunt, absument. Recte ergo ante diem tertium, hoc est in morborum principis, purgationes vetat Celsus.

ne vlla cruditate sub-  
stante, &c.

QVANTVAM cruditatem sub principis comprehendere dixerimus, tamen quoniam practici hic miris modis se torquent, in materiei digestionem, ut loquimur, aut maturationem, aliis concoctionem increassando, aliis contra attenuando fieri affirmantibus, vbi duo illi Arabica schola cardines longis ambagibus seu gyris quibusdam sese implicant, adeo ut vix sese extricare possint: crassum enim humorum incisione, & tenuium ac serosorum inspissatione, concoctionem, aut preparationem humorum fieri sateri coguntur, quum tamen Hippocratem & Galenum passim inculcantes audiant, Corpora quum quis purgare voluerit, oportet fluida facere, quod non increassationem aut inspissationem aliquam; ut sic dicam, exigere videtur; nam erunt fluida Galeno teste, omnibus meatibus reseratis, humoribus incisis, atque extenuatis; atque hoc est quod voluit Hippocrates sexto Epidemion: Si volueris, inquit, ut is qui helleborum bibit, celeriter purgetur, aut lauet, aut comedat, praecipue lauet, nimirum corporis meatus laxiores reddendo, & ut humores balnei calore fluidantur. Comedat autem cibos eos, qui videlicet incidunt crassos



dant crassos & tenaces humores. Nam quantumcunque tenues; quantumcunque subtiles sint humores, aut materia peccans, semper attenuantibus & incidentibus uti solent; ac propterea Galenus in acutis etiam passionibus consuevit capere occasionem propinandi melicratum, in quo coctum sit aliquid, vel hyssopi, vel origani, vel tragorigani, aut thymi, aut pulegii, sine quid aliud huiusmodi vim habens humores extenuandi: nam quæ de achoribus obutuntur, clariora sunt quam ut responsum mereantur, quum incipientes achores (ubi totum corpus superfinitatibus caret) per astringentia & repellentia curari certum sit. Huc quamvis referri possint, quæ de minoratione materiae dicuntur; tamen quoniam à doctissimo viro, mihi nunquam nisi honoris titulo nominando, Domino Hieremia Drinco preceptore quondam nostro, tum ab aliis, satis explosa sunt, ne attingere quidem volumus.

### ne in ipso accessionis impetu.

PURGATIO non exarscens, sed mitescens morbo offerenda; tum enim natura ductum imitari æquum est, siquidem ea plerumque in seclum, maximèque intermittentiam inuasionibus vomitiones, & in declinationibus sudores commode ciet, quo tempore eadem nobis utiliter arte promovere concessum est, at non vel alui deiectionem, vel venæ sectionem meditari. In accessionibus enim ab illo omnino temperandum est, ut quas natura non molitur, sed si quæ incidunt, solius morbi impetu atque furore fiant, & quum alui deiectiones vires fere lacefiant, vix tunc potest in tanta accessionum quasi fluctuum aestuatione obiri, quum humores tum maximo quodam quasi aestu incitati effervescent, obstruuntque permisceantur, nulla etiam queat instaurari excretio.

### Prædie verò abstinere.

HINC satis constat Celsum antè per substantiæ cruditatem intellexisse materiam quæ causa esset ipsius morbi: nam iam ne incoctus adhuc crudusque cibus vasis

inhereat præcaueus, pridianam commendat abstinentiam, quod videlicet natura diabolus, atque iisdem diuersis officiis simul ad amissionem intentum esse nequeat: neque enim cibos concoquere, concoctasque digerere commodè posset, simulque medicamento purganti obtemperare.

### Eodem die ante aliquot horas.

CELSVS hic horis aliquot ante medicamento purgantis summptionem; aquam calidam bibendam dat, eamque aut simplicem, aut eam in qua decoctum sit hordeum: idque non tantum ut superiores partes madescant; verum etiam ut intemperies totius corporis aut ventriculi si calidior sit, nonnihil ad temperiem reducatur, ne videlicet calida intemperies, medicamentis, quæ fere facillatè calida sunt, aliquo modo ledaatur. Orbasius eandem exhiberi solitam ait præstis illis medicis post purgationem: nam & morsus vellicationesque sedare credebant, & excretionem iuuare; cuius loco hodie medici sorbitunculam, aut ius carminum exhibent.

### si leui medicina contenti sumus.

HÆC, & reliqua quæ ad capitis usque finem subsequuntur, vel ad enemaum infusionem transferri possunt, vel præcedentibus rectè accommodari: siquidem quum autè dixisset in intemperie calida totius corporis aut ventriculi tantum, eiusdemque imbecillitate rectè ante purgationes exhiberi aquam calidam, iam eiusdem exhibendi ordinem prescribit. Nam si leui medicina contenti fuerimus, suffecerit pura aqua; si paulo valentiori, mulsæ, quod hinc videlicet mellis acrimonia aliquid detorsoria purgantisque facultatis addiderit. Atque eadem ratione quid obstat quo minus aquam in qua decocta sit verberna, propinquius ante medicamento purgatorij exhibimus, stomacho debiliore atque ad vomitum propensiore? Et quod subiungit acriorem fieri adiecto nitro, non improbat quin sententia inchoari possit de præparatione ad medicamentum purgans.



pionem : nam Galenus, & post eum Paulus & Aëlius, nitrum si intro sumatur, secare atque extenuare lentos crassosque suc-  
eos restantur; idq; potentius quam reliqua  
salis genera. Et Oribasius, iis qui sumpto  
medicamento purgatorio non purgantur,  
aquam mulsam sorbendam dat, aut nitrum  
aqua liquefactum. Qua quamvis sic se ha-  
beant, proprietas tamen sermonis exigere  
videtur, ut de enematum iniectione senten-  
tiam intelligamus : siquidem per superiora,  
quemadmodum per inferiora non infundi-  
mus, sed aut propinamus, aut exhibemus  
sorbenda deglutiendaue medicamenta : quan-  
quam quomocunque intelligas, constet  
sententia.

Cum infusum est quan-  
tum fieri.

QUAMVIS Hippocrates in Aphorismis  
dicat, Quum biberit quis helleborum, ad

motiones corporum ducere magis, ad som-  
nos verò atque quietem minus : indicat au-  
tem navigatio turbari motione corpora. &  
alio loco : Quum volueris magis ducere hel-  
leborum, mone corpus; quum verò sistere,  
somnia facito. Sententia huic nequaquam  
refragatur Celsus : etenim tantisper quies-  
cendum dicit, dum medicamentum, aut id  
quod infusum est, vim suam exernerit : si-  
quidem quum quies in eodem statu seruet;  
motus verò mutet atque alteret corpus, faci-  
lius medicamentum energiam suam attra-  
ctoriam exeret in quieto, uti expulsoriam  
catharticamve in moto. Ideoque Hippo-  
crates particulam magis addidit. Tantisper  
igitur quiescendum monet Celsus dum pur-  
gari incipiat corpus, ac deinceps movendum,  
ac rursus quiescendum si hypercatharsis mo-  
lesta sit; & si vires deficiant, cibum exhi-  
bendum pro ratione accessionis eius quæ ex-  
pectabitur.

## CAPUT XIII.

## De Vomitu.

AT vomitus, ut in secunda quoque valetudine sæpe ne-  
cessarius biliosis est, sic etiam in his morbis, quos bilis  
concitavit. Ergo omnibus qui ante febres horrore & tre-  
more vexantur, omnibus qui cholera laborant, omnibus  
etiam cum quadam hilaritate insanientibus, & comitiali quo-  
que morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus  
est, sicut in cholera, si febris est, ut inter horrores, asperiori-  
bus medicamentis opus non est, sicut in deiectionibus quo-  
que supra dictum est, satisque est ea vomitus causa sumi, quæ  
sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi, valentes-  
que morbi sine febre sunt, ut comitialis aut infania, veratro  
quoque albo utendum est. Id neque hyeme, neque æstate  
rectè datur, optimè verè, tolerabiliter autumno. Quisquis  
daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus \*humi-  
dum sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamen-  
tum, quod potui datur, non semper ægris prodesse, semper  
sanis nocere.

\* humi-  
dus

ENARRA-



## ENARRATIO.

**P**RIORE libro canones quosdam tradidit, ad conseruationem sanitatis vomitus necessarios, ad quos cen Polycleri regulam actiones suas dirigerent, qui huiusmodi medicamenti genere humorem noxium purgare conarentur: Vtilior est, inquit, hieme quam astate vomitus: nam cum & pituita plus, & capitis grauitas subest. Inutilis est gracilibus & imbecillis stomachum habentibus: utilis est plenae & biliosae omnibus, se vel nimium sese repleuerint, vel parum concoxerunt: nam sine plus est quam quod concoqui non potest, periclitari ne corrumpatur non oportet; si vero corruptum est, nihil commodius est quam id quae via priuim expelli potest, eicere. Itaque ubi amari ruitus, cum dolore & grauitate praecordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Sic Polybus quoque, Sex mensibus, inquit, hybernus vomere utile est; per id enim tempus pituita magis quam astate abundat, & morbi capitis & partium quae supra septum transuersum sunt, magis infestant. Et quamuis iuxta Hippocraticum axioma, quo natura vergit per loca maxime conuenientia, eo ducere oporteat, ac pituita deorsum natura feratur, maiore tamen id compendio per vomitum ante fieri demonstrant Celsus, quam per alui deiectionem, quum ea in stomacho supernatans, ac subinde nascentem mouens, oesophagum petat. Vomitum igitur videntur sani, ut auctor noster docet, qui ciborum humorumve copia grauantur; pituitam enim mouet vomitus, & caput leuat, & eum qui antea cibum ingessit, & plus vini hausit, ledi prohibet. At egrotis necessarius est vomitus qui ex bile laborant, quod hac sua leuitate superiora potissimum petat: quare quum naturae ductum imitari debeat medicus, per superiora, hoc est vomitum, bilem educere conabitur: sic itud in febris cum rigore, vel tremore incipientibus, quales tertianae purae nothaeque sunt, atque adeo in quartanis vel ipso accessionis tempore secure vomitoria exhibebimus, natura huiusce-

modi expulsionem per se nonnunquam mouente.

## Cum hilaritate quadam insanientibus.

**I**N his nimirum quibus a stomacho initium mali oritur est: nam his qui exire primario affectu comitiali morbo correpti sunt, incongruus est vomitus. Affici autem cerebrum consensu stomachi & altarum quarumvis partium, Galenus libro De locis affectis passim docet, tum eo loco ubi iunem epilepticum statim ante accessionem epilepticam, a genua ceterum lenem agram ad cerebrum ferri sensisse edocet, quam sympathiam cerebri cum ventriculo fieri dicit propter magnitudinem nervorum a cerebro ad os ventriculi descendentium.

## Sed si acutus morbus est.

**I**N acutis morbis acriora aut vehementia non sine periculo adhiberi docet; vel quod vires morbi magnitudini simul, & medicamenti violentia non sufficerent; vel quod intemperie medicamenti vomitorij morbus ipse augetur. Sic Hippocrates carnes sanas habentibus, helleborum periculosum dixit, facereque conuulsiones. Sic quoque Aegineta, Medicamentis, inquit, vomitum facientibus, neque sani, neque acuta aegritudine occupati, uti permittuntur. Verum quae citra molestiam vomitum mouent, tunc exhiberi possunt: qualia sunt mulsae, aqua tepida, in qua garum sit coctum, prisana cui mel sit additum, lomentum carniuum, pingua omnia; neque solum iura ipsorum, verum etiam (vbi Paulus & Aetius restantur) ipsas quoque carnes integras deglutire oportet, eoque vomitus ipsi mandendis diu immorabitur, in eundem usum exhibentur vina dulcia, quod in ventre magis supernatent.

## At ubi longi valentesque morbi.

**N**ON simpliciter in longis valentibusque morbis,



morbis, sed si sine febre sint, veratrum exhiberi periculum enim esset, ne helleborus febri incrementum adderet, aut alioqui inflammationem excitaretur propter operationis vehementiam: siquidem tum demum veratrum exhibendum est, ubi longi valentesque morbi sunt, & spes ex aliis praesidiis adempta est, quod nimirum aegritudo in omnibus fortior existerit. Rosius autem comitialem, & infantiam pro exemplo aliorum morborum: nam siue continue infestauerit morbus, ut in hydropse, siue statis temporibus, seu paroxysmis quibusdam innaserit, ut in podagra & comitiali recte adhibetur. Porro, usum exhibendi veratri, copiosissime nobis inter alios describit Oribasius atque eiusdem preparandi modum: ac inter reliquos commendat eum, qui ex hellebore libra triduo macerata in semis aqua heminis lento igne ad tertias decoquebatur, deinde expresso helleboro, additis decocto heminis mellis duas, iterum decoquebat ut ars exigebat: atque huius quidem cochlearia duo propinabant, quae circa ullam molestiam aut animi anxietatem purgare prodiderunt, atque adeo in qui insanunt, neque ulla pacto eum sumpturi essent, propterea quod omne alimentum suspectum habeant, rectissime propinari crediderunt: nam licet morbum non expellat, minuit tamen adeo ut sepe ipsis volentibus iterum propinemus.

### Id neque hieme neque aestate.

HIEME & aestate non citra periculum veratrum exhiberi docet, quum tamen Hippocrates opportunissimum tempus ad purgationes superiores, aestatem statuerit: Medici cavi, inquit, aestate superiores magis, hieme inferiores: quod nimirum humor qui aestate abundat, ut ait Galenus, flava bilis sit, & omnino tota animalis natura propter ambientem caliditatem, magis ad superiora moveatur. Celsus & Polybus, ut ante dixi, hieme per superiora purgabant supernatantem in stomacho pituitam. Atque haec quidem etsi quam maxime sic se habeant, non tamen sequuntur Celsum male suspectum ha-

bere hieme & aestate veratri usum, quum dictus Hippocrates Aphorismus, de iis medicamentis quae leuiter per superiora ducant, intelligendus sit. Hic autem Celsus de veratro summisque remediis, atque adeo de iis morbis loquitur, qui per intervalla innadunt, de quibus simile plane pronunciatum reliquit Hippocrates: Nam quibus, ait, vena sectio vel purgatio cum medicamento convenit, hos Vere purgare, vel sanguinem incidere oportet, ut videlicet anticipemus Vere adveniente purgare, vel per vena sectionem, si plenitudinis morbus subiacuit, vel per purgationem, si eis qui ex corruptione proveniunt. Tempus igitur verum ad sumendum helleborum accommodissimum est, deinde autumnus: aestas autem incongrua est, ut & hiems, nisi valde magna urgeat necessitas: & tunc hieme quidem aptiores sunt, ut docet Aëtius, qui valde calidum temperamentum sortiti sunt, aestate vero senes. Caeli autem constitutio ad hellebori sumptionem idonea est, serena & calida, & insolata. Nam & Hippocrates sub Canem, & ante Canem canendas pharmacias docet, & graciles & facile vomentes per superiora purgandos, vitata hiema.

### Quisquis daturus erit.

QUUM alii alius difficilius per superiora purgatur, & euacuatio ea quae per vomitum sit, aliquid molestiae secum soleat afferre, docet iam quae potissimum ratione ante hellebori sumptionem preparandum sit corpus, ac inter ut acceptum corpus humidius sit: corpora etiam quum quis purgare voluerit, oportet fluida facere, humectantur autem qui lavacro, aut pluri cibo, aut quiete: Siquidem, ut sexto Epidemion Hippocrates, si volueris eum qui helleborum bibit celerius purgare, lavare aut comedere oportet; lavare autem convenit non multo tempore ante assumptionem, sed pridie; diffundit enim humores corpusque laxius ac mollius reddit lavacrum. Quies etiam, si quod aliud, humectat: quo fit, ut febricitantibus eam summe commendatam habeat Hippocrates. Cibus autem non quivis humectabit corpora, sed is.



sed is qui citra manifestam aliquam qualita-  
tem extenuet, atque incidat crassos humo-  
res, & qui meatus qui in corpore sunt per  
quos humores isti transmittuntur, atque  
trahuntur à medicamentis purgantibus ape-  
riat, hoc est, talis qui neque acerbis prorsus,  
neque acris, neque salus, neque amarus sit.  
Accuratissima igitur victus ratio instituenda  
est iis, qui veratro sunt usuri; attenuatis  
enim corporibus, non citra noxam exhibetur.  
Abstineant ergo, ut docet Aëtius, diebus tri-  
bus aut quatuor à carnibus, aut reliquis crassi-  
succi edulis, aut potibus: assuesciant autem  
seipsos ad vomitum, & ter aut quater prius  
vomant à cana, & alius ante subducatur;

videndumque, ut deficiente potius, quam  
increcente luna vomitum cum helleboro  
pronocemus.

### Illud scire oportet.

PRIORE libro corpus sanum exlex esse  
dixit; & nos helleborum sanis non conveni-  
re, aut diximus: iam autem non semper  
agris prodesse dicit. Oportet igitur dome-  
sticis ante declarare anxietatem certaminis  
futuri; atque sic ad hoc auxilium procedere:  
nam non raro strangulationis periculum im-  
minet; convulsio, item singultus, & id ge-  
nus alia, quæ non citra vitæ discrimen in-  
cidunt, subsequuntur.

### CAPVT XIII.

#### De Frictione.

DE Frictione verò & \* gestatione aded multa Asclepia-  
des, tanquam inuentor eius posuit: quod in eo volumine  
quod communium auxiliorum scripsit, cum trium tantum  
faceret mentionem, \* huius & equi & gestationis, tamen  
maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem ne-  
que recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel  
rectè secuti sunt, & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos  
posita sunt, auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest,  
quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione  
utendum esset, Asclepiades præceperit, nihil tamen repere-  
rit, quod non à vetustissimo auctore Hippocrate paucis ver-  
bis comprehensum sit, qui dixit, Frictione si vehemens sit,  
durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, im-  
pleri. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, cum aut astringen-  
dum corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod in-  
duruit: aut digerendum in eo quod copia nocet: aut alen-  
dum id, quod tenue, & infirmum est. Quas tamen species  
si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum non perti-  
net, facile intelliget, omnes ex vna causâ pendere, quæ de-  
mit. Nam & astringitur aliquid eo dempto, quod interposi-  
tum,

\* equita-  
tione

\* aliàs,  
vini scilicet,  
& aqua, & ge-  
stat.

b

tum,



tum, ut id laxaretur, effecerat: & mollietur eo detracto, quod duritiem creabat: & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat. Diuersarum verò rerum in modo causa est. Inter unctionem autem & frictionem, multum interest. Vngui enim leuiterque pertractari corpus etiam in acutis & recentibus morbis oportet, in remissione tamen & ante cibum. Longa verò frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus conuenit, præterquam cum phreneticis somnus ea quaeritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse incrementibus morbis, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est, ut & quam primum bona valetudo contingat: & ne morbus, qui remanet iterum, quamuis leui de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus grauis esse quam fuerit, neque ideo tamen solui, sed reliquijs quibusdam inherere, quas ad motum aliquod auxilium discutit. Sed ut leuata quoque aduersa valetudine rectè frictio adhibetur, sic nunquam adhibenda est febre incremente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit, minus certè cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modò est in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris, & membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longè tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeque cum à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiam volumus, ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Et si is per infirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse \* faciendum. Inter vtrunque deinde, prout

\*fricandū.



prout vires sunt. Quò fit, vt etiam minùs sæpe in muliere, quàm in viro, minùs sæpe in puero vel sene, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentiq̃ue frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari citò per partem potest, & opus est quàm plurimum materiæ digeri, siue idipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At vbi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, breuior esse debet & lenior, vt tantummodo summam cutem emolliat, quò facilius capax ex recenti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur, vbi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, vt suprà posui. Sed tunc quoque vnicum in frictione præsidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicinæ locum facere.

## ENARRATIO.

**F**RIGATIONIS multus apud veteres usus erat; adeò vt Aesclepiades, (vt auctor noster docet, & Plinius capite tertio libri xxvi. testatur) eam inter quinque res communium auxiliorum professus sit: hodie contra nullus aut perquam rarus eius usus est, præsertim illius quæ Preparatoria, seu Parascenastice, & quæ Apotherapia dicitur. Annumerabatur autem hæc frictionis species in genere eorum quæ sanitatem conseruant: suscipiebantur enim in optimi status natura calefaciendi corporis causa; adhibebaturque parascenastice ante exercitationem, quòd corpus prius manuum ac liueorum frictione calefactum oportuit; fricabant autem tantisper dum colore virido corpus effloresceret, & conficta particula in molem eleuaretur; ac primum quidem molliter; mox verò exercitationem aggressuri, duriter fricabant, atque tum demum corpus inungebant. Tenebat autem preparatorie frictionis scopus huc, vt corpus mollius redderetur, & excrementa attenuarentur: Apotherapie autem scopus erat, vt excrementa purgaret & corpus à lassitudine tutum conseruaret; est enim omnis exercitationis probè peractæ postrema pars apotherapia. Porro siebant va-

ria frictiones ex manuum iniectu circumactioneque: alia enim superne deorsum; alia inferne sursum adhibentur; alia rursum intransuersum & subtransuersum: faciebant autem varium manuum iniectum circumactumque, quo vniuersæ, quoad fieri posset, musculorum fibræ omni ex parte fricarentur. Medicamentosa autem frictio ea dicebatur, quæ agrotantibus exhibebatur: cuius generis est contraposta partis frictio, potissimum per ea medicamenta quæ calefaciunt; annumeraturque inter medicamenta quæ in contrarium vocant; cuiusmodi ea quæ plethoricis sit frictio, inter resoluentia aut purgantia. Galenus enim auctor est plethoram non raro discuti sola frictione: nam libro quarto Methodi: Si quis, inquit, etiamnum sanus, nec adhuc quicquam lesus in sanguinis redundantis concursu sit positus; non statim hinc mitti sanguinem est necesse: imò alij sufficit inedia, alij cibi parcitas, alij soluta aluus, vel purgatio, vel frequens balneum; alij sola exercitatio, vel multa frictio. & XIII. methodi, Plethora, inquit, tum sanguinis missione curatur, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum frictione.

b 2

Neque



### Neque dubitari potest, quin.

MULTIS argumentis Galenus libro Sanitatis tuenda contra Theonem gymnasten agit: contendebat enim Theon qualitatis quantitatisque mentionem minimè faciendam seorsim; sed in frictione qualitates quantitibus semper esse coapiandas, per se nanque esse imperfectiores, quam ut aliquis successus provenire possit: quasi verò si quis Hippocratis in dicendo brevitatem scrutetur exactius, hanc Theonis combinationem non inveniat; nam quum frictionem vim solvendi, ligandi, carum augendi ac diminuendi habere dicunt, duram utique ligandi, mollem solvendi, multam minuendi, mediocremque carnem augendi; quis non ex his intellexerit, molli frictione solui, aut, ut dicit Celsus, leni moliri corpus, si modice fiat; & si amplius adhibeatur, moliri quidem vel solui & tunc, sed intensius? Adde rectè dicit Celsus, nihil ab Asclepiade repertum, quod non à vetustissimo auctore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit: Hippocrates nanque (ut pulcherrimè docet Orbasius) reductis veluti in elementa simplicibus differentiis, universam frictionum rationem absoluit, quemadmodum carnem satis adicias, quemadmodum detrahas, quemadmodum corpus mollias, quemadmodum constringas. Cum his protinus una se promunt tum media earum opera, tum quæ per coniugationem faciunt: media quum neque ligare corpus neque solvere, neque carnem minuire neque augere studemus: per coniugationem verò sunt, ut quum (verbi gratia) pariter colligare & carnem adiacere volumus, frictionem duram unà cum mediocri quantitate adhibeamus; quum verò mollem, frictionem quoque mollem, & in quantitate mediocrem administramus; & in aliis etiam coniugationibus ad proportionem. Etenim tres differentiæ (ut docet Galenus libro Sanitatis tuenda secundo) frictionum à qualitate sumptæ, tribus quæ sumuntur à quantitate, coniunctæ, novem coniugationes efficiunt: siquidem una iuxta quan-

titatem nempe multa, si tribus quæ à qualitate sumuntur, dura dico, molli, & mediocri innungantur; tres secundum multitudinem differentias efficiunt; modica rursus si eisdem tribus copuletur, tres alias procreabit: sic & mediocri quantitate eisdem tribus addita, alias tres propagabit. Sed de his abundè Galenus.

### Quas tamen species si quis curiosus.

FRITIONEM, qualis qualis ea sit, semper admovere docet Celsus: nam quantumvis pauca carnem augeat, id fieri magis ratione assumpti tibi, qui per frictionem relaxata rite per corpus uniusum facilius distulatur.

### Inter vñctionem autem & frictionem.

VNCTIONI cum frictione commune est, quòd neque in morborum accessione, neque ante cibum obenda sit; habetque vñctio, non seorsim ac frictio, varios diversosque scopos: alia enim ad refrigerandum, alia ad calefaciendum, alia rursus ad humectandum, rarefaciendum & consipandum utimur. In hoc autem ab vñctione differt frictio, quòd recentes atque acuti morbi in ipsis morborum principis, nulla habita cruditate ratione, vñctionem admittant. Sic Hippocrates quarto Acutorum eos quibus inter initia febrim urina tenues fuerant, non purgabat, sed quieti permittibat, vñgebat, & equaliter contegebat, nullamque aquosam bibendam, & præsana cremorem sortendum dabat, ventremque ab iniurio enemate ducebat, nempe adversus vim febris, humiditatem eam quæ vñctionibus comparatur remedium esse putavit: præterea & neque valenter calefacere, neque refrigerare, sed lenire mulcerereque, quibus maxime indigent quæ cognuntur, maturanturque: Frictio contra in principio aut incremento morborum nulla ratione admittenda est; nam præterquam quòd nihil prodesset, plurimum etiam incommodi secum afferret; periculum enim esset ne humores qui in una aliqua parte



parto continentur, frictione in totum animalis corpus quodammodo respiciuntur; frictio enim adiuvat digestionem, ac distributionem humorum in corpus.

### Longa vero frictione viti neque.

ACUTI morbi, ut iam sepius dictum est, magna ex parte originem suam a causa calida habent; ac proinde quum contrarium contraria sunt remedia, frictio in acutis non recte adhibetur, quod calefaciat, corpusque impuritate magis contamineat, atque adeo obstructionibus opportunius reddat. In phreneticis tamen, ubi somnum conciliare propositum est, frictio quae molles simul & longa sit, conveniet; haec enim demulcet, ac spiritus foras evocat. Nam ut Galenus XII. Methodi therap. ad somnum alliciendum frictio uberius facit.

### Amat autem hoc auxilium.

FRICTIO, ut diximus, digestionem adjuvat, quare in morbis longis, usque qui ex decidentia acuti dicuntur (sunt enim hi magna ex parte frigidi, aut in abscessu aliquo terminantur) recte post augmentum in morbi declinatione ea veniunt; maturat enim, rarefacit & digerit, atque evaporare facit noxios humores.

### Neque ignoro quosdam dicere.

QUEMADMODUM morbus per tempora, hoc est principium, augmentum, statum, declinationem distinguitur; ita ordinem quandam in curationibus desiderat: adeo ut aliquid in eis primum, secundum, tertium, aut quartum sit. In aliis enim venesectione; in aliis purgatione; ac rursum in aliis mediis, aut victus ratione congrua, aut cataplasmatibus, inunctionibusque, & id genus aliis ordine quodam vivitur; nam in principio raro, id est, cum praemeditatione, medicamentis purgantibus utendum; sequi autem corpus foret moriens, frangunt, atque concoctionem (cui omnes natura in-

terita est) impediunt, in iis tamen si quando materia iurget, in ipso morbi insultu medicamentis usus est: nam quum periculum sit in mora, salius est anceps quam nullum remedium experiri; adeo in omnibus habenda ratio naturae est, quam recte in Epidemius morborum curatricem appellat Hippocrates. Si igitur inter morborum inopia naturae studeat, huc omnes actiones dirigeret medicus; sin eadem expulsionem materia peccantis (quod fere in statu atque declinatione facit) molietur, verbi gratia, aut per sudores, urinam, excrementa alii, aut vomitum sese exonerans, omni rursu eandem promovebit, ne quid sit quod vasis inherescens recidivam pariat; nam, quemadmodum senex ille Cossus, quae relinquuntur in morbis, recidivam facere consueverunt. Neque enim semper adeo robusta est natura, atque ad expulsionem prompta, ut absque adminiculo prudentis medici, quicquid in corpore redundat reiciat. nam videmus non raro, ut recte subiungit auctor nostrer, morbum quendam nonnunquam minus grauem esse, quam fuerit, neque tamen ideo solui, sed reliquis quibusdam inherere, quas admodum aliquid auxilium discuteret: atque hinc est quod Galenus naturam omnium horum opificem, medicum vero ministrum dixerit.

### Sed ut leuata quoque aduersa valetudine.

SI per incrementales febres intelligimus febriles paroxysmos, aut eas febres quae quum laetia sunt, & a calida materia originem suam trahant, atque actiones suas incrementales faciant, neque ad remissionem perveniant, bene quidem: sin per incrementalem febrem eam quae ad statum nondum pervenit, accipiamus; nescio quomodo Celsum cum Galeno componemus: hic siquidem his qui ex copia cruentorum humorum cum stomachi offensione febricitant, statim in morbi principio vitur: nam XII. methodi. Nulli tali sine maximo dispendio inquit sanguis mitti solet, quum tamen vacationem desideret: verum nec sanguinis missionem nec purgationem sustinent, vapore quos sine his syn-



his syncope subito adortur. Quanam igitur est ratio talibus medendi, qui quum vacuari postulent, vacantia praesidia non ferant? Sanè nullam aliam vacationem idoneam his inueni, praeter eam qua ex frictione paratur. Incipere verò in principio statim morbi oportet, ac primum à cruribus superne deorsum, idque linteis non admodum molli- bus, sed aspredis mediocriter quid habentibus debet abradi his cutis, quum simul & cale- fieri per eam, & digne agrotus postulet: Dehinc tota brachia ab humeris usque, & superne deorsum simili modo sunt fricanda; & reliqua quae deinceps sequuntur. subiun- git autem paulo post: Eas quas dixi partes ordine fricans, eoque solium tempore inter- mittens quo somnus hominem occupauerit, ad quem etiam alliciendum frictio uberior fa- cit, itaque vel hoc nomine utile praesidium fuerit, nedum quòd inaniat. haecenus Gale- nus, aperte declarans etiam in febrim ini- tiis sola habita somni ratione frictionem in- terdum rectè adhiberi. In aliis tamen febri- bus frictiones quae ad resoluendas morbi re- liquias obvenit, non quous tempore, sed circa morbi tantum statum conueniunt, non omni quidem in parte, sed extrema, ut non longè à declinatione absit: in temporibus verò accessionum primum in declinatione fieri debent. Obseruandi tamen sunt, qui partes aliquas inflammationibus obsessas ha- bent: nam si ea sint, dissolui nullo pacto fe- bris poterit.

### Nam & capitis longos dolores.

PRO exemplo quopiam subiungit capi- tis dolores: quibus si inclinato doloris im- petu adhibeatur frictio, maximum lenamen aegris conciliabimus. Contra si ingruente morbo eandem moliamur, tantum abest ut quicquam in melius proficiamus, ut hinc multo maior noxa expectanda sit. Confido- randa igitur morborum tempora, in quibus quid conueniat, aut non. Ceterum quòd frictio, ea videlicet quae mollis est, capitis do- lores leniat, ex aedictis satis patet; neque id mirum est, quum demulceat sinul & fric-

ritus euocet. Et quòd dura frictio à causa frigida resoluta membra firmet, autè di- ctum est.

### Longè tamen saepius aliud.

DVPLEX usus est frictionis: aliàs enim affectam partem liberat atque euacuat; aliàs in contrarium reuocat, atque sicuti Galenus libro quinto Therapeuticae methodi, Frictio contraposta parvis potissimum per ea me- dicamenta quae calefaciunt, iis quae in con- trarium reuocant, medicamentis est annun- randa: sic sanguine è naribus erumpente, extremos artus; mensibusque immodicè ma- nantibus, brachia manusque fricamus: sic quoque si in profundum corporis materia de- litescit, visceribusque inhaeret, frictione ex- tremarum partium elicitur.

### Neque audiendi sunt, qui numero.

QVONIAM sicuti frictione non secus quam sanguinis missione, purgatione, aut vomitu, corpus attenuatur, atque materia peccans euacuatur, frictionis finis sen- tentius non numero agitationis circummagita- tionisve manuum metiendus est; sed ex vi- ribus hominis aestimari debet: Siquidem, quemadmodum Galenus docet, summe ca- uendum est, ne ex nimia frictione vires la- cessant, aut lassitudinis sensus contusa iam carne supernent: quo fit etiam ut ubi par- ticularis aliqua frictio obeunda sit (verbi gratia, aut in pedibus aut in manibus tan- tum) multam valentemque frictionem faci- lius leniusque rulerint aegri, quam si vni- uersum partium corpus fieret.

### In malis iam agrum esse.

RETULI ante ex Hippocrate, exteriorum summorumque partium frigus, atque inter- narum cum sui, calorem, exitiale esse. Verum quoniam medicorum theoremata non sunt ita certa, ut interdum etiam non fallant (nam rationem coniectura talem esse ante demonstrat Celsus, ut quum sepius aliquando responderit, interdum tamen nos fallat)



fallat) ex proposito nunc docet, quomodo rum partium frictione calor foras euacatur, huiusmodi signum se offerens, nos usque spes aliqua adhuc superest; potest enim modo terere non debeat: nam si extrema- dicina alicui locum facere.

## CAPVT XV.

## De Gestatione.

**G**ESTATIO quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est, utilisque est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt: & his quibus lentæ morborum reliquæ remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, vehementique febre, præcipueque ardente, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit, meliusque quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiat, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolentibus: neque vnquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & pro viribus cuiusque, & pro opibus, ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili obliunt. Gestationum lenissima est naui, vel in portu, vel in flumine: vehementior in alto mari naui, vel lectica, aut scamno: acrior vehiculo. Atque hæc ipsa, & intendi & leniri possunt: si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moueri: si ne id quidem est, at certe vni pedi lecti funiculus subijciendus est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmis conueniunt. Valentiora verò his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent. Quod & in tabe, & in stomachi vitijs, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit. Aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manent.



nent. In quibus affectibus ea quoque genera exercitatio-  
num necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo  
quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent præ-  
cipimus.

### ENARRATIO.

**O**MISIT ferè reliquas omnes exerci-  
tationes, quæ in motu corporis sitæ  
sunt, præter gestationem & frictionem; de  
qua præcedente capite dictum est; idq; ut  
videtur, quod de corporibus nentis aut egro-  
tantibus aliqui sermonem fecerit. Nam  
quum tria prima exercitatorum genera nu-  
merentur, primum, quum a nobis ipsis mo-  
uemur, tanquam sanorum proprium omisit;  
de altero, quum ab aliis mouemur, videlicet  
gestatione, sermonem nãt instituit; quem  
admodum paulo ante tertij, hoc est einc quod  
a medicamento sit, meminit. Est autem ge-  
statio mixtum quid ex motu, & dispositione  
quieti simili, quum plurimæ corporis partes  
quiescere videantur, totum corpus gestatio-  
nis tractu moveatur: utilis admodum &  
lenis exercitatio, convalescentibus aut debi-  
latis conveniens. Non enim lassitudinem  
inducit corporibus, quum tamen ipsa, velut  
maxima exercitationes, moveat, excitetque  
innatum calorem, & materię multitudi-  
nem diffundat atque dispergat, habitumque  
corporis ac stupidas actiones roborat. Et in  
iis quidem quos vigilie exercent, somnum  
conciliat; & contra veretnostis & dissolutis  
reditum ad se, & vigilie parat. Ac som-  
num quidem conciliat, excrementa quæ a  
capite ac stomacho delabuntur, per habitum  
digerendo, quum hæ partes sint vigiliarum  
causæ præcipuæ; vigilias autem postea in-  
ducit corporis tenorem ad se reducendo &  
corroborando. Caterum utilis est, ut dicit  
Celsus, corporibus tantum quæ febris ca-  
rent, aut quæ aliqui exerceri non possunt.

### Asclepiades etiam in recenti.

**Q**UAM rectè Asclepiades in vehemente  
ardente febre in ipso statim principio ge-

statione sit usus, viderint alij: mihi certè  
nondum placere potuit; præsertim quum Hip-  
pocrates somnum & quietem cõcoquere at-  
que adeo mitigare febres dixerit. In mi-  
oribus tamen febribus, & ubi vigilie urgent,  
aut quos cataphoræ premunt, gestatio lenis,  
& qua in sella stratoriaria gestamus, conue-  
niet. Et qui permanente diuturnæ, &  
simplici febre iactantur (ut docet Oribasi-  
us,) si vires ferant, debent gestari quam-  
plurimum; quandoquidem gestatio minus  
mouens corpora, quandoque febrem exco-  
gat. Ergo in febricitantibus qui ad integritatem  
perueniunt, vel quorum longa admodum  
remissio est, vel qui febribus tenentur ad-  
modum longis, etiamsi nõ magna interna læ-  
sione habeant, conveniet gestatio; non in ardente  
aut vehemente febre.

### Genera autem gestatio- nis plura sunt.

**V**ARIA sunt genera gestationis; quæ  
ordine, quodam Celsus noster recenset: pri-  
mum enim sit in lectulo; idq; eo aut pensili,  
aut fulcra mobilia iuxta angulares pedes ha-  
bente, aut chõrda vni pedi subiecta. Alium  
sit in lectica, quod & duobus modis obitur;  
significum ij qui gestantur, aut decumbunt,  
aut desident. Tertium sit nauigio: quartum  
vehiculo: quintum equo; sed huius men-  
tionem nullam facit, quod robustis magis  
conueniat. Lenia autem gestationis genera,  
imbecillissimis conueniunt, ut Valentiora ro-  
bustis. Nam quæ in lecto sit, ut docet  
Aëtius, videndum est in febricitantibus, aut  
diuturno morbo decumbentibus, in quo cor-  
pora ita consumpta atque exhausta sunt, ut  
erigere sese nequeant. Sed & in his qui vi-  
res recolligunt à febrili affectione, & phre-  
neticis utilis est: nam spiritus perturbatio-  
nem pla-



nem placide lenit, ac somnum allicit. At qua in curru gestatio sit, concussorium quid obtinet, & diuturnos morbos commouet. potest autem & intendi & remitti: mitioréque vitandum est in capitis affectionibus, & in his quibus intestina fluxione laborant; vehementiore vero in affectibus pectoris & stomachi, in laxis tumoribus ac hydropicis, ac stupore attonito percussis. Vertiginosos aures & hemicranicos, aures ab itinere retrorsum desiderare in curru oportet, eosque leniter mouere: multos enim se nouisse Aëtius dicit, qui hoc modo curati, nullo alio auxilio egerint. Gestatio quæ in nauigio sit iuxta ripam, aut in mari tranquillo, hydropicis conuenit, siccatis tumidisque; subuertit quidem primo stomachum, paulo autem postea in consuetudinem venit. At quæ per

pelagus sit, omnium vehementissima est, mutationesque plurimas ac maximas facit, mirum quum anima mixtos affectus habeat, ex tristitia, spe, metu, ac periculo, modo gaudentibus & lætis, modo periclitantibus nauigantibus.

### Aur ubi quidam morbi.

Hic locus non sine mendis suspitione, ac plane abruptus esse videtur: nam sententia efflagitat, ut plena sit periodus atque oratio constat, ut tamen ex æquo non semper affligunt, aut aliquid simile adiciamus, in hunc modum: Aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis infania est, sine febre, qui quamuis diu manent, tamen non semper ex æquo affligunt. In quibus, &c.

## CAPUT XVI.

### De Abstinentia.

**A**BSTINENTIAE verò duo genera sunt. Alterum, ubi nihil assumit æger. Alterum, ubi non nisi quod oportet. Initia morborum, primum famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi moderationem, ut neque aliud, quam expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neque enim conuenit iuxta inediam protinus satietatem esse. Quod si famis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam ægro? Neque vlla res magis adiuuat laborantem, quam tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt, sibiipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cætera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quærat, quid medico liceat, non quid ægro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in eius quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.

### ENARRA-



## ENARRATIO.

**D**E inedia aded multa Erasistratus eiusque sequaces scripserunt, sicuti auctor est Galenus, ut è medio pulso phlebotomia usu, morbos quosvis ex plenitudine ortos, ea sola curari posse existimarent. quod sanè quàm fuerit erroneum, & quàm multos ea curandi methodus interemerit, satis aperte edocet Galenus libro De sanguinis missione, & eo qui hunc sequitur, adversus Erasistratios. Proinde sicuti plenitudinem duobus modis molestam esse diximus, altero ad vires, quum qualitate sanguis peccet; altero ad vasa, quum quantitate; sic quoque duplex esse abstinentie genus auctor noster in presentia edocet: alterum videlicet quod quantitate aestimetur, nimirum ubi nihil assumit eger, inediam vocamus; alterum quod quantitate aquè ac qualitate mensuramus. Nam hic (quod in aliis ferè omnibus integrum est) quantitates à qualitatibus separare non licet: sunt enim nonnulla, quæ licet quantitate modica exhibeantur, qualitate tamen & citò alterentur, & multam nutrant; in quo albo, ovarum luteum est. Alia rursus sunt, quæ quantumcumque ad nauseam usque sumuntur, parum tamen aut nihil nutrant: cuiusmodi sunt pisana, melicraonum, & similia.

### Initia morborum, primum famem, &c.

**H**IC, si usquam alibi, Celsus dum brevis esse laborat, obscurus fit: nam in genere dicere initia morborum primum famem sitimque desiderare, ut in aliquibus verum est; ita in multis falsum, sicuti decimo Methodi demonstrat Galenus: nam si quis ex inedia, labore, siccitate, ira, ardore solis in febrem inciderit, huic nec sitim nec famem prescribemus; sed in ipso principio antequam febris acrimonia reliqui succi accendantur, humidum nutrimentum exhibebimus, & si assueverit, gelidam fontanam propinare non verebimur: quemadmodum Galenus de iunene calido & secco, qui in fœnorbis sub Ca-

nacula ex ira febricitaverat, narrat; is enim ubi in prima accessione, duas frigida heminas bibisset, statim quidem vomuit flavissimam bilem, non multo post etiam deorsum excrevit. Deinde quum rursus post cibum aqua heminam similiter sumpsisset, iam febricitare desit. Quare ut Celsum à calumnia vindicemus, & cum Hippocratis & Galeni theorematibus conciliemus, initia quidem morborum qui ad vigorem citò perveniunt, famem sitimque desiderare dicemus, si agrotantis vires adsint, per initia, totum tempus dum morbus consistat intelligentes: morbus siquidem quia morbus est, aspidi inediam flagitat; quo fit ut si quid cibi administretur, non alia de causa id fiat quàm quò vires conserventur: sunt namque, ut ex Hippocrate rectè monet Galenus, à primo statim die in omni agro spectanda duo hæc à quibus cibandi consilia petamus, summus nempe morbi vigor, & agrotantis vires.

### ipsi deinde morbi moderationem.

**N**ISI mihi religio esset, totam hanc periodum hunc in modum immutarem: Initia morborum qui statim ad vigorem perveniunt, famem sitimque desiderant: ipsi deinde qui hos ordine sequuntur morbi, moderationem, ut neque, &c. Ita enim breviter clarissimeque, varios Hippocratis Aphorismos coniunxerit, quos alioqui magis confuderit atque offuscavit, quàm explanarit: neque enim perpetuum esse demonstravimus, in initis quorumvis morborum famem sitimque prescribere; & rursus quotquot tales sunt, eos non solum in principiis, sed multo magis sub vigorem extreme tenuissimum requirere victum: quod Celsus nostrum voluisse coniectura est, dum initia morborum famem sitimque desiderare dicit: siquidem, ut Hippocrates inquit, Quando morbus in suo vigore consisterit, extreme tenuissimo victu utendum est. & alio loco: Quibus morbus



bus morbus statim consistit, iis statim tenuis victus adhibendus est; quibus vero posterius debet consistere, iis & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibis subtrahendus est; prius vero uberiùs agendum, ut ager sufficiat. Quò alludens auctor noster, moderationem quandam eos requirere dicit, qui hos ordine sequuntur, hoc est, tantum in his à tenui victu declinandum, quantum morbus antedictis minis fuerit acutus: nam, ut idem senex ait, Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu utendum; ubi vero non, sed pleniorum victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantum morbus extremis est mollior. Quamquam non absurdè quis moderationem hanc ad tempora morbi transtulerit: neque enim conuenit statim in declinatione pleno victu uti, hoc est, ut auctor noster dicit, iuxta inediam protinus satietatem esse; sed sensim ad consuetam victum rationem transeundum; nam quæ sensim extenuata sunt corpora, lente reficere oportet.

### Neque enim conuenit iuxta inediam.

CAVENDVM monet Galenus ne propere & multum, sed sensim paulatimque renutramus: quippe qui post inanitionem ad pristinam dietam protinus redeunt, iis corporis habitus crudis succis repletur, quos mirum antequam concocti commode in ventre venisque sint, corporis moles ad se trahit. Ceterum locus hic ex secundo De ratione victus in morbis acutis, transumptus videtur. nam Hippocrates, Verum, inquit, & medicos contra omnino quam oporteat agere scio: nempe omnes languentes ipsos per initia morborum duos vel tres vel etiam plures dies inedia siccare, atque ita tum sorbitiones vel potus exhibere volunt; idque fortassis quod magna corporis mutationi, magnam quampiam mutationem obliuiscere ipsis decens videatur. Verum mutatio ipsa bene quidem habet non modica, sed rectè transferenda venit. Iam autem & ciborum exhibitio, mutationis rationem maxime subit, maxime

ergo ludentur, qui tota utentur pituita, nisi rectè transferantur; ludentur quoque, qui solo utentur cremore, quanquam minus; ludentur quoque qui solo utentur potu, sed hi minime. Oportet autem ex sanorum hominum victu disciplinam quæ conferat facere: nam si sanis quibusdam tales, vel tales cibi variare videntur, tum in aliis quibusdam, tum in nonnullis mutationibus, quomodo & morbis quibusdam & maxime acutis non valde variabunt? hucusque Hippocrates: qui quamuis in diatriarios sermonem primum facere videatur, tamen quæ de sanorum hominum victu subinngit, ad sententiam nostram plurimum faciunt; adeo ut verisimile sit Celsum quæ hic de renutritione scribit, ex dicto Hippocratis loco mutatum.

### Neque vlla res magis adiuuat.

QUANTVM momenti in morborum curationibus afferat victus ratio congrua, passim inculcat Galenus & Hippocrates: si enim cū tū nūq̃ exhibeantur cibi, ut vires non grauant, ita facile consueuntur; & rursum si intempestinè, vires caloremque naturam suffocant, & corpus crudis succis replens: neque enim potest natura duobus simul esse intenta, hoc est non potest morbum euincere simul, & cibos conficere: verum ut tempora quibus cibi offerendi non sunt, & tū, & quibus offerendi existunt cognoscamus, maximum est, ut diximus, febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutis modò, verum quoque & in longis obseruare: nam in principiis & in accessionibus, ut docet Hippocrates, abstinere oportet, cibum enim dare noxium est; & quibus per circuitum sunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

### Intemperantes homines.

NON est in medico semper relictum ut ager: siquidem sunt morbi, qui quum diuinum quippiam coniunctum habeant, (ut auctor est poetarum sapientissimus Homerus) medicamentis parum cedant; alij contra



acutos vehementesque adeo paroxysmos habent, ut remediis ne momentum quidem temporis concedant: sunt rursus alij ita rebelles atque maligni, ut quantumvis tempora medico concedant, saluberrima presentissimaque remedia respuant: alij deinceps sunt qui etsi solertis medici industria superari atque evinci possint, assidentium tamen, & ægri incuria in peius mutantur; quod (pro dolor) in nostro rigido septemtrione nimisquàm frequens est: nam quum

commensationibus ingitque crapula assueverint, difficulter ad probam victus rationem, atque eam potissimum quæ ex præscripto medici fiat, transferuntur: quo fit ut quum aut cibandi tempora negligant, aut à medico præscriptam ciborum, tum quantitatem, tum qualitatem contemnant, non raro in vitæ discrimen incidunt: adeo rectè ab Hippocrate dictum est, quod non solum oporteat ut medicus seipsum præstet opportuna facientem, sed & assidentes, & agrum & exteriora.

## CAPUT XVII.

## De Sudore.

\*sudatio-  
aum,

\*interini-  
tia m. v.  
e. cum non  
amplius  
grau.

\* & si ante

**S**UDOR etià duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & arenæ calidæ, & Laconici, & clibanij, & quarundam naturalium \*sudationes, ubi è terra profusus calidus vapor ædificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoque, & exercitatione is movetur. Ut iliaque hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. Ac nervorum quoque quædam vitia sic optimè curantur. Sed cætera infirmis possunt convenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, vel \* initio morbi, vel etià grauibz morbis tenentur. Cauendum autem est, ne quid horum vel in febre, vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modò discussis febribz initium cibi plenioris, viniq; firmioris valetudini facit: modò febrim ipsam tollit, fereq; adhibetur, ubi summam cutem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet: \* & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simul atque ea vno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die reuertatur, quandocunque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribz, si hæc sunt



sunt lentæ, lienesque iam diu malè habent, rectè medicina ista tentatur. Cum eo tamen, ne præcordia dura sint, nève ea tument, nève lingua aspera sit, nève aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, nève tum febris increseat. At in his quidem febribus quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt, alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his verò qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio, aut, si id non solet, \* certè lenita est, iamq. corpus tam integrum est, quàm maximè esse in eo genere valetudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum, vitare debet, ne antè frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum venit, paulisper \* resistere, experiiriq. num tempora astringantur, & an sudor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die balneum est: perungendus est is leniter, & referendus est, vitandumq. omnimodo frigus, & abstinencia vtendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fouendum os aqua calida, tum \* in solio descendendum est: atque ibi quoque videntur, num sub primo contactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri potest, si priora rectè cessarunt. Certum id autem signum inutilis balnei est. Antè vero, an postea, quàm in aquam calidam se demittat aliquis, perungi debeat, ex ratione valetudinis suæ cognoscat. Perè tamen, nisi vbi nominatim, vt postea fiat, id præcipitur, moto sudore \* leniter corpus perungendum, deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio est. Neque committendum, vt per æstum anima deficiat: sed maturius is auferendus, curioseque in vestimentis inuoluendus est, vt neque ad eum frigus aspiret, & ibi quoque antequàm aliquid assumat, insudet. Fomenta quoque calida sunt, milium, sal, arena, quodlibet eorum calefactum, & in linteum coniectum. Si minore vi opus est, etiam solum linteum. At si maiore, extincti titiones, inuolutique panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calido oleo replentur vtriculi, & in vasa fictilia, ad similitudinem, quas lenticulas vocant, aqua coniecitur, & sal sicco linteo excipitur,

\* resistere  
\* certè  
cūta l. 11. 115

\* resistere,

\* in solium  
descend. c.

\* leniter

De his extinctis titionibus habes  
infr. lib. 3.  
cap. 12.  
Lenticula.  
a similitudine



\* intraque  
al. lixata-  
que igne

\* intereaq.  
descendit  
al. ascen-  
dit fumus,

rum, demittiturque in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fouendum est, collocatur: \* iuxtaque ignem ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus, alterumque ex his demittitur in eum salem, & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigere coepit, ad ignem refertur, & idem in altero fit, deinde inuicem in utroque \* inter quæ descendit salsus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo neruis opitulatur. His omnibus commune est digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

### ENARRATIO.

**Q**UONIAM qua de insolatione ac arene aggestione ac aliis vaporariis fomentis Aëtius tetrab. I. sect. tert. cap. IX. ex Antylo posteritati reliquit, ad loci huius explanationem satis faciunt, ordine ascribimus. Quidam, inquit, ad solem se exponunt, partim non uncti, alij etiam uncti, & alij desidentes, alij decumbentes, aut stantes, aut deambulantes, aut etiam currentes. Ex decumbentibus aliqui in strato, aliqui super corio, alij in arena, aut sale decumbunt. Solaris itaque inustio citra unctiōnem moderatè adhibita perspirationem occultam auget, & sudores elicit, aluum autem sistit, & carnem conseruat, pinguitudinem autem abolet, & tumores laxos, cum alios, tum maxime hydropicorum deprimit, spiritum autem densiorem ac velociorem reddit, & propterea anhelos, & reuera ceruice spirantes exacerbat, verum capiti diuturna frigiditate laboranti commodat: nam & firmum, & agilitatibus minus obnoxium reddit. Conuenit autem soli & igni dorsum præter cetera admoerere; nemi enim qui voluntatis sunt, in eo potissimum siti sunt, ut habet Herodotus, quibus calefcentibus totum corpus valentius redditur. Caput verò aliquo operimento regendum est, & solis radij vitandi sunt. Oportet tamen in his aluum præuenire: inimica est enim

insolatio capiti, euacuatione non præmissa. At verò insolatio cum unctiōne, eadem similiter potest; verum corpus magis siccatur, velut vngine assatum: quapropter & superficiem magis denigrat, ceterum per occultam transpirationem hæc minus discit, nimirum ad canterij similitudinem densans carnem. Qui verò desidentes ac stantes insolantur, vehementius quam deambulantes, & magis quam currentes inurentur; decumbentes autem in strato, non magnopere inuantur, sed capite magis replentur. Qui super corio soli se exponunt, magnam utilitatem consequuntur, præsertim hydropici, ischiadici, nephritici, resoluti, elephantiasi laborantes, intumescētes circa resectionem, & qui circa vesicam veterem morbum habent, itemque siderati, femina quoque quæ ab utero strangulantur, adhuc amplius quæ alba vteri fluxione molestantur. Oportet autem magnum esse corium, & oleo perunctum, & super tenuem cribratam arenam extentum, & ubi percalfactum est corium, tum demum agrum super id decumbere, capite cum crudo linteo velato. Permanendum est autem diutius in ea decubitus signa, & postquam corpus multum fuerit seruesactum, vertere iubendum, ac denolendum; ac postea rursum in alterum latum reuoluendum, ac quiescendum: atque hoc ipsum



hoc ipsum sapius facere oportet. Idem etiam modus in arena adhibetur, loco assidue permutato. Oportet autem ministrum adesse qui calientissimam arenam recolligat, & corpori effossi atque obruti superingerat, si quidem mare affuerit, utendum eius arena est, nam & lenior & magis exiccans huius arena fomentatio ac fervor est, quam eius quae per corium contingit: si vero flumiatis arena fuerit, praestat corio viri: nam & arena flumiatis, & aer humectior est ex evaporationibus. Curandum interim est ut is qui hoc medicamenti genere usus est, cibos ante probe conficiat, ac prius inambulet, & pro virum ratione leniter exerceatur; deinde quum aer calidior fuerit, & arena satis fervens fuerit reddita, ad decubitum, ut dictum est, se componat. Quod si salis copia adsit, multo praestabilius est tenni sale subtrato hominem decumbere. Oportet autem altitudinem non minorē esse tribus palmis parvis, si enim non fuerit altus sal, caliditas ipsius facile dissilatur, utpote quae ex alto emersum, ac progressum non habeat. hucusque Aëtius. Caterum exercitationem sudores pronocare mirum non est, quod omni animali ab exercitatione caloris augmentum excitari sciamus, neque calefacere tantum, sed & insiti caloris motum extrorsum concitare: sed haec ut concussorium quid magna ex parte obtinet, ita robustioribus tantum convenire dixit Celsus. Laconicum autem, ut tradit Dion, à Laconibus, seu Lacedaemoniis inuentoribus dictum est; quoniam nudi unctique, ante alios in hisce sudatoriis exercebantur. Vitruvius scribit Laconicum sudationesque coniungendas tepidario, qui sativitate epularum immodica crudi erant, & cacostomachi, cruditateque laborabant, hi ad balneas confugiebant, & in sudatoriis Laconicisque sudorem evocabant, ita stomachi cruditatem digerentes, quam epulae copiosiores afferebant. quo alludens Columella, satyrico morsu canināque facundia innectit in luxuriosorum delicias, Mox, inquit, ut apti veniant ad ganeas, quotidianam cruditatem Laconicis excoquimus, & exento sudore suum quarimus. Eliciebatur autem in Laconico sudor

sicco calore, humorisque aliquanto vehementius in eo quam in balneo resolvebantur, corpus univsum vapore quodam fervido incendebatur, exiccabatur, atque ob id calidis, biliosis acutisque affectibus, & extenuato corpori inutile. Morbis autem quorum materia, aut in summa cute, aut in artubus haberetur, & qui frigidi ac diuturni essent, accommodatissimi. Baia autem civitas Campaniae est secus Campanum mare sita, à Baio Vlyssis socio illic sepulto sic dicta; in huius agro aqua calidae sunt, & ad voluptatem & ad varios morbos accommodata, de quibus abunde Plinius: cuius sententiam quoniam ad loci huius intelligentiam plurimum facere existimavi, subiungendam censui. Emicant (inquit Naturalis histor. lib. xxxi. cap. 3.) benigne passimque in terris alibi frigide, alibi calidae, alibi iunctae, sicut in Tarbellis Aquitania gente, & in Pyrenaeis montibus tenni intervallo discernente, alibi tepide egelidaeque auxilia morborum conferentes, & cunctis animalium hominum tantum causa erumpentes. Augent numerum eorum variis nominibus, urbesque condunt, sicut Puteolos in Campania; Statillas in Liguria; Sextias in Narbonensi provincia; nusquam tamen largius quam in Baiano sinu, nec pluribus auxiliandi generibus; alia sulphuris, alia aluminis, alia salis, alia nitri, alia bituminis, nonnulla etiam acida salsaque mixtura: vapore quoque ipso aliquae profunt, tantaque eis vis est, ut balneas calefaciant, ac frigidam etiam in solis fervere cogant, quae in Baiano Posidiana vocantur, nomine accepto à Claudij Caesaris liberto: Haec Plinius. Meminit & Baiarum Iosephus Antiquitatum Iudaicarum libro xxviii.

### At balnei duplex usus est.

BALNEORVM quaedam sunt dulcia, quaedam qualitatis expertia, nonnulla etiam qualitatem aliquam extraneam habent; cuiusmodi sunt nitrosa, salsa, aluminosa, bituminosa, sulphurenta, & quae ferri & aris qualitatem habeant. Haec igitur quum ex variis & contra se mutuo pugnantibus qualitatibus constent, consequens est, ut pro qualitasum



qualitatum differentia, varios atque eos differentes in corpore effectus edant. Quare verisimile est auctorem nostrum, non de omnibus quotquot sunt in genere balneis locutum, sed de iis tantum quæ ex aquis dulcibus consunt: harum siquidem usus, præferim in febribus, ad eliciendum sudorem frequens existit. Huius porro duplex est usus: nam (ut Galenus libro De ratione vitæ in morbis acutis) laborantem sapius ad balneum deducimus, non vacuandi corporis causa, sed prorsus ob contrariam rationem, ut scilicet humectetur madescatque quod immoderatus exaruit: sic Cornelius nos ter discussis iam febribus adhiberi dicit, quod morbi reliquiis, atque ex morbo relictis affectibus medetur; materiam enim, si quæ superest, foras euocando disciuit, atque adeo totum corpus humectat.

### modò febrem ipsam tollit.

IAM secundum balnearum usum enarrat: duplici namque nomine balnea calida aquarum dulcium, febribus, iisque potissimum quæ tertiana exquisita nominantur, profunt; tum quod, ut dixi, foras materiam febris euocent, bilisque nonnihil, ut auctor est Galenus ad Glaucomem primo, educant; tum quod sua qualitate corpus humectent ac refrigerent. Refrigerant autem potentia, immisso nimirum in his madore calido, deinde spacio temporis ad nativam humiditatem redacto.

### fereque adhibetur ubi.

QUOMODO hæc operetur balneum, Galenus decimo methodi Therapeut. clarissime demonstrat: Balneum, inquit, ingredientes in aëre versantur calido; postea in aquam calidam descendunt; mox ab hac egressi in frigidam; postremo sudores detergent. Potest autem prima eius pars materiam per totum corpus tum calefacere tum liquare, præterea quæ inequalia sunt aquare, & cutim laxare, & multa quæ detenta sub hac finire, euacuare. Secunda eius pars, ubi quis in sicco corporis affectu ea vititur, potest madorem vitilem solidis particulis inmittere. Tertia

balnei pars potest ubi quis frigida vititur, & totum corpus refrigerare, & cutem densare, & vires firmare: Quarta vero corpus per sudores citra rationis noxam euacuare. quod Celsus hoc loco voluisse censendum est, quum omnia hæc balneum præstare dicit, nullo discrimine partium balnei habito.

### Antiqui timidiùs eo vtebantur.

QVA ratione veterem medicinam immutauerit Asclepiades, Plinius Naturalis Historie lib. xxvi. cap. tertio edocet: & quoniam non semel Asclepiadis huius mentionem facit Celsus, Plinii verba, quod ad loci quoque huius explanationem faciant, asseribam. Durabat tamen, inquit, antiquitas firma, magnasque confesse rei vindicabat reliquias, donec Asclepiades ætate Magni Pompeij orandi magister, nec satis in arte ea quaestuosus, ut ad alia sagacis ingenij, huc se repente conuertit: atque (ut necesse erat homini, qui nec id egiisset, nec remedia nosset oculis usque percipienda) torrenti ac meditata quotidie oratione blandiens, omnia abdicauit; totamque medicinam ad causam renocando, coniecturam fecit: quin res maxime communium auxiliorum professus, abstinentiam cibi, alias vini, frictionem corporis, ambulationem, gestationes: quæ quum unusquisque semetipsum sibi præstare posse intelligeret, fauentibus cunctis, ut essent vera quæ facillima erant, vniuersum propè humanum genus circumegit in se, non alio modo, quam si calo emissus aduenisset. Trahebat præterea mentes artificia mirabili, vinum promittendo ægris, dandoque tempus, tum frigidam aquam. Et quoniam causas morborum scrutari prior Herophilus instituerat; vini rationem illustrauerat Cleophantus apud præcos; ipse cognominari se frigida danda præferens, ut auctor est M. Varro, alia quoque blandimenta excogitabat, iam suspendendo lectulos; quorum iactatu aut morbos extenuaret, aut somnos alliceret, iam balneas anidissimas hominum cupidine instigando, & alia multa distu grata atque iocunda.



iocunda: magna auctoritate, nec minore fama, cum occurrisset ignoto suero, relato homine ab rogo atque servato, ne quis lenibus momentis tantam conversionem factam existimet.

### Quisquis febre liberatus est.

HYIYSMODI potissimum febres sunt, ex quas ephemeræ aut diarias vocant: nam Galenus ad Glauconem primo in his statim post primam accessionis solutionem laudandum monet, atque ad solitam victus rationem transferendum, quod videlicet, ut dixi, morbi reliquias, si quæ supersint, per sudores euacuet atque discutiat.

### At si circuitum habere ca febris.

VNDICESIMO methodi Galenus, in balneo per febres adhibendo tribus attendendum monet: vni quod citra horrorem administraretur, quod etiam paulo post observandum docet Celsus: secundo, quod nullum primæ notæ viscus sit imbecillum: tertio, quod multitudo crudorum humorum in ventris non contineatur: horror namque non solum non intendere præsentem febrem, sed etiam quum non fuit, eam iterum excitare potest. Partes vero imbecille liquatas humores iam recipiunt magis quam antequam liquarentur. Crudorum etiam humorum copiâ in totum corpus digeritur: horum si nihil obset, ex balneis duo hæc ægro compendia accedunt, & quod redundantiuum humorum aliquid euacuabitur, & quod multum febrilis calor intranspirabitur. Quare nec in principio, nec in augmento quisquam febrientem balneo vti præceperit: sed in febris inclinatione, aut incipiente, aut procedente aut amplius etiam progressa.

### Manentibus verò adhuc febribus.

PER manentes & lentas febres, eas hoc loco intelligere videtur, quæ de quatuor in quatuor accessiones suas faciunt: eæ siquidem vel lentos habent paroxysmos, ita

diu permanent, adeo ut non raro spiritibus depaſtis atque humoribus solidiores corporis particulas occupent, hæc tunc, aut marasmodi ob id vocantur. Oriuntur autem hæc ab atro sanguine, quem melancholiam vocant, cuius quum receptaculum sit lien, rectè subiungit auctor noster, lienisque iam diu malè habent. Ac quod in his conveniat, atque admodum salutare sit balneum aquarum dulcium, docet Galenus libro x. Methodi: Nam quicumque, inquit, febre hæc laborant, atque ex his ipsis præcipnè qui iam marasmode hæc febricitant, modò his nulla alia febris ex putrescente humore, nec phlegmone sit adiuncta, eos omnes andacter lauabis, sed prorsus citra omnem laborem, ne vires resoluas: ex necis enim solidis particulis vitalem madorem balneum immittit.

### Cum eo tamen, ne præcordia.

DIXI paulo antè, id animaduertendum in febribus, ne primariæ aliquæ partes imbecillæ sint: quod volens Celsus, præcordiorum duriciem cauendam monet. Ea autem ferè oritur post viscerum, hoc est lienis, aut hepatis inflammationem minus rectè curatam, sanguine circa splenitides, hepatides, & venter in ipsis obturato, qui quum neque digeri, neque excerni facile possit, duriciem quandam scirrhosam gignit, alias quidem cum tumore, alias citra tumorem. Ac quod in his balneum minus tutum sit, ex antedictis satis liquet: siquidem tenax alioqui lentæque materia calore balnei dissoluta iam, ad partes affectas decumberet, unde non solum nihil accederet commodi, sed multo magis exacerbesceret, augeturque malum: huc quoque referenda sunt, quæ de dolore, qui aut in medio corpore, aut in capite est, dicit.

### neve lingua aspera sit.

LINGVA in febribus nonnunquam ab intemperie sicca aspera redditur: in huiusmodi sanè si reliqua respondeant, non omnino alienum est balneum. Contingit etiam non raro, ut exasperetur aut diffringatur lingua, aut



qua, aut carbonum speciem induat, ab interiorum viscerum phlegmone aliqua insigni: quæ sanè lingua asperitas, quum in principis ferè appareat, nondum apparentibus signis aliquibus inflammationis, a balneo, ut qui maxime, abhorret.

### At in his quidem febribus.

NON statim ante horrorem convenit balneum; periculum enim esset ne balnei calore humores ad expulsionem agitat, horrorem atque adeò novam febrem inducerent, sed tribus aut quatuor ad minimum horis ante horroris invasionem: ut si sexta hora horroris impetus expectaretur, secunda, aut tertia balnei administrandum sit; ita enim, & materiam peccantem expurgabimus, & morbo aliquid demetur.

### In his verò qui lentis febriculis.

PER lentas febres hic intellexero quotidianas: hæc siquidem quum vix ad infestationem veniant, leniores tamen accessiones faciunt; in his etenim post morbi inclinationem, ut in aliis quoque, rectissime adhibebitur balneum.

### imbecillus homo iturus in balneum.

QUÆ imbecillo ante ingressum balnei consideranda sunt, explicat: ac primum ne frigus aliquod experiatur ingressurus monet; id enim corpus densaret humoresque ad interiora pelleret, quos aliqui balneo per sudores elicere mens erat. Deinceps ubi iam ad balneum ventum est, paulisper quiescendum ac resistendum docet; est enim agrotanti quies, ut corpus in balneo tum laxius, tum mollius reddatur, idonea. siquidem dum movetur corpus, muscoli distenduntur, qui minus, tum molliuntur, tum relaxantur: quo fit ut videndum quoque dicat, si tempora astringantur, inutile nanque eo die balneum esse: significant enim magnam febrilis aut extranei caloris excessum, aut aliqui ingentem ariditatem, principiumque mortis.

### & abstinencia utendum.

LAVARI, inquit Hippocrates, is non debet, qui super sorpsit vel bibit; neque confestim a balneo sorbendum vel bibendum: nam qui biberunt, his caput repletur; qui verò cibum sumpserunt, his non caput modo, ut docet Galenus, verum etiam corpus totum alimonia prius quàm cōcocta fuerit, ad se trahit.

### atque ibi quoque videndum num.

HORRORIS huius causam alibi esse dicit Galenus, rodentium excrementorum confertim actorum citatiorem motum. Proinde quibus horum est abundantia, caro verò & cutis densa, siue balneum sint ingressi, siue steterint in sole, siue quoquo modo vel gestati vel perfricti vel exercitati vehementius sint dimoti, utique his horror incidet, contra quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus ut remittatur, laxeturque a balnei calore promptius, non modò non horrent, sed etiam meliores redduntur, utpote excrementis per balneum evacuat.

### Fomenta quoque calida.

FOMENTORUM alia sunt humida, alia sicca; lenia alia, alia mordacia: bustida itaque fomenta inflammationibus a biliosis humoribus factis conveniunt; sicca verò his quæ à tenui & aquoso sanguine producta sunt: lenia quidem mordacibus humoribus opitulantur; ut mordacia & attenuantia crassis & viscosis. Quid autem per extinctiones velit, sequente libro de curatione horroris in febribus dicit: nam fomentis protinus validioribus, ait, totum corpus circumdare convenit, maximeque involutis extinctis testis & titionibus. Vasorum autem scilicet (ad similitudinem quas lenticulas vocari dicit) in curatione voluisti Aëtius mentionem facit. Nam fomenta, inquit, adhibenda sunt ex furfuribus & per vaporaria vasa lenticulata, & per vesiculas bubulas oleo semiplenas. Reliqua quæ sequuntur, quoniam per se ipsa clara sunt, volentes præterimus.

CAPVT



## CAPVT XVIII.

*Qui cibi, potionēs ve, aut valentis, aut mediæ,  
aut imbecilla materiæ sint.*

CUM de his dictum sit, quæ detrahendo iuant, ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetque ad rem, omnium proprietates nosse: primum, ut sani sciant, quomodo his utantur: deinde, ut exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessaria erunt, subijcere. Neque necesse \* est subinde singulas illas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæque ex frumentis panificia \* sunt, generis valentissimi esse. Id valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quadrupes domi natum, omnem grandem feram, quales sunt capræ, ceruus, aper, onager: omnem grandem auem, quales sunt anser, & pavo, & grus. Omnes belluas marinas, ex quibus *κῆτος* est, quæque his pares sunt. Item mel & caseum. Quod minus mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media verò materia, numerari ex oleribus debere ea, quorum radices vel bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, leporem. Aues omnes à minimis ad Phœnicopterum: item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidi ve saliantur. Imbecillissimam verò materiam esse omne olus, & quicquid in cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparitis. Omnia poma, oleas, cochleas, itemque conchyilia. Sed quamuis hæc ita discreta sunt, tamen etiam quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt, aliaque res alia vel valentior est vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in \* carne, quàm in vilo alio. Firmius est triticum, quàm milium, id ipsum quàm ordeum, & ex tritico firmissima siligo, deinde simila, deinde cui nihil ademptum est (quod *αὐτόπυρον* Græci \* pane,

d. 2.

vocat).



Cibarius  
panis.

Varro libr.  
4. de ling.  
lat. Radix,  
inquit, pe-  
regrinum  
vocabulū:  
sic enim  
antiqui  
Græci, quū  
nunc Ra-  
phanum.

\* sparus,

\* lacteus

\* infirmis-  
simis

vocant) infirmior est, ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus verò valentior faba, vellenticula, quàm pisum. Ex oleribus valentior rapa, napique, & omnes bulbi (in quibus cepam quoque & allium numero) quàm pastinaca, vel quæ specialiter, \* radícula appellatur. Item firmior brassica, & beta, & porrum, quàm lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores vix, ficus, nuces, palmulæ, quàm quæ poma propriè nominantur. Atque ex his ipsis firmiora quæ succosa, quàm quæ \* frigida sunt. Item quæ ex his auibus, quæ in media specie sunt, valentior ea, quæ pedibus, quàm quæ volatu magis nititur: & ex his quæ volatu fidunt, firmiores sunt, quæ grandiores aues, quàm quæ minutæ sunt, vt ficedula & turdus. Atque ex quoque quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant, quàm quæ natandi scientiam non habent. Inter domesticas verò quadrupedes, leuissima suilla est, grauissima bubula. Item quæ ex feris quo maius quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. Piscium quæ eorum, qui ex media materia sunt, quibus maximè vtimur: tamen grauissimi sunt, ex quibus salisamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est, deinde qui quamuis teneriores, tamen duri sunt, vt aurata, coruus, \* scarus, oculata: tum plani, post quos etiam leuiores, lupi, mullicæ, & post hos omnes saxatiles. Neque verò in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod & ætate fit, & membro, & solo, & cælo, & habitu. Nam quadrupes animal omne si \* lactans est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior pullus cohortalis est. In piscibus quoque media ætas, quæ nondum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue vngulæ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædove, cum petiolis totum caput aliquanto, quàm cætera membra, leuiora sunt, adeo vt in media materia poni possint. Ex auibus, colla alæ rectè \* infirmis annumerantur. Quod ad solum verò pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quàm campestre. Leuior pifeis inter saxa editus, quàm in arena: leuior in arena, quàm in limo. Quò fit, vt ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem

\* fragilia  
al. fracida  
al. friabili-  
lia.



eadem genera grauiora sint. Leuiorque qui in alto, quam qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal domestico leuius: & quodcunque humido cælo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra, recentia quam salsa, noua quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quam assa: magis assa, quam \*frixæ. Ouum durum valentissima materiam est: molle vel \*clixæ. forbile, imbecillissima. Cumque panificia omnia firmissima sint, elota tamen quedam genera frumenti, vt alica, ὀρυζα, ptisana, vel ex hisdem facta sorbitio, vel pulicula, & aqua quoque madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus vero, quæcunque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis, valentissimi generis est. At \*acetum, & id vinum, quod paucorum annorum, \*acidum, vel austerum, vel \*lene est, in media materia est. Ideoque \*pingue infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est: firmiorque ex frumento potio est, quod firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui, quodque temperato cælo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido, aut calido natum est. Mulsum quod plus mellis habet, defrutum quo magis \*incoctum est, passum quo ex sicciore \*excoctum est, eo valentius est. Aqua leuissima pluuialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, post hæc ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturam eius requireribus. Nam leuis pondere apparet, & ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæque est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoque celerius ex ea legumina percoquantur. Ferè vero sequitur, vt quod valentior quæque materia est, eo minus facile concoquatur, sed si concocta est, plus alat. Itaque vtendum est materiam genere pro viribus, modasque \*omnibus pro genere sumendus. Ergo \*omnium imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. Moderiter firmos media materia optime sustinet: & robustis apta

d 3

validis



validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest: magis in his, quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

## ENARRATIO.

**Q**UANTVM momenti afferat ad sanitatis non solum conseruationem, sed & ad profligandos morbos ciborum qualitas, satis aperte Galenus declarat, initio libri De boni & mali succi cibus: verum quoniam, ut paulo post docet Celsus, alij cibi multum nutriant, alij parum, alij etiam præterquam quod corpus non alant, vitijs quoque succis repleant; ciborum qualitates breuiter explicasse conueniebat; idq; ut à precedente, aut purgatione, aut morbo, aut inedia, aut alia quavis ratione exhausto corpore, rectè restituere ac reficere egrum possumus. Nam sicuti varia sunt ciborum qualitates, sic quoque inter se differentes sunt refectiois scopi: alia enim corpora, ut auctor est medicina parens antiquissimus Hippocrates, lentam, atque alia citam refectioem desiderant: nam quæ sensim extenuata sunt corpora, lentè reficere oportet; quæ verd citò, breuiter.

## Scire igitur oportet omnia legumina.

**G**ENERATIM tantum enumerat quæ multum nutriant, non distinguens boni succi cibos à cacoehymis; id enim paulo post explicabit. Dicit autem omnia cerealia, hoc est legumina & frumentacea, valentissimi esse cibi, vocantur autem legumina quæcunque manu leguntur, frumenta quæ falce putantur, quanquam sint, qui, ut docet Galenus, solum triticum sub frumenti nomine comprehendere maluerint. Caterum vrit est, siue sub frumento, siue sub leguminibus complectamur, certum est alia aliis plus nutrire. At quod omnia legumina valentissima materia sint, non videtur verisimile; sunt enim quæ media sunt inter multum, & parum nutrienda: nam phaselli & pisa, ut docet Pseudo, media sunt inter luxuriam & modum.

Quæ, siue coquantur, siue minis, inter tarda meatu & celeriter, inter multum & parum nutrienda. Eadem ratione nec omnia frumentacea valentissima materie erunt: siquidem hordeum parum nutrit: & quemadmodum docet Galenus, quod ad panes hordeaceos pertinet, scire oportet omnes quoquo modo parentur, exigui esse alimenti, succumque crassum, ac statim nimium generare, vti etiã omnia legumina: nam hæc præterquam quod valentissima materia sint, etiam flatuosa sunt. In summa, omnes crassi succi cibi multum nutriendi: sic, omne animal quadrupes, domi natum, omne grandem feram, omnes beluas marinas valentissima vocat.

## Item mel.

**Q**UVM mellis mentionem facit Celsus, videtur non solum quæ crassi succi sunt, inter valenter nutrienda numerare; sed & ea quoque quæ tenuem succum gignunt. Nam mel, ut auctor est Galenus, ciborum omnium non modo dulcissimum, sed & succum etiam consistentia tenuissimum gignit. Quare ut rectè à Celso inter valentissima nutrienda numeratum sit, valde dubito: nisi quis ex Hippocratis analogia ad vinum facta, mel multum nutrire dicat: siquidem libro De ratione victus ait dupli vini epotum minus alere, quam simplum mellis. Verum hic Hippocratis locus, non videtur resque adeo urgere, ut hinc statim inter maximè nutrienda mel, idq; potissimum crudum adhuc collocemus: nam Hippocrates non simpliciter & citra exceptionem simplum mellis duplo vini plus nutrire dixisse videtur; sed aliquod vinum, quale est idonæ Phœgæ, nos villum aut pauciferum vocamus, duplo minus melle alere: dicit enim mulsam vino albo tenui, paucifero, & inodoro.



doro quodammodo fortiorem, quodammodo inferiorem esse: adeo ut hinc inter media materie cibos melius constituendum putem.

### & caseum.

CASEVS omnis, inquit Hippocrates, robustus est, estuosus, multum alit, aliumque sistit: Robustus, quidem, quod proximus est generationi; multum alit, quia carnosa sunt reliqua lactis; estuosus, quia pinguis est; alium sistit, quia succo & coagulo compactus sit. Quod igitur valentissima materia sit, satis hinc constat; praesertim quando crasso succo materiam praestet.

### Quo minus mirum est.

LOQVITVR de placenta ex lacte & caseo confecta, de laganis, rheumatis, & iis quae ex similitudine & lacte consunt: quae omnia quam crassioris succi cibi sunt, vix simile quoque est multum nutrire.

### In media vero materia.

DYAS tantum extremorum differentias ponit Psellus; Celsus inter hanc mediam statuit, ut res lectori paulo clarior esset. Recenset autem in medio genere cibiorum, olera, quorum radices vel bulbos assumimus: cuius generis sunt sesarum, rapa, bulbus, napi & similia; sed inter haec alia aliis intensius nutriunt.

### Ex quadrupedibus, leporem.

DIXIT paulo ante omne animal quadrupes domi natum, omnem grandem feram valentissime esse materia: nunc sub medio genere, mediae staturae quadrupedes aut animalcula complectitur: Sed & hac reserve oportuit ceterorum animalium extrema, cuiusmodi sunt vulua, alius, intestina, cauda, auricula, axungia. In genere quoque volucres omnes minus alunt quadrupedibus: unde recte omnes aves a minimis ad phoenicopterum sub hoc genere complexus est. Est autem phoenicopterus ex aquilarum genere, ab alarum rubedine dicta, magnitudine per-

dices excellens, rostrum, & pedes phoenicia habens: versatur per lacum, vulturni similis, minimis alis; imbecillisque, & degener, adeo est, ut a cornis non raro superetur. Huius autem linguam praecipue esse saporis Apitius docuit, quod Marialis quoque hoc disticho satis demonstrat:

Dat mihi penna rubens nomen, sed  
lingua galosis.

Nostri placet, quod si garrula lingua foret.

item pisces omnes qui salem.

PISCIVM omnium nutrimentum sanguinis est: pariterque quam carnis. Quamquam alij aliis nutrimenti plus praebeant, (nam cetos & alias id genus beluas marinas valde nutrire dixi,) dicunt pisces omnes qui salem non parantur, media esse materiae: sunt autem eiusmodi omnes molles & friabiles carnes, aut si qui tales sunt, qui salem ferre possint, eos esse qui solidi, hoc est integri condiantur sale; ut distinguantur a beluis marinis, quas frustis salimus.

Imbecillissimam vero materiam esse.

NUNC ad ea quae minimè nutriunt progreditur: sunt eius generis herbacea omnia, cucumeres, melones, melopepones, etc. huius excrementitia enim magis sunt, quam nutritiva: de iis pronuntiatur in Epidemide reliquit Hippocrates, quod statim in corpore euacuentur, paruo ne tempore in corpore durantem substantiam habeant: Nam tibi, inquit, imbecilliores momentaneam vitam habent.

Siquidem plus alimenti est in carne.

CARO omnis, praesertim quae succulenta est, qualis in venarum, & porcorum est, valentissime nutrit, atque ovis suae in alimentum transit: nam quo natura sibi ipsi similia facillime alteret, atque ad sibi ipsi similem



similem ideam transmittit: carnem quae a sanguine quam minime differt, cunctissime alteratur, & valentissimum nutrimentum inde consequitur: quod frustra alioquin ab aliis quae valentissimè nutrientibus annu-meramus, expectabimus. Nam quantumvis cetacea omnia beluaeque marinae corporis mole terrestria animalia ad eum humanum accommodata superent; tamen, ob excre-mentitiam quandam, pinguisamque superfluitatem qua redundant, minus nutrimen-um terrestribus praebent; adeo rectè à Celso dictum est, ea quae sub eadem specie sunt, magna discrimina recipere, aliâque alius vel infirmiora vel valentiora esse.

### Firmius est triticum quam milium.

INTER tritica plurimum habent ali-menti quae densa sunt, totamque substantiam adeo compactam habent, ut dentibus vix dividi queant; talia enim exigua mole cor-pora plurimum nutriunt; quae vero is sunt contraria, quaeque dentibus quidem facile franguntur, fractaque rura ac lenia appa-rent, magna mole exiguum reddunt nutri-mentum. Verum quae legumina tandem sit fru-mentum, firmius est quam milium: panis siquidem qui ex milio fit, ut docet Galenus, exiguus est, asperius ac frigidus, perspicuum-que est, quod praeparatus sit, ac friabilis, nihil enim in se neque lentoris neque pinguedinis habet, ideo ergo humentem alium magis desiccatur; sed utrum hordeo firmius sit mi-lium, magno pere ambigo: nam hordeacei quidem panes, ut Galenus De alimentorum facultatibus, triticeis multo minus alunt; qui tamen ex praestantissimo hordeo conficiun-tur, minus à triticeis in eo superantur; qui verò ex laxiorae leni, sursuraceis respondent. Dioscorides testis est eum qui ex milio fit panem, ceteris frugibus minus alere: Pellus quoque eundem concoctioni repugnare au-ctor est, quare, si quid hic mihi concedatur, parva dictionum metathefi pro hordeo, milium substituerò; ac rursus pro mi-lilio hordeum.

### & ex tritico firmis-sima filigo.

SI per filiginem alteram speciem triti-ci intellexerit (sunt enim tria in uniuersum tritici genera, robur, filigo & setanum, quod semestre quoque triticum vocant) ne-scio quam apposte inter tritica firmissimam filiginem dixerit; haec enim, ut ordine robo-posterior est; ita bonitate quoque eodem in-ferior est; degenerat enim non tardè in filigi-nem (ut auctor est Columella) robur. At si per filiginem leuissimam purissimamque fa-rinam, semoris viriculis ac sursuribus (quam alij tritici florem, Plinius eiusdem delicias appellat) intellegamus, plurimum inter om-nia panificia dixerimus nutrire, solent autem panes ex ea confectos, purissimos, & tri-tes filiginosque vocare. Hi & massam lentam albidam, ut quam longissime in-durata trahi possit, & plurimum ponderis exigua mole habent; unde & tardissime se-cernuntur, atque nutriunt plurimum; quare bene fermentandos ac probe subigendos, ne-què statim post fermentationem assari vult Galenus, sed longum aliquod intervallum ut intersit praecipit.

### deinde cui nihil adem- ptum est.

Ad hoc & Galenus etiam *συρκοῦς* & dicitur, quod ad ipsos conficiendos tota fa-rina nusquam à sursure seuncta *συρκοῦς* & hoc est comportetur: autem *ρ* & au-tem dictus est *ρ* & *αὐτ* & *ρ* & *ρ* hoc est totum triticum, nulla sui parte adempta, in panificium edat. Verum quid hic ordine filiginos sequi debeat, non possum inueniri ut credam; quum qui ex polline seu simila conficitur, ut filiginis plus, sursurisque ac viriculorum habet minus, ita autopyro na-driat intensius: nam & hunc ordinem Ga-lenus observavit: St quidem inter panes, aut filiginem plurimum nutrit; post ipsum au-tem similacem; tertio loco medius qui & *αὐτοῦ* & *ρ* & *αὐτοῦ* & dicitur: hos ob-baris sequuntur, quos nonnulli secundo co-ctos panes, vulgè biscottos dictos esse, pu-  
bant.



tant. Postremum autem omnium locum obtinent fursuracei, sordidi à quibusdam vocati; hi enim quum parum alant, excrementis tantum ventrem replent. Quorum Celsus ideo non meminit, vel quod in usu non essent, vel quod pecudibus quam hominibus magis convenire existimaret. Cibarii autem panes fiebant ex viriculorum aut fursurii maiore portione, pollinis verò aut siliginis minore.

### Ex leguminibus verò.

LEGUMINA vocari dixi cerealia semina, quæ mann leguntur, & ex quibus panis non fit: huiusmodi sunt fabæ, pisa, cicera, lenticula. Fabarum autem cibus flatulentus admodum est, etiamsi coctus divissimè fuerit, aut quovis modo paratus; multoque magis flatulentior erit, si quis iis integrè coctis utatur; fixa quidem aliqua ex parte statim deponunt, sed concoctu difficillima redduntur, tardèque prætereunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Lentes autem arida sunt ac friabiles, corticemque habent astringentem, & quæ ipsarum est velut caro, crassi est succi & terrei, auileram qualitatem habens exigua, difficilis concoctu, melancholicum succum generans, somniag; ob id terrifica concilians, dolorem capitis adaugens, pulmone ac partibus omnibus nervosis ac felli inutilis, soli stomacho ad subversionem, seu dissolutionem utilis. Triginta enim lentis grana deuorata eandem curare dicuntur, Dioscoride ac Plinio testibus. Pisa autem tota substantia cum fabis similitudinem quandam habent, ut auctor est Galenus, eodemque cum fabis modo sumuntur, tantumque ab eis discrepant, cum quod non aquæ ac fabæ sint flatulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habeant: quo fit ut miretur cur hæc ordine lenticulis & fabis inferiora definiuerit Celsus.

### Ex oleribus valentior rapa.

RAPA, napique succum in corpus distribuunt mediocri crassiore; ac proinde si quis ipsis liberalius vescatur, succum crudum acervabit, potissimum si minus iusto

confecerit: aqua incocta nulla plantarum congenerum minus nutriunt. Bulbi autem omnium, ut crassam & lentam corporis substantiam consequuti sunt, ita succum non omnino tennem generant, quanquam suo amareore crassos lentosque humores incidere, atque appetitum quodammodo incitare non negauerim, reiectionibusque ex pulmone & thorace prodesse. Caterum si bis fuerint elixi, plus quidem nutriunt, sed depositio amareore iis quæ per sputum deicienda sunt aduersabuntur. Radicula autem opsonium magis est, quam alimentum: si quidem cum manifesta sua calefactione atque acrimonia attenuandi habeat facultatem. Caterum hic cum Galeno mirari subit eos medicos atque idiotas, qui post cibos, coctionis innanda gratia, crudas radículas esant: ipsi quidem hanc rem experientia sibi satis exploratam esse affirmant; qui tamen eos ipsos sunt imitati, omnes lesi fuerunt.

### Item firmior brassica.

BRASSICA æstiva, ut inquit Simeon Zethi, peioris succi est quam hiberna, malumque ac melancholicum succum generat, visum hebetat, & somnum per contraria insomnia interturbat; cocta cum pingui carne, plurimum vitij atque noxæ amittit. Cato, ut auctor est Plinius, crambem crispam magis probat; deinde leuem grandibus folijs, caule magno; prodesseque tradit capitis doloribus, oculorum caligini, præsertim quæ ob humiditatem fit, eorundemque scintillationibus, vel stomachi doloribus crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula sumptam acerbulis duobus matutino tempore; tantamque esse vim, ut qui terant hæc, validiores se fieri sentiant. Galenus, non ut alimentum, sed ut opsonium plerosque mandere dicit; medicos autem, ut siccante medicamento vii. A beta autem, ut à reliquis quoque oleribus, corpori paucum admodum alimentum accedit; verum hepatis liensisque obstructions aperit: unde iure quis ut medicamentum potius quam ut alimentum mandi dixerit, nam si multum comedatur, ut auctor est

c

Simeon



Simeon Zelhi, stomacho infestum edulium est. Porrum quoque acris saporis est; quæ ratione corpus calefacit, crassosque humores attenuat, ac lentos incidit: mali succi est; quare ut præstantior eius usus reddatur, bis aut ter in aqua decoquendum est, neque amplius depravatium succum obtinebit. Lactuca omnibus aliis holeribus anteferenda est: est enim succi quam alia omnia laudabilioris. Nam, ut docet Galenus, omnibus aliis ole-ribus paucissimum sanguinem, & vitiosum generantibus; ex sola lactuca non multus quidem nec vitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis, gignitur. Vescimur autem vix plurimum ipsa cruda; ac tum stomachi ardores compescit: æstate autem quum in semen prorupitura est, in aqua dulci percoquentes, cum oleo & garo & aceto assumimus, aut cum alio ex condimentis opsoniisque; præsertim iis quæ caseo constant: plerique etiam antequam excalescat, in aqua elixa utuntur: Dioscorides elixam cruda magis alere affirmat; quo fit ut non satis mirari possim Celsum, quod lactucas brassicæ, betæ, porro capitato postposuerit; quum ex antedictis satis constet, laudabiliorum, probiorum ac copiosiorum sanguinem à lactuca gigni, quam à quouis aliorum prædictorum olerum; nisi forte hæc idem valentiora dixerit, quod crassiores succum generent. Sed si de lactucis id concedamus, quid tandem de altilibus asparagis, quos omnibus postponit, pronunciabimus? siquidem Simeon Zelhi medium quiddam eos obtinere dicit inter olera & carnes: Asparagus, inquit, olerum omnium maxime nutrit; proinde si quis dicat eius naturam positam esse mediam inter olera & carnes, non procul à vero aberrabit, propter nutriendi facultatem, plantarum, & carnum quæ similiter in se habet. Præterea Plinius utilissimum stomacho cibum asparagus prædicat: adeo multis in locis multa præposterè ac confusè (hoc præsertim libro) tradidit Celsus; ita ut nisi religio esset, totam orationis seriem hunc in modum inuerterem: Item firmior asparagus, & lactuca, quam vel cucurbita, vel porrum, vel beta, vel brassica.

### At ex fructibus surculorum.

POMA eò quod posu indigeant, dicta putat Marcus Varro. In genere autem vocantur poma fructus omnes, qui ex arboribus esui humano apti sunt; sic Cato Prænestinas quoque nuces poma vocat; & Martialis pini nuces poma appellat: quod sanè ei licentia quadam poetica concedendum foret, nisi Plinius, Varro, Columella, & quotquot de re hortenſi scripserunt, eadem licentiâ usi fuissent. Propriè autem poma nominantur, fructus omnes teneriore mollioreque velamine seu corio recti; ut nuces quæ duriores. Ficus porro, ut reliqui omnes fugaces fructus, pravi succi sunt; habent tamen aliis minus: sunt autem varia ficu genera, ut auctor est Plinius. Nam sunt quæ grandiores & insipidiore sunt, fatuas ob id Martialis vocat; quæ Mariscæ dictæ sunt. & Chia reliquis delicatioribus sunt: Aphricana à provincia sic dicta, quod Romanis delenda Carthagini occasionem præbuerunt. Sunt præterea quæ Cœtana dicuntur: sunt etiam ficus carica; quæ quum optimè exiccantur, omnes ficus siccatas caricas appellare suenimus. Cæterum quantum ad naturam earum attinet, malum, ut dixi, succum generant; alium citant, vim habent abster-gendi atque cathartici, plus aliis pomis nutriunt, carnem tamen non compactam neque firmam generant, ceu panis, & suilla, sed sublaçam, & subinanem, ut fabæ: præferuntur immaturæ, quas grossos nominant, maturæ; hæ enim nihil ferè obſunt. Ante cibum sumptæ ventrem irritant; sed nisi celerius ventrem pertranscant, non bonum sanguinem gignunt: quapropter si ad satietatem usque edantur, scabiem & pruritum & pediculos excitant. Post ficus inter fugaces fructus (quos opæis vocant) sequuntur una: quemadmodum enim minus quam ille nutriunt, ita minus malum succum generant; maximumque idipſis inest commodi (ut auctor est Galenus De alimentorum facultatibus) quod velociter subsidant: quocirca si quando haſerint, graniter ledunt, neque



neque enim verentur bellè concoquuntur, & dum in venas ac iecur distribuuntur, succum crudum generant, qui non facile in probum sanguinem convertitur: nam acinorum substantia, composita est ex ipsarum velut carne, & humore qui per carnem est dispersus, ex quo fit vinum; præterea ex seminibus, & membranofo tegumento, quod omnia hæc extrinsecus circumdabit. Caterum seminum quidem substantia quodammodo sicca est, & astringens, omniaque intestina peruat, nihil quod sensu deprehendi queat à se mutata. Tegumentum quoque in stomacho exiguum recipit alterationem: quo fit ut quidam ipsum & omne quod intus habent suxerint, una cum seminibus expuant: quæ & ipsa nonnulli comantur expuere, potissimum quum acini grandiores fuerint, nam in exilibus id factum difficile est. Est autem inter vnas, sicut inter ficus, quoque non parua differentia: alia siquidem dulces sunt, alia acida, alia austera, alia rursum quæ nullam vehementem habent qualitatem; vocantur hæc vinosas. Igitur, quæ dulces sunt, succum habent calidiorem, atque ob id sunt sitibunda; austera verò & acida frigidiora; vinosæ verò inter calidum & frigidum medium obtinent. Omnium certe usus si moderatè sumatur, tutissimus est, quum natura fuerint carnosæ atque maturæ. Innocentiores sunt, ut auctor est Dioscorides, quæ decerpita diu pendere, pensiles dictæ, ideo quod in eis copia humoris exsiccat; vilesque sunt stomacho ægrisque quibus cibi aviditatem excitant, capiti quoque prorsus nihil laudunt, quod aliis ferè omnibus commune est, si immoderatius edantur. Sub hisce verò possemus quotquot sunt durioris tegumenti fructus intelligere: in quo albo sunt, castaneæ, pistacia, amygdalæ, pinæque. Firmissimi inter omnes alimentum: sed strictius de iuglandibus tantum, (quas persicas, basilicasque seu regias vocant,) & auellanas (quas Ponticas, & Prænestinas nominant) intelligemus; multum siquidem harum ambarum usus est; alimentumque corpori præbent exiguum, copiosius tamen Pontica vocata quàm Regia nux, quod nimirum ipsius substantia

compactior sit & coactior, minusque oleosa: Regia verò laxior, continetque ipsa in se plus pinguedinis: coquitur tamen nux hæc facilius quàm pontica, stomachoque gravior est, idque multo magis quando una cum caricis manditur. In genere verò recentes nuxes stomacho minus nocent, utpote quæ suavior, atque à frigidis ventriculis facillimè concoquuntur, à calidis verò in bilem magis conuertuntur. Palmarum quoque quas *Phoenix* & *balavods* vocant, variae multæque sunt differentie: alia siquidem magis, alia minus humida sunt, atque alia dulces, alia sicca & astringentes: quotquot autem sunt, difficiles sunt concocti, atque capiti dolorem inferunt: nam succus qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassus omnino est, ac lentoris quiddam particeps habet, quo fit ut celerrimè hepar lienemque obstruant. Porro eæ quæ dulces sunt, succum habent calidiorem; astringentes frigidiora; ac rursum dulces magis nutriunt, acerbescientes prosunt stomacho, ventremque compefcunt. Pomorum autem, ut reliquorum omnium fructuum, magna quoque est differentia, non in generibus solum, sed in eadem etiam specie, quam ex saporibus distinguemus, atque ex his (Galeno quarto Simplicium auctore) facultates ipsas diinducimus; siquidem quæ acerbescunt, frigidum habent & terrestrem succum, nempe crassum; quæ autem acida, frigidum, sed tenuium partium. Dulcia calidiora indicantur: ut *Ææ* (ab Arabibus corrupto vocabulo muza; nos acidodulcia vocare possumus, ut dulcedinis & aciditatis alicuius participia) mediè quodammodo sunt temperamenti. Omnia autem quotquot sunt, excrementitium aliquem, aquerimque, hoc est qualitatibus omnis expertè magis quàm probum succum generant: adeo rectè dictum est Omnia mala, mala. Caterum an Celsus succosa frigidis rectè opposuerit, nondum satis assequor, nisi quæ dulcia sunt, eadem protinus & succosa & calida esse dixerimus, ac proinde frigidis contraria: verum facilis admodum fuerit lapsus pro frigidis, frigidam scribere; quare expuncto digamma *Æolico*, rigida substituerem; eam enim



etiam voce quoniam non solum frigiditas, sed & diuicio deuocetur, recte succosis pomis rigida opposuerit.

### Itemque ex his auibus.

MIRVM nemini uideri debet, quod in eodem genere (valentissime dico & meliocriter nutrientium) aues quae pedibus sedant, quam quae volatu magis nitantur valentiores sint; & rursum inter has ipsas eo firmiores esse, quo fuerint maiores: est praeterea notum, omne animal domesticum agresti esse valentioris nutrimenti; nam haec ingi quadam & perpetua aerium agitatione, ac totius corporis motu, quicquid est excrementitium exiunt; illa contra delicata & ociosa vita, ut adipis multum accumulans, ita excrementitium multumque succum plurimum coacervans. Eadem ratio est cur aues quae continuo perpetueque volatu huc illuc feruntur, (ceteris paribus dico) minus nutrantur iis quae pedibus nituntur: in his enim pedes tantum atque muscoli eos dirigentes exercentur; in illis contra non solum pedes atque ipsorum muscoli, sed tota quantalacunque est corporis compago laborat: nam dum volatu quoquoersum feruntur, alia corporis particula continuo motu agitantur, alia contra dum maximo labore contrahuntur, immobiles persistunt; idque ne aut aeris motu aut ventorum procellis ab instituto itinere perturbentur; siquidem non secus ac naui in aequore clauo regitur, ita iis particulis, quas tamen minime laborare putes, auicula ad optatum finem dirigunt.

### Atque ex quoque quae in aqua degunt.

NISI hic subterfugium aliquod queramus, ac ea quae in aqua degunt inter se comparemus; distinguamusque ita, ut alia natandi scientia praedita, alia minus dicamus, nescio quomodo Celsum hic ab errore vindicabimus: nemini namque dubium est, aerias volucres, palustres, lacustres, aut aquatilibus esse lenioris tum cibi, tum nutrimenti: nam quomodo aliquis ab improba malique succi victus ratione bonum succum aut nu-

trimentum expectare audeat? quis à pisciculis, iis potissimum, qui & lentoris plurimum habent, & solide carnis quam minimum, laudatum sanguinem gigni affirmet? quis deinceps ex pituitoso quodammodo sanguine, solidam compactamque carnem desideret? & rursum, quis ex laxa distractaque carne bonum & firmum se consequitur alimentum existimet? qualis certe earum animi caro est, quae in stagnis palustribusque locis & aqua victum querant. Verum quum aliae vastissima interdum flumina, lacusque natantes dum praedam venantur oberrant; aliae rursum natandi peritiam à natura nondum edoctae, in ripis fluminum aut stagnis si casu aliquo praeda quaequam sese offerat, desides oculis tantum quaquaersum circumactis expectant, comparatione quadam inter has facta, leuioris nutrimenti esse dixit, quae natandi scientia praedita sint, quod videlicet nunquam desides atque ociosae sint: sed sine in aquis victum querentes, siue per aëra volitantes, maximo conatu corpus moueant atque exerceant; nam illic dum aduerso flumine pergant, pedibus pectorisque magnis nifibus cum rapidis vorticibus certant, ac dum in vastum flumen praede causa seipsas demergunt, omnes quotquot sunt lacertos ad opus accingunt: hic contra dum expansis alis aërem ferunt, eas quae in aquis quiescere videbantur particulas plurimum & mouent & exercent; unde & magnam excrementitij humoris partem exiunt, & lenius nutrimentum corpori exhibent.

### Inter domesticas vero quadrupedes.

PER suillam carnem, eam hoc loco intelligere videtur auctor noster, quae veteris victimae aratrem non exceperit, vel nondum assensu sit, hoc est quae prorsus media sit aratis; haec enim optima est & ad gula illecebras & corporis alimoniam & optimi censetur succi. hinc Plinius libro VII. cap. II. Animam, inquit, sui pro sale datam non illepide existimabat. Adde quod quum porcellorum carnes damnet Hippocrates, mada tamen







pisces qui in media materia sunt attinet, grandissimi sunt ex quibus salsamenta quoque fieri possunt; redduntur enim, ut dictum est, carnes sale moderatiores, & probioris succi, suntque eius generis lacerti; eos statim ordine sequuntur, qui quum dura carnis sint, difficiles quoque concoctu existant: in quo albo corni seu coracini numerantur. Vocat autem lacertum (ut auctor est Paulus Iovius eo quem de piscibus Romanis conscripsit libro) quem Graeci *οακισπος*. Plinius tamen libro XXXIII. capite ultimo varia esse lacertorum genera tradidit. Ceterum lacerti, quos scombros esse diximus, oblongi & exiles sunt, sulphureoque colore conspiciunt, praesertim quum in aquis vagantur, verumque potissimum pinguescunt; & quum durioris carnis sint, boni quoque succi sunt, sed difficile secernuntur ac digeruntur, quare salsamento substantiae crassities quodammodo atteritur, & ad excretionem promptiores redduntur. Aurata autem & scari inter pelagios pisces summè commendabantur, adeoque inter se similes sunt, ut vix discerni possint: ex auratis verò quum toto passim mari gignantur, Tarentinam praeulerunt antiqui, eamque potissimum qua Lucrinis stagnis illata concharum esu pinguesceret: nam, ut Martialis,

Non omnis laudem preciumque aurata meretur,  
Sed cui solus erit concha Lucina  
cibus.

Capiuntur raro aestate, hieme autem frequentissimè. Scaros Ennius Iouis cerebrum appellare solebat, quod inter petrosos pelagiosque primas obtinerent. Coruos autem & coracinos contra Volaterranum eosdem esse existimat Iovius: Nam cornus, inquit, gibberosus est, & proportionem ceterorum admodum latus videtur; ut accidit coracini, quos Parmenio Rhodius, qui de re coquinae scripsit (ut allegat Athenaeus) *πλατυσκοπος* à latitudine corporis appellavit. Oculatam Plinius inter lacertorum genera annoveravit, atque à melanuro se iungit: Iovius oculatam cum melanuro idem esse affirmat, sicque vocatam ab oculi magni-

tudine. Luporum autem carnes à Galeno in ratione valetudinis, mirificè commendantur, quod sanguinem subtiliorem, bonique succi gignant. verum quis fuerit piscis lupus, & virum is quem lupi nomine passim appellamus, in fluminibus, paludibus, stagnisque ac fossis delitescens, admodum dubito; siquidem Galenus inquit: In aquis dulcibus natum hunc piscem non vidimus, sed è mari in flumina aut stagna ascendisse conspeximus; & quamvis pelagius sit, stagna tamen maritima non fugit. Multi quoque senigle, pelagicis piscibus annoverantur, celebranturque olim adeo apud homines, tanquam voluptate reliquos cibos superarent, ut sepius argenti puri pondere à privatis etiam civibus, quum pedis longitudinem superarent, emerentur. Omnium servè aliorum pelagicorum carnem habent durissimam, & valde friabilem: unde neque lentoris alicuius, neque pinguedinis particeps est; nutritque, si probe confectus fuerit, omnibus aliis piscibus copiosius. Atque haec haec de pelagicis, qui saxe ut crassioris substantiae sunt saxatilibus, (voco autem saxatiles seu petrosos, qui in petrosis promontoriis, & ubi saxa sunt delitescunt parviusque) ita etiam plus nutriunt, quanquam hi probiorem tenuioremque sanguinem generant.

### Neque verò in generibus rerum.

NON solum rerum genera aut species ciborum discrimina evariant, sed & sexus; alterius enim aries, alterius vernex; & rursus alterius succi nutrimenti que omnis: eadem ratio est de taurinis, bubulis, vaccinisque carnibus; nam castrata omnia melioris succi sunt, & probius nutriunt. Sexum statim sequitur aetas; nam haec varietatem quandam & discrimen admittit: etenim quadrupedia quae immatura sunt & adhuc lactantur, ut humidiora sunt, ita discutiantur facilius, ac proinde minus nutriunt. Medio loco se habent mediae aetatis; quod ad succi bonitatem attinet; at quod ad alimoniam spectat, ceteris intensius nutriunt. Senum autem carnes pessima sunt, tum ad conco-

quendum,



quendum, tum ad bonum succum generandum, tum ad nutriendum. Etatem habitus sequitur, probioris enim succi, validiorisque cibi est bene habitum, quam macilentum ac strigosum; ac rursus sanum, quam morbidum; nigrum, quam album, nigricantia enim albicantibus robustiora sunt & iocundioris saporis. Cohortales porro pulli quo teneriores sunt, eo quoque lenioris materia: dicuntur autem cohortales anes quae intra cohortem villaticam continentur, quales potissimum sunt gallinae, ex eo dictae (ut auctor est *Mat. Varro*) quod circa eum locum pecus coërceatur.

### Deinde ex eodem fove vngulae.

Hic locus flagitat ut breviter de omnium terrestrium extremis visceribusque sermonem instituamus: extrema autem voco rostrum, pedes, aures; haec & parum carnis habent, & quum perpetuo motu exercitentur, viscosiora sunt & nervosiora: quo fit ut quum ob viscositatem alio facilius secedant, minus quoque nutrimentum corpori administrent; quare recte in media materia auctor noster constituit. Inter vngulas autem seu pedes summe commendantur suilli. Rostrum ordine sequitur pedes; atque hoc rursus aures, haec siquidem sola cute & cartilagine constant, quare & lenioris nutrimenti, & difficilius concoctum sunt: nam cartilago in perfectis quidem animalibus confici omnino non potest, in his vero quae adhuc augeantur, si in ore bene lenigata, & in stomacho probe confecta fuerint, paucum alimentum corpori dabit. Cerebrum autem reliquis omnibus pituitosius est alimentum, crassi ac improbi succi, ac tardi transitus, difficile concoctum, inutile stomacho, nauseamque concilians. Huic proxime accedit osium medulla: quae quantumvis durior suaviorque sit, nausea tamen cruditate generat; si tamen probe concoquatur, nutrit ex sententia. Agnorum autem, hadorumque petioli (ita enim vocamus paruos pedes) cum toto capite lenis admodum sunt nutrimenti, sed boni familiarisque quodammodo succi.

Glandulosa autem omnes partes, si probe conficiantur, non minus quam carnes alunt: hoc enim commune habent, quod tenerae, ac suaves edentibus appareant; sed mammarum praecipue, quum lac habuerint, dulciores habentur. si non concoquantur, excrementitium crudumque succum gignunt. Ex harum quoque numero sunt testes, qui propter virositatem quandam quae ipsis inest concoctioni resistunt, & vitiosos generant humores. Renes autem quod mali succi sint, vel hinc liquet, quod in gustu urinae qualitatem quampiam praeseferant. Hos ordine sequitur iecur: quod ut crassi succi est, ita concoctum difficile, ac aegre digeritur. huic, quod ad substantia qualitatem attinet, quamproxime accedit cor: lien vero ut melancholici humoris receptaculum est, ita si estur, eundem in corporibus gignit ac adangit; ac proinde iecinori aequè ac lieni incommodat. Pulmo quidem reliquis facilius concoquitur, minus tamen nutrit, ac succum pituitosiorum gignit.

### Ex auibus colla alaeque.

Hic meminisse oportet, quod ante dictum est, non parvam esse differentiam earum animarum quae in stagnis, aut palustribus locis degunt, ad eas quae per montes ac siccos locos victum quaritant: etenim iuxta locorum proportionem carnes animalium aut siccae aut superfluitatibus carentes, & concoctum faciles; aut contra humide excrementitiaeque, ac concoctioni repugnantes redduntur. Alae igitur in iuuenibus ac pinguibus volucris optima sunt, ac boni succi, & facile concoquantur: nam ingi motu si quid habent excrementitij exiunt, suntque imbecillae materiae, ut neruea omnia.

### Quod ad solum vero pertinet.

PRISCI qui de agricultura scripserunt, tria terrarum genera definiuerunt, campestre videlicet, collinum, & montanum, collemque clementem, ac molliter ascendentem qui orientali, aut meridionali plagae aduersus esset, laudabant, quique lenibus quibusdam



rimulus irrigaretur; hic enim, ceteris paribus, firmitus meliusque frumentum producit, quam aut campus aut mons. Neque hic in terminis habendum est; nemini siquidem dubium est, campestre frumentum, quod in pingui, bene subacta dulciq; terra creverit, valentius esse collino, quod aspero, macro, frigidoque solo natum sit.

### Leuior piscis inter faxa editus.

HIC obiter admonendum mihi lector est, quam temere medicastri nonnulli cum vulgo pelagicorum piscium (inter quos saxatiles merito annumerantur; vocamus enim, ut dixi, saxatiles pisces qui vti petra, ac littora saxosa sunt degunt) usum agrotantibus potius interdixerint, quam flumiatilium; quod videlicet granioris materie & cibi firmitioris, succique improlioris esse existimarent. Quod sane quam à veritate dissentiat, argumento erunt mugiles, anguilla, lupique, qui quum ex alto mari in vicinam aliquod flumen aut stagnum feruntur, statim à genuina illa succi bonitate degenerant: nam (ut post Galemum auctor est Aetius, Paulus & quotquot de re medica classici scriptores erant) optima caro piscium est in puro mari degentium, magisque ubi locus is ventorum procellis agitetur, & neque terrea neque lenia littora aquam ambiant, sed arenosa aut aspera aut lapidea: si vero ad aquilonares quoque ventos loci conuersi fuerint, multo melius est: manifestum est enim mare mari prestare in eo quod aliud perfecte tranquillum est, & *καταστάσις* Græci vocant; aliud magnos fluctus excipit: siquidem tanto deterior piscium eorum caro redditur, quanto fluctibus minus agitur; mediūq; quodammodo locum inter pelagicos marinosque pisces, & flumiatiles obtinet. adeo magnum discrimen est, inter pelagicos flumiatilesque pisces, ut non solum succi bonitate cum illis comparari non mereantur, sed multis numeris ab illis superentur; & quod ad succi probitatem attinet, tertij tantum ordinis censentur. Adde quod in flumiatilibus quoque non paruum discrimen sit; siquidem optimi cen-

sentur qui in iis fluminibus gignuntur, ubi aqua & copiosa est & rapide fluit; hos sequuntur qui in leni fluminis tractu pascuntur; hisq; peiores sunt, qui in stagnantibus aquis degunt; habent enim carnem concoctam difficilem, & bonum alimentum quam paucissimum. Proinde non solum aquarum discrimina pisces bonitate succi aut commendant, aut eiusdem improbitate reproband, sed & penes alimenta quoque peiores melioresue redduntur: siquidem quibusdam, ut docet Galenus, herbarum, aut bonarum radicum copia suppetit, iſq; eam ob causam reliquis sunt præstantiores, alij contra herbis pascuntur limosis, & radicibus mali succi: præterea sunt qui in fluminum ofiis magnam aliquam præterfluentium urbem que sterquilinia, aut balineas, aut culinas, & vestium ac linteorum sordes expurgant, victitant; qui ut pessimo victu viuunt, ita pessimi, atque inter reliquos deterrimi sunt. In genere autem neque lacustres, neque palustres, neque stagnales pisces laudem aliquam aut ob succi bonitatem, aut ob nutrimenti copiam merentur.

### Omne etiam ferum animal.

GALENUS De alimentorum facultatibus tertio, Domestica, inquit, animalia temperie humidiora sunt quam agrestia, tum ob aeris in quo degunt humiditatem, tum vero etiam ob vitæ ignaviam: nam que in montibus degunt, multum exercentur ac fatigantur; præterea in aëre sicciore viuunt, quapropter earum caro est durior, nulliusque prorsus pinguedinis, aut paucissime, participes; que causa est cur pluribus diebus quam domesticorum & ociose viuentium animalium seruetur impuris. Liqueat item quod alimentum quod ab iis provenit, minus habet excrementi, sicut excrementitium est quod à domesticis atque ociosis sumitur: necesse igitur est alimentum huiusmodi nutrire valentius, quam alterum, succūq; genere multo meliorem. Hucusque Galenus ferorum animalium & domesticorum discrimen enarravit, totamq; hanc periodon breuiter



breviter explicavit; nam aeris seu calidi humiditatem, multum ad temperiem humidam conferre dixit; atque hanc rursum pinguedinis quodammodo causam esse. quare quod & ea quae domestica & solo humido nata, & pingua sunt, feris, hoc est his quae in montibus degunt animalibus, & quae siccato celo pascuntur, & quae natura non morbo aut alimenti penuria, macra sunt, valentioris nutrimenti sint, liquet: ac proinde quum ea tantum sale condiamus, quae & excrementitia sint, & corporis mole excedant (sal namque si quid in corpore est humidum, quodammodo absorbit, & quod reliquum est substantiae solidae contrahit, ac proinde conditura sua carnes servat, atque à putredine tuerit) recte salsa insulsis ac recentibus minus nutrire dicimus, quanquam nonnunquam si recenter salita sint, probiorum succum gignant recentibus: cuius rei argumentum praeberi cetacea omnia, sues bouesque praepingues; redduntur siquidem, ut dictum est, salis conditura carnes moderatiores. Caterum quod noniter mactatae carnes (ita enim proprietates sermonis efflagitat ut intelligamus) vetustis plus alimenti praestent, vel hinc constat, quod haec exucca; ille contra succi plene: quare non secus ac pingua macris, recentia vetustis intensius validiusque nutriunt.

### Tum res eadem magis alit.

ESCVLENTA alia elixa, alia assa melius & edi possunt, & nutriunt; quae enim humidiora natura sunt, ampliore humidificationem non desiderant; quare & exiccationem requirunt, quam assatura aut fruxura facillime consequuntur. Elixia enim omnia humidiora mollioraque redduntur; quae ratione facilius consueuntur & valentius nutriunt. Assa similiter frixis magis alunt: igneo namque calore quicquid est humoris, quicquid superest succi quodammodo exigitur. Quanquam non negem Aristotelem Problematum sectione prima, assas carnes elixis humidiores praedicare, quod videlicet calore ignis densata carne obstitat, quae poris dum exitus viam nullam inne-

nunt, humores intro resiliunt, ac proinde succulentiorum carnem reddunt. quod sane quam sit rationi consonum (quanquam analogia ad eos qui nudo corpore in sole obambulant nitatur praebere) cuius satis notum arbitror: nam eodem libro sectione vigesima palam elixatione carnes humiliores mollioresque reddi affirmat.

### Ouum durum valentissimae materiae.

OVA tres habent penes se differentias: aut enim penes propriam substantiam; gallinarum enim aut phasianorum meliora sunt: aut penes tempus, recentia scilicet ne sint aut vetera; recentia namque meliora sunt, atque adeo optima eorum est operatio: aut penes cocturae rationem modumque decoquendi; nam quaedam diutius decocta fuerunt, alia ad mediocrem usque consistentiam, alia etiam dimittat excelsa: atque hinc quum summam varietatem, vel ad succi probitatem, vel ad nutrimenti qualitatem consequantur, Celsus duabus prioribus differentiis omisis, hac sola contentus fuit, clarius existimans quam ut explanatione egeat, phasianorum, gallinarumque ova ceteris praestare. Igitur ea quae sordida sunt ova (ut auctor est Simeon Sethi) vix calida parantur, facile pertranscunt, & gutturis leniunt aspredinem, quod humor in eis nondum incrassatus concreverit; nutriunt autem reliquis minus. proxima his sunt tremula, vel mollia ad medicam consistentiam cocta; ad nutriendum omnium sunt praestantissima: nam facilius concoquuntur, & digeruntur, bonisque humores procreant. Quae vero ad sifistudinem usque cocta sunt (eodem Graeci vocant) ad concoquendum sunt difficilia, tardaque transitus, crassiusque alimentum corpori tribunt. At maius adhuc eorum onorum est vitium, quae subitus calidum cinerem assantur; haec enim reliquis antedictis peioris sunt succi, & tardius descendunt: adde quod ἐμπύρεμα quoddam sapiant. quo fit ut non possim satis mirari obstetricum nostrarum vulgus, quae tamquam optimi succi cibo, sex parva decumbentes his solis

f

ennutrire



ennutrire consueverunt; atque adeo eas etiam quæ febris correpta sunt, quo alienum nihil exhiberi potest, propter *ἰσχυροποιήσας*, ut dixi, qualitatem, & succi ipsius improbitatem, ut interim difficultatem concoctionis omittam. Non negauerim tamen quin nonnunquam citra noxam administrari possint: ut si restringendum sit, aut fluxus aliquis inhibendus; ut si puerperij purgamenta immodicè fluant, aut si alius per se fluxa nimis sit. verum satius esset ad arcendam succi improbitatem, & adustionis qualitatem, eadem horis duabus in acvi aceto macerata madefactis stupis, aut lineis lineis inmoluere, & deinde cineribus obrinere. Est porro præter hoc aliud coctura genus, quo in sartagine ova fringuntur, *τρύγανδα* vocant, quæ pessimum habent omnibus modis alimentum: nam interim dum concoquuntur, in nidorem vertuntur, ac præterquam quod succum crassum gignunt, ipsum etiam prauum gignunt atque excrementitium. At quæ *πικράδα*, hoc est suffocata appellantur, elixis & asis sunt meliora, Paranturque, inquit Galenus, ad hunc modum: Vbi ipsa oleo, & garo, & paucis vini aspersa fuerint, vas quo continentur cacabo aquam calidam habenti inditur: deinde ubi ipsum totum superne obturauerint, ignem substruunt, quoad ona mediocrem habuerint consistentiam: quæ enim supra modum sunt crassa, elixis & asis sunt similia; quæ vero ad mediocrem crassitatem peruenierint, & melius quam dura concoquuntur, & alimentum corpori dant præstantius.

### Cumque panificia omnia.

**PISTORIA** omnia seu panificia (eo etenim nomine cereales omnes fruges complectimur) valentissima materia esse autè demonstratum est. verum quum sub eadem specie varia nonnunquam discrimina reperiuntur, in his etiam non parua differentia est: alia siquidem aliis intensius minusve nutriunt; nam robur tritici speciem, inter reliqua cerealium valentissima materia designimus, & ex tritico firmissimam siliginem. Ea autem frumenti genera ex quibus

elotis aut puliculas aut sorbitiunculas parare solemus, media aut aliqui imbecillissima materia annumerantur: cuius farinae sunt alica, oryza, ptisana; in genere quoque quotquot sunt frumentacea quæ elota sunt, infirmioris sunt alimenti illotis, nam quicquid habent lentoris, quicquid habent crassitie, ablutione exiunt. Per alicam autem, frugem intelligit, ex tritici genere; quæ, ut auctor est Galenus, nisi lota sit, valenter nutrit, succumque crassum habet. ceterum sine ea quæ Græcis *χόρδο*, & an ea quæ *ἄλγ* dicitur, doctissime disputat Rembertus Dodonæus medicus Mechliniensis: quare si quis huius & aliarum pulicularum & sorbitiuncularum, quarum hic Celsus meminisse videtur, facultates atque naturam scire desiderat, eum consulat. Oryza autem sine elota sit, sine illota, alica minus nutrit, difficilisque conficitur. Per ptisanam autem hordei granum decorticatum intelligit, quod nimirum ex hoc (potissimum apud Græcos) ptisana conficeret: nam alioqui etiam (nisi oryza meminisset) ad oryzam, & ad alias omnes fruges purgatas & à corticibus suis mundatas (nam ptisana *ἀπὸ τοῦ πριότου*, hoc est à purgando, dicta est) æquè transferri posset: siquidem Plinius libro XVIII. Italici, inquit, oryza maxime gaudent; ex qua ptisanam conficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Galenus quoque ex tritico eandem fieri affirmat: quæ uti ex firmiori fit materia, ita ea quæ ex hordeo conficitur intensius nutrit. Atque hæc hactenus de elotis frugibus, sorbitiunculisque ex iisdem factis. verum qui panis ablundi modum excogitarunt, ut ait Galenus, minoris sanè alimenti cibum, sed qui ab obstructionis nota absit, quoad licet longissime, innenerunt: siquidem panis hic succum habet minime crassum & lentum, ut qui ex terrestri aëri sit factus: nam eius lemitas apparet tum per stateram, tum quod in aqua non submergatur, sed suberis instar supernatet.

### Ex potionibus verò.

**VARIA** ex hordeo triticoque, vini penuria, potionum genera excogitarunt homines; ita



nes; ita ut quot sunt septentrionem versus provinciarum nomina, totidem sint potionum discrimina: quas omnes uno eodemque vocabulo patrio nomine birias; aut à cerealibus frugibus cereuicias nominant. Antiquitas zythi, conuimque & potentie (quam ἄλφις & Græci dicunt) meminuit: nam, ut Dioscorides, ex hordeo potus fit cui zythi nomen est. huius usum apud Ægyptios Dioscorum primum inuenisse tradunt: qua de causa apud poetas Pelusianus potus nominatur. Suidas autem zythum hordeaceum vinum nominat, quod vicem natini vini gerat: alij βύτρον seu βύτριν vocare maluerunt; Aristoteles autem, ut auctor est Athenæus, τριζον appellat: verum quomodounque appellare lubuerit, idem esse zythum cum nostra cerenisia contenderim; qua quanto plus tritici aut hordei admittit, eo valentius nutrit: varias namque facultates sortitur pro decoctionis differentia; alij etenim hordei auenæque, quam minimum, triticique quamplurimum induunt; alij rursus tritici nihil, secalis, hordei aut auenæ quam plurimum: sunt alij rursus qui resinis quibusdam utantur; alij hormino satius eiusque semine; alij deinceps agrestis myrri decoctionem præparant; atque omnes quotquot sunt lupo salutaris tanquam condimento quopiam, ne ante tempus ace scat, coniungunt.

### itemque lac, mulsum, defrutum, passum.

LAC, ut docet Galenus De alimentorum facultatibus tercio, inter cibos qui ab animalibus sumuntur, est numerandum: in quo haud parua pro anni temporibus est differentia, & adhuc maior pro ipsorum animalium specie atque habitu, atque ex ipsis pascuis. Nam quantum natura inter se distat vacca, equa, & ouis, ceteraque quotquot sunt animalia; tantum & lac ipsorum inter se differt: siquidem bubulum lac crassissimum est ac pinguisimum, ac proinde valentius reliquis nutrit. tennius, liquidius, ac pinguedinis minimè particeps est camelorum. mox equarum sequitur; deinde asinarum: media autem consistentia est capra-

rum; hoc crassius est ouium: suillum autem omnium crassissimum est, ut neque coagulandum opus sit ad coagulandum, & serum modicum habeat, & in coctura celerrimè coeat, unde in ventriculo leuissima de causa nauseam mouet. Ab habitu quidem: nam melius lac præbet sanum, quam morbidum animal; nigricans quam albicans; nam in totum in brutis nigriora sunt robustiora; alba verò imbecilliora; nam & carnes nigrorum animalium magis sapida ac delicatioris sunt, quam alborum. Secundum anni tempora: nam verum, & post partum est liquidissimum; temporis verò progressu, magis ac magis incrassescit, ita ut media estate ipsum in medio sue naturæ consistat, quare & tum concoctum facilius, & suauioris est odoris; post id deinceps tempus sensim crassescit, donec in totum deficiat. Sed & neque ex his tantum lactis discrimina petenda sunt, verum etiam à pabulo quo vescitur animal: alias siquidem aliam herbam depascuntur animalia. sic si quando contingat (ut docet Galenus libro De sanitate tuenda) ea lactucas marinas esitasse, lac quoque vim catharticam sortiatur. sic Hippocrates sexto Epidemion, Si puero alius non satis responderet, inber ut mulier aut capra elaterium, aut cucumim siluestrem comedant; ita enim puerulis facilem subsequitur purgationem: nam & si astringitione opus sit, exhibitis ante pabulis qua astringunt, & austera acerbæque nonnihil sunt, lactis ipsius naturam præparare solent. Præterea virides herbae, & iuxta aquas nascentes liquidius modicumque lac suggerunt; qua verò duriores sunt ac montana, optimè se habent ad lactis tum boni, tum copiosi generationem. In genere tamen lac omne boni succi est & multi nutrimenti: præsertim si animalium sit in vigore consistentium; id enim reliquis melius, nam inuenum liquidius, senum siccius est. Intensius autem nutrit, si cum aliquo crassioris succi edulio diutius coquantur, statuostratèque deponet. atque hac hætenus; de mulso, defruto, passo in sequentibus dicturi.

f 2

vinum



vinum aut dulce aut  
vehemens.

EVARIANT vina penes solum, substantiam, colorem, saporem, etatem & odorem: Secundum solum; nam aliud collinum, aliud campestre, montanumque aliud. Penes substantiam: aliud siquidem tenuium est parium, aliud crassarum. Penes colorem: ut si rubrum, subrubrum, nigricans, fulvum, albissimum sit. Penes saporem: aliud namque dulce, aliud acre, astringens & astringens aliud est. At secundum eam quæ in odore est qualitatem: alia siquidem boni odoris existunt, alia contra ingrati odoris sunt, ac fermentem quandam ac insuavem nacta sunt qualitatem, alia rursum nullum omnino odorem habent, sed aquæ instar inodora sunt. Secundum etates autem differunt: nam aliud recens est, aliud magna vetustatis, aliudq; medio quodam loco inter hæc situm est. Verum non est presentis institui singulas vinorum differentias enumerare, atque eas ad amussim excutere; sed eas tantum quæ ex nutriendi facultate sumuntur. Igitur quod ea quæ crassa sunt tenuibus intensius nutriant, præter experientiam, ex ipsorum quoque natura clarum sit. hoc tamen variant discrimine quod alia magis, alia minus pro crassitudinis portione id efficiant: nam quæ crassa admodum sunt, ut tardius conficiuntur, ita si robustum ventriculum nacta sint, atque perfecte concoquantur, reliquis copiosius alimentum subministrant. Atque ea quæ moderate crassa sunt & rubra, optime nutrire dicimus, ut quæ minima egeant mutatione, ut in sanguinem mutantur; quo fit ut ei generando sint accommodatissima. His proximè accedunt, quæ nigra, crassa dulciæque sunt, atque ea quæ colore quidem nigra sunt, & rubra; consistentiâ autem crassa cum astringendi facultate. His minus alunt, quæ alba simul sunt & crassa & acerba: ut omnium minimè, quæ & colore alba sunt, & consistentiâ tenui. Cæterum quacunque dulcia sunt, ea quoque substantiâ crassa sunt, ac facultate calida; (nam, ut Galenus de simplicium medicamen-

torum facultatibus, dulcis sapor à caliditate, quæ non immoderata & vehemens sit, generatur) austerisque facilius & distribuntur in ventriculo & conficiuntur. Vehementia autem vocat, quæ Hippocrates & Galenus potentia ac vinosa appellant: ea colore quidem fulva aut flava, consistentiâ vero, sicuti dulcia, crassa sunt: hæc principem ad sanitatis conservationem locum obtinent, si moderate sumantur; nam calorem innatum augent, ventriculum roborant, atque quæ concoctionem adiuvant, facile etiam concoquuntur, aliisque ducende non omnino aliena; in hoc solum vituperanda, quod caput virtute sua calida repleant, atque offendant. Muslum deinceps quomodo valentissimi generis alimentis ascripserit, vehementer miror; notum siquidem est muslum omne & crassum esse & flatulentum & concoctu difficile, atque id bonitatis dumtaxat habere, quod ventrem subducit; cuius successu si frustretur, maiorem noxam corpori asferre: nam facillimè in stomacho acescit, & diutissime in ventriculo aquæ instar suspensum manebit, ac calorem innatum suffocabit, & concoctioni resistet. Contra quæ magnæ vetustatis sunt vina, eò inter valenter nutrientia numerant, quod eadem consistentiâ crassa quoque sunt; siquidem nulla tenuia (quæ *ἀλυσόμενα* vocant) vetustatem ferre possunt: sunt tamen in regimine sanitatis non ab omni noxa libera; nam si immodicè bibantur, ut ait Dioscorides, nervos reliquosque sensus ledunt, quare cavendum iis qui intestina alicuius partis imbecillitatem sentiunt; monet; si tamen in secunda valetudine diluantur aqua; noxam aliqua ex parte exuere tradit. Solent autem vetera vocare vina, quæ septennium transgressa essent; media siquidem vinorum ætas, eodem teste, septimo anno desinebat.

## At acetum, &amp; id vinum.

QUEMADMODUM varia sunt vinorum discrimina, ita acetum plurimum reperitur differentie: omnes tamen quotquot sunt, parum admodum corpori subministrant alimentum, quare an rectè medicæ materis attribuerit,



tribuerit, dubito: nam praequam quod parum nutriat, crassos ac lentos humores etiam incidit: unde rectius imbecillissimis annumerandum putarim. nam, quod ad nutriendi facultatem attinet, nescio an recte vino (quod quum paucorum annorum sit, leue quoque vel austerum est) comparari possit: siquidem quantumcumque omnia, qualia tandem sint, recentia vina parum nutrire dixerimus, plus tamen aceto cuiuscunque generis alent. Vocat autem paucorum annorum vinum, quod septimum, ut diximus, annum nondum attigit.

### Idcoque infirmis nunquam generis.

VINUM leue, quod ἀνρύφον, quoque vocari dixi, quod paucorum quoque annorum sit, egrotis rectissime administratur; ut quod parum nutrit, & citissime per uniuersum corpus distribuitur ac per urinas fertur, caputque ac nervos quam minimè tentat. Verum an idem in austero experiri liceat, deliberandum cenfeo: siquidem quantumvis parum nutriat, ac per uritides in vesicam oryssimè delabatur, citra tamen noxam aliquam id non praestabit; nam caput leuissima de causa dolore tentat, & quam citissime temulentiam igitur.

### Aqua omnium imbecillissima est.

QUANQVAM generatim omnes aquarum differentiae concocti sint difficiles, tardique transitus, ac nullum vel parum admodum corpori nutrimentum exhibeant; intenditur tamen firmitusque redditur earum alimentum, si frumento commisceatur, quemadmodum in zytho ceremisiaque fieri ante demonstravi; idque eo validius, quo frumentum firmitus meliusque fuerit.

### firmior ex eo vino quod bono solo.

QUEMADMODUM ad frumenti bonitatem non parum conducit soli qualitas (nam collinum reliquis praestare dictum est) ita ad vini naturam immutandam non parum se-

cerit caeli temperies & soli qualitas; siquidem quod temperato caelo, ac lato bonoque solo, & annibus quibusdam irriguo natum sit, eo quod strigoso lenique solo, & caelo ad alienius intemperiei excessum declinante prouenerit, firmitas multo ac ad usus humanos magis accommodum reddetur.

### Mulsam quod plus mellis habet.

MVSI, quod διώματα vocant, vires (quod ad nutriendi facultatem attinet) non solum intenduntur, pro mellis copia, sed & eiusdem qualitate, & vini ex quo fit, etate & consistentia. Si ex probi mellis metreta una (quale est, Galeno libro De sanitate tuenda auctore, id quod odorum flauumque praeterea acerrimum dulcissimumque fuerit, tum erassitudine nec planè crassa nec liquida, sed quae continuatam suam teneatur, ut si digitum in id demiseris, post in sublimè tollas, quod mellis ab eo desluit, longissima quasi lineà continuatum videas) quam id quod ab improbi mellis (cuius modi id est quod multam egerit spumam) sesquimetreta vini metretis duabus praeparetur. Ac rursus intensius nutriat mulsam, si ex cocto despumatoque melle confiat, quam si ex crudo. Adeo multa hic consideranda sunt: nam & vinum ipsum si antiquum sit, & fulvum & consistentia crassum, vinum quodammodo intendit; ubi vilius tenue & paucorum annorum, eandem imminuet. Praeparabant autem antiqui variis modis oenomeli: nam Dioscorides id summe commendabat, quod ex duabus vini veteris metretis, mellisque una pararetur. Palladius contra musti optimi, post dies xx quam ex lacu leuatum fuerit, quateram voluerimus sumendum praecipit; ac deinceps mellis optimi non despumati (prius tamen fortiter triti, dum albescat) quintam tantum partem admiscet. Quae sanè confectio ut mellis minus recipit, ita debilius nutrimentum subministrat. Atque haec de simplici mulsis: nam ex medicatis herbis, aut aromatibus praeparatur; quod podagricis, nephriticis, artriticis febribusque viliissime subministrari affirmat Galenus



libro sanitatis tuenda quinto: quod ut medicamentosum magis quam vescum est, ita ad hunc locum parum pertinere arbitror.

### Defrutum quo magis incoctum est.

DEFRUTUM à defruendo dictum est: solebant autem id variis modis preparare, variæque pro decoctionis modo nomina inde: siquidem aut saporam, aut carannum, aut defrutum nominare consueverunt. Mulsam igitur aut mustum ubi fortiter despumauerit, atque ad spissitudinem effectum est, defrutum; Carannum quum tertia deperdita duæ partes remanserunt; saporam, ubi ad tertias partes redactum descenderit, vocabant. Celsus solo defruti nomine contentus, eo plus nutrire dicit, quo plus inferbit: nam decoctione firmius crassiusque redditur; qua ratione saporam carano defrutog; proprie dicto intensius nutrire dicemus.

### passum quo ex sicciore uua est.

PASSUM hoc modo conficitur: leguntur uuae passæ quamplurimæ, & in sicellis clausæ iunctis factis aliquatenus rariore contextu uirgis primo fortiter verberantur; deinde ubi unarum corpus vis confusionis exsoluerit, cochlea supposita spora comprimuntur: hinc passum est quicquid effluerit; ac proinde quemadmodum de uuis quoque, defruto, ac mulsio dictum est, quanto fuerit crassius, tanto validius enadet, cuiusmodi ex ficiorebus potius quam humidioribus uuis exprimitur.

### Aqua leuissima pluuialis est.

AQUARVM differentia variæ sunt: nam præter eas quas hic enumerat Celsus, enariant non raro propter spiritus; ut si Bozeas, Ausler, Fanonius, Eurus, aut alius quispiam collateralis ventus spirauerit. Penes tempus anni etiam discrimen admittunt: uti penes regionem; ut si ex montibus, aut acclini planiorve loco fluant, ac rursum secundum orbis plagam quâ feruntur; ut si se-

ptemtrionem, meridiem, occidentem aut orientem versus labantur. In genere tamen aqua eo commendatior est, teste Hippocrate, quo fuerit lenior: qualis cerè erit, si citò calefiat & frigefiat. Galenus lenitatem non vult estimari pondere, sicuti facit Celsus, sed quòd ventrem citò permeet, atque quam minimè grauet; qualis inter reliquas pluuiæ potissimum est: hæc enim & tenuissima & leuissima est, sine pondus, sine & ζυγπορτίος species: nam quum sol educat, & rapiat quod est subtilissimum, non ab aquis dulcibus tantum, sed & à cadaueribus & aliis corporibus unde pluuiam generari tradunt philosophi, consequens est vapores corporibus unde exhalantur, esse tum & ζυγπορτίος, tum leniores. & ζυγπορτίος autem Celsus subintellexit, quum dicit quoque celerius ex ea legumina percoquuntur. Pluuiatili quamproximè accedit fontana, præsertim si ex præruptis rupibus per meatum quendam, aut terram puram, orientem versus prorumpat, qua ut grauior & crassioris consistentiæ est fluminalis, ita quòd ad bonitatem attinet, ordine posterior: præter solam Nili aquam, quæ prærogatina quædam reliquas aquas quoquoersum ferantur, antecellit: nam & parum accelerare traditur, & vrina eienda, ac ventri subducendo accommodatissimam ferunt, corpusque concinnum ac vegetum reddit. Postponunt autem fluminali scaturiginosam sine putealemi vocare malis; nam & grauis terræque est, & frigida; redditur tamen probior si continuò exhauiatur, ac si fluat. lacustres ac palustres omnes quum stataria sint ac cænosæ, præterquam quòd difficile secedant, ac graues corpori sint, etiã facillimè putrescunt; unde retrum quendam odorem spirant.

### Ferè verò sequitur, ut quo valentior.

FIRMO robustoque ac exercitationis affueto, alimenta firma ac consistentiâ crassa conueniunt: ea enim ut promptè alterabit, ita ex his quam maximum nutrimentum consequuntur: quod ex aliis, qua alioqui



quum boni succi sint, facile tamen tum alterentur, tum cennium partium sint, ne sperare quidem liceat: nam hæc non modò non concoquet, sed in alienum quendam humorem transmutabit; adedò diligenter in hoc studendum est, ut quibusvis congruam & consuetam victus rationem præscribamus. Nam ea ferè quæ multum nutriunt, ut crassum sunt partium, atque excrementitia, si

non probè consiciantur, ita si bene alterentur atque concoquantur, optimè plurimùmque alimentum subministrabunt. quare neque morbo extenuatis, neque his qui ex natura debilitate stomachi laborant; aut generatim desidem ociosamque vitam degentibus præscribemus: sed qui & viribus polleant, & stomacho valeant, & vehementius corpus exerceant, sicuti de athletis dictum est.

## CAPVT XIX.

*Quæ natura ac proprietas cuiusque rei sit, qua vescimur.*

**N**EQVE hæc sola discrimina sunt, sed etiam aliæ res boni succi, aliæ mali sunt, quas *ὄχλα*, \*vel *καρόχλα* Græci vocant. Aliæ lenes, aliæ acres, aliæ crassiores pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorem, aliæ idoneæ sunt stomacho, aliæ alienæ sunt. Itemque aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt, aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant, aliæ facile in stomacho acefcunt, aliæ non facile intus corrumpuntur, aliæ mouent aluum, aliæ supprimunt, aliæ citant vrinam, aliæ tardant. Quædam somnum mouent, quædam sensus excitant. Quæ omnia idedò noscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

## ENARRATIO.

**G**ENERATIM quæ supersunt cibi ac potus discrimina, enarrat: neque enim tantummodo multum aut parum nutrientia sunt. Sed alia probum etiam succum gignunt, alia improbum sanguinem & vitiosis humoribus refertum generant; alia attenuant, alia densant, alia inflant, alia inflationem amouent, alia rursus citant aluum reddunt, alia tardi transitus sunt, ac fluentem aluum compescunt; atque ita deinceps. Sed neque simplicis alicuius facultatis particula tantum sunt singula, sed nonnulla sibi

innicem contrarias ac pugnantes non raro insitas habent; quemadmodum brasicam simul & lenire aluum, atque iam immoderatius fluentem sistere dicimus. Plurima etiam varias, non tamen contrarias facultates habent: nam sunt quæ simul & probum sanguinem generent, & incidant, & status discutiant, citique transitus sint, quemadmodum in subsequenibus latius explicabimus. quæ omnia idedò cognoscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

## CAPVT



## CAPVT XX.

*Quæ res boni succi sint.*\* verda  
laet.\* ventricu-  
li que.

**B**ONI succi sunt, triticum, filigo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calefaciunt, tragus, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque hæ, quas suprà nominauimus. Medij inter teneros durosque pisces, vt mullus & lupus, \* verda, lactuca, vrtica, malua, cucumis, cucurbita, ouum forbile, portulaca, cochleæ, palmulæ. Ex pomis quodcunque neque acerbum neque acidum est. Vinum dulce vel lene, passum, defrutum, olea quæ ex his duobus in alterutro seruatæ sunt, vuluæ, rostra, \* trunculi que. In summa omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ boni succi sunt, Græci indifferenter *εὐχρηστα* & *εὐχρηστα* vocare consueuerunt: sunt autem eiusmodi, quæ sanguinem purum, hoc est enim qui neque consistentia crassus sit admodum, neque tenuis nimium seu serosus, & in summa, quæ nullius extraneæ qualitatis particeps sit, ita vt nec cholericus, neque atrabilarius, nec pituitosus aliqua sui parte existat. At quæ huiusmodi succum gignunt, varia admodum sunt: nam alia firma sunt, alia imbecilla; ac rursus alia media inter hæc, quæ lenia vocant. Inter firma triticum, filiginem, oryzam, alicam, amyllumque numerat: sed au citra exceptionem omnia hæc boni succi sunt, indagare opus censeo; siquidē sunt quæ quum neque exquisitè improbi aut boni succi sint, inter media rectè collocaueris, qualis est oryza, alica, amyllum: nam quum glutinosos humores crassioresque pituitam gignant, vt non omnino malum succum procreant, ita inter ea quæ extra omnem calumniam aleam posita sunt, non numeraueris, sicuti etiam oleracea omnia: nam quan-

tumius inter reliqua omnia lactuca succi bonitate commendetur, Psellus tamen inter *εὐχρηστα* constituere vult: Nam olerum, inquit, nullum omnino est boni succi: medicis est lactuca, & ciccorium, & buglossa; inde malua, inde chrysolachium, & portulaca, & blitum, & lapathum. Lactuca non omnino dissimilis est cucurbita: nam si coquatur, concoctum facilis est, & boni succi, si iungue sedat, & calidis & siccis temperaturis admodum prodest. Crudam autem esitasse omnino noxiū est, nam præterquam quod improbi succi causa esset, variis etiam symptomatibus locum daret.

## lac.

**L**ONGE optimi succi est, vt auctor est Psellus, lac recens omnium ferè animalium, quod confestim bibatur, quum primum multum fuerit, id sanè sumendum est ante cibum omnem, & potum, nec quicquam aliud cum ipso manducandum, antequam concoquatur & digeratur: nam si quid vel parum modò ei misceatur, ipsum corrumpitur, &



itur, & quod cū eo assumptum est. Præstat igitur matutino tēpore id bibere statim multum, nec interea comesse quicquam, clementer inambulando. primum igitur alui citat, deinde impensissimè nutrit, nec ultra excernit, sed sistit aluum. Cæsus autem, quod ad succi bonitatem attinet, lacte multo inferior est: nam Galenus omnes, quales tandem fuerint, cæcos mali succi esse dixit; veteres etiam improbi: quo tamen fuerint recentiores, ac minorem ab injecto coagulo acrimoniam receperint, eo coquentur facilius, & distribuentur, & meliorem succum producent.

### omnis venatio.

VENATIONEM hic ita intelligemus, ut domestica animalia à sylvestribus distinguamus: siquidem ferorum, quam cucurum carnes succi sunt melioris, nam aliqui si in genere omnem venationem inter boni succi alimenta referamus, nescio an citra calumniam id facere possimus: nam leporinas ceruinæque, & alias id genus carnes, idque potissimum si completam aetatem consequuta sint, inter improbi succi edulia (quod crassiorē sanguinem generent) rectè collocaveris; si tamen teneriores adhuc sint, atque in- crescant, magnam noxam exerunt.

### omnes aves quæ

INTER reliquas optimi succi sunt galinarum, phasianorum, attagenarum, perdicumque carnes: hæc sequuntur turdi, merulaeque iuvenes, passeris, montanae aniculae: palustres omnes & aquaticæ volucres, quas in media materia posuit, excrementitia magis sunt quam boni succi.

### Medij inter teneros durosque.

MEDIOS inter teneros durosque pisces vocat, qui leniores atque friabiles sunt; quales saxatiles existunt. nam paulo antè piscinum discrimina ita distinxit, ut alij teneri, alij duri, alij leniores essent; sub lenioribus (viri etiam hic) mulos & lupos vernas complectens. Vernas autem lupos eos vocat, qui

verè nati essent: quemadmodum vernas vocare solent servos proprios ex ancillis verno tempore genitos.

### cucumis, cucurbita.

NVSQVAM hæc elogio cucumim celebrari audio, quo hic Celsus: nam, quantumvis substantia minus humida quam pepones, ideoque non tam facile quam illos corrumpi dixerit Galenus; non tamen, ut innoxios, inter boni alimenti cibos numerat. Simson Sethi anguria quæ cucumeres & trauguria vocari dicit, ob frigidum & humidum temperamentum noxia & mali succi esse dicit, pituitamque glutinosam in ventriculo gignere, quæ cruda per venas diffundantur. Non negaverim tamen, quemadmodum antè quoque de cucurbitis dictum est, si coquantur, ac pipere, thymbra aut eragorigano condiantur, minorem tum noxam conciliare, tum probioris succi reddi. Quamquam crediderim magis à quopiam qui rerum naturam non satis exploratam habuerit, inseras hoc loco cucumes: Nam verisimile est Celsum dum hæc scriberet, adeo vecordem atque sui immemorem non fuisse, ut easdem res boni & mali succi definires: siquidem subsequente capite cucumes quoque inter cacochyta numeravit. Adeo multis locis sciolorum quorundam inscitia defœdatus, ac corruptus est, ut dum non raro sibi ipsi pugnantia dicere videatur, atque iis conciliandis nequiquam operam impendas, frequenter integras periodos immutare, interdum etiam substituta obelisco notare atque succidere cogaris. Atque id cur in Celso nostro vetustissimo auctore acciderit, non est quod mireris: præsertim quum Galenus ipse queratur, bibliopolas, ut merces suas prosequerent, atque quæstum uberius facerent, præscis auctoribus multa ascripsisse, quæ ne somniasent quidem illi. Quod sanè ut in hoc nostro auctore, hoc præsertim libro, multorum errorum occasionem dare potuit; ita crediderim Gotorum ac Vandalorum barbaram collusionem multum nanis ac mendis eundem conspersisse, dum omnem mandicem, omnem ornatum, omnem humanitatem,



tem, omnes denique liberales artes atque disciplinas, una cum antiquo Reip. statu evertunt atque erunt. Unde factum est ut summa in scholis vigeret barbaries, philosophia reperiatur, matheses exularent, res medica Cimmeriis, quod aint, tenebris obnueretur: siquidem dum politiores literas negligimus, dum relictis veris fontibus unde disciplina haurienda essent, rivulorum scaturigines querimus, Arabum scriptis contenti in barbarici cano delitescimus, ac nihil nisi quod meram barbariem speret resonique admittimus. Hinc mille in re medica errorum labyrinthi: hinc laceri defædatique in medium produnt classici scriptores: hinc multis partibus mutilus antiquissimus medicus Romanus Scribonius Largus: hinc Celsus quoque noster multis modis laniatus, sanctus, senticosus, ac vixdum sibi constans in lucem prodit. Sed hæc latius quam exigebat præsens negotiū, ut facilius nobis ignosceret candidus lector, sicubi non per omnia Celfo subscribamus, eiusque sententiam immutemus: si modò immutare sit, pro falsis ac substitutis, vera ac germana reddere.

#### ouum forbile.

POST lac, cui principem locum inter boni succi alimenta tribuimus, summè commendantur oua tremula forbiliāque, imprimisque gallinarum ac phasianorum lutea; hæc enim reliquis intensius nutriunt, & concoquantur facilius, sanguinemque laudatiorem gignunt.

#### cochleæ.

COCHLEÆ aded in deliciis habita sunt, ut earum viuaria in Tarquinensi paulo ante civile bellum instituerit Fulvius Lupinus. sunt autem genere duplexes: aquatiles videlicet & terrestres; suntq; ut reliqua omnia & exærodigna, dura carnis: quare utilia stomacho, nec facile corrumpi auctor noster asserit: Paulus tamen Agneta negat; Nam omnibus crustatis, inquit, succus inest alio subducenda idoneus, eoque etiam terrestribus cochleis: ac quum duram carnem concoctū difficilem valentis materia &

succis vitiosam sortiatur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad alnum subducendam adhibent.

#### palmulæ.

SVCCVM crassum gignunt, quare iecini nori lienique obstruendo accommodissima sunt.

#### Ex pomis quodcunque.

HVIVSCEMODI poma mēzæ, aut acidulcia vocari dixi; ea enim diu servari possunt, & anequam marcescant, exiccantur. verum an hæc boni succi sint, videndum est: nam Galenus omnes fructus quos arbores ferunt, demptis castaneis, mali succi esse dicit; quæ si in ventriculo conficiantur, efficaciter nutriunt, atque crassi quidem, nunquam tamen mali succi sunt.

#### Vinum dulce vel lene.

DVLICIBVS equè ac suaveolentibus natura gaudet & delectatur: quare ea amplectitur, atque quàm ocysimè, si quando offerantur, in benignum succum transmutat, nisi crassitie sua meatus infarciant, ac viscera obstruant: nam dulcia omnia ut crassi succi sunt, ita lenissima de causa obstruiones pariunt.

#### oleæ.

OLEÆ κρυσπεδὺς stomachum roborant ac appetentiam excitant, parum nutriunt, pinguedinisque quamminimū habent: si tamen defruto, passo, aut alio quopiam simili condiantur, efficacius & nutriunt, & succum probiorem reddent.

#### vulvæ.

EIVSDEM planè qualitatis sunt ventriculi, vulvæ, intestina: nam hæc, ut Galenus, duriori quàm caro constant substantia; quodque ea duriora sunt, eo quàm caro ipsa ad nutriendum minùs efficacia sunt: quare rectius hæc & sequentia omnia proximo capiti adiunxeris.

#### trunculioue.

SVSPICATVR h'c mendum esse vir doctissimus Ioannes Casarius, ac pro trunculis



culis & ventriculis subliuendum, idq; auctoritate Pselli ductus, qui inter ea quæ crudos humores generent, ventres, intestina, vulvas numerat. non tamen negat esse doctissimi quendam virum qui priorem lectionem non improbet, qui trunculos edulij genus esse dicat, quod frustulatum concisis carnibus constet; qualia sunt toties ab Apitio descripta minutalia.

In summa omnis pinguis.

ANIMANTIA omnia potissimum quæ purum aerem inspirant, & exercitiis corpus

fatigant, si neque macie strigosa, neque adiposa, sed bene habita sint & carnosæ (ita enim pinguem carnem intelligit Celsus) optime nutriunt, & laudatissimum sanguinem gignunt; idq; eo magis si incrementum adhuc animalium carnes sint; nam seniorum, quales tandem sint, pessimi succi sunt.

glutinosa.

GLUTINOSA omnia non tam probum succum, quam crassam pituitam, gignere autè dictum est.

## CAPUT XXI.

*Quæ res mali succi sint.*

**M**ALI verò succi sunt milium, panicum, ordeum, legumina, caro domestica permacræ, omnisque caro falsa, omne falsamentum, garum, vetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, fœniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerbæ, oleum, pisces quoque saxatiles, omnesque qui ex tenerissimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, virosique sunt, ut ferè quos stagna, lacus, limosive riuiferunt, quive in nimiam magnitudinem excefferunt.

## ENARRATIO.

**M**ALI succi cibos *κακοχόλους* & *κακοχόλους* vocant. ab his, quauis concoquantur, omnibus iis qui sanitati inuadendum, cauendum moneo: latenter enim, ut docet Aëtius, diuturniore tempore vitiosus humor in venis ex ipsis congregatur, qui leuissima putrefactionis occasione accepta, malignas febres gignit. Est autem vitiosus humor non unum simplexque genus, alius

namque pituitosus, alius cholericus, alius melancholicus, ac rursus alius ex hisce commistis constat.

**milium, panicum**

**PANICVM**, ut milij similitudine prosit, ita, quod ad faciliorem seu energiam pertinet, parum admodum ab eo differt: siquidem virumq; alio compefcenda idoneum



est; utrunque quum parum nutriat, difficile concoquitur; atque quum praavidum quoque sit ac cineris instar friabile, nulliusque lentoris pinguedinisque particeps, improbum succum accumulat. Cedit tamen in omnibus, quod ad succi bonitatem attinet, panicum milio, quum esu insanius sit, ac concoctum difficilium. Ceterum hordeum, cui summam dotes attribuit Hippocrates, praesertim si probe coctum fuerit, nescio quomodo inter huius ordinis cibos numerauerit: nam Galenus tenuem, ac nonnihil deterforium succum in nobis gignere, qua ratione alio cienda idoneum sit, auctor est. Quare si cui hic libeat parua dictionum metathepsi pro hordeo, orobum substituere, non aberrabit.

### legumina.

QVOD legumina, cuiuscunque generis sint, cacoehyla sint, argumento erunt faba & pisa: quae quantumvis succi bonitate reliquis praefertantur, crassum ac flatulentum quendam succum in nobis gignunt; unde corporis habitum neque compacta densaque carne implent, ut suilla, sed quodammodo fungosiore ac laxiore, sentiuntque, qui eis assidue utuntur, in toto corpore velut tensionem quampiam a spiritu flatulento.

### caro domestica.

NON solum, ut dixi, permacra domestica caro, mali est succi; sed quantumvis bene habita, si sylvestribus comparatur: nam melioris succi esse demonstrant carnes animalium quae liberum, purum tennemque aerem inspirent, atque aridiores utantur nutrimento, atque in totum quae in agris vitant agunt, probeque exercitantur, quales sylvestrium sunt. Quare non ab re distinctione quapiam permacras, a domesticis sinuoris: sunt enim non secus ac permacrae, domestica omnes (sola suilla excepta) mali succi; nam inter carnes primo ordine vituperantur onivle, mox caprinae, arietinaeque deinceps.

### omnisque caro salsa.

SALE quicquid est humoris, quicquid

est lentoris, quodammodo exagitur atque exsiccat: quare ante quoque dictum est, omnes beluas marinas, quae natura excrementitia admodum sunt, atque quae in genere valentissime nutrientium numerantur, rectissime sale condiri. Quum igitur sal omnes exhaustiat humiditates atque dissipet, non mirum est salsamentum omne, atque omnes quae salem diu passe sunt carnes, improbi succi reddi. Non negaverim tamen esse, quae si octo aut novem plus minus dies sale excipiantur condianturque, probioris omnino succi futuras, dum quicquid est immodici lentoris sanguine exagitur atque extenuatur, & quicquid excrementitij est salsamento exiit, cuius potissimum generis sunt onivle, bubula suillaque carnes.

### cicer, radícula.

SATIS erat dixisse omnia legumina esse improbi succi: nam cicera, cicercula, dolychi sub leguminum quoque genere comprehenduntur: nisi quis cicerum ideo speciatim fecisse mentionem dicat, quod quemadmodum urbanis insuetus sit cibus (solum enim insculo eorumdem vescuntur) tum ad ducendum lotium, tum ad comminuendos lapides; ita si iidem vesci contingat, mali praereliquis esse succi: nam sicut aliis intensius nutriunt, ita excrementitia admodum sunt, & difficulter concoquantur; idque eo magis si tosta, assa, frictaque fuerint.

### rapa.

RADICES stirpium olerarum mali succi sunt, quaecunque acres, ut bulbi, cepae, porri, allia, raphani & dauci; exunt tamen omnem malitiam bulbi admodum cocti, cepae, allia, porra, ampeloprasa bis ternesacta malum deponunt humorem. Raporum autem, naporum, atque dauci radices, ut non plane bonae sunt, ita non penitus vituperandae, potissimum si bene coquantur; nam medio quodammodo loco inter res boni & mali succi collocantur.

### brassica.

BRASSICAE omnes mali & melancholici succi



lici succi sunt participes, amittuntque plurimum noxa, atque vitij, si cum præpingui carne coquantur: præferuntur autem æstiva hybernis. Cymas eandem, quanquam sine stomacho utiliores, idè damnant, quod prætor succi malitiam, acrimoniam quoque maiorem sortita sint: nam paulo post omnia acrida, acida, acerbæque ut mali succi vituperat.

### beta, cucumis.

EX oleribus nullum omnino boni succi est; extreme autem mali sunt olera quæcumque sylvestria: cuius generis sunt agrestes lactuca, lapathum, picris, & similia. De cucumeribus autè satis dictum est: nam non solum hi, sed & omnes subcaniculares fructus, ut improbi succi vituperantur, solis cucurbitis exceptis, quas medio loco inter boni & mali succi res statuant.

### lienes, renes.

NON solum lienes, renes atque intestina mali succi sunt, sed & omnia interanea, ut est cerebrum, spinalis medulla, testèsque perfectorum animalium omnium, exceptis gallinacis; reliqui enim viris quoddam olent.

### pomum quodcunque.

HIS addere licet omnes arborum; præterea poma quæ præcedenti capite enarravimus, ficusque ac vinas; quæ quoque si immoderatius sumantur, ut obstructionem parient, ita non citra noxam eduntur. Pessima autem sunt omnia immatura: his accedunt fugaces horarum fructus, persica videlicet, corna, mora ac cerasa.

### oleum.

OLEVM quod ex maturis olivis exprimitur, dulcissimum est calidumque ac humidum moderatè, ac proinde ad succi bonitatem accommodatissimum: sed quod ex imma-

turis olivis (quod omotribes, aut omphacite nominant) quantum austeritatis participes est, tantum & refrigerat, & consipat, & noxiorum humorum causa efficitur. Fit tamen immoderatum illud calidius & acrius, ac quantum quidem à dulcedine recentis olei declinat, tantum quoque ad succi pravitatem accedit; omotribes contra vetustate dulcescit, ac sensim vires dulcis imbuat.

### pisces quoque saxatiles.

DICAMUS, amice lector, si quisquam hic Celsus (si modò Celsus ita pronunciatum reliquit) subscribere audeat: nam quis saxatiles pisces qui optimum laudatissimumque sanguinem gignunt, atque citissime in ventriculo consiciuntur, ut improbi succi reiiciat? quis rursum, teneritudinem alimenterum summè commendatam incusat? Nam si saxatiles tenerosque pisces, quod facile in probum succum convertantur, atque id si minus consequantur, damnari; eadem quoque lege, & ratione, ova sorbilia, lac recens multum, phasides, perdices, capones reiiceris. quare pro saxatilibus, fluuatilibus aut stagnatilibus legero: & pro tenerissimo, valentissimo. nam ceracea omnia, & quæ in valentissimo genere consistunt, mali succi sunt. Sic scorpios, dracones, xygenas, aliæque marina monstra, propter succi malitiam reiicimus: sic quoque putidos, virosos, limosos, durosque, quales stagna producunt, in sanitatis conservatione non admittimus. Neque enim terrere nos debet, quod paulo post reiterat, quos stagna lacusque, limosive riui ferunt, quæ in nimiam magnitudinem excefferunt. hic siquidem auctor noster classicos scriptores imitatus videtur, qui quoties quid diligentius hominum mentibus impressum cupiunt, eandem rem variis tropis diversisque dictionibus efferunt.



## CAPVT XXII.

*Quæ res lenes, quæve acres sint.*

Petiolis, id  
est, parvis  
pedibus: à  
Catone pec-  
decini, in  
de re rustic.  
appellati.

**L**ENES autem sunt, forbitiones, pulticula, laganum, amy-  
lum, prifana, pinguis caro, & quæcunque glutinosa est.  
Quod ferè quidem in omni, quæ domestica sit, præcipuè ta-  
men in vngulis, trunculisque suum, in petiolis, capitulisque  
hœdorum, & vitulorum, & agnorum, omnibusque cerebel-  
lis. Item si qui propriè bulbi nominantur, lac, defrutum, pas-  
sum, nuclei pinci. Acria sunt omnia nimis austera, omnia  
acida, omnia salsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis.  
Item allium, cepa, cruca, ruta, nasturtium, cucumis, beta,  
brassica, asparagus, sinapi, radicula, intubus, ocymum, lactu-  
ca, maximaque olerum pars.

## ENARRATIO.

**L**ENIA acris opponit, eò videlicet  
quòd quemadmodum hæc pulmone, tra-  
cheam arteriam atque interiora omnia ex-  
asperant atque mordicant; ita illa eadem  
demulcent, mitigant, leniunt atque lenigant.  
Sunt autem duplicia genere: sunt nanque  
talia, aut penes substantiam, aut penes qua-  
litatem. secundum substantiam quidem sunt;  
ut si glutinosa, pinguis, viscida lentaque  
fuerint: penes qualitatem verò, si omnis ex-  
traneæ qualitatis expertia fuerint: extraneas  
autem qualitates voco omnes quæ neque  
æquales, neque dulces, neque suaves omnino  
sunt: nam has, ut familiares, natura am-  
plectitur ac fouet; compertum enim est dul-  
cia omnia gutturis pulmonisque asperitati-  
bus leniendis accommoda esse.

## forbitiones.

**S**ORBITIONES omnes quæ ex fari-  
na, aqua, lacte, hordeo, leguminibus fiunt  
(quales sunt echnos, lecythum, prifana, pha-  
coprifana) pinguedine ac lentore quodam  
quem adiunctum habent, leniendi vi præ-

dita sunt. his non inferiores sunt placenta,  
lagana, rhymata: quæ si fermenti ac casei,  
veteris præsertim, acrimonia destituantur,  
omnis mordicationis sensu carebunt, & ex-  
asperata lenient: nam aliqui si fermenti  
quippiam, caseiue veteris, aut aliud quid  
simile receperint, ut nihil lenient, ita mor-  
dicationis non omnino erunt exortia.

## pinguis caro.

**Q**UOD omnis domestica caro in pinguior  
tum glutinosior sit sibiuestri, antè dictum est;  
& quòd leniendi vi prædita sit, satis quoque  
explanatum est. Verum quid hic per trun-  
culos suum velit, admodum consideran-  
dum est: non enim, ut aliquando ex Ioan-  
nis Casarii in Celsi annotationibus suspi-  
catus sum, edulij genus erit quod frustulatum  
concisis carnibus constet, minutal vocat Api-  
tius; id enim nihil minus quam leniet: nam  
dum frigitur, quicquid est lentoris, quicquid  
est pinguedinis, quicquid est humidi exiit;  
vnde non immerito ut mali succi cap. XX.  
vituperamus. Quare aliud quippiam quod  
interfectum



interfectis animalibus detruncetur intelligendum puto; cuiusmodi sunt pedes, aures, rostrum, myflax, & id genus alia. neque mirum alicui videri debet, quod hic suum ungulas à trunculis eorundem seiuixerit (id enim tam Celsò quàm Hippocrati & Gale-  
no peculiare admodum reperies) præsertim quod ungula suum reliquis quæ truncantur probioris longe succi sunt. Suum tamen omnia quæ detruncantur, ut etiam capita petiolique hedorum, agnorum, & vitulorum, si coquantur, lentoris cuiusdam participia sunt; cerebrum & spinalis medulla etiam humoris.

### Item si qui propriè bulbi.

BULBORVM plura sunt genera: differunt siquidem colore, magnitudine, & figura, & sapore. Nam Taurica Chersoneso dulces admodum, & omnis amaritudinis gustu privati nascuntur; reliqui amarorem quandam nanciscuntur. Inter omnes tamen bulbos, Megareses potissimum commendantur. Verum quum bulbi omnes amarorem quandam participent, inter acria rectius eos collocaveris, quamvis lentorem quempiam coctura adipiscantur, ac magnam amaroris partem exuant.

### lac, defrutum.

HVC etiam rectissime accommodaveris eorum lutea, ceteris efficacius exasperata

demincentia: pinæ nux succi crassitie idem præstat.

### Acria sunt omnia nimis austera.

SI proprietatem sermonis perpendamus, austera non rectè acria dixerit: verum quomodo eadem acria appelleret, ex precedentibus clarum est; quare acerba quoque & asringentia omnia hæc addere licet.

### cucumis.

NISI ambubaia, asparagorum lactuca-rumque nihil minus quàm acrum hic quoque mentionem faceret, locum hunc de anguino, aut sylvestri cucumi intelligerem. Verum quoniam verisimilius est Celsum de sativa locutum fuisse, cucumim, intubum, lactucam atque asparagos ante Acria insererem; itemque bulbos, cepis statim annexerem: atque hunc in modum lectionem variarem, transpositis aliquot dictionibus: omnibusque cerebellis: lac, defrutum, passum, nuclei pinei, cucumis, asparagus, intubus, lactuca. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia fælsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, & si qui propriè bulbi nominantur; eruca, ruta, nasturtium, beta, brassica, sinapi, radícula, ocymum, maximaque oleum pars.

## CAPUT XXIII.

### Quæ res crassiolem, quæve tenuiorem pituitam faciant.

CRASSIOREM autem pituitam faciunt, oua forbilia, calica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem omnia fælsa, atque acria, & acida.

### ENARRA-



## ENARRATIO.

**M**AXIMA breuitate plurima hic complectitur auctor noster: nam sub crasso pituita, ea omnia subaudit, quae crassos humores generant: qualia sunt non solum quae phlegma, sed & quae melancholicum succum (qui inter reliquos crassitudine excellit) quaque abundantiam humorum faciunt, atque adeo quae poros & meatus grauiant atque obstruunt. Ac huiusmodi quidem sunt, itria omnia, triticum quo grauius ac spissius est, panis siliagineus non fermentatus, nec probe subactus, omnes casei, lactaria orania.

## oua forbililia.

**R**ECTIVS frixa, dura, aut assa legeris: nam inter reliqua quae bonum succum gignere dixi, summe commendantur forbililia oua; dura contra tum crassi succi, tum valentis materia censentur. Quamquam, si excusationem Celso quaeramus, albumen ouarum forbilium ut difficilis concoctum, crassiotem pituitam; luteum, contra sanguinem consistentia optimum, atque succum probissimum gignere dicemus.

## alica, oryza.

**S**IMILA & alica, ut auctor est Oribasius, valde glutinosos gignunt humores in nervis, & canis locis membrorum: his quamquam non omnino simile, proxime tamen accedit amyllum. Pisana si cruda est, nec bene cocta, idem praestabit; recte tamen probeque preparata, omnis culpe vitiique expers est.

## lac.

**N**ON quoduis lac huc referre licet, sed tantummodò quod feri modicum habeat, ac multum caseosae substantiae; id siquidem crassitie sua iecinoris obstructioni erit accommodissimum, ac renes laedit, calculisque generandis occasionem praebet.

## bulbi.

**B**ULBI si crudi sunt, amarore suo crassos humores extenuant: quare ut sensus constet, de biscoctis intelligendus est Celsus. Nam Psellus biscoctos bulbos in oleo, & garo cum aceto mansos, crudos humores generare auctor est. Sub bulbis autem non solum proprie dictos bulbos intelligemus, sed & alia quoque comprehendere licebit, si eadem industria atque arte praeparantur.

## omniaque ferè glutinosa.

**Q**VALIS est caro recens agnina, callus porcinus, porculi, atque adeo omnes porcinae carnes, si non exacte conficiantur, myrtax circa labra, auricule, lingua, & membra animalium glutinosa.

## Extenuant eandem.

**Q**UAE cunque & contactu linguae ipsam non astringunt neque contrahunt, velut astringentia solent, sed contrarium facere videntur, extergereque & eluere, falsa omnia dicuntur. Quae verò absque caliditate mordent, acida vocantur: quae autem mordent, & cum valida caliditate erodunt, acrida. Ceterum acida, ut docet Paulus, incidere, diuidere, attenuare, aperire & perpurigare citra calefactionem possunt. Acre autem similem quidem acidis effectum praestat extenuando, perpurgandoque, sed acidum refrigerando euariat, acre calefaciendo. falsum citra manifestam aliquam caliditatem & frigiditatem idem efficit: ac pari modo amarum meatus expurgat, abstergit, extenuat, inciditque crassos succos citra manifestum calorem. Porro quae extenuant, omnia tenuium sunt partium, ac eorum transitus velox est in sensibilibus partibus, suntque, quod ad odores attinet, odorata, ac aromata quid spirantia, ut piper, casta lignea, cinamonum, thymbra, origanum, tragoriganum, &c.

## CAPVT.



## CAPVT XXIII.

*Quæ res stomacho idoneæ sint.*

**S**TOMACHUS autem aptissima sunt, quæcunque austera sunt, etiam quæ acida sunt, quæque contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel prifana, omnis auis, omnis venatio, atque vtraque vel assa, vel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrum potius, quàm pingue. Ex fute vngula, rostra, aures, \*vulvæque steriles. Ex oleribus intubus, la-  
 \*vulvæ, steriles-  
 \*que.  
 etuca, pastinaca, cucurbita elixa, filer. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustuminum, vel ne-  
 \*saguina.  
 uianum est. Item pira, quæ reponuntur tarentina atque \*si-  
 gnina. Malum orbiculatū, aut scandianum, vel amerinum, vel cotoneum, vel punicum. Vux ex olla, molle ouum, pal-  
 mula, nuclei pipei, oleæ albæ ex dura muria, eadem aceto  
 intinctæ, vel nigra, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel  
 quæ in passo, defrutulo ve seruata sunt. Vinum austerum, li-  
 cet iam asperum sit, item resinatum. Duri ex media mate-  
 ria pisces ostrea, peccines, murices, purpuræ, cochleæ: cibi,  
 potionesque vel frigida vel feruentes, absinthium.

## ENARRATIO.

**S**ICVTI varie diuersæque causæ sunt  
 cur flaccescat stomachus, ita varia atque  
 eadem diuersa sunt, quæ eundem labescen-  
 tem reuertunt ac roborant: siquidem alia aut  
 austera, aut acerba, aut amara, aut acida,  
 aut modico sale confecta sunt: quæ omnia  
 ut diuersas qualitates gustantibus exhibent,  
 ita diuersarum quoque partium sunt: alia  
 namque sunt quæ deperitissimæ, alia quæ nu-  
 tritissimæ vocantur. Acida omnia velociter pe-  
 netrant, atque per profundum corporis actio-  
 nem suam ostendunt: quare tenuium quo-  
 que partium existunt. acerba contra auste-  
 raque, atque vniuersim astringentia omnia,  
 tardi motus sunt, atque actiones suas in su-

perficie tantum exerunt: sunt enim terrea ac  
 crassarum partium. ac proinde quum ea quæ  
 inter eustomacha numeret, tanta varietate  
 discrepent, consequens quoque est singula  
 quasus stomachi debilitates, refrenare, atque  
 compescere non posse. sed unumquodque,  
 prout necessitas atque tempus flagitat, id pra-  
 stare: nam frigido atque nimia pituita flu-  
 tuanti stomacho, nequicquam acida propi-  
 naheris: offendes enim magis quàm iuueris;  
 astringentia contra ventriculo non citra maxi-  
 mum commodum exhibueris. Caterum au-  
 stera omnia, quemadmodum acerba quoque,  
 aut crassarum partium sunt, ita difficile alte-  
 rantur atque corrumpuntur: quo fit ut quum  
 diutius

h

diutius



dinius ventriculo inhæreant, eundem quodammodo cum astrictione quadam comprimant; unde & alii profluvio scite adhibentur, ac stomacho nauseabundo commodissime propinantur. Dum enim comprimitur ventriculus, cibos amplectitur, atque is consiciendis elaborat. Ea verò quæ modico contracta sunt sale, ideo stomachum roborare dicitur, quod minus insulsis corrumpantur: nam quum ea quæ sale condire solent homines, pingua excrementitiaque sint; sit ut stomachum leuissima de causa subvertant: quod ab iis quæ modico sale conspersa sunt quam longissime abest; nam, ut iam millies dictum est, sale omnem superfluitatem exciunt: unde & teneriores, & probioris etiam succi modica salugine redduntur carnes.

### Item panis sine fermento.

FERMENTATIVUS panis sicut citissime conficitur, ita non raro ex fermenti, quam ex putredine assumpsit, acrimonia, leuissima de causa in ventriculo corrumpitur, ac in nidiosum quendam succum convertitur. Non fermentato panis non infirmior est olia aut alica aut oryza: nam ablutione omnem, si quem habent, lentorem exciunt.

### omnis avis.

MONTICOLÆ omnes aves, ut bonitate succi commendantur, sic stomachum quam maxime roborant; palustrinum contra ac desidem vitam agentium carnes, ut excremento non vacant, ita non omnino stomacho confirmando idoneæ sunt; idque eo magis quod excrementis plus abundaverint. Quid autem per venationem velit, iam sæpe dictum est: atque quod hæc entomachia sit, certum est, quum excrementis careat, atque macra sit: nam pingua omnia stomachum obrunt; quare macra potius in hoc genere quam pingua statuit. Edocer autem breuiter atque aphoristicè modum exhibendi carnes, tam sylvestrium animalium quam avium, quum dicat atque veraque vel assa, vel elixa: nam si stomachus pituitosior sit, atque frigidior, assas; sin ad calidum declinet, elixas easdem dabimus.

### Ex domesticis.

HAC solum laude digna sunt bubula carnes, quod stomachum roborant, ac multum nutriant; idque si nec macie strigosa, nec vetustate rigida, neque prapingues admodum, sed bene habita sint. Ita enim non secus quam sylvestrium animalium carnes minus excrementitia sunt; concoquuntur tamen difficulter: quare si modico sale imbuta atque contacta sint, ut palato gratiores, sic stomacho non inuites reddentur.

### Ex sue vngula.

NON tantum sum vngula, ac reliquæ extrema partes manduntur, sed & reliquorum pedestrium animalium, solentque elixas ex aqua cum aceto mandere. Prepoller autem in his veruosa & cutacea natura: quare ut pinguedinis, ita substantia quoque carnosa quamminimam habent: quo sit ut non facile in stomacho vitentur.

### vulva, sterileque.

ERAT quando hic citra distinctionem vulvæque steriles legendum sufficeret, mendumque subesse constanter assererem, quod steriles nec multis partibus enectæ vulvæ meliores censeantur: nisi casu quodam in Plinij locum libro XI. cap. XXXVII. incidissem, ubi sic habet: Vulva eiectione partu melior est, quam edito; eiectione vocatur illa, hæc porcaria, primipara suis optima: Contra effectus a partu præterquam eodem die suis occise, livida ac macra. Nec novellorum suum, præterquam primipararum probatior, potiusque veterum, necdum effectarum, & biduo ante partum, & post partum, aut quo eiecerint die. Proxima eiectione est occisa uno die post partum. Quod allusisse videtur Martialis hoc disticho:

Te fortasse magis capiet de virgine porca;

Me materna graui de sue vulva capiet.

NAM quod olim in deliciis habita fuerint vulvæ, Apitius ille nepotum alitissimus gurges, & ut ait Plinius, ad omnem luxum ingenio mirum, docuit. Siquidem ad languentis



guentis stomachi vires refocillandas, vulnam cum lasere Cyrenaisico, pipere, mentha sicca foliis (addito liquamine, melle & aceti modico) condire solebat. Hinc Horatius:

Quum sit obeso  
Nil melius turdo, vulua, nil pulchrius ampla.

### Ex oleribus intubus.

INTUBI omnes tam satini, quam agrestes subamaro quodam gustu astringunt ac refrigerant, ac stomachum adiuuant: sylvestres tamen, si Dioscoridi credimus, stomacho meliores sunt; comesti enim imbecillum ac astringentem leniunt. eiusdem plane facultatis sunt lactuca: nam fastidium auferunt, & cibi appetentiam faciunt. Cucurbita autem, quamvis elixa, aut in sartagine fixa aut assa fuerit, nescio quomodo estomacha dici possit: si enim cruda estur, insanis admodum est ac stomacho perniciofa & concoctum plane inexpugnabilis; adeo ut si quispiam, teste Galeno, alterius cibi inopia eam ingerere cogatur, pondus cum algore ventriculo incumbere sit sensurus, stomachumque energet, & ad vomitionem concitabit, quae una eum urgentibus symptomatibus liberare potest. Quare quum de ea veteres medici ita senserint (si Plinio habenda fides est) ut nihil aliud quam aquam congelatam esse dicerent, statim ac elixa fuerit, ut vesca reddatur, aut in sartagine frigemus, aut assabimus; ita enim succi maliciem omnem deponet: verum an ob id stomachum roborare possit, nondum induci possum ut credam.

### pastinaca.

ORIBASIVS sylvestri pastinaca, vti & Celsus, vim stomachum roborandi tribuit; idque fortasse quod absterforium quid in se habeat. Plinius etiam folia eiusdem contra cruditates mandi auctor est. Sisari autem radix ut elixa ori suavis est, ita stomacho quoque grata, & appetentiam excitat, fastidiumque dismit. Huc quoque referri possunt, rapa napique valde cocti, bulbi quoque; nam ciborum appetentiam exacuant; nemque capparis sale condita.

### Ex pomis cerasium.

TEMPVS utendi ut intubis, lactucis cucurbitisque elixis, ita & moris cerasisque est; idque cum corpus squalore ventriculi astringat, quo tempore necesse est idem quoque hepati accidere. Sumenda autem sunt ante alios cibos, nam celeriter transennt, cibusque aliis praecunt, si ventriculum purum inuenierint; sin post alios cibos sumpta fuerint, ac ventriculum impurum nacta fuerint, celerimè una cum aliis quoque cibis corrumptuntur. Verum quum cerasia alia aliis magis astringant, quo maiorem astringentem sortita fuerint, eo etiam reddentur stomacho gratiora.

### forbum.

SORBA, ut auctor est Galenus, magis ut medicamentum, quam ut cibus eduntur: quare & parè quoque iis vitimur. Astringunt aluum; debilius tamen quam mespila, & maiori quadam cum voluptate sumuntur: neque enim ut mespila in initio prorsus acerbis quippiam obtinent, sed succus eorum citra acerbitatē dumtaxat aufterus est; unde & amica stomacho sunt.

### pirum fragile.

FRAGILIA pira vocat quae cito frangi possunt, & quae friabilia sunt: huiusmodi autem potissimum sunt, quae acidulo quodam sapore non iniucunda sunt; inter quae primas facile (si Columella & Plinio credimus) obtinent crustumina.

### Malum orbiculatum.

MALIS omnibus orbicularis figura est, ut piris turbinator: sunt tamen quae proprie orbiculata vocantur, sic dicta à figura orbis in rotunditatem circumacti; inter quae scandiana, amerina, coronea punicaque numerantur. Plinius in Epyro orbiculata, unde & Epyrotica quoque dicantur, primum inuenta docet. Caterum mouet hic rectè Celsarius Plinium, Scantiana scribere maluisse; quanquā auctor noster & Macrobius Scandiana legerint.



## vel cotoneum;

CYDONIA mala astringentem copiosorem fortiantur; unde iis quoque qui deiectionem habent appetentiam, sunt accommodatissima. Punica autem mala piris, pomisque reliquis succum habent copiosorem, suntque cardialgia, (cum Hippocrate secundo Epidemion, tum Galeno De alimentorum facultatibus secundo testibus) aptissima: nam ore ventriculi vitiosis humoribus repleto adeo roboratur, ut humorem ipsius tunicis imbitum expellere queat.

## Vux ex olla.

OLLARES vinas componendi ac faciendi varios modos observabant antiqui: quos si quis scire desiderat, Columellam De re rustica libro XII. cap. XLIII. consulat. Generatim tamen decerpebant luna decrefcente vinas sereno celo, post horam quartam quum iam insolate essent, nec voris quicquam haberent (nam sic optime absque noxa eas servari tradunt) ac deinceps in singulorum aliquod vas, in modum patinarum latum, quod extrinsecus & interius bene picatum esset, modicumque defruti, passive reciperet, per transversos fustes ne qua parte sibi contigua essent, aut defrutum passumque attingerent, vinas reponerant; ac tum deinde opercula vasis superponebant, & pice aut gypso obliniebant. Dabantur autem iis commodissime quibus stomachus fluctuaret, & appetitus prostratus esset, sicuti etiam passae, acerbescensque atque vinaceis demptis vna, si Psello, Aetio, Oribasioque credimus. Ceterum Oribasius (forte quod iam in dissuetudinem venissent ollares vna, aut quod vulgo non satis nota essent) ansteras vnas si cum ipsis foliis appendantur, commendabat.

## palmulae.

IDQUE eo magis quo fuerint acerbiores, sunt enim omnes, Dioscoride teste, astringentes ac acerbae.

## nuclei pinei.

SI pineos nucleos simpliciter & citra exceptionem stomacho idoneos prouocavit Celsus, non video qui calumniā subterfugere

possit, quum omnia oleosa pinguiusque (in quo albo pinei nuclei sunt) stomacho nequaquam commoda sint, ut post Galenum etiam Auicennas testatur reliquit. Quare quum hoc capite de nutriente potissimum cibo stomacho conueniente agat, dicendum erit Celsum de lotis tantum nucleis pineis locutum fuisse, quos Galenus pro nutrimento illotis praefert, quod nimirum lotione omnis pinguedo euanescat & absumatur, sicut testatur septimo De simplic. med. facultatib.

## oleae albae.

OLEARVM fructus si non ad unguem maturus ac substantus adhuc sit, stomacho astanti melius conueniet, quam si prorsus maturuerit, ac nigredinem quandam quodammodo induerit: non negauerim tamen omnes oleas stomachum roborare, & appetentiam excitare; sed efficacius id efficient subaustere, idque eo magis si cum sale aut muria condiantur (quas adpēdas vocant) aut aceto intincta eidem quodammodo innatent, & adpēdas ob id vocat: nam has praedictis praestantiores esse asserit Oribasius.

## Vinum austerum.

VINVM austeriusculum atque acerbescens, Aetio teste, os ventris roborat, itemque ventrem ipsum, praesertim calida intemperie affectum: si tamen admodum austerum sit atque acerbum atriumque vomitum citat. Resinatum autem vinum si ex opposita dyscrasia vitium contraxerit stomachus, eidem robur addit.

## Duri ex media materia.

TESTACEA omnia quae & ex & odipus vocantur, quemadmodum carnem habent ad concoquendum, ita ad corrumpendum difficilem; atque ob eam causam ea saepius exhibemus, quibus cibi in ventriculo ob prauios succos corrumpuntur, siue ex hepate in eum conflant, siue in ipsius tunicis conneantur; ostrea tamen inter alia omnia testacea ut carnem habent mollissimam, ita quam minimum robur ventriculo dant.

cibi



## cibi potionesque.

CALIDÆ intemperiei cibi potionesque frigida conueniunt; frigida contra feruentes, hoc est quæ teporem aliqua ex parte excedunt: nam alioqui si simpliciter feruentes cibos accipiamus, potius aduendo lædent, quam commodum aliquod afferent.

## apsinthium.

APSINTHIVM, ut auctor est Galenus, astringentiam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, excalescens pariter & abstergens, roborans simul ac desiccans, ac proinde biliosos humores ventri ac stomacho

inherentes per inferna propellit ac per urinam euacuat Dioscoridi, inflationibusque ventris, & stomachi doloribus, cum fefeli ac uardo Gallica prodest. Atque ob hæc quodque sapor eius in uina quotidie transferunt; id enim stomacho, si quod aliud, accommodum, ac tardè concoquentibus uile. Verum quum tria apsinthij genera tam Galenus quam Dioscorides describant, non quoduis prout in manus venerit, usus humanis commodum est (nam seriphium quod maximum vocatur stomacho inimicum est,) sed solum Ponticum seu Romanum tanquam germanum verumque dictum.

## CAPVT XXV.

*Quæ res alienæ stomacho sint.*

**A**LIEA verò stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis fermentatus, itemque vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, & quodcunque olus ex oleo garôve estur, mel, mulsu, defrutu, passu, lac, omnis caseus, uua recens, ficus & viridis & arida, legumina omnia, quæque inflare consueuerunt: item thymum, nepeta, satireia, hyssopum, nasturtium, lapathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neque quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

## ENARRATIO.

**S**ICVTI omnia quæ ventriculum cogunt comprimuntque, eustomacha sunt, ita si quæ eundem laxant, subruunt, ac fluctuantem faciunt, stomacho aduersantur: ac proinde quum frigida calentiæque ei accommoda sint cogendo, tepida quoque tanquam acribus hæc extremis contraria stomacho inimica dicimus, quod exoluant, atque nauseabundum reddant: eadem quoque ratio est, cur pingua vituperantur; siquidem

hæc præterquam quod fastidium pariant, fluctuant quoque in stomacho; ac rursum sicuti antea bene habitas carnes ac modico sale conspersas laudamus, ita macie rigidas strigosasque, ac salsedine nimia exsuccas, tanquam cacostomacha reiecit. Prædulcia autem omnia stomacho ideo aliena dicit, quod citò vitientur, atque leuissima de causa in biliosum humorem conuertantur.

h 3

panis



## panis fermentatus.

**O**B acrimoniam nimirum quam ex fermento assumpsit; siquidem acris omnia stomacho ingrata sunt. Ex milio autem panis propter nimiam quandam aviditatem (est enim omnis pinguedinis ac lentoris expers, atque arena instar friabilis) stomacho ineptus est.

## radices olerum.

**M**IRVM admodum est neminem aduertisse, locum hunc mendose deprauatque ad hæc usque tempora impressum: siquidem clarius luce est, blitum betasque stomacho adeo inimica esse, ut morsum inducant si uberius comedantur: si tamen cum aceto, garo, oleoque comedantur, maliciam exuent, atque non inepta stomacho reddentur: quo fit ut hunc in modum legendum putarim: radices olerum & quodcumque olus, si non ex oleo garove estur. Sic enim Psellus, Aërius, ac Oribasius de oleribus pronuntiati sunt reliquerunt.

## mel, mulsum.

**M**EL, ut docet Galenus, in calidis corporibus promptissime in bilem vertitur; frigidis vero, siue per ætatem, siue per morbum, siue natura tales fuerint, est accommodissimum: ob id in sanguinem mutatum nutrire ipsa potest; in calidis vero prius in bilem quam in sanguinem mutatur. Non igitur omnibus in uniuersum ventriculis incommodum mel est; sed iis tantum qui calore æstuant: nisi quis ob nimiam mellis acrimoniam vellicari stomachum contendat. Passum autem, mulsum, defrutum, noua crassaque vina crassitie sua ac dulcedine, nauseam vomitumque conciliant.

## lac.

**S**IVE in calidiorem, siue frigidiorum ventriculum incidit lac, non citra noxam

sumitur; nam in hoc acescit, in illo in bilem ac nidorem conuertitur: verum ut utramque hanc noxam subterfugiamus, mellis aliquantulum salisque atque aqua momentum ei incoquimus: nam mellis acrimonia facile deorsum fertur, aquaque tam mellis, quam feri acrimonia compescitur; unde non ita facile in bilem mutatur.

## omnis caseus.

**C**ASEI omnes ut mali succi sunt, ita viscera grauant atque obstruunt: veteres etiam quum succi improbi sint, acrimonia sua stomachum pungunt atque rodunt.

## item thymum.

**T**HYMVS, thymbra, seu santheia, eiusdem plane facultatis sunt; vilesque sunt pro condimento in sanitatis usu, ut ait Dioscorides: quare an recte inter subruentia stomachum numerauerit Celsus, deliberandum censo; nam sicuti acrimonia aut calore suo calida ventriculi intemperiei obsunt, ita eidem si frigidior sit, optime conueniunt; adeo nihil in huiusmodi categoricas pronuntiandum est. De hyssopo autem id concedimus, quod post Celsum, Plinium quoque idem pronuntiati sunt reliquisse comperiamus; quemadmodum de nasturtio omnes ferè ad unum classici scriptores.

## iuglandes.

**I**UGLANDES, quas regias quoque nunc vocant, stomacho quidem per se sunt inritiles; anellana tamen sunt innocentes, nec omnino ventriculo ingrata, si cum caricis sumantur.

## Ex his intelligi potest.

**E**XEMPLO erit lac: id namque quum inter reliqua optimi succi sit, inimicissimum stomacho (ad utramcunque temperiem declinet) est. Contra quantumvis conueniat, panis non fermentatus malus est.

## CAPVT



## CAPVT XXVI.

*Quæ inflent, aut inflammationem leuent.*

**I**NFLANT autem omnia fere legumina, omnia pinguia, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus allium, cepa, brassica, omnesque radices, excepto fisure & pastinaca, bulbi, ficus etiam aridæ, sed magis virides, vuarum recentes, nuges omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisque caseus, quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchylis, ouis vel mollibus, vel forbilibus, vino vetere. Fœniculum verò & anethum inflationes etiam leuant.

## ENARRATIO.

**I**TA videtur partitus Caput hoc auctor noster, ut quum alia sint quæ flatu generent, atque alia rursus quæ inflationes leuent; sint tamen alia quæ quum neque exquisitè inflent, non possis tamen exactè inter flatu experiri numerare: ex quibus minimam inflationem fieri dicit. Verum quum magna pars eorum quæ hoc capite recensentur, ex antedictis satis constent, satis erit nobis difficiliore aliquot locos annotasse.

## omnia ferè legumina.

**LEGUMINA** appellat fabas, pisa, ciceres, lentes, lapinos, oryza, eruium, cicerulam, aracas, eruilia, phaselos, & similia. Sunt omnia flatu non omnino exortia: alia tamen aliis intensius id præstant; siquidem cicera fabas, reliquis inflant magis: ac rursus inflat magis fabarum farina, quam si integra aut alio quouis modo coquantur; frieta enim faba flatu omnis expers est. Dolichi inflant quidem, fabis tamen minus & ciceribus: Pisa contra, phaseli, cicerula, eruilia, media quodammodo sunt inter flatuosa & flatu experita.

## Ex oleribus allium.

**Q**UOD cepa bulbique, præsertim crudi, inflationes pariant, & quod probè decocti atque ex oleo cum aceto comesti inflationem omnem exuant, notum admodum est: verum an allium inter flatuosa numerandum sit, aliis pronunciandum relinquo: nam neque Dioscorides, neque Galenus, neque Aëtius, nec quisquam alius hac nota scorodon insigniuit; sed omnes ad unum allium comestum corpus excalfacere, flatu discutere, crudos ac lentos humores incidere affirmant.

## omnesque radices.

**SISARI** quidem radix quod quum calescat, adiectam quoque habeat amaritudinem quandam cum leuicula astrictione; pastinaca quod absterforum quid in se contineat.

## Ficus.

**FICIVM**, ut auctor est Aëtius, flatu modico tempore durat, propterea quod facile aluo subeant: quæ exactè matura sunt, nihil offendunt. Quo fit ut Oribasius easdem non simpliciter inter flatulentos cibos numerauerit,



rauerit, verum tum demum flatulentas tantum esse dixerit, quoties diutius in ventre haeserint: ficibus non omnino ab similes sunt carice, dactyli, vna.

lac.

NON solum lac caseusque facile in ventre inflantur, sed omnia quotquot sunt lactaria.

quicquid deinde subcrudum.

SIVE subcrudum ad fructus, tanquam immaturum dicas, siue ad cocturam referas, parum interest: nam tam immatura quam semicotta, excrementis non vacant, unde flatibus generandis occasionem quam cunctissime praebent.

Minima inflatio fit.

QVOD ea qua libero aere vagantur, animalia, atque ea qua perpeti alarum nisu per aera feruntur, quam minimam inflationem, ut pote excrementis omnis humoris expertia, generent, clarum satis arbitror; verum an in eodem albo sint pisces, ambigo: nam quum pumtosi sint excrementisque; si corporis compagem spectes, suburgida inflataque potius carne (si saxatiles demas) quam compacta erunt, quare aut expungendos esse censeo pisces, aut statim subiungen-

CAP. VII

dum saxatilibus, in hunc modum: Aucupio piscibus saxatilibus.

pomis.

NVLLA in vniuersum poma flatibus omnino destituntur; reliquis tamen minus cotonea, & quantumcunque decoctas, licet flatulenti spiritus portionem aliquam exuant, nunquam tamen effeceris, ut omnem flatulentiam deponant.

conchyliis.

CONCHYLIA atque adeo ostracodermia omnia, ut durioris carnis sunt, atque difficilius in stomacho corrumpuntur, sic reliquis piscibus minus inflant.

vino vetere.

QVEMADMODVM noua vina, multa dulcia crassaque, quod tarde transeant atque meatus obstruant, flatum generant; ita vetera tantum non eos gignunt, sed quodam modo (sicut anisum, feniculum) lenant ac discutiunt.

anethum.

PRO anetho mallet hic anisum legere, feniculo per omnia par, ventrisque inflationes, si quod aliud, sedans: quanquam non ignorem ad crasorum humorum inflationes anethum quoque prodesse.

XXVII

Quae res aut calefaciant, aut refrigerent.

AT calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, allium, cepa, ficus arida, fassamentum, vinum, & quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, praecipueque acetum, siue cibus ex eo, siue potio assumitur.

ENARRA



## ENARRATIO.

**CALEFACIENTIA**, ut refrigerantia, quatuor ordinibus seu gradibus distinguuntur: primum quidem ordinem faciunt, ut quum humani corporis temperati excedat temperiem, ad sensum tamen adeo sit obscurus, ut ratione deprehendere oporteat: alterum ab eo secundum, qui iam ad sensum manifestior est: tertium qui fortiter calefacit, nondum tamen urat: quartumque ac ultimum qui vltorius plane sit; ac de eius ordinis simplicibus, quum vesca non sint, nec in quotidianum usum recepta, hoc capite non sumus dicturi. Sunt autem generatim omnia calefacientia tenuium partium, atque diversis saporibus evariant: siquidem alia dulcedinis, alia amaroris; atque alia acrimonia cuiusdam sensum exhibent, & (quod ad odorem pertinet) quum oxypora sint, facile ad cerebrum usque permeant, ac nares fragrantia aliqua, aut aromatico odore replent.

## vinum.

**VINROVM** hunc ordinem ponit Aëlius: Vetusissimum, inquit, mulum calidum est; dulce moderate calidum; ac propterea suum inducit: fulvum calidius est nigro; flavum calidissimum est exireme; album omnium minimè calefacit: rubellum, tenue, mustum novum ac crassum infrigidant.

## Item coriandrum.

**CORIANDRI** temperamentum minimè simplex est ac frigidum, ut hic Celsus innuere videtur, & alibi testatur Dioscori-

des; sed variè coalitum ac compositum est ex contrariis facultatibus, ut auctor est Galenus: siquidem plurimum habet amare essentia, quam ostendimus tenuium esse partium, & terrestrem: sed & aquosæ humiditatis repida ei non parum inest, habetque & astritionis pauxillum.

## beta.

**VIDETVR** hic, sicuti Martialis, non citra mendi suspicionem satnas insipidasque vocare betas, ac temperiem frigidam illis ascripsisse, quum caliditatem potius indicet nitrosa qualitas, usque tum extergens, tum digerens: quare nisi quid obset, pro beta blitum, si quod aliud, insipidum admodum olus, sustinero.

## caro elixa.

**PAVLO** antè inter calefacientia carnes invulatas, nunc elixas (quod ferè idem est) inter refrigerantia posuit: verum id ideo fecit, quod quemadmodum carnes in decoctione varia opsonia atque condimenta recipiunt; ita contingit quoque earum temperiem immutari pro condimenti quod recipit qualitate.

## præcipueque acetum.

**ACETVM** frigidum admodum est atque exiccatorium: quare sitim qua à calore immodico oritur, strenuissimè restinguit; sicut eam qua a calida & sicca temperie, aut a sicca tantum provenit, sanare nequit. de eius porro facultate si quis plura desideret, Galenum libro primo Simplicium consulat, ubi ex professo temperie eius discuit.

## CAPVT XXVIII.

*Quæ res intus facile vitientur, vel minimè corrumpantur.*

**FACILE** autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quàm ex tritico est, lac, mel, ideoque \*lactaria atque omne pistorium opus, teneri pisces, ostrea, olera, i cascus,

\*lactantia



caseus, & recens, & vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minimè intus vitiantur, panis sine fermento, aues, & eæ potiùs duriores, \* aurati pisces: neque solùm aurata pura, aut scarus, sed etiam lolligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisque dura caro, eademque aptior est, si macra, si salsa est, omniaque salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, vinum austerrum, vel refinatum.

\*duri p.

## ENARRATIO.

**Q**UÆCUNQUE humidum temperamentum sortita sunt, nisi citò per alium secedant, lenissima de causa corrumpuntur: quare ut ocyus subsidant, ante alios cibos sumenda sunt: sunt autem eiusmodi præcoces omnes fructus ac subcanculares, lac, casei recentes æquè ac veteres, lactaria omnia, ut sunt placentæ, rhyemata, atque etiam lactantia: hæc enim ut teneriora sunt, ita faciliùs corrumpuntur. Malim tamen hic, (quanquam exemplaria variant, & utraque lectio sibi constare possit) lactaria, quàm lactantia legere. At quòd panem fermentatum in hoc albo collocet, mirandum mehercules est, quòd videlicet is qui probè

coctus est, ut optimum atque laudatissimum gignit sanguinem, ita si temperatum bonumque ventriculū sortitus sit, quamminimè, & nisi gravissimis de causis, vitabitur. non negaverim tamen non fermentatum & siliginem difficiliùs corrumpi; quamquam ob id in censum eorum quæ intus facile vitiantur, non sit referendus fermentatus panis. Carnes autem crassas vocat pingues, non autem carnosas ac bene habitas. Ostrea verò vitioso humore corrumpunt reliquum cibum; quare bis tergè, coquenda sunt, atque in aliam puram fermentem aquam transferenda; sicuti etiam alia quæ dura restā integuntur: atq. ita quàm minimè vitiantur.

## CAPUT XXIX.

*Quæ res alium moueant.*

**A**t alium mouent, panis fermentatus, magisque si cibariorum vel hordeaceus est, brassica, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium, ocymum, vitica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malua, lapathum, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, vua, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis viridis, vix recentēs, pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, musculi, & omnes fere conchulæ, maximeque ius earum, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiarum atramentum, si qua caro assumitur pin-



tur pinguis eadem, vel iurulenta, vel elixa, aues, quæ natant, mel crudum, lac, \* lactaria omnia, mulsu[m], vinu[m] dulce, \* lactantia vel falsu[m], \* aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pinguia, elixa, iurulenta, falsa, diluta.

\* aqua, tenera omnia.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ alium movent *καταρτυα*, nos purgantia; Celsus Methodicus affectu quodam dicendi modo ventris fluxa dicere maluit. Fermentum igitur alium ducere, ex ipsa falsedine & acrimonia satis constat: atque id quidem quamvis per se præstet, non tamen ob id omnis fermentatus panis alium statim leniet: nam qui ex purissima tenuissimæque farina (quam tritici florem vocari diximus) consciuntur, plurimum ponderis exigua mole habentes, tardè admodum deiciuntur, quantumvis fermenti plurimum adieceris. Furfuracei autem panes (quorum Celsus, ut ante dictum est, nusquam meminit,) sicuti parum nutriunt, ita facile subsidunt: furfur enim quum facultatis sit deterforia, merito intestinis irritatis celerem facit deiectionem; ita ut hic fermenti parum, aut levis subactio, brevèque intervallum suffecerint. His quamproximè accedunt cibarii sordidius dicti panes: nam quemadmodum siliginis quam minimum, furfurisque quam plurimum recipiunt; ita alium quoque lenigant, & parum corpori præstant nutrimentum. In eodem quoque albo sunt hordeacei: parum enim & hi nutriunt, & quum friabiles sint, nihil in se lenoris habent; ac proinde tenuem ac deterforium in nobis succum gignunt.

## brassica, si subcruda.

**V**SUS exhibendi brassicam, Galeno teste, is fuit ad subducendam alium. Leniter coctam & universam ac repente in vas aliquod in quo sit oleum & garum transfusum, ante alios cibos sumebant. Dioscorides crudum eius succum cum iride & nitro vorandum exhibet. Purgat autem propter qualitatem quandam nitrosam quam obti-

net; qua si diutius coquatur, absuntitur: atq. hinc fit ut sequente capite inter alium astringentia posuerit biscottam crambem. Dioscorides percoctam idem facere testatur; enaporat enim tenerior & absterforia qualitas, vehementi & diuturna coctione. Paulus marinam vehementiorè dicit ad solvendam alium, propter amarorem: Dioscorides sativam prætulit. Lactucas autem alio ducende ideo idoneas dicimus, quod aquosa sua substantia facile permeant; quanquam de sylvestri seu marina lactuca locum hunc intelligendū existimem: nam, ut docet Dioscorides, aquam per alium elicit, potus in aceto, mulsu ad duos obolos eius succus. Si tamen de sativa accipere malis, de ea intelligendum suspicor quæ in caulem exierit; hæc namque vim quandam nascitur, succo aut lacti sylvestris lactuca similem.

## anethum.

**H**IC, si quid mihi concedatur, iam iterum pro anetho, anisum substituo; idq. eò potissimum, quod Dioscorides anisum urinam ciere, aquam quæ subit eum distillare, potumque sitim sedare dicat: Anethi contra, præsertim comæ seminisq. decoctum, urinam quidem ciere, alium tamen leuèque vomitiones sistere: cui sententia Plinius quoque subscribit; nam is tormina sedare dicit, atque alium sistere. Quanquam si quis anethum viride ideo alium solvere dicat, quia minus calidum sit sicco, atque eodem humidius, ac proinde crudos humores coquere, per me quidem integrum est; quanquam, ut dixi, anisum legere malim: atque sic quæ sequuntur coherebunt; nam ocymum alium turbare tradit Dioscorides, nasturtiumque ventrem mollire Plinius: Nasturtium,



tum, inquit, Venerem stimulat, animum exacuit, aluum purgat, detrahbat bilem potum cum aqua decem denariorum pondo. Vrtica autem folia cum conchis cocta aluum emolliunt, urinamque cient, Dioscoride teste: Galenus autem ventrem subducere, ipsa dumtaxat exersione, ac veluti titillatione, non purgatione asserit.

### portulaca.

COMPERTVM satis non habeo, quomodo portulaca vim subducendi aluum ascribat auctor noster: nam quantumvis temperie sit humida, unde facile intestina praterlabatur; habet tamen vim quandam asfrictoriam: quo fit ut intestinis fluxione laborantibus recte infundi dicat Dioscorides; & sicut Galenus asserit, paucæ ansteritatis particeps est; & quoniam asfringit, utiliter dysentericis editur, & in muliebri profusio & in sanguinis reiectionibus. Plinius etiam vomitiones sistere auctor est, dysenterisque & vomitiis dari ex aceto, vel bibi cum cumino.

### radicula.

EODEM ferè elogio celebrantur, radícula, cepa, allium, capparitis: nam omnes quotquot sunt, crassos corporis humores extenuant, sitim gignunt, aliuoque utiles sunt, eamque leniter subducunt.

### malua.

VENTRICVLVM (ut inquit Simeon Sehi) malua facile subit, non solum propter humiditatem, verum etiam glutinositatem; atque in primis si cum oleo & gavo offeratur, vino quo editur tempore irrorata.

### lapathum.

Αλάπατον. Graeci dictum autumant ἀλάπατον, quod omnium solis decoctis aluum molliatur, atque inaniatur: Galenus tria tantum genera facit; Dioscorides autem quatuor. Verum quotquot sunt rumicis genera, lubricam aluum efficiunt; radicemque cum viuo decoctum, regio morbo mederi tradunt, bile nimirum per secessum expurgata. Beta autem nitrosa facultatis particeps est: qua tum extergit, tum digerit, tum per na-

res purgat, atque aluum ad excretionem stimulat, stomachumque vellicat, eorum praefertim, qui hunc sensibilem valde habent. Cocta autem beta, ut vult Galenus, nitrositatem omnem exurit, & ad detergendum digerendumque validior est alba; nam nigra adiunctam habet asfrictionem.

### asparagus.

ASPARAGVS generatim dicitur canaliculus tenerior herbe fruticis ad fructum & semen excrescens; spectatim vera herba vulgo satis cognita ita vocatur: atque huius quidem canaliculi cocti & comesti aluum molliunt, ac urinam movent, renisque ac iecur infarctum liberant. quod hinc manifestum fieri affirmat Simeon Sehi, quod urina odorem in suum transmutant.

### cucurbita.

SUBSTANTIÆ quidē affinitate cōiuncta sunt, mora, cerasia, melones, cucurbita, pepones, cucumeres; omnibus siquidem cōmune est quod cum substantia humiditate lubricitatem quandam sortiantur. Quare si ante alios cibos sumantur, & in purum ventriculum inciderint, citò subsidunt, ac ventri utilia sunt: Cucurbita autem elix succus expressus, ut auctor est Dioscorides, cum exiguo melle & nitro potus, aluum leniter purgat, ac si quis in cucurbitam crudam excavatam vinum infundat, & sub dio habeat, temperaturumque ieiunus bibat, aluum leniter molliet.

### vua, omnia mitia.

SI quid rursum hic mihi concedatur, pro tō vua, legero vinajdg; ne in eo, quem summe breuitati studuisse certum est, τρωτοδολις aliquo modo culpare possimus: nam paulo post vuas recentes ac pingues enumerat. Neque enim alienum a ratione est, ut ante quoque dixi ubi vinorum facultates expendi, mitia vina, hoc est dulcia, nulliusque ansteritatis participia molliere aluum: nam in subsequente capite vina aspera, quae ex diametro mitibus opponuntur, asfringentibus annumerat.

figus.



## ficus etiam arida.

**FICUS**, ut docet Galenus, commestibiles sunt, & facile in totum corpus perueniunt penetrantque; nam & abstergerendi vi pollent haud obscura; cuius gratia commansa, & calculosis renibus arenularum vires propellant. Aride quoque ficus, quas caricas vocari dixi, extenuandi incindendiue vim habent; quo nomine aluum stimulant ad excretionem, renisque purgant.

## vux recentes.

**DICTUM** est maximum viarum bonum esse, quod celeriter subeant atque aluum turbent; atque horum magis participes reddi, quo fuerint & pinguioribus, & recentioribus: nam quae aliquandiu decerpit pependerit, peniles ob id dictae, ut humoris portione aliqua priuata exaruerunt, ita aluum ducenda minus idoneae sunt.

## minutae aues.

**NON** quotquot sunt minutae aues, ventri ducendo idoneae sunt; sed quae tenerae sunt & laxae: sub quo genere comprehendere possumus passerulorum atque omnes monticolae aues; haec siquidem quemadmodum facile conficiuntur atque distribuuntur in vniuersum corpus, ita facilius aluum reddunt; secus est de aquatilibus auib; quae parua corporis mole iusto craffiorem gignunt succum. Si tamen placeat per minutas auiculas, teneras adhuc & nuper excludas intelligere; constabit sententia: nam omnia nuper edita facilius alterantur ac distribuuntur; ac ventri subducendo utiliora sunt annosis, quae sicuti exurca magna ex parte sunt, ita aluum ducendi inutilia.

## cochleae.

**CRUSTACEAM** testaceamque habentium tunicam ius (inquit PSELLUS) ut asporum, pagurorum, nutilorum, concharum, & aliorum id genus, ventrem citat: nam si quis hoc coquat, inde concinet coctionem ex oleo & gario & pipere, facile aluum citauerit. Ceterum marinorum echinorum, & conchylium iura, ut etiam veterum galorum, praesertim rufforum, per se aluum

subducunt. Paulus Aegineta, Ias, inquit, omnium quae testis integuntur, aluum ducit. ob hanc causam terrestres cochleae ventrem solvunt: nam, ut ait Galenus, omnibus id commune est quod falsum in carne succi contineant, qui aluum subducit, quod scorium unicuique magis minusque inest, pro qualitate ac quantitatis ratione; siquidem ostrea inter alia testacea carnem molliissimam habent: quo fit ut aluum quoque valentius subducant.

## garum, falsamenta.

**NON** modica falsarum carum diffrentia est, prout quaedam ex ipsis saliantur: nam adeo immutantur, ut sepe animalis temperamento humidi caro salita longe fierior euadat, quam caro animalis siccata natura, non falsa. Generatim tamen omnia falsamenta tenuium sunt partium, & comesta lentos ac craffos humores incidunt atque attenuant, atque intestina ad fluxionem stimulant. A falsamenti autem quam minimè, quod ad vim ducendi aluum pertinet, declinat garum; cuius conficiendi modum docet Plinius Naturalis historiae libro VIII. cap. VII. Aliud, inquit, etiamnum exquisitum liquoris genus est, quod Garum vocare, intestinis piscium, ceterisque quae abicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentiam sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce quem Graeci Garon vocabant: & reliqua quae finissimè eodem capite tractat Plinius. Sunt alij qui costorum piscium ius vocent garum, quod in hunc modum preparatur, quemadmodum in venusto quodam manuscripto libro se reperisse affirmat Gualterius Ruffinus: Sumuntur pisces minores salsi, aut si salsi non fuerint, saliantur paucis sale, mittunturq; illorum sextarius unus in boni vini sextarios tres, ac decoquuntur aevo vase dum duae partes absumantur, deinde ius decocti per incertum percolat, reconduntque vitreo vase, atque usui seruant. Caelius Methodicus libro Chronion, Garum, inquit, appellatur ius ex piscis siluro confectum. Aetius multos alios purgatorij Gari modos describit: quos si quis scire desideret (longum enim esset hic singulos adscribere) eundem consulat.



## sepiarum atramentum.

SEPIÆ ex genere mollium piscium sunt, salsumque quodammodo humorem in se continent, unde & alio ducenda accommodata sunt. Vocat autem sepiarum atramentum, liquorem qui his pro sanguine inest.

## si qua caro assumitur.

HYMIDA omnia sicca, succosaque exunctis facilius præterlabuntur: quo fit ut carnes omnes pingues (sunt enim temperamento humida) alium molliant; idque potissimum si aut intulenta sint, aut elixæ. Verum quomodo in hoc albo posuerit carnes earum alium que natant, nondum assequor; hæc siquidem ut crassi succi sunt, ita difficile secernuntur: nisi quis ideo lenire dicat, quod aquosa cuiusdam humiditatis participes sint.

## mel crudum.

QUVM mel tenuium sit partium, ut docet Galenus, acrimonia quiddam habeat necesse est, qua alium ad excretionem prouocet; quam adimentes ipsum efficiunt ad distributionem & concoctionem accommodatius. optime autem ipsum adiungemus, si primum, illi multum aquæ admiscuerimus, ac deinde tantisper coxerimus, quoad spumare desinat. Oportet autem spumam statim ut emergerit, incontinentem ab ipso tollere: quum enim hac parandi ratione acrimoniam amiserit, neque ad excretionem amplius alium irritabit; atque ob hoc melli crudo tantum purgatricem facultatem ascribit Celsus.

## lac.

LAC omne quo liquidius est, eo magis alium subducit, crassum minus; serum autem lactis (ut XII capite ostendi) valde emollit ventrem. Iniiciendum autem lacti est (ut rectè monet Galenus libro De alimentorum facultatibus), ad ipsum mellis optimi quod satis sit ad condiendum solum, ne stomachus subvertatur, ac in eandem rationem salem indere oportet, ne gustus offendatur.

## lactaria omnia.

ETSI hic inter exemplaria non satis conueniat, aliis lactaria, aliis lactantia legentibus; potiorque numerus priorem lectionem sequatur: malimus tamen inter alium ducentia lactantia animalia numerare. nam, ut Psellus, iuuenum animalium carnes, magis quam veterum, subducunt, extremæque mediis. Ac Aërius animalium valde iuuenum carnes facilius alio secedere testatur: siquidē quanto sunt atate propectis humidior constitutione seu temperamento, tanto sunt excrementosiores ac humidiores: ac proinde minus quidem nutriunt; discutuntur autem ac distribuntur celerius. Et quum lac ex contrariis substantiis coalitum sit, serosa videlicet, cui purgantem facultatem inesse tradidi, butyrosa seu pingui ac caseosa, qua obstat ac meatui infarcti; nescio quomodo lactariis omnibus vim subducendi alium rectè ascribemus: nam que ex crasso lacte confiunt, ut crassioris sunt consistentie, ita fixiusherent, tardiusque præterlabuntur: Huc adde quod Aërius, Oribasius, Psellus liborum ac placentarum genera, pistiorumque omne opus tardi transitus esse dixit.

## mulsam.

MVLSVM, quod ὀνόμελα, & aquam mulsam, quam ὀνόμελα καὶ μελίχερς appellant, eo intensius purgare constat, quod fuerint minus cocta: nam coctione, ut dictum est, mellis acrimonia dissipatur. Ac quod dulcia omnia vina subducant alium, satis explicatum est: & si quis qua de salisamenti dicta sunt intelligat, facile percipiet, vinum salsum ad excretionem irritare.

## aqua tenera.

SIVE tenera cum tepidis, siue cum aquis adiungamus, parum interest. verum si aquis annexamus, tum eam intelligemus, qua dulcis & sincera sit, nullius plane qualitatis particeps; hæc enim ne minimo quidem tempore in præcordiis moratur, facillime citra molestiam fertur: quanquam si quis & tenera repentinis annexat, clariorem sententiam efficiet: atque ita hunc locum non



cum non de predictis tantum aquis, sed & de marina quoque intelligere licebit; hæc quum calida simul sit & acris, alnum ceterum vehementius conturbat, atque pituitam

expellit. Nam aliqui nisi teneris omnibus tepida ascribamus, stomachum magis subvertere, atque ad vomitum provocare dicemus, quam alnum turbare.

## CAPVT XXX.

*Quæ res alium adstringant.*

**C**ONTRA adstringunt, panis, ex filigine, vel ex simila, Panis.  
magis si sine fermento est, magis etiam si \*ustus est, \* tostus  
tenditurque vis eius etiam si bis coquitur. Pulticula vel ex alica, vel ex panico, vel ex milio, itemque ex iisdem sorbitio, & magis si hæc antè fricta sunt. Lenticula, cui vel beta, vel intubus, vel ambubeia vel plantago adiecta est, magisque etiam, si illa antè fricta est, per se etiam intubus, vel ex plantagine vel ambubeia fricta, minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisque si assa sunt, minutæ aues, merula, palumbus; magisque si in posca decoctus est, graues omnes aues, quæ magis currunt, quam volant: lepus, caprea, iecur ex his quæ seuum habent, maximeque bubulum, ac seuum ipsum, caseus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione quam in caseo transmarino videmus, aut si recens est, ex melle mulsõe decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba, magisque ea, quæ torminalia vocantur, mala cydonia, & punica, oleæ vel albæ vel perimaturæ, myrra, palmulæ, purpuræ, murices, vinum resinatum vel asperum, item meracum, acetum, mulsũ quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua vel tepida, vel præfrigida, dura, id est ea quæ tardè putrescit, ideoque pluuiâ potissimum, omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem carne assa potius quam elixa.

## ENARRATIO.

**L**ENTORIS ac crassitie plurimum foritur panis filiginens; hunc sequitur similacens: quo fit ut alium astringant; idque eo magis si fuerint azymi, hoc est, non fermentari; nam fermenti acrimonia, ut præ-

cedente capite dictum est, ad expulsionem irritaretur. Intenditur autem adhuc magis eorundem astrictio, si ostiense aut recoctione humidum quicquid habebat exurgatur: nam sicca omnia atque exucca difficilius transiunt.

Pulti-



## Pulicula.

**ALICA** nunc frugis genus est, modò ex fruge facta farina, & inde pulicula vel sorbitumcula; habetque non secus ac siligo succum lentum, unde & difficulter subsidet, ac iecur oxyimè obstruit, renibusque generandi calculum occasione prebet; atque hinc Galenus iis qui sani adhuc vehementi ventris mordicatione, aut ob biliosi humoris transitum, aut aliud genus infestabantur, sorbitiones ex alica exhibuit. Milium autem & panicum, eiusdem planè, astrictoria dico, facultatis sunt: nam utraque nihil neque lentioris neque pinguedinis habent, sed prae arida simul & friabilia sunt; unde & humerenti alium per se, & ex iisdem facta sorbitumcula vel pulicula deficcant, idq; eo magis si milium plurimumque alium. extabuerunt decoquantur: atque vehementius adhuc vis astrictoria intenditur, si fruges primùm frignantur: nam frictura non solum si quid estur, astrictoriam facultatem adipiscitur, sed quicquid succunda alio vel medicamentum assumitur, sic rhubarbaro, sic quotquot sunt myrobalarum generibus, cathartica aliaque vi praeditis, vel lentissima frictura aut obfultatione astrictoris nonnihil conciliamus.

## Lenticula, cui vel beta.

**OMNIA** ferè in quibus sapor est acris vel salus, vel nitrosus, dicat ea quae contrarias in se facultates habent: sic brassicam lentemque paulò ante purgare dixi, quas nunc alium cohibere affirmat: nam substantia quae velut oleris ipsius caro est, astringit; succus vero, atque ipsorum decoctorum vis ventrem emollit. Sic lenticula quoque cunctis gustu magnam restringendi facultatem representet, eandem potentiam sortita est, ut auctor est Galenus libro De alimentorum facultatibus: nam si quis ipsas in aqua coxerit, & deinde aquam sale aut garo, aut cum ipsas oleo condiens sumperit, potius is alium danciet. At ex his decoctis lentibus ad eum quem diximus modum lens apparatus, succo habet facultatem contrariam: nam corticem habet astringentem; & quae ipso- rum veluti est caro, crassi est succi & terref,

austeram qualitatem habens exiguam, cuius cortex multa est particeps. Hinc porro si beatam adieceris, ac una coxeris, gratissimum non modò opsonium, sed medicamentum effeceris; ut quod Galenus Heraclidem Tarentinum sanis aequè ac aegris exhibere solitum dicat. Nam quum extremorum quodammodo sint expertia, mediam quandam naturam sunt adepta; unde non tam astringunt, quam robotant ventrem: atque hinc quum ex utrisque mistas quodammodo facultates sortiretur, τερτοφάνης nominabat Heraclides. Eadem ratione Galenus ex piisana (quae lenis quoque contrariam facultatem habet) & lente praestantissimum edulium componi auctor est, quod phacopisanam nominat. Astringet autem vehementius lenticula, si eidem admisceatur intubus, ambubeia vel plantago; nam omnia haec astrictoria facultatis sunt, idque eo magis si frignantur.

## per se etiam intubus, vel ex plantagine.

**VIDE** ne non consumptio ex expurgenda sit, atque sic immutanda lectio: per se intubus, vel plantago, vel ambubeia fricta.

## minuta olera.

**NE SCIO** quam appositè minima omnia olera alio compeccente idonea dicat: si quidem hic non tam humilitatem, proceritatem aut quantitatem, quam qualitates quae ex gustu deprehenduntur, expendere licet: nam si acerba, si austera sint, quantumcumque in alium assurgunt, ventre sistere dicimus: & rursum quae acris, nitrosa, incidentiaque sint, quantumvis humilia, alium ducunt.

## brassica bis decocta.

**QVOD** brassica bis decocta astrictoria facultatis sit, ante dictum est. verum ubi humerenti alium exicare volumus, quum iam modèratè cocta esse videtur, prima aqua effusa, aliam calidam statim affundimus, deinde in eam ipsa rursu coquimus donec flaccida fiat. Oportet autem neque aërem neque aquam



que aquam frigidam attingere quod bis co-  
quitur : non enim amplius exacte flaccescit,  
etiam si diutissime coquatur.

### dura oua, magisque si assa sunt.

QUAEVNOVE dura sunt & consisten-  
tia crassa, ut difficile concoquuntur, crassum-  
que succum generant, ita tarde secernuntur,  
alio inutilia sunt : non mirum igitur si oua  
ad duritiem decocta ventrem astringunt,  
idque eo magis si in cineribus assa sunt : ea  
enim praeter duritiem à circumiectis cineri-  
bus, terrea quadam crassaque qualitate par-  
ticipant.

### minutae aues.

NESCIO an sui per omnia memor mi-  
nutas aues hic collocarit : nam precedente  
capite easdem lenire alium dixit, ubi sub  
minutis avibus, non tantum monticolae au-  
culas comprehendi posse demonstravi, sed &  
quasvis nuper editas : aetate enim quales qua-  
les tandem sunt, sicciores atque tardioris transi-  
tus redduntur : adde quod coctura ratio, cu-  
ius hic non meminit auctor noster, ipsarum  
facultatem nonnihil alterare posuit : nam qua  
in aqua dulci ebulliant, sicut alimentum  
humidius subministrant, ita alio utiliores  
sunt ac facilius secernuntur : at quae assan-  
tur aut sartagine fringuntur, quemadmodum  
sicciores coctura redduntur, atque omnem quo-  
dammodo humorem exiunt, ita alio inuti-  
liores sunt, atque eandem duritiem reddunt.

### merula, palumbus.

QUEMADMODUM turdo non omnino  
ab similitudine merula, ita quam proxime ad eius  
delicias ac dulcedinem accedere quidam exi-  
stimant. Plinius tamen earum carnes astringe-  
toriae cuiusdam facultatis participes quo-  
dammodo innuere videtur : Nam dysente-  
ricis cum myrti baccis recte adhiberi dicit.  
De palumbo autem mirum non est : nam ob  
glandium immodicum esum, quibus delectari  
ferunt, Venerem simul ac alium cohibet,  
quod respiciens Marialis inquit :

Inguina torquati tardant hebetantque  
palumbi;

Non edat hanc volucrem qui cupit  
esse salax.

Magis autem astringunt si in aceto aut  
posca decoquantur : nam tum quoque dy-  
sentericis commodè administrari auctor est  
Plinius.

### Grus, omnes aues.

GRVVM substantia, ut auctor est Gale-  
nus, dura est & fibrosa : quare ante esum  
pluribus diebus macerare solent, ut ita faci-  
lius & concoquantur & dissolvantur. Caesarius  
hic mendum subesse suspicatus, graues le-  
gere maluit, ita ut graniores omnes aues  
quae pedibus fiderent, quam quae volatu ma-  
gis niterentur, intelligeret : ea siquidem quem-  
admodum nutrimentum copiosius praestant,  
ita difficilius secernuntur : sunt autem eius-  
modi anseres, tarda vnde dicta, struthio-  
cameli similisque.

### lepus, caprea.

VENATIO omnis crassi melancholicis-  
succi est, agrèque digeritur : quo fit ut ob-  
structis meatibus difficile excernatur. Non  
solum igitur leporem capreamque, sed & cu-  
niculos, cernos, hinnulos, atque adeo omnem  
venationem tardi transitus dicemus.

### iecur ex his quae seuum habent.

ANIMATIA quae natura magis terrea  
sunt, sebum habent : qualia sunt, si Aristo-  
teli credimus, quae altera tantum parte den-  
tata sunt ; humectiora autem adipem atque  
haec utrimque dentata, idem affirmat. Quum  
igitur iecur omnium animalium crassi succi  
tardisque transitus sit, ac difficultis concoctionis,  
eorum potissimum animalium, quae natura  
sicca & terrestria sunt, veniri inutile erit,  
quale, si quod aliud, bubulum est.

### caseus qui vehementior.

CASEI omnes, ut auctor est Galenus,  
agrè concoquuntur, acidum rictum gene-  
rant, & statim ventrem implet, & improbe  
alio secernunt, pituitam & astringunt ventri  
inducunt ; siquidem in preparatione ab  
immissa coagulo acrimoniam assument, &  
omnem

k



omnem humorem deponunt; præsertim inueterati, qui acriores quidem & calidiores redduntur; ceterum maiorem noxam ex succi prauitate consequuntur, ægriusque concoquuntur ac difficilius aluo sedantur. Transmarinos autem caseos vocat eos, qui trans maria vehuntur; in quo albo potissimum censebantur, ut auctor est Columella, qui neque fistulosi, neque falsi, neque præaridi omnino, neque alicui vitio subiecti, sed qui à crassiore liquore coacti in longam ætatem seruari possunt. Erantque si Plinio credimus, trans maria Bithynius caseus in gloria.

aut si recens est ex melle.

QUANQUAM alibi recentem caseum, & modo coactum deicienda alui gratia cum melle ante cibum sumi testetur Galenus, sententia huic non oppugnat: nam mellis crudi acrimonia ad excretionem stimulat, quod à solo caseo tantum abest, ut expectemus ut ventrem, iecur, renesque (sicuti etiam lac, quod quum consistentia crassum sit, parum feri habeat) obturet & obstipet: quo minus mirum est omnia liborum ac placentiarum genera, ex recenti caseo, simlagine mellisque confecta, tardi transitu esse; nam lentore quopiam meatus infarciunt.

Item mel coctum.

QUOMODO mellis acrimonia per decoctionem adimatur, precedente capite ex Galeno retulimus. Plinius medicamentosam astringentiamque magis vim obtinere dicit, si in eodem apes mortue sint; id enim decoctum dysentericis vtiliter exhiberi.

pira immatura.

IMMATURA pira omnia austera sunt acerbique, frigida, concoctum difficilia prauisque succi, ac proinde quum qua austera acerbique sunt, eadem statim astringentia sint, consequens est omnia pira ventrem astringere.

forba.

SORBIS, ut auctor est Plinius Naturalis historia libro XV, quadruplex est differentia: alii enim eorum rotunditas mali,

alii turbinatio piri, alii ovata species; ceterum malorum aliquibus. Hæc obnoxia acri odor, & suauitate rotunda antecellunt; ceteris vini sapor. Generosissima quibus circa pediculos tenera folia. Quartum genus torminale appellant, remedio tantum probabile, assiduamque pronent, minimum pomo, ideoque torminale dictum suspicor, quod dysentericis, quæ tormina Latini vocant, medeatur, generatim tamen quot quot sunt sorba astringunt; nam succus ipsorum austerrimus est, sine ulla acerbitate. Dioscorides & Plinius sicca & ante maturitatem collecta ad compescendam aluum magis commendantur. Sammonicus autem vetusta sorba pueris ex dentitione fluore alui laborantibus appositissime adhiberi auctor est: nam Proderit (inquit) & pueris quos dentis origo fatigat

Castaneas coxisse nuces, & sorba veterusta. Quod alludens Martialis, dicit:

Sorba sumus molles nuntium durantiæ ventres;

Aptius hæc puero, quam tibi poma damus.

Mala cydonia vel punica.

COTONEIS eximium quippiam, quod in aliis non inuenitur, inest: nam præterquam quod astringentem habeant copiosorem, succus etiam eorum diu permanet ac durat. Punicum quoque malum omne astringentis est facultatis; sicco tamen acini magis, atque his intensius cortices astringunt.

oleæ vel albæ vel præmatura.

SI quid rursum hic mihi concedatur, pro præmaturis, immaturas legero, nisi forte quis præmaturum id quod ante tempus maturuerit, intelligere malit; quanquam ne sic quidem sententia constare possit. Nam, ut Galenus, olim rami quantum habent astringentis, tanta & frigiditatis participes sunt; fructus vero, si quidem ad æquum maturuerit, moderate calidus est; si immaturus est, magis cum astringit, cum refrigerat.

myrta.



## myrta.

MYRTI baccas, Catiōnem sequutus myrta vocat, Varro Myrta dicere maluit. Constant autem ex contrariis substantiis: verum prædominatur in ipsis terrenum quippiam; habet tamen & quippiam tenuium partium calidum, unde & fortiter siccant. Omnes tamen ipsius partes restringendi vim habent, tum forinsecus corpori impositæ, tum intra sumptæ. De palmulis capite XVIII. satier dictum est: sunt autem hic eo convenientiores quo fuerint acerbiores.

## purpuræ, murices.

ORONDEQUAR in scula precedente capite vi quadam ob innatam saljedinem alium ducendi prædita ostendimus, eorundem tamen carnes exhausto humore ventrem astringere: nam contrarias atque sibi invicem quodammodo pugnantes, non secus ac lenticula, faciliates obtinent.

## vinum resinatum vel asperum.

PERSPICVVM est, auctore Galeno, quod astringens, austerrum, asperumve & acerbum, qualitatē unicam significant: ac proinde quod austera vina qualis tandem coloris sint, ruffa, alba, flava, nigræve ventrem sistant, consequens est. Verum an resinatum vinum idem efficiat, indagare opus habet: nam ut calefacit, ita concoctionem quoque adiuvat, ac proinde ventri non omnino inutile est, nisi quis resinatum vinum a resina lentissima (quam massichem appellant, quæ reliquis resinis præfertur, quod parum astringentis possideat, & stomachi ac ventris, hepatisque debilitati conducatur) dictum putet. Verum etsi resinatis vinis id concedamus, citra calumniam meraca omnia vina idem efficere difficile sit asserere: nam dulcia omnia, & quæ mista sunt, alio cienda idonea pronuntiamus: quare per meraca ea tantum intelligemus, quæ quum vinosa sint, consistentia etiam crassa sint; quæ videlicet calore suo humores cogant atque adassent.

## acetum.

ACIDA omnia, ut auctor est Galenus,

quum crassum succum in ventre innuerint, ipsum incidunt, ac deorsum subducunt; atque ob id, deiectiones humectant: quod si ventrem purum innuerint, ipsum magis sistunt.

## mulsum quod inferbuit.

PERIPHRASTICVS quod Græci ἐμφρασις aut σίγειον, nos Sapiam, mulsum quod inferbuit, vocat; idque ut defrutum à sapa distingueret, diximus autem XVIII. capite varios tum mulsi, tum defruti componendi esse modos, atque pro decoctionis modo nomina immutari: ac rursum quoniam, ut præcedente capite dictum est, decoctione mellis acrimonia dissipetur, consentaneum quoque est, mulsum quo magis inferbuit, eo sistende alio magis idoneum reddi, ac proinde sapiam quum defruto magis decoquatur, efficacius quàm defrutum ventrem cohibere.

## • passum.

PASSVM appellare solent, quod vis sole siccatis in area aut in sarmento torrefactis exprimitur; quod sanè lentore quopiam ac crassitie obstruit.

## aqua vel tepida vel.

NESCIO quàm appositè, aqua præfrigida tepidam opposuerit; neque enim hæc ventrem astringit, sed stomachi potius molietur subuersiones, aut si id non efficiat, per alium citissimè labetur: quare, nisi quid obster, tunc tepida in feruida commutatur; idque ideo potissimum, quod antè inter stomachum roborantia, seruidos ac frigidos tam cibos, quàm potus posuerit; seruida enim non secus ac præfrigida, alium firmat atque obstitat. Pluviam autem aquam cur inter alias duram dixerit, demiror: nam Hippocrates, Galenus, Aëtius, & quotquot sunt classici scriptores, pluviam aquam lenissimam, & quæ citissimè mutetur, definierunt: quare quum fatilè mutetur, atque in bilem transeat, febribus ac reliquis huiusmodi affectibus non admodum convenire. Quo fit ut si rursum aliquid mihi condoverit, locum hunc ita immutandum censeam: aqua quæ vel feruida, vel præfrigida, dura, id



ra, id est ea quæ tardè putrescit, ideòque putrea potissimum: nam quantumcunque pluviam aspidionis quippiam habere concedamus, præsertim si ventosior sit, non ideò duram eandem dicere fas erit; qualis certe putrea si quæ alia est:

nam frigida terreæque est, difficulter exseritur, agrèque concoquitur, ideòque tardè putrescit. Dura autem, aspera, tosta, macra; cur huc referantur, non opus est rationem reddere, quum ex antedictis satis clarum sit.

## CAPVT XXXI.

*Quæ res urinam mouent.*

**U**RINAM autem mouent, quæcunque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocymum, mentha, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, eruca, fœniculum. Præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thymum, fatureia, lapsana, pastinaca, magisque agrestis, radícula, fiser, cepa. Ex venatione maximè lepus, vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, absinthium, nuclei pini.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ urinam mouent tam medicamenta quàm cibi, diouρητικά Græci, Celius Methodicus affectatè mictualia vocat; suntq; omnia tenuium partium, & quod ad temperiem attinet, terij serè ordinis exiccantium & calefacientium: qua ratione Celsus noster si quæ in hortis nascantur, quæ boni odoris sunt atque aromatum quid spirant, in hoc albo locat: sunt autem talia, anisum, ruta, hyssopum, nasturtium, thymbra, capparis, thymum, nepeta, lapsana, radícula, pastinaca. verum efficiunt id alia aliter: siquidem sunt quæ per urinam humorem è thorace educant, quod sanè inter reliqua nuclei pini virides, piper rutæque efficiunt. Alia rursus ab hepate educunt per urinas, ut est mentha, fœniculi & anisi semen; atque item alia à renibus eandem expellunt, ut apium, pastinaca, piper, vinum tenue: atque iterum sunt quæ à splene idem præstant, qualis est thymus, capparisque tum radix, tum fructus. Atque in summa sunt

quæ à toto corpore efficaciter id operantur, ut asparagus, basilicon, vinum tenue, salvia autem, erythrodanque radix urinam multam, pinguem, sanguinèque non alibilem educere creduntur: orobisq; sanguinem male olentem per urinam expurgare dicitur. Atque hæc hætenus: nunc quomodo hæc facultate prædita sint nonnulla, expendamus. Asparagus igitur abstersionem tantum citra manifestam aliquam caliditatem, aut frigiditatem lotium ciere dicitur. Ocymum autem (quod & basilicon dicitur) & fœniculum quum calefaciant modicè, excrementicia quadam humiditate quoque prædita sunt: quo fit ut non tam urina cienda, quàm lacti generando idonei sint. Coriannon verò aut coriandrum, temperie variè coalitum est, ac mixtum; est enim non copiose amaritudinis particeps, quæ in reni simul ac terrestri parte fundatur, unde urinas mouere auctor noster docet: sed & aquosa humiditatis tepida non parua ei inest, qua ratione lacti generando



generando & somno conciliando non omnino inutile est. Mentham autem ideo pronocare urinam dixerunt, quod sanguinem extenuet, atque serosum faciat, iecurque ab obstructione liberet. Ac quod sicca quam viridia, semen quam herba, agrestia quam domestica hortensiaque efficacius id prestant, clarum admodum est: nam exiccata temperie calidiora, & sicciora redduntur, hortensiaque

agrestibus ferè humidiora sunt. Porro leporinae carnes Hippocrates siccare quidem atque sistere, sed lonium monere docet. Pipere quoque urinam monere in confesso est: verum quod (ut Aristoteles vult) si largius sumatur, vesicam soluat; si parcius, alnum, non ita vulgatum, cuius si quis rationem desideret, problematum sectionem primam consulat.

## CAPUT XXXII.

*Quae res somnum moucant, aut  
sensus excitent.*

SOMNO verò aptum est papauer, lactuca, maximeque æstiuæ, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porum. Sensus excitant nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueque pulegium, ruta, & cepa.

## ENARRATIO.

SOMNVS, Aristotele teste, est sentiendi quedam impotentia, ob alimenti vapores in cerebro refrigeratos, & internum calorem ad cor reuocari proueniens. Verum quamquam scire admodum somnum desinuerit Aristoteles, non tamen semper, ut innuere videtur, ex eadem causa pendet: siquidem contingit nonnunquam somnum irrepere ab intemperie frigida, aliàs ab humida; vti etiam nonnunquam ab vtriusque simul mixtis: quo fit ut ea quæ somno conciliando idonea sunt, temperie varient, hoc est aut frigida, aut humida aut vtriusque qualitatibus simul commixtis, frigida simul sint & humida. Porro quæ somnum inducunt, duplicia sunt genere: nam sunt quæ æstiuæ & vespertinæ, tanquam stuporem quandam inferentia vocantur; atque hæc quidem si quando in usum veniunt, remediis rebellem frigiditatem relinquunt: quare non nisi in summis morbis ad ea confugiendum esse monet Galenus, ob deleteriam quandam facultatem.

Alia rursus sunt, quæ citra ullum periculum assumi possunt; qualia cori sunt, quæ temperamento sunt moderatè frigido & humido, inter quæ commendatur lactuca, maximeque æstiuæ, cuius cauliculus iam lacte impletus est: is enim succus quum frigidus & humidus sit, nequaquam vitiosus est, teste Galeno libro De alimentorum facultatibus, ubi plura ad hunc locum pertinentia scribit. Quod autem ad papauer attinet, quamquam candidi vel satini papaveris semen totum in secunda mensa cum melle apud antiquos edi solitum tradiderit Plinius atque Galenus, panibus non secus ac sesamum vtiliter cum dulciarium inspergi, non libenter quotidianum eius usum aduiseo: nam propter nimiam quandam refrigerandi vim, non solum somniferum, sed & soporiferum quodammodo est: siquidem si liberalius edatur, soporem inducet, agrèque concoquetur. Nolim tamen inficias ire, citra omne discrimen calyculorum decoctum, æquè ac seminis albi



albi (quod quum reliquis tuius sit, Apuleius  
vfuale vocat) iis qui vigiliis vexantur ex-  
hiberi: quanquam id prunis aut lactucis in  
cauliculis exurgentibus, aut moris, aut ce-  
rasis, aut corianni decocto, aut aliis, quæ  
moderate frigida & humida sint, experiri  
malim: si tamen eius usus necessarius sit,  
preferendum nigro album, quod videlicet  
illud frigidius sit. Atque hæc hætenus. Ve-  
rum cur porrum, nil minus quam somnum  
promoveans, adiecerit, nondum satis assequor:  
nam Dioscorides terrifica insomnia facere

auctor est. quo fit ut hic quoque mendam  
subesse arbitrer, substituendumque pro porro,  
prunum facultatis frigida & humida, ut  
morum: aut aliqui inter ea quæ sensus ex-  
citant transponendum, statimque subiungen-  
dum cepis, quibus facultate omnino respon-  
det. Porro sensus excitant quæ somnificis  
contraria sunt, hoc est calida & sicca, atque  
ea quæ acrimonia quadam prædita sunt: de  
quibus quoniam, quod ad loci explanatio-  
nem attinet, in præcedentibus satis dictum,  
verbum non amplius addam.

## CAPUT XXXIII.

*Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant; aut refrigerent,  
aut calefaciant; aut durent, aut emolliant.*

**E**VOCARE verò materiam multa admodum possunt. Sed  
ea quæ ex peregrinis medicamentis maximè constant,  
aliisq. magis quàm quibus ratione victus succurritur, opitulatur,  
in præsentia differam. Ponam ea verò, quæ prompta, & his  
morbis (de quibus protinus dicturus sum) apta corpus ero-  
dunt, & sic ex eo, quod mali est, extrahunt. Habent autem  
hanc facultatem semina erucæ, nasturtij, radiculae, præcipuè  
tamen omnium sinapi. Salis quoque & \* fici eadem vis est.  
Leniter verò simul & reprimunt & molliunt lana succida  
\* ex aceto vel vino, cui oleum adiectum est, contrita palmu-  
læ, furfures in salsa aqua, vel aceto decocti. At simul repri-  
munt, & refrigerant, herba muralis, parthenium vel perdi-  
cium appellant, serpyllum, pulegium, ocymum, herba san-  
guinalis, quam Græci πολύγονον vocant, portulaca, papaue-  
ris folia, capreoli que vitium, coriandri folia, hyoscyamum,  
muscus, \* fiser, apium solanum, quam σπύγγιον Græci vocant,  
brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semen, contrita  
pira vel mala, præcipueque cydonia, lenticula, aqua frigida,  
maximeque pluuiialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo  
magis, madens vel panis, vel farina, vel spongia, vel cinis, vel  
lana succida, vel etiam linteolum, creta cimolia, gypsum,  
melinum,

\* visci

\* vel aceto  
vel vino,  
quo oleum  
adi.

Herba san-  
guinalis.

\* cicer,



melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum, verbenarum confusa cum teneris caulibus folia, cuius generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cydonia, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fæce vini, vel ex myrti folijs, amaræ nuges. Calefacit verò ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farris, siue hordei, siue erui, vel lolij, vel milij, vel panici, vel lenticulæ vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quàm ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisque si vetus est, sal, nitrum, git, piper, quinquefolium, fereque quæ vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quæ calefaciunt & digerunt, & emolliunt. Præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel fœni græci semine. His autem omnibus & simplicibus & permixtis variè medici vtuntur, vt magis quid quisque persuaferit sibi appareat, quàm quid euidenter compererit.

## ENARRATIO.

**S**ICUTI medicina ratione & experientia, tanquam duabus manibus ad omnes actiones obeundas vtitur, ita ea bifariam in membra quadam diuiditur, in theoricen videlicet, & practicen: theorice quidem ea tractat quæ circa signa, causas, symptomataque versantur: atque huius partes ferè sunt *quædam*, in qua de hominis natura differitur; *ætiologia*, quæ ea quæ præter naturam sunt inquirunt; *prognosis*, præteritorum cognitionem, præsentium inspectionem, & futurorum prædictiones continet: atque de his abinde dictum est in primis capitulis. Practica verò hæc quæ per rationem inuenta sunt, ac per usum ac experientiam comprobata sunt, nititur: atque hæc rursus trifariam distinguitur, in pharmaceuticam, diæticam, & chirurgicam seu manialem:

Pharmaceuticæ ferè priuatione eorum quæ ledunt atque abundant obitur: diæticæ autem tum morbo collapsas vires restituit, atque si quid desit restituit, tum supernacua non raro demit. Chirurgia autem variis modis obitur: nam demit dum scalpello confusa vena sanguis emittitur, dum quod aut corruptum est, aut quod abundat resecamus, adurimus, aut alio quouis modo tollimus. Adhæc stantia nimis reprimunt, ac dum res exigit obstituta foras euocat; præterea indurata mollit, atque mollia durat: atque de hac potissimum medicina parte, licet breuiter & confuse admodum, auctor noster potissimum hoc secundi libri capite tractare decreuit: nam hæcenus, quum nimirum cuiusque rei proprietates expendere docuit, de istantibus simplicibus quæ quotidianis nostris

usibus



visus sese offerunt, & quæ vesica sunt, ser-  
monem fecit, ut ex iis distam, prout morbi  
ratio flagitare videbitur, & votantibus exacte  
prescribere possimus. Nunc verò quamquam  
simplicium quorundam quæ intro tanquam  
cibos & medicamenta assumimus, mentio-  
nem quoque faciat, de iis tamen tantum in-  
telligendum, quæ foris applicita, eiusmodi  
energiam exhibent: bona etenim eorum pars  
quæ hic recensentur, ob insignem qualitatis  
alicuius intemperiem à natura abhorret (pe-  
regrina ob id Celsus vocat) atque deleteriam  
quandam facultatem obtinet: quæ si intus  
sumantur, aut intersciant, aut sensibilem  
aliquam noxam lesionemve inferent, forin-  
secus autem imposita, aut infrigidabunt mul-  
tum ac supescient, aut contra adurent ex-  
ulcerabuntque; atque alia reprimunt, rur-  
susque alia, dum corpus erodunt, ex eo quod  
mali est attrahunt. Elicuntur autem variis  
modis quod nocet corpore: nam sunt quæ  
id præsent cutem tantum rarefaciendo, vaso-  
rumque oscula aperiendo; atque hæc mode-  
ratè & citra molestiam, calefaciunt. Alia  
item exulcerando in superficie; atque alia  
rursum dum vehementer calefaciunt, te-  
nuum quoque sunt partium, ut acria omnia;  
unde & vrunt, corpus erodunt, & crustam  
inducunt, & foras euocant.

#### & fici eadem vis est.

SYCCO, quam scilicet maior vis inest,  
ac rursus fici arboris liquor, foliorumque  
eius succus potèius digerit, ac discit, quam  
quam non negaverim, collas fici ritas illi-  
tasque, durities, discit, parotidas ac su-  
rumculos emollire, panosque maturare, ma-  
ximè iride, nigro ac calce additis. Succus ta-  
men ut efficacior est, ita non solum hæc præ-  
stat, sed & exulcerat corpora, & venarum  
ora aperit, myrmecidæque efficit, ut auctor  
est Galenus. Plinius arboris succo etiam pro  
psoluto utitur.

#### Leniter verò simul.

Quæ reprimunt, ex diametro cum iis  
pugnant quæ foras euocant, suntque magna  
ex parte astringenti vi prædita.

#### lana succida.

TONSVRÆ tempus (inquit Varro) in-  
ter æquinoctium vernum & solstitium, quum  
sudare inceperint omnes, est: à quo sudore  
recens lana tota, succida est appellata. Porro  
hæc propter sordes & sudores (ita enim æsy-  
pum vocant) per se applicita, emollit: tota  
autem aut aceto intincta, minus mollior, ve-  
hementiusque reprimat.

#### furfures in salsa aqua.

MALIM hic pro disuncta copulatim  
scribere, in hunc modum: furfures in  
aqua salsa & aceto decocti. ita enim  
oxycraton (postquam Latini dicunt) repercuti-  
forium, si quod aliud, intellexerit.

#### At simul, &c.

LOCVS hic usque adeo senticosus  
ac spinosus est, ut vix multis exanclatis la-  
toribus se erueret possis; atque hinc fit, ut  
dum substantia ac facultate plurimum di-  
stare quæ sub eodem genere statuit, videmus,  
caput hoc hinc inde tanquam ex varicolori-  
bus centonibus confartum esse, sufficere.  
Nam quis pulegium folano; quis papaveris  
folia, nisi amens, lauro? quis portulacam  
atque hyoscyamum fœniculi semini, ocymo-  
gete comparaverit? quis præterea vinum  
aceto recte contulerit? Scinenda igitur  
hic dixerò à frigidis ea quæ facultate calida  
sunt, qualia sunt serpillum, ocymum, siser,  
apium, fœniculi semen, laurus: atque nisi  
quid obster, locum in ammittamero. Salis  
quoque & fici eadem vis est. Item  
serpillum, pulegium, apium, bras-  
sicæ folia, ocymum, fœniculi semen,  
laurus. Leniter verò simul & reprimunt  
& molliunt, ligustrum, siser,  
lana succida ex aceto vel vino, cui  
oleum adiectum est, contrita pal-  
mula, furfures in salsa aqua & aceto  
decocti, muscus, creta cimolia, he-  
dera, lenticula. At simul reprimunt  
& refrigerant herba muratis, (papa-  
ver vel perdicium appellant) herba  
lingualis, quam Græci παλαστειον  
vocat, portulaca, papaveris folia,  
capreo-



capreoliq̃ue vitium, coriandri folia, hyoscyamon, solanum quam *εὐχνοί* Graci vocant, intubus, plantago, contrita pira vel mala, præcipueque cydonia, aqua frigida, maximeq̃ pluuialis, vinū, acetum, &c. atque hæc cū ita inuerterimus, dum singulorum temperiem ac facultates expendimus, paucis explicabimus.

### serpyllum, pulegium.

**PVLEGIUM** quum acre & subamarum sit, valde ium excalfacit, ium extenuat, ideoque in tertio ordine calidum, & siccum esse statuit. Galenus illi rubificare, & si quis diutius tollerit, exulcerare: Dioscorides extenuare & concoquere auctor est. huic per omnia simile est serpyllum: nam acre admodum gustu est, atque ita calidum, ut menses & vrinam moueat. Dicit tamen forte quis, Celsi dum serpyllum inter reprimentia numerat, erroris occasione dedisse, quod Dioscorides, Plinius, & Aëtius, male factum aceto ac decoctum, admixto rosaceo, phrenitium & lethargum patientibus summo opere congruere tradiderint; quasi verò id non efficiat distinctione magis, quam reprimendo.

### ocymum.

**OCYVM** & sisarum utraque secundis ordinis excalfaciunt sunt: in hoc tamen differunt, quod ocymum excrementitia cuiusdam humiditatis particeps sit; sisarum autem propter modicam siccitatem, astrictiorem quandam sortitum sit: unde & inter ea que leniter reprimunt & molliunt; ocymum verò quum fortis illi digerat & concoquat, foras euocantibus adieciunt.

### coriandri folia.

**POTVISSEM** & hic quoque, idq̃ Galeni auctoritate, aliò transferre coriandri folia, nisi compertum nobis fuisset, antè ex Dioscoride, Celsi temperie frigidi coriandri definitum: quare quoniam ad loci huius planiorem intelligentiam plurimum fecerit Galenus, operæ precium erit ex septimo Simplicium libro, illius verba in medium

proferre: Coriannum, inquit, siue corion, aut vicinūq̃ vocare lubet, verustiores Graci coriannum nominabant: at recentiores omnes medici corion appellant; senti etiam Dioscorides, frigidam esse herbam ipsam distictans; sed perperam: siquidem ex contrariis facultatibus constat, & composita est, plurimum habens essentia amara, que tenuium est partium, & terrena, nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, que tepentis est facultatis: his adiunctum est astrictiōis quoque pauxillum; ex quibus omnibus variè quidem agit ea que scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Caterum ego cuiusque particulatim actionis causam enarrabo: Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminate de morbis pronunciant; sicut sanè in hac tempestate non paucos innenas medicos, vel insignes præter alios in hac re hallucinantes. Interdum enim atra, limida, frigidaque reddita parte qua erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, cū antea, sed ea qua infixum parti præter naturam humorem eliciant; quidam tamen refrigerare persueverunt; alij ad digerentia quidem transiunt: ceterum ea erysipelas sanare dicunt; quanquam sciebant incipientibus etiamum atque gliscentibus crescentibusue erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus, ac flaccescentibus: sed ita res non habet; neque enim erysipelas vocari debet posteaquam inflammatio eius & feruor ac biliosum illud abierint, neque qua facultate sunt frigida, neque que illa sanant, remedio esse putandum, sed veluti si vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiā aut limidus aut niger exiierit, eum esse frigidum affectum existimabis, & qua digerant excalfaciantq̃, poscere. Ad eundem opinor modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine; aut si displicet nominis mutatio, saltem (sicut quidam alij scribunt) principij, alia declinationis remedia; concedendumque sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas



pelas vocetur; sed eam etiam calidam dicere, ubi iam refrigerata est, id vero neutquam concedendum. Itaque ne quod ei tunc auxilio est refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides coriandrum, qui cum pane & polenta erysipelas curet illitum: nam quod ad unguem est erysipelas, quod utique inflammatum est, & flauum, & biliosa fluxione infestatum, haud quaquam sanare queat coriandrum; sed illud quod refrigeratum est. Hucusque Galenus, copiose quidem multisque verbis coriandri facultates expendens, perperam à Dioscoride frigidum dictum convincit, idque paulo post multo aperius, dum suo ipsius gladio Dioscoridem ingulat: Neque enim rheadas seu strumas cum eregmo vel lomento discueret, si frigidum est: nam Dioscorides ipse sexcenta remedia rheadas sanantia scripsit, quae omnia tum temperie calida, tum actionibus digerentia confectus est.

### muscus.

MYSCVS vim habet astringentem invalidam, ut Galenus sexto Simplicium; quia nimirum nec multum frigidus est, sed proxime ferme mediis, unde & digerendi & emolliendi facultatis est particeps, maximeque is qui in cedrinis lignis reperitur. Hinc, quod ad facultatem attinet, non ab- similis est creta cimolia; refrigerat enim ac digerit paululum. Hedera similiter ex contrariis composita est facultatibus: habet enim astringentis substantia quiddam, quae terrena & frigida est; habet etiam nonnihil acris, quae calida est, neque deest tertia, aqueam namque substantiam obtinet, praesertim si viridis sit; siquidem dum aversit, haec prima exhalet necesse est, manetque quae terrea est & astringens, & ea quae calida & acris. Succus autem & lachryma eius, ita caleat, ut inter psilochra numerentur. De lenticula autem satis dictum est: Polygonum, parthenium, vitinum capreoli, papaveris folia, hyoscyamum, solanum, plantago, acetum, aqua frigida, non ignaviter frigefaciunt & reprimunt.

### apium.

APIVM & feniculum calida usque adeo sunt, ut menses & urinam pronocent, flatibus quoque disentiendis apifissima sunt, mammarumque durities emolliunt.

### brassicae folia.

BRASSICA sine manducata, sine foris imposita desiccatur: unde reprimere quoque dixit, sed moderato suo calore discutit potius; nam cum fenugraci farina podagricis & arthriticis medetur, atque eorum dolores mitigat, cum sale carbunculos rumpit. Exsternorum autem canthium brassica cinis desiccans admodum est; adeo ut adurere quodammodo videatur: quo fit ut si veterem adipem ei admiscueris, discussorium valde, ad quoscunque etiam innumeratos dolores laterum, medicamen effeceris.

### vinum.

NON quodvis vinum, sed acerbum tantum, & ansterum reprimat: nam calidum alioqui, & quod tenuius est partium, resolvet potius atque digeret.

### ligustrum.

CYPRVS arbor, & ligustrum similes admodum & affines sunt; adeo ut quidam persuasum habeant, pro eodem sumi cyprum & ligustrum: quos doctissimus vir Franciscus Massarius Veneris convincit. verum, ut ut est, hoc est, sine eadem sine diversa sit arbor, in hoc certe conveniunt, quod eiusdem sint facultatis, ac utriusque tum folia, tum germina qualitatibus mixta sunt, & facultatis: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, habentque etiam astringentium quiddam ex terrea substantia frigida: quo fit ut inter lauter reprimentia posuerim.

### laurus.

LAVRI semen & folia quod calida sint, clarius est quam ut dici debeat: & quod emolliant, testis est Dioscorides; nam laurorum decoctum in muliebres infusus ad- ditum, vulvae & vesicae vitis conuulsi- testatur; & rursum medicamentis iis quae

HERMORUM



nervorum lassitudines reprimunt (ἀναγκάζουσι) ac quæ calefaciendi ac discutiendi vi prædita sunt, commodè adhiberi: præstant autem hæc omnia efficacius semina quam folia.

### medulla, adeps.

NON tam calefaciunt quam molliunt, & leniunt; unde indurata corpora emolliunt, siue ligamenta, siue muscoli, siue tendines, siue viscera hoc modo fuerint affecta. Differunt tamen singula inter se prout magis, aut minus eas vires habent. Nam Aëtius cervinam medullam optimam esse testatur; deinde vitulinam; taurorum autem & hircorum acriorem magisque siccatoriam esse; & propterea durities in scirrhum duratas dissolvere non posse.

### fereque, quæ vehementer & reprimunt & refrigerant.

MIRUM prorsus est omnibus obuium usque adeo mendum hætenus à nullo animaduersum; nam quis, cui vel mica rationis superest, verba quidem sibi constare, sensum vero propter malè distinctas periodos inuersum non videat? Neque enim quæ vehement

menter reprimunt & refrigerant, calefacere dicere quisquam audeat; & rursum durare quæ calefaciunt & digerunt & molliunt. Quare immutatis paulum distinctionibus, & expuncta copulatiua & ante rō digerunt, sic legendum cenfeo: Fereq. quæ vehementer reprimunt, & refrigerant, durant; quæ calefaciunt, digerunt & molliunt. Reliqua quæ sequuntur, clariora sunt, quam ut longiore egeant enarratione; siquidem non erat nobis in animo, huic capiti tam diu inherere, nisi rationes aliquas addere decuisset, cur mutilum aliqui, aut inuersum caput, totum fere restituerimus, aut inuerterimus, quod sanè quæ potuimus fide & diligentia fecimus, non canillandi studio aut libidine aliqua incitati; sed quò antiquissimus auctor suo tandè nitore restitueretur, atq. à calumniis immunis redderetur; sperantes interim non defuturos, qui dum nostras hæc enarrationes legerint, simili planè studio ducti, hæc & reliqua quæ extant Celsi, ita cum nostris aliorumq. censuris expendant, ut integer tandem & ei qui iam circumfertur dissimilis planè in lucem prædeat.

1 2

AVRE.



# A VRELII CORNELII CELSI

DE

RE MEDICA

LIBER TERTIVS,

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,**Enarrationibus illustratus.*

CAPVT I.

*De morborum generibus.*

\* Præuis

**P**

ROVISIS omnibus, quæ pertinent ad vniuersa genera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Græci diuiserunt, aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Idcirco quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alij inter acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam enim breues \* vtique sunt, qui citò vel tollunt hominem, vel ipsi citò finiuntur. Quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est. Tertiumque genus eorum est, qui modò acuti, modò longi sunt. Idcirco non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in alijs quoque fit. Atque etiam præter hos, quartum est, quod neque acutum dici potest, quia non perimit: neque vtique longum, quia si occurritur, facillè sanatur. Ego cum de singulis dicam, cuius quisque generis sit, indicabo. Diuidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, & eos qui oriuntur in partibus. Incipiam à prioribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo quidem morbo

\* acutique



morbo minus fortuna sibi vindicare, quam ars potest, ut po-  
 te cum repugnante natura, nihil medicina proficiat. Ma-  
 gis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acu-  
 tis morbis, quam in longis. Hic enim breue spatium est, in-  
 tra quod si quod auxilium non profuit ager, extinguitur.  
 Ibi & deliberationi & mutationi remediorum tempus patet,  
 adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens ager  
 sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus  
 infedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acu-  
 tus quidem, quod vetustior est, longus autem quod recentior,  
 eò facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quod  
 non omnibus agris eadem auxilia conueniunt. Ex quo in-  
 cidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola \*vindicau-  
 erint, prout cuique cesserant. Oportet itaque ubi aliquid  
 non respondit, non tanti putare auctorem, quanti agrum, &  
 experiri aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis ci-  
 to mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut  
 facit, sic etiam soluit, non statim condemnatur, si quid non  
 statim profuit. Minus vero remoueat, si quid paulum sal-  
 tem iuuat, quia profectus tempore expletur.

## BALDWINI RONSSEI

## ENARRATIO.

**Q**UAE corpus nostrum alterare solent,  
 genere triplicia sunt: causa, morbus,  
 & quod ipsi sequitur symptoma seu ac-  
 cidens. Morbus quidem in acutos seu cele-  
 res, & tardos seu longos diuiditur; atque  
 hos quidem Graeci *πρῶτος* & *ὑστέρος* agros  
 illos agros vocant. Diuturnus morbus est  
 omnis qui quadragessimum diem transcen-  
 dit. Acutus vero trifarium distinguitur;  
 aut enim talis simpliciter aut exquisitè existit  
 (Hippocrate sectione secunda Aphor. XXIII.  
 auctore) qui ad decimumquartum diem ex-  
 tenditur: est & alius non exquisitè talis,  
 qui ad vicesimum usque progreditur: est  
 etiam acutus ex mutatione vel decidentia,

qui in quadraginta diebus indicatur. Recen-  
 tiores in peracutos, quorum quatuor est in-  
 dex; in peracutos simpliciter, quorum septimus;  
 & in peracutos ex degeneratione seu deci-  
 dentia, quos Hippocrates simpliciter acutos  
 vocat, quorum decimus quatuor est index;  
 & in acutos simpliciter, quorum vicesimus  
 est indicatorius; & acutos ex decidentia, di-  
 stinguere solent, qui, ut iam diximus, qua-  
 dragesimo die indicantur.

## Quidam enim breues.

ACUTVS morbus dicitur, quod motus  
 eius velox sit, & subito illi pericula adue-  
 niant; neque enim recte acutus dici potest



(ut commenſo tertio Prædictionum Gale-  
nus) niſi adiuncta ſit magnitudo quædam  
ac febris continua.

### Tertiumque genus.

Hoc videlicet quod ex præteritis  
ſen decidentia fieri dixi, vixit quod per  
imperfectam indicationem ab una ſpecie in  
aliam mutatur; ut ſi plenitudo in ſuppu-  
rationem, angina in empyema tranſeat.

### Atque etiam præter hos quartum eſt.

Hoc nimirum, quod neque ſenſitioni  
accidentium, neque continuam febrem con-  
iunctam habet: atque huiusmodi poſſimum  
eſt, quod quadrageſimo indicari diximus; id  
enim neque exquiſitè acutum, neque lon-  
gum dicere poſſis.

### In nullo quidem morbo.

PVLCHERRIME hoc demonſtrat  
Cælius Methodicus in præſatione ſæ-  
ræ: Celeres, inquit, vel acutæ paſſiones,  
etiam ſpontè ſoluantur; & nunc fortuna,  
nunc natura fauente: quo ſit ut ignari ho-  
mines elati, ſæpe medicos fugiant, quum hos  
prouentus incantationibus nonis aut liga-  
mentis adſcribant, aut fortunæ; quum quo-  
ties repentino aliquo nuncio lati aut terribi  
ægotantes, mutatione quadam corporis mor-  
bos excludunt, vel ea per intemperantiam  
gerunt, qua ratione occulta ſibi proſutura  
neſcientes, duce deſperatione committunt;  
ſicuti de quodam elephantico qui per vi-  
ctus autem intemperantiam ſanitatem recuperavit, me-  
moriam prodidit Antonius Beniuennius.

### repugnante naturâ.

QVOD omnium que in humano cor-  
pore geruntur opifex ſit natura, auctor eſt  
Hippocrates, tum aliâs, in ſexto Epidemion,  
ubi naturam morborum curatricem defini-  
uit; quum non ſolum in ſanis, ſed & in  
ægris ſua ſponte, non ex intellectu moriones  
innenerit; ſponte enim in ægris non raro è  
naribus ſanguinis profluuium, hæmorrhoidi-  
bus, aut aliunde, ſudoresque & alii proflu-  
uium molitur ad expellendas morborum reli-

quias; adeò rectè natura morum imitan-  
dum in Aphoriſmis idem præcipit: nam quò  
natura fert, inquit, per loca maximè conue-  
nientia, eò ducere conuenit.

### Magis tamen.

HIPPOCRATES in Aphoriſmis, Ac-  
torum morborum non omnino certa ſunt  
prænuntiationes ſalutis aut mortis: per paro-  
xiſmorum enim vehementiam, continuam-  
que inſultum ac breuitatem temporis, medico  
vix ſpatium temporis relinquunt ut morum  
natura adiunget.

### Longus tamen morbus.

MORBI longitudine vires non ſolum  
conuelluntur atque proſternuntur; ſed &  
non raro totius corporis habitus corrumpi-  
tur: unde ſit ut vires debiliores, quam ut  
increſcentem adhuc longumque morbum ferre  
poſſint, non minus periculum ægro porten-  
dant, quam ſi acutiſſimo prehenderetur  
morbo; adeò malum eſt morbum aliquem  
radices fixiſſe, atque ſolidas corporis par-  
ticulas occupari, ſicuti in maraſmode indices  
videmus.

### Alterum illud.

QVEMADMODVM omnes omnibus  
corporibus, ætatibus atque virisque ſexui com-  
munes ſunt morbi; ita varia eaque diuerſa,  
pro ætate, ſexu ac temperiei diſcrimine me-  
dicamenta expoſcunt: aliud ſiquidem ſenex,  
aliud iuuenis, aliud vir, aliud mulier, aliud  
ſanguineus, ac rursus, ab hoc diuerſum reme-  
dium phlegmaticus poſtulat: ac proinde quot  
ſunt temperaturarum diſſerentia, tot oportet  
eſſe morborum diuerſa auxilia.

### Oportet itaque.

OMNIA, inquit Hippocrates, ſecun-  
dum rationem facienti; ſi non ſecundum ra-  
tionem ſuccedant, non tranſeundum ad alia  
ſtante eo quod prius fuit: ſit enim nonnun-  
quam, ut in commenſo eiſdem aphoriſmi  
Galenus ait, ut morbi aliqui adeò pertina-  
ces atque rebelles ſint, ut non niſi tempore  
medicamentis cedant; ſicuti gutta cadens la-  
pidem canat ſæpe cadendo: atque in iis qui-  
dem non



dem non statim, si non ex sententia res ce-  
 dat, medicamentum immutandum est, sed  
 perseverandum, dum sensibile aliquod lena-  
 men consequatur: si tamen experientia du-  
 ce, quæ præter rationem sunt adhibeamur,  
 neque emolumentum quicquam consequamur,  
 satius est rationem ducem sequi, neque tanti  
 facere auctorem quam rationem.

Sic tamen ut in acutis.

ACUTI morbi quum veloces admodum

## CAPUT II.

Quomodo morbi cognoscantur, et an incre-  
 scant, an minuantur. Et qua ratione ab initio,  
 qui languere incipit, curari debeat.

PROTINVS autem inter initia scire facile est quis acutus  
 morbus, quis longus sit: non in his solis in quibus semper  
 ita se habet, sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine  
 intermissionibus accessiones & dolores graues vrgent, acu-  
 tus morbus est. Vbi leni dolores, lentæve febres sunt, & spa-  
 tia inter accessiones porriguntur, acceduntque ea signa, quæ  
 in priore volumine exposita sunt, longum hunc futurum esse  
 manifestum est. Videndum etiam est, morbus an incre-  
 scat, an consistat, an minuat, quia quædam remedia incre-  
 scentibus morbis plura inclinantis conueniunt. Ea quæ  
 \*decre-  
 scentibus apta sunt, ubi acutus incre-  
 scens vrget, in re-  
 missionibus potius experienda sunt. Incre-  
 scit autem mor-  
 bus, dum grauior dolores accessionesque veniunt, hæc  
 & ante quam proximæ reuertuntur, & postea desinunt. At-  
 que in longis quoque morbis etiam tales notas non habenti-  
 bus, scire licet incre-  
 scere, si somnus incertus est, si deterior  
 concoctio, si \*fœdiores deiectiones, si tardior sensus, si pi-  
 grior mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si idem magis  
 pallet. Ea verò \*quàm contraria his sunt, decedentis eius no-  
 tæ sunt. Præter hæc in acutis morbis seriùs æger alendus est,  
 nec nisi iam inclinatis, ut primò dempta materia impetum  
 frangat.

\* accessio-  
 nū dolore  
 graui vr-  
 gentur,

\* crescen-  
 tibus

\* fœtidio-  
 res  
 \* quæ



\* aduen-  
turi  
\* At  
\* moliri,  
per quam

frangat. In longis maturius, ut sustinere spatium \* affecturi  
mali possit. \* Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte  
est, magis tamen ad rem pertinet vinum totius corporis \* molli-  
ri, quam propriæ partes agra sanentur. Multum etiam in-  
terest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam, quia cu-  
ratio minus his prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si quis  
temere habitus, adhuc integris viribus vivit, ad mora curatio-  
ne momento restituitur. Sed cum ab his coeperim, quæ no-  
tas quasdam futuræ aduersæ valetudinis exhibent, curatio-  
num quoque principium ab animadversione eiusdem tem-  
poris faciam. Igitur si quid ex his quæ proposita sunt, inci-  
dit, omnium optima sunt, quies, & abstinencia. Si quid bi-  
bendum, aqua. Idque interdum vno die fieri satis est. In-  
terdum, si terrentia manent, biduo: proximeque abstinencia  
sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua, postera die  
etiam vinum, deinde inuicem alternis diebus, modò aqua,  
modò vinum, donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc  
enim sæpe instans gravis morbus discutitur. Plurimique fal-  
luntur, dum se primo die protinus sublaturòs languorem, aut  
exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut vomitu,  
aut sudationibus, aut vino sperant. Non quò non inter-  
dum id incidat, aut non \* decipiat, sed quò sæpius fallat, sola-  
que abstinencia sine vllò periculo medeatur. Cum præfer-  
tim etiam pro modo terroris moderari liceat, & si leuiora in-  
dicia fuerint, satis sit à vino tantum abstinere: quod subtra-  
ctum, plus quam si cibo aliquid dematur, adiuvat: si paulò  
grauiora, facile sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo  
carnem subtrahere. Interdum panis quoque minus quam  
pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse conten-  
tum, & olere potissimum. Satisque sit tum ex toto à cibo,  
à vino, ab omni motu corporis abstinere, eum vehemen-  
tes notæ terruerunt. Neque dubium est quin vix quisquam,  
qui non dissimulauit, sed per hæc maturè morbo occurrit,  
ægroret.

\* deinceps  
fiat,

ENAR-



## ENARRATIO.

**A**CVTORVM morborum natura est (ut libro De ratione victus in morbis acutis auctor est Hippocrates) ut febres continuas coniunctas habeant: quare quum & propter casum vehementiam, & morbi magnitudinem ad vigorem celerrime properent, cuius facile erit longos ab acutis morbis discernere.

## Videndum etiam est.

**G**ALENVS De prestantissima medicorum secta ostendit, quomodo morborum tempora indicantur, certo cause motu (sunt autem ea quatuor numero, principium, augmentum, status & declinatio:) ac proinde si motus, qui prius in nobis non erat, moveri incipit, & constituitur iam molestia, huiusmodi motum principium vocat; si autem magis procedat moris is, incrementum; si statim incrementum acceperit, vigorem nominat; atque si motus imminuat, declinationem. Horum autem temporum maxima habenda est ratio, quod sine horum cognitione nemo egrum recte aut cibaverit aut enacuaverit. Nam in principis dum adhuc constant vires, si quid movendum videtur, movere expedit, iuxta Hippocratis sententiam: in vigore contra fractis consumptisque insultum vehementia viribus, quiescendum est.

## Atque in longis quoque morbis.

**L**ONGI morbi non secus ac acuti tempora habent; quae tamen non tam facile deprehendi possunt, quum neque in his gravitas doloris aut paroxysmorum percipi possit, & sola concoctione diiudicari queant: nam quantisper crudus morbus est, adhuc augetur; quod ab excrementis peritus medicus facile praedixerit: quanquam & reliqua quae hic Celsus adiungit, ad temporum cognitionem non parum momenti attulerint. si quis autem generalium morbi temporum pleniorum cognitionem desideret, Galeni De crisi-

bus, & qui hunc sequitur De generalibus morborum temporibus consular.

## Præter hæc in acutis morbis.

**A**CVTVS morbus, inquit Hippocrates, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu vivendum est; ubi vero non, sed pleniorum victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantum morbis extremis fuerit mollior. considerandum tamen est, an ager ad vigorem usque morbi perdurare possit cum victu quem praescripsisti, & numquid ille prius deficiat, & cum illo victu durare queat; aut morbus antea deficiat aut retardetur. Nam hic quoque, ut in aliis omnibus, dandum aliquid consuetudini, tempori & aetati est. In genere tamen quo peracutior fuerit morbus, & celerrime ad vigorem pervenerit, eo tenuiorem victum flagitat. Sed nec in vigore ipso quicquam dandum est; praestat enim naturam permittere, ut vacet circa morbi concoctionem, quam eundem anocare ad conficiendos cibos.

## In longis maturius.

**I**N longis morbis non sunt inedia aut tenui aliqui victu laceffende egri vires; quando inter reliqua harum praecipue sit habenda ratio: tantum igitur cibi hic indulgendum est, quantum & natura circa molestiam concoquat, & virium robur efflagitet: nam aliqui inedia praestare vires morbi longitudini omnino non sufficerent.

## At si quando is non in toto.

**V**ITPVTA si phlegmon alicuius partis sit; exempli gratia, pleurae aut lateris: hic satius erit totum corpus molliori tenui victus ratione, quam acutus quoque sit morbus, quam propria partes egre, hoc est, difficulter sanentur; frustra enim sanguinis missionem, frustra localia adhibueris, nisi adsit debita vitæ ratio.

m

Igitur



Igitur si quid ex his  
quæ propofita.

QUIES quidem quia concoquit & huiusmodi: nam, ut in Epidemius Hippocrates, somnus & quies concoquunt, atque adeo materiam caloremque febrilem dissolunt. inedia; quia si quid abundat demit: quam tamen, ut dictum est, pro tempore variare conuenit.

liquid bibendum  
est, aqua.

VIDETUR hunc & præcedentem paragrapum, de acutis morbis intellexisse, qui ut originem sortiuntur calorem non naturalem, ita quietem quam maxime desiderant & abstinentiam, hoc est tenuem dietam, quæ humida simul sit & frigida. atque hac quoque ratione nunc frigidam commendat, quod nimium inflammationi aduersetur; cui postmodum, hoc est alternis, aut tertio quoque die vinum subiungendum dicit, quod putredinem discutiat; ut in primum Celsi annotauit mihi numquam nisi honoris titulo nominandus D. Hieremias Drinerus Brachelius.

solaque abstinentia.

PRÆCEDENTE libro, capite De abstinentia, ex decimo Methodi Galeni libro retulimus esse morbos, qui nihil minus quam inediam flagitent: atque hi quidem quales sint, secundo huius capituli §. dictum est; nam reliquis ut non aliena est abstinentia, ita plurimum emolumenti citra ullam noxam affert. Considerandum tamen est quantum à naturali temperie recefferit corpus, atque si multum ab eadem declinet, maiori uindictam abstinentia, ut ad pristinam constitutionem redeat, si parum uinum aut alterius diei abstinentia suffecerit.

humidoque cibo esse  
contentum.

CIBVS humidus à natura facillime alterari & distribui potest: quare eum secunda sectionis Aphorismo xi. iis qui celeri refectioe opus habent, accommodatissimum scribit Hippocrates: Facilius, inquit, est refici potum quam cibo; ac proinde qui in genere parum nutrimenti, radices olerum quæ edimus, atque adeo olera ipsa posuerimus, consequens est oluscula cuiuscunque generis sub tenui victu comprehendi.

### CAPVT III.

#### De Febrium generibus.

ATQUE hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur verò curatio febrium, quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his vna quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, sed id raro euenit. In prioribus & morbi sunt, & medicina. At quartanæ quidem simplices sunt. Incipiunt fere ab horrore, deinde calor erumpit, finitaque febre biduum integrum est, ita quarto die reuertitur. Tertianarum verò duo genera sunt. Alterum eodem modo quo quartana & incipiens & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod vnum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longè perniciosius, quod



quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autem & quadraginta horis, fere sex & triginta per accessionem occupat, interdum etiam vel minus vel plus, neque ex toto in remissione desistit, sed tantum leuius est. Id genus plerique medici hemitritæon appellant. Quotidianæ verò variæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, vbi extremæ partes membrorum inalgescunt: horrorem, vbi totum corpus intremat. Rursus aliæ sic desinunt, vt ex toto sequatur integritas: aliæ sic, vt aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquiæ remaneant, donec altera accessio accedat, ac sæpe aliæ vix quicquam, aut nihil remittant, sed ita vt continuent. Deinde aliæ feruorem ingentem habent, aliæ tolerabilem, aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares, atque inuicem altero die leniores, altero vehementiores, aliæ tempore eodem postridie reuertuntur, aliæ vel seriùs vel celerius, aliæ diem noctemque accessionem & decessionem implent, aliæ minus, aliæ plus, aliæ cum decedunt sudorem mouent, aliæ non mouent: atque aliàs per sudorem ad integritatem venit, aliàs corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modò singulæ singulis diebus fiunt, modò binæ, pluresve concurrunt. Ex quo sæpe euenit, vt quotidie plures accessiones, remissionesque sint. Sic tamen vt vnaquæque alicui priori respondeat. Interdum verò accessiones quoque confunduntur, sic vt notari neque tempora earum, neque spatia possint. Neque verum est, quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex vlcere. Facilius enim semper curatio foret, si hoc verum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. Neque de re, sed de verbo controuersiam mouent, qui cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedant, non easdem inordinatè redire, sed alias, aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiamsi verè diceretur. Tempora quoque remissionum modò libera, modò vix vlla sunt.

Frigus.

Horror.

\* libera



## ENARRATIO.

**F**EBRIS est calor præter naturam; aliàs quidem manu mordax, aliàs mitis; aliàs non mordax, sed increpescens, ut cap. I. De diff. feb. disputat Galenus. Atque hic quidem calor aliàs ex alio incipit; aliàs enim spiritus, aliàs humores, aliàs solidas particulas accendit, quæ Hippocrates continentia, contenta & impetum facientia vocare solet: ac prout hoc vel illud occupauerit, varia sortitur nomina: nam quæ spiritibus accensis oritur febris, diuina vocatur; quæ solidis particulis incensis, hectica; qui humores occupat febrilis calor, putridas gignit, varias quidem variisque paroxysmis pro humoris peccantis differentia discrepantes: sunt enim quæ quotidie, quotidianas; sunt quæ de tertio in tertium, tertianas nominamus; atque rursus sunt quæ de quarto in quartum accessiones suas faciant, quartanas vocat; quibus tardius morientur quæ de quinto in quintum, de sexto in sextum, & de septimo in septimum accessiones suas faciunt, quintana, sextana ac septimana ob id appellata. Præter has etiam sunt nonnullæ continentes dictæ, quod citra ullam remissionem corpus affligant.

## Interdum etiam longiore circuitu.

**A**CCESSIONVM periodi raro ultra quartanam extenduntur; quare Celsus raro id euenire recte asserit: nam & Galenus nullam se ultra quartanā quæ certam periodon seruaret, ait vidisse accessionem. Alexander tamen Aphrodisæus secundo libro Problematum una cum Hippocrate, quintanam, sextanam & nonanam ponit, ac intervalla hæc periodorum fieri asserit pro materie peccantis quantitate. Dicit autem: Quo minus materie subest, eo lentius redit accessio; quæ ratione quintana, sextana & nonana fieri potest, pro materie vitiate quantitate, ita enim à natura comparatum est; ut sanguis, qui nostra aleret corpora, esset largior, continuūque putrescens suc-

cenderet febrem: secundum verò locum pituita obtinet, nam & hæc corpus alere potest: bilis verò stanya tertium occupat, quoniam ob sui acrimoniam nihil alimenti præstat. At atra bilis sortis est postrema, nature infesta, quæ membra exedit & interimit. Hæc ille, quæ si ita sunt, inter omnes periculi maxime exors erit nonana, ut quæ à paucissima materia originem trahat, & quæ uberrimum, corpus & vires reficiendi tempus concedat. adde quod & eadem ratione inter reliquas à melancholia originem trahentes, breuissima erit; citius enim atque facilius discentiunt, atque euincuntur à natura pauca quam copiosa materia. hæc ordine sequetur septana; deinde quintana, atque ita quartana simplex dicta: in eo enim omnes conueniunt, quod duplex magna ex parte longior sit & periculosior; continua etiam non raro mortifera. Hippocrates tamen in Epidemiis septanam atque nonanam reliquis longiores esse asserit; at quintanam omnium periculosissimam: etenim & ante tabem, & iam tabidis superneniens, inquit, interimit: quod quavis etiam febres facient, quando calore febrili, si quid superest humidi illius innati, exigitur, unde mortem in tabidis accelerari necesse est. Si cui tamen Hippocratis auctoritatem hic tueri in animo sit, velim aliam quam Aphrodisæus statim intervalli periodorum in febribus causam in medium producat. Nem quæ ex Auicenna in medium asserit Michael Sannarola si recipiamus, eam quæ per longissima intervalla periodos facit, reliquis periculosiorem fateamur necesse est; quando ea ex phlegmate vitreo adusto melancholia mixto originem suam ducat, huic quamproxime accedere, quæ de septimo in septimum, ut quæ pituita salsa atra bili coniuncta ortu suum tribuat; atque hæc rursus contra mentem Hippocratis minus periculosam quæ de quinto in quintum accessiones facit, ut quæ ex melancholia phlegmati naturali commixta fiat.

At quar-



### At quartanæ quidem simpliciores.

SIMPLICIORES vocat quartanas non minus mixtas, sed mitiores, atque ita passim apud Hippocratem accipi auctor est Galenus: ac quod quartana omnium lenissima, ac minime mortifera sit, docet idem senex; siquidē 1. De morbis vulgaribus, At vero, inquit, omnium est quartana securissima, facillima, longissima; hæc enim non est ipsa quidem per se tantum talis, sed etiam à magnis aliis vindicat morbis: nam & comitiales morbos à quartana diu infestante discussos auctor est Galenus.

### Incipiunt ferè ab horrore.

SECUNDO De differentiis febrium Galenus, Quartanis, inquit, accidit rigor, qualis potissimum in forti frigore refrigeratis, non qualis interdum per astum aut lassitudinem, vel medicamentum calidum ac mordax ulceri adhibetur.

### Tertianarum verò duo genera sunt.

BILIS quum extra venas putruerit, atque id quod putruit, resolvitur, priusquam alia portio putruerit, oritur tertiana intermittens, sic dicta, quod ad infebrecitationem perveniat; atque hæc quartanæ modo, statim circuibus, quanquam brevioribus, hoc est de tertio in tertium accessiones suas facit. Contra si intra venas bilis putruerit, sintq; ea vena à corde remota, continua tertiana gignitur, quæ cum tertio quoque die exacerbetur, ad perfectam tamen infebrecitationem non pervenit.

### Alterum longè perniciosius.

QUÆ ex continua quotidiana & tertiana intermittente fit, semiteriana vocatur; quod videlicet utriusque febris symptomatum particeps sit: nam sicuti tertiana cum rigore, quotidiana cum frigore, ut docet Galenus, innadit; ita hemitritæ seu semiteriana cum horrore. (qui in medio utrius-

que, rigoris dico & frigoris, consistit) magna ex parte incipit. quare an rectè tertianis ascripserit, penes alios iudicium esto: ego cerè neque Hippocratem neque Galenum, neque quemvis alium id fecisse memini; quum nō simplicem aliquam sed compositam febrem semiterianam definiant. Ac proinde quod dicit triginta sex tantum horis occupare per accessionem, id quoque à natura semiteriana (quam Hippocrates in genere non intermittentium, atque earum potissimum quæ perniciosissima sunt constituit) alienissimum est. Nam quantumvis uno die leniores sunt, altero iterum gravius invadentes; omnino tamen non intermittunt, quod altero die duæ simul febres corpus occupent, altero unica, quotidiana videlicet continua, cuius ea natura est, ut nunquam intermittat, aut quietem aliquam febre vacantem admittat.

### Quotidianæ verò variae sunt.

VIDETUR hic Celsus tertianas quartanasque duplices cum quotidianis confudisse, aut alioqui quotidianas pro continuis dixisse; neque enim ea est varietas quotidianarum: siquidem omnes haud quaquam cum rigore primo statim die invadunt, sed temporis spatio, persfrictione magis quam rigore moleste sunt, sensumq; frigiditatis calor mitis subsequitur, propter pituitam. Quanquam si quis hic lyprias, epialasque febres comprehensas velit; per me integrum est; ut quotidianas cum frigore, epialam cum calore, lypriamque cum horrore invadere dicamus: nam sicuti in hac interiora calent, exterioraque frigent; ita in illa viscera, excepto corde, frigent, exterioraque calent; ac proinde in utrisque simul calor & frigus sentitur.

### Frigus voco, ubi extremæ.

MORBIDVM horrorem atque rigorem vocat Galenus, quum à nulla exteriori causa violenta corpus, sed ex sese, talem habet dispositionem: est autem rigor nativus caloris affectus: solent autem Græci tribus gradibus febrium frigora dimetiri; quorum extremum,



irenum, rigorem; medium, ut diximus, horrorem; ac mitissimum, frigus appellare solent. Celsus suo more hic ut in aliis rigorem cum horrore confundit.

### Rursus alia sic desinunt.

QUOTIDIANÆ non minus quam tertiana aut quartana in intermittentes & continuas diuiduntur: intermittentium quidem paroxysmus horarum octodecim, quies sex tantum, atque ea quidem talis est, ut non ex toto remissionem, aut infebri-tationem sentiat eger, quum semper fiat humorum euaporatio à materia crassa. Sunt tamen alia ex genere intermittentium; quæ quum tenuiorem pituitam, & quæ à natura facilius emitti possunt, mali originem faciant, breuiiores simul & minores paroxysmos fortiantur, quæ etiam corpori saltem quietem concedunt, ut ex toto subsequatur integritas. Continua verò quum continuas ingesse accessiones faciant, nihil prorsus remittunt, neque quietem aliquam corpori admittunt.

### Deinde alia feruorem.

VIDETUR Celsus febrium hanc differentiam ex Epidemion sexti Aphor. XXVIII. sumpsisse, ubi sic Hippocrates: Febrim hæc quidem manu mordaces, illa verò mites, quedam verò non mordaces, sed incrementes; alia acuta, verum ab ipsa manu denitæ; nonnullæ confestim exardentes, quedam semper debiles atque sicca, cui per omnia respondet Celsus, nisi quod τὸ ἀγνὸν ad febriles paroxysmos potius, quam calorem retulisse videatur: nam ideo τὸ ἀγνὸν πᾶσι πυρετοῖς ἀγνὸν vocat Hippocrates hoc loci, quod velocem ac citò deficientem calorem habent, haud aliter quam acutos morbos nominare solemus, qui citò ad statum pertingunt. Reliqua quoque quæ ad paroxysmos Cornelius noster retulit, Hippocrates ad febrilem calorem tanquam febris substantiam accommodauit.

### alia quotidie pares sunt.

DISPESCIT singulas febrium differentias; siquidem alia alias innadunt, sunt enim

quæ spiritibus, sunt quæ humoribus, sunt quæ solidis particulis accensis fiant: accidunt porro in se inimici differentes febriles accessiones pro materia differentia in qua calor febrilis accenditur: nam si spiritus occupant, diariam eriri certum est; si solidas corporis partes, hecticam aut miasmam; si humores, putridam consequi ratio dicitur, atque hæc quidem pro humoris peccantis differentia varias facit accessiones.

### alia quum discedunt, sudorem mouent.

FEBRES omnes nisi in longius producantur tempus, quadrisariam iudicantur: aut enim per vomitum, aut sanguinis fluxum è naribus, aut alinunde, aut per alui fluorem, vel sudores finiantur: nam alioqui in abscessus terminantur, ut memoria prodidit Hippocrates. Ceterum quæ sudorem mouent febres ferè mitiores sunt, neque tactu mordaces, ut ait Hippocrates, sed quas idem in Epidemion τὸν ἀδρὸν, hoc est ad manum humidam appellat.

### Accessiones etiam.

QVALES sunt ea quas semiterianas vocamus, aut planetes erraticæ febres; cuiusmodi in mulieribus suppressis mensibus contingere solent.

### Sed quod euidentes.

CAVSARVM duo sunt genera, τὰ ἐξ ἑαυτῆς quam & πρὸς τὰ ἑξ ἑαυτῆς, Latini extrinsecus aduenientem extrinsecumque vocant; idq; non quod perpetuò extra corpus sit, sed quod à rebus externis, hoc est à substantia corporis diuersa proueniat, aut quod ab anima quæ alia est à corpore oriatur. Celsus euidentem vocat, quod quibusvis etiam plebeis, non solum medicis, perspecta sit: hæc medicorum vulgus primitiuam vocat. Abdita autem seu interna, præcedentisve causæ Græcis τὰ ἐξ ἑαυτῆς dicta, sic appellantur quod in animantis consistunt corpore; hæc non solum in principio morbos gignunt, sed & eos iam factos argunt atque conseruant: nam, ut Galenus in libello aduersus Iulianum,



num, augmentum morborum à precedentiibus sit causis; qua enim omnino post generationem morborum inceptum, eas augere eosdem quoad simile quid effecerint necesse est. adeo rectè à Celso dictum est, additas causas idem facere posse quod euidentes.

## CAPVT IIII.

*De curationum diuersis generibus.*

ET febrium quidem ratio maximè talis est. Curationum verò diuersa genera sunt, prout auctores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, vt tutò, vt celeriter, vt iucundè curet. Id notum est, sed ferè periculosa esse \* nimia, mium & festinatio & voluptas solet. Qua verò moderatione vtendum sit, vt quantum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandum erit. Et ante omnia quaeritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quòd cruditatem maximè horrebant: deinde eam materiam, quæ lædere videbatur, ducendo sæpius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. \* Febre verò ipsa præcipuè se \* ad eius remedium vt professus est. Conuellendas enim vires ægri putauit, luce, vigilia, siti ingenti: sic, vt ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia iucundam eius disciplinam esse contendunt. \* His enim vltioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit: primis verò tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, & aluum duci non nisi rarò debere, concedo. Et id non ideo tamen agendum, vt ægri vires conuellantur, existimo: quoniam \* ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantam materiam superantem oportet, quæ naturaliter \* digeritur, vbi nihil noui accedit. Itaque \* abstinendus à cibo primis diebus est, in luce habendus æger, nisi infirmus interdiu est, quoniam corpus ista quoque digerit, isque cubare quàm maximo conclauì debet. Quod ad sitim verò somnumque pertinet, moderandum est, vt interdiu

\* In febre  
\* eo remedio vti

\* Et is enim

\* & ex

\* detrahatur,



\* q. d. ci-  
bum  
al. quat-  
tum diem  
cibo.

\* imbecil-  
lum  
\* fami pro-  
dat.

\* demere-  
tur:

diu vigilet: noctu, si potest, conquiescat: ac neque potet, ne-  
que nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi &  
siccum est, & ipsi foetet, quamuis id tempus aptum potioni  
non est. Commodeque Erasistratus dixit, saepe inferiore par-  
te humorem non requirente, os & fauces requirere, neque ad  
rem male haberi agrum pertinere. Ac primò quidem sic  
tenendus est. Optimum verò medicamentum est, opportu-  
nè cibus datus, qui quando primùm dari debeat, quæritur.  
Plerique ex antiquis tardè dabant, saepe quinto die, saepe se-  
xto, & id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto cæli ratio pati-  
tur. Asclepiades ubi agrum friduo per omnia fatigarat, \* quar-  
to die cibo destinabat. At Themison nuper, non quando  
cœpisset febris, sed quando desisset, aut certè leuata esset,  
considerabat, & ab illo tempore expectato die tertio, si non  
accefferat febris, statim: si accefferat, ubi ea vel desierat, vel, si  
assiduè inhærebat, si certè se inclinauerat, cibum dabat. Ni-  
hil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo  
die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio,  
potest non nisi quarto, aut quinto, potest post vnam accessio-  
nem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qua-  
lis morbus sit, quale corpus, quale cælum, quæ ætas, quod  
tempus anni. Minimeque in rebus multum inter se diffe-  
rentibus, quod intermittendum non est, perpetuum esse præ-  
ceptum temporis potest. In morbo qui plus virium aufert,  
celerius cibus dandus est, itemque eo cælo quo magis digerit.  
Ob quam causam in Aphrica, nullo die æger abstinere rectè  
videtur. Maturius etiam puero, quàm iuueni; ætate, quàm  
hyeme dari debet. Vnum illud & semper & ubique seruan-  
dum est, ut ægri vires subinde assidens medicus inspiciat, &  
quamdiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem  
verericœperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, ut  
ægrum neque superuacua materia oneret, neque \* imbecilli-  
tatem \* fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque in-  
uenio, qui quamuis parùm docuit, quando venter, quando  
corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen hæc esse vincen-  
da, & tum cibum dandum, cum corpori \* deberetur: satis  
ostendit,



ostendit, dum vires superessent, dari non oportere: ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab vno medico multos non posse curari, eumque (si artifex est) idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit. Sed qui quæstui seruiunt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in hac ipsa re. Facile est enim dies, vel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro vident. ille assideat necesse est, qui quod solum opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de ægris iudicaretur, *νεοίμια* nominabant. Hi erant diestertius, quintus, septimus, nonus, vndecimus, quartusdecimus, vnus & vigesimus, ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde vni & vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant, ut dierum imparium accessiones expectarent, deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus, darent, adeo ut Hippocrates, si alio die febris defisset, recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut vnum repudiavit, neque in villo die, quia par, imparve esset, his vel maius, vel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies impares fiunt, & opportunius post earum accessiones cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo, dierum ratio mutatur, fitque grauior, qui remissior esse consueuerat, atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primam naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octauum, neque decimum neque duodecimum diem \*sumendum quasi potentio-  
 Quod cum fecissent sine vlla probabili ratione, ab vndecimo non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse grauissimum. Ita illo quoque

Dies impar-  
res.

et non  
de morbo

no.

8.

apud.

\*sumendo.

rebus.

transibant.

et

n

auctore



*Sed si octauus  
primi naturam  
habet: unde-  
cimus quartus,  
non quintus  
erit.*

auctore in die pari & grauior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem, vt in vtrumque efficacissimum apprehendit, id est, quartum, septimum, vndecimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit: & ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die vndecimus, non quartus, sed quintus sit: aded apparet quacunque ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub illo quidem auctore reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fefellerunt, cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare, quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tunc oporteat dari, cum iam bene venæ conquieuerunt, aut etiam num manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhærente. In quo  
 \* vnā \* vanam rationem secutus est, non quò non sit interdum maturius cibus dandus, si maturè timetur altera accessio: sed quò scilicet quam sanissimo dari debeat. Minus enim cor-  
 \* non va- rumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen \* ve-  
 num est, rum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset æger, satius esse tunc dare, vt ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non præ-  
 \* est stet, satius \* esse principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi, ita, si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est: si breue, etiam antequam  
 \* & ex toto integer fiat. Quo loco verò integritas est, eodem \* est  
 \* si qua remissio, \* quæ maximè in febre continua potest esse. At hic  
 al. quanta quoque quæritur, vtrum tot horæ expectandæ sint, quot fe-  
 maxima brem habuerunt, an satis sit, primam partem earum præteri-  
 \* accidat, ri, vt ægris iucundius \* infidat, quibus interdum \* non vacat.  
 \* minimū Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus præ-  
 v. terire, quamuis vbi longa febris fuit, potest indulgeri ægro maturius, dum tamen antè minimè pars dimidia præteatur.



tur. Idque non in ea sola febre, de qua proximè dictum est, sed in omnibus ita seruandum est.

## ENARRATIO.

QUANQVAM ea sit medicina conditio, ut naturam ducem sequens praeproperam festinationem, ut quæ periculosa sit, semper exosam suspectamque habeat, & grauissimis nonnunquam (ut monet Hippocrates) agrotantes doloribus afficiat, puta quum aut secunda, incidenda aduendæue sit aliqua particula corporis: tamen si quis Asclepiadis hoc dictum penitus limiteur, non est quod aut festinationem aut voluptati incusare possit; quum securitas illa, quam celeritati atque voluptati comitem esse voluit, maturitatem quandam denotet. Nam, per deum immortalem, quis non desideret medicum, qui primis morbi insulibus quam ocysimè resistens, morbum statim & citra molestiam, hoc est, tunc & iocundè repellat? adeo, ut quamuis alia ferè omnia, præter rationem & dixisse, & fecisse sciamus Asclepiadem; hoc certè eum diuinum quoddam oraculum enunciaisse credamus, dignum quod quinis artem medicam professus pectori insculpat, quod secum obmurmuraret quotidie, atque inter quotidianos sermones vsurpet; sicut Octavius Augustus (quemadmodum docet Aulus Gellius Notum Atticarum libro x. cap. xi.) suum illud Festina lentè, quod non secus ac Asclepiadem hoc, Citò, tunc, & iocundè, moderationem quandam & maturitatem in capeffendis exequendisque consiliis denotat.

Et ante omnia quæritur,  
primis diebus.

PRIMOS dies vocat morbi principium.

Antiqui medicamentis.

HANC methodum obseruauerunt, Hippocrates, Galenus, & qui eos sequuti sunt verè illius atque antiquæ medicinæ cultiores. Nam in longis morbis semper ante materiæ purgationem, medicamentis quibusdam datis

fluxibiliorem reddiderunt, & concoctionem eiusdem moliti sunt. In acutis etiam raro in principio non præparata ad expulsionem materia purgabant, & nisi admodum turgeret, concoctionem adiunabant. in quem vsu Galenus etiam in principio acutorum morborum, si occasio ferat, decoctum origani, tragorigani, hyssopi & similium exhibendum docet; idq; Hippocratis auctoritate, qui concocta medicari, & mouere; non cruda præcepit. Verum de his si quis plura consideret, primam Aphorismorum sectionem consulat, ubi varios in hanc sententiam Aphorismos reperiet.

Asclepiades medicamenta sustulit.

ASCLEPIADES hic, ut præcedente libro dictum est, Pompeij Magni ætate floruit, è rhetore factus repente medicus: omnia ferè placita veterum subuertit, totamq; medicinam ad causam renocando, coniecturam fecit; negantque cibos à natura in ventre & partibus corporis confici, sed crudos in corpore digeri contendit. Acernos illos atomorum & vacuum Epicuri recepit, diuisit substantias rerum, & consensum partium abstulit. Quare quando, ut tertio Crisium monet Galenus, quod ea quæ sunt in corpore concoquantur, vel non concoquantur, Hippocratis non Asclepiadis sit dogma, rectè Celsus medicamenta sa potissimum quæ concoctionem adiunant, eundem sustulisse auctor est, quum eadem cruda, & à natura prius non confecta in corpore distribui contendat.

aluum non toties.

QUANDO & in quibus ducenda sit aluus, præcedente libro abundè dictum est: quare non est opus eadem repetere.



### Conuellendas acri vires.

QUAM fuerit sibi per omnia similis, hoc est vanus Asclepiades, vel hinc conicere licet, quod quum medici officium esse dixerit, ut celeriter, ut tuto & iocunde curet, nunc incunditatis illius, quam securitati cum celeritate comitem esse voluit, planè immemor, carnificem potius quam medicum primis agit diebus, atque nihil minus quam iocunde curet: adeò fallaces sunt atque vani, aut popularis cupidi homines.

### Itaque abstinendus à cibis.

PRÆCEDENTE quoque libro cibandi tempora distinximus: quare qui loci huius plenioris explanationem flagitat, in eundem librum nostras legat Enarrationes, & Galeni therapeutice methodum consulat, ubi multis argumentis, & prolixè admodum contra methodicos & diatritarios agit.

### Quod ad sitim.

QUANDOQV IDEM natura minister est medicus, sui officij esse consequens est, ut nature functiones muniaque promoueat in melius, ita ut si quæ suo tempore, aut modo non obeantur, ad pristinum reducat statum: & quoniam natura ita constitutum est, ut nox requies, dies vigiliis dicata sit, in hoc totus esse debet medicus, ut somnum nocte conciliet; ita enim fiet, ut materia peccans quodammodo conuoluetur, & facilius per halitum discutiat: quanquam si contra nature ductum contingat interdum somno opprimi, atque nocturnas vigilias infestare, non susserim subito diurnum illum somnum interrompere: verum considerandum moneo iuxta Hippocratis præscriptum, laborem faciat nec ne: nam si dolor subsequatur & grauitas, malus profectò hic erit somnus; si leniter ferat, promouendus est, ut qui natura duce obitur.

### Os etiam elui potest.

NON solum eluendum os aqua frigida est, sed & interdum eadem potui danda est: nam, ut XI. Methodi Galenus, frigida potio

febris aptissima est; etenim qui sani adhuc dum frigide porioni assueverunt, si febrientes eam bibant, summum lenamen consequuntur; præsertim quum caloris febrilis copia quasi munimen quoddam sit contra frigide noxam: tuto igitur in febribus exhibebitur, nisi obstructio, purisue humor non concoctus obstat, aut nisi in principe aliqua particula tumor aliquis consistat, ex phlegmonis, ædematis aut scirrhi genere: nam hisce frigida potio omnino contraria est; ut quæ tumores, atque obstructions auget. atque huc respexisse Celsum verisimile est, dum oris factorem & siccitatem suspectam habet; adeò rectè Erasistratus pronunciatum reliquit, inferiore parte non requirente humorem, os sanæque eundem desiderare: quamquam Galenus X. Methodi potione frigida phlegmonem angere manu, quam sinere hominem hecticam incurrere.

### Optimum verò medicamentum.

CIBVS importune exhibitus, morbum non modo non tollit, sed eundem auget; & si non fuerit, eiusdem causa existit: in principis enim abstinendum monet Hippocrates; & non pura corpora quanto magis nutrit, tanto magis lades.

### Nihil autem horum perpetuum est.

EST quando primo statim die cibandi sunt ægri: nam si qui ex inedia, ardore solis, ira, labore, siccitate in febres inciderunt, his nequaquam famem præscribemus: sed statim cum cibo frigidam propinabimus. Est etiam quando in secundum aut tertium diem differenda sit cibatio: nam, ut citandæ Methodi Galenus, sunt nature quibus aut non magno opere, aut nihil incommodet ridui inedia.

### Refert enim qualis morbus sit, quale corpus.

IVXTA secundum primæ sectionis Aphorismum, inspicere oportet & ægriorem, & tempus, & ætatem, & morbos, quibus conueniat,



conueniat, aut non: siquidem quando vires legitimus robur suum adhuc habent, & morbi summus vigor mature expectatur, tenuissimo victu uti licet sine gravi noxa; sed adiciere ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de robore virium imminutum.

### Maturius etiam puero.

HIPPOCRATES sectionis primæ Aphorismo XIII. Senes, inquit, facillime ieiunium ferunt: secundo loco qui consistentem etatem habent; minis adolescentes; omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt vniuires, quod videlicet (ut sequente hunc Aphorismo docet) plurimum caloris innati habeant qui crescunt, ac proinde quo plus habeant nativi caloris, tanto plus alimenti desiderant, & plus appetant; plusque longis inediis afficiantur.

### æstate quàm hieme dari debet.

NISI iam antè dixisset in Africa nulla die ægrum abstinentiam tolerare posse, parua dictionum metathesi locum sic mutarim: hieme quàm æstate: quod videlicet, quum ventres hieme & vere natura calidissimos, somnosque longissimos dicat Hippocrates, unde & plus appetant, & sumptos cibos melius conficiant, consequens quoque videatur, ut hieme quàm æstate maturius cibemus. Verum quum æstate acuti morbi magis innadant, atque ij potissimum qui vires prosterunt (quando & calore ambientis nos aeris nativus ille calor, vitæ nostræ assiduus fomes, dissipetur) maturius quidem, sed tenuius parciusque quàm hieme cibandum est; conservandorum virium causa.

### Vnum illud.

CONJECTARE (inquit Hippocrates sectione prima Aphorismorum,) oportet, an æger cū victu sufficiat perdurare donec morbus consistat; & numquid prius ille deficiat, nec possit cū victu perdurare, vel morbus ante deficiat atque hebescat.

### Est autem alia etiam.

DECRETVM aliquando fuerat hic Hip-

pocrati, contra Asclepiadem & Celsum nostrum, patrocinari; præsertim quando hodie nonnulli reperiantur qui his subscribere malint (quum non considerent quàm sit propria quedam dierum decretoria natura) quàm Hippocrati, viro, ut scitè dicit Galenus, admodum veraci, & in dierum decretorum natura admodum versato. verum quoniam argumentum hoc à Galeno abunde tractatum est, libro præsertim De diebus decretoriis, de criftus & suis in Epidemion libros & Aphorismos commentariis, consultum putauimus lectorem eò relegare, atque locos quos hic auctor citat adscribere.

### eosque tamquam tunc de ægris.

DIES alios *receptivos* seu decretorios, alios contemplabiles seu *θεωρητικούς* vocant: decretorios quidem appellabant, ubi subito turbatio in morbo orta salutem aut exitum portendant; Contemplatorios seu indices nominat Hippocrates, & Galenus in quibus aliquod signum apparet futura indicationis, indicantium in altero aliquo indicantium dierum, quos Hippocrates, tum in Aphorismis, tum in Prognosticis vnamquamque septimanam in duas diuidens partes, in quaternarios digessit: Septenarium, inquit, quartus est index; alterius septimana octauum principium: est autem & undecimus contemplabilis; ipse enim quartus est alterius septimana: Rursus verò & decimus septimus contemplabilis est; ipse enim quartus est à decimoquarto, septimus verò ab undecimo.

### ita ut summa potentia septimo.

PVLCHERRIMA allusione Galeni libro De diebus decretoriis, diem septimū regi, sextumque tyranno comparat, quod septimus, Hippocrate teste, perfectissime indicet; sextus imperfecte, ac recidivum minetur. Ac rursus, quod septimus clementior tanquam bonus aliquis princeps, iis quos indicat, vel supplicij partem admittit vel illustrat victoriam; sextus contra vel pernicio illius



illius quem indicandum suscepit gaudet, vel saluste dolet, queritque ubi animum expleat, & male egrum tractet, tum longa pernicie exerceat.

### Igitur sic ægros nutri- triebant.

SECTIONIS primæ Aphorismo XI. ait Hippocrates, In accessionibus à cibo abstinere oportet; siquidem cibum dare nocuum est: & si qui per circuitum accessiones obtinent morbi, in ipsis accessionibus cibum fugere conuenit, quod natura non sufficiat, & morbo & cibo oblato; atque adeo quod, quum natura à materia morbi ad cibos distrahat, humores morbum efficietes adaugeat.

### adeo vt Hippocrates.

FEBRICITANTEM, inquit Hippocrates, nisi diebus imparibus febri reliquerit, solet recidinare. & Aphorismorum quarto, Aphorismo XXXVI. Sudores febricitantibus si euenierint, tertio die, & quinto & septimo, & nono, & undecimo, & decimo-quarto, & decimo-septimo, & XX, & XXVII, & XXXI, & XXXIII, boni sunt; ij enim sudores morbos indicant; qui autem secus eueniunt, laborem significant longitudinemque morbi, & recidivam. Similiter & primo Prognosticon: Sudores, inquit, saluberrimi censentur ij in omnibus acutis morbis, si diebus indicatoriis oriantur, febremque finiant; contra inutiles, qui id efficere non possunt.

### Nonnunquam etiam in ipso morbo.

Id non tam ratione ipsius morbi, quam eorum que exterius accidunt vitio contingit: nam fit ut incuria medici, ingluvie, aut ægroti intemperantia, astantium importunitate, aut alio quouis modo dierum ratio mutetur.

### atque ipse quartusdecimus par est.


QUANDOQV IDEM. usque adeo urget

Celsus, & neque omnino à ratione aliena esse videantur iis qui Galenum non satù legerint, aut non intellexerint, operaprecium fore duxi, hic periodos nonnullas ex Ioanne Morisoto, quod Hippocratis in hac re fidissimus assertor extiterit, & Galeni omnia tanquam in compendium redegerit, ascribere. Scribit autem in hunc modum in enarratione aphorismi LIX segmenti quarti ubi ex professo locum hunc explanandum sibi proponit. Prima, inquit, omnium que sunt principia sunt duo, & πρῶτος & sine inordinatum, & quod ordine semper ornatius procedit: illud ex ista mundi materia proficiscitur; hoc è celestibus originem ducit. Celestium verò sol veluti rex est, qui & presens diem, & absens noctem, & alius astatem, & humilis hiemem, & mediocriter obliquus utrumque solstitium facit. Luna verò ut princeps inter illum & nos medius, reliquos planetas vicinitate superat, & cuiusque mensis dies disponit, ex solis aspectu mutandi facultatem consecuta. Eius enim tanta portio illucescit, quantam sol afficit: hinc decem illa figura (vt tradunt Mathematici quidam) gena, ortus, surgens in cornua, & huiusmodi, diximus, & πρῶτος & πρῶτος: rursus semidinisa, diuisa, surgens in cornua, & coitus: vel, vt alij volunt, undecim, vt quæ πρῶτος & πρῶτος sine plenilunio sufficiant πρῶτος & πρῶτος, quum & πρῶτος & πρῶτος appellantur: quanquam alij malint septem tantum esse; alij coitum etiam adiciant, atque octo statuant: nos octo sequemur, vt dies decretorios commodius demonstrare possimus. Surgit ergo in cornua, quum LX partes abest a sole; dimidia est quum nonaginta; gibbosa quum CXX; plena quum CLXXX; rursus fit gibbosa quum CXX; dimidia quum XC; surgit in cornua quum LX; eiciens quum sub limine solis fertur, qua & silens dici solet. Prima figura est in sexangulo mundi schemate, siue, vt alij loquuntur, in aspectu sextili, die serè quarto; secunda in quadrangulo schemate, siue aspectu quadrato, die septimo; tertia in triangulo schemate, siue aspectu trino die XI; quarta in diametro siue oppositione die XXI; quinta in eodem



eodem schemate cum tertia, XVII die; sexta in eodem schemate cum secunda die XX; septima in eodem schemate cum prima, die XXIII; octava in coniunctione die XXVII.

## ASCENSVS.



## DESCENSVS.

Sunt igitur indicatorij, quartus, septimus, XI, XIII, XVII, XX, XXIII & XXVII. nam si nec quicquam externum (sunt autem externa, medicus, egrotus, famulus, domus, vicinia, negotia, atque item alia sexcenta) nec internū (cuiusmodi sunt, morbi, eorum causa, & accessiones) naturam concitauerint, acuti morbi his indicantur, sequitur enim motum lune colerrimum, ut solis tarditate diuturni. Sunt & alij decretorij, nempe XXXI, XXXIII, XXXVII, XL: nec mirum est quod ex XXXI secundi mensis quartum, ex XXXIII septimum; & ex XXXVII undecimum; ex quadragesimo decimumquartum colligere possimus. Quanquam Hippocrates eos in quaterniones

& hebdomadas distinguat: & ex ternis septimanis circuitum facit absolutum: in menses tamen diuidere placuit, ut ex natura celestium vis eorum omnino perspiceretur. Reliquum igitur est, ut qua ratione numerentur hī dies, ostendamus. Hippocrates Praesagiorum segmento tertio in hunc modum scribit: Igitur accessiones ipsae ex acutissimis morbis per quatuor in viginti auctae finiuntur: sed nihil horum potest diebus integris annumerari; nec enim annus nec menses, integris diebus natura numerari queunt. Ut igitur, inquit Galenus, annus ad trecentos sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarta adiectam habet, tum mensis ad xxx dies absoluendos unius dimidius desiderat;



desiderat; sic & septimana, sexta maxime dici parte; ut septem integros habeat indiget. Quamobrem tres septimane non unum & viginti dies integros, sed minus fere tota unius dimidia parte consequuntur. Quod ut facilius intelligi queat, rem paulo altius repetemus. Motiones quae in corporibus nostris accidunt; duae traduntur: una propria quae ex circuitu zodiaci nascitur; communis altera, quae ex menstruo tempore progignitur: ex hoc si tres coitus dies sustuleris, quod reliquum erit tempus manifesta apparitionis atque efficacia dicitur: constat autem ex diebus viginti sex & dimidio. Significari vero circuitus, intra viginti septem dies, & tertiam unius partem expletur. hos porro dies si coniunxeris, deinde in duas aequales partes divideris, viginti sex dies & horas duas & viginti esse dimidium invenies. Quod si in partes aequales rursus distribuas, facies hebdomadas quatuor ex senis diebus & denis septenis horis, & hora dimidio. Tres igitur septimane ex xx diebus & horis quatuor, atque unius hora dimidio constabunt. unde fit ut prima septimana seuncta sit a secunda; secunda contra cum tertia cohereat: nam si prima cum secunda coniungeretur, neque in decimum nonum; si rursus distincta essent, in XXI incidere. Est autem haec periodus absoluta: siquidem quadragessimum, LX, LXXX, centesimum, & centesimum & vigesimum vigesimo saepius aucto fieri videmus; ac nec septimus id prestare potest, nec decimusquartus: nam ille vigesimum primum, vigesimum octavum, xxxv, xlii, hic similiter xxviii, & xlii si augeatur consistunt: qui dies ut non sunt decretori, ita nec septimus est perfectus circuitus nec decimusquartus. Est igitur duplex periodus, perfecta & inchoata. sed & perfecta ex ternis inchoatis conflata est, ut inchoata ex binis quaternionibus: atque ita si perfectam divideris, quaterniones senos invenies; non aliter utique quam sunt sex periodi perfecta. Hucusque Morisotus indicatoriorum dierum rationem ex luna motu doctissime descripsit: cui quum & ipsa experientia (quam non minoris, quam ipsam rationem hic facit Ga-

lenus) indices accedat, non est quod Asclepiadem aut ei succedentem Celsum audiamus.

### Est etiam apud Hippocratem.

HIPPOCRATES segmenti quarti Aphorismo LXXI: Quibus septimo die indicatur morbus, iis quarto die nubeculam habet vrina rubicundam, & alia signa proportionem; ut ante diximus septimi quartum esse indicem seu contemplabilem.

### Verum in his.

DE Pythagoricis numeris per multa Macrobius in commentariis quos edidit in Semonium Scipionis: In summa, Pythagoras omnem philosophiae rationem ad numeros traxit: quem sequutus Plato, in Timeo praesertim, obscuram admodum reddidit, atque nebulas offudit, locumque proverbio praebuit, ut auctor est Cicero, Platonis numero obscurus.

### Illud autem magis ad rem.

TRIA univrsim sunt capita, quibus vitus ratio comprehenditur: unum, quod ad qualitatem; alterum, quod ad quantitatem; tertiumque, quod ad usus modum attinet. Qualitatem quidem ac quantitatem variare par est pro morbi differentia. Ac quod ad usus quidem modum (ut XI methodi Galenus) aptissimum in febribus quae intermittunt & repetunt tempus est, quum exhalare caeperit febrilis calor: statim enim corpus ad nutrimentum preparatur; huius quoque opportuno tempore ex duplici coniectura respectu, nempe summo accessionis praecedentis vigore, & futura principio. Ad haec namque spectantes operam dabimus, ut quam longissimè ab viroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus invenire; sin exiguum id fuerit, alteram facias necesse est, ut aut egrum adhuc admodum calentem nutrias, aut sequentis accessionis inuasionem iam iam asutura. Quo magis praesagio medici huiusmodi febris indiget, qui primis statim diebus quanto spatio duratura



duratura sit febris, coniciet. Quippe si continens fuerit, constat brevi finiendam. Si igitur ultra septimum progressura non videtur, prorsus à cibo continendus est ager, vique si virtutem non defecturam coniciamus: Sin ad nonum aut undecimum, aut decimumquartum usque progressura vide-

tur, aut etiam in septimo finienda, ceterum ager vires infirmiores habere, quam ut in tantum tempus sufficiat; necesse erit nutrire, ac deligere sicut in re ancipiti convenit, quod minus sit noxium, distinguendo id discernendoque ab eo quod magis sit nociturum.

## CAPUT V.

*De febrium speciebus, & singularum curationibus:*

*& primò, quando cibus febricitantibus dandus sit.*

**H**AEC magis per omnia genera febrium perpetua sunt, nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex æstu, aliave simili re fuit, sic ut interior nulla causa metum fecerit, postero die cum tempus accessionis ita transiit, ut nihil mouerit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, & grauitas vel capitis vel præcordiorum secuta est, neque apparet quid corpus confuderit, quamuis vnâ accessionem secuta integritas est, tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus præterit, cibus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si verò postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quæta tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc verò eas explicabo, quæ quotidie vrgent. Igitur tertio quoque die cibus ægro commodissime datur, ut alter febrem minuatur, alter viribus subueniat. Sed \* his dari debet, si quotidiana febris est, \* is quæ ex toto desinat, simul atque corpus integrum factum est, \* si quamuis non accessiones, febres tamen iunguntur, & \* si quod quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpora se habet, ut maior remissio non expectetur.



peccetur. Si altero die grauior, altero leuior accessio est, post grauiorem. Ferè verò grauiorem accessionem leuior nox sequitur: quò fit, vt grauiorem accessionem nox quoque tristior antecedit. At si continuatur febris, neque leuior vnquam fit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus aëris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia manè est, sed quia remissio est aëris, dari debet. Si verò ne tunc quidem vlla requies aëris est, hoc ipso peius id tempus est, quòd cùm sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum: à quo cùm omnis aeger ferè peior fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quàm ex consuetudine vrgeatur. Igitur alii vespere tali aëro cibum dant. Sed cùm eo tempore ferè \* pessimi sint, qui aegrotant, verendum est, ne si quid tunc mouerimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem \* decurro, id est finito iam grauissimo tempore, eodemque longissime distante, secuturis verò antelucanis horis, quibus omnes ferè maximè dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si verò febres vagæ sunt, quia verendum est, ne cibum statim subsequantur, quandocunque quis ex accessione leuatus est, \* tunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, paræne per omnia sint, (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia pares sunt, post eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vespertinum definit. Si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est, post grauiorem dari debet: si altera longior, altera breuior, post longiorem: si altera grauior, altera longior est, considerandum est, vtra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest, quantæ, qualesque inter eas remissiones sint. Nam si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est: integro corpore, cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est, adeò vt vbi accessiones continuantur.

\* pessimè

\* decurro,

Febres vagæ.

\* hunc



continuantur, protinus inclinata priore dandus cibus sit. Et enim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest, cibum quàm maximè semper ab accessione futura reducere, & hoc saluo, dare quàm integerrimo corpori. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cum sit aptissimum tertio quoque die cibum dare, tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoque magis si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt, aut si duæ pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibus dari quotidie debeat. Si protinus venæ conciderunt, & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his seruandum est, ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum verò febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde cum decessio eius consistit: \* tertium, si necesse est, quandoque de- \* tertio cedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre, quàm crescente. Sarius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neq. hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem, seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interueniunt. Cum verò semper ægros securos agere cõueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent, tum præcipuè, ubi cibum sumpserunt: \* at- \* itaque que si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt, optimum est, \* ea dum agrotant eorum notitiæ subtrahere. Si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum \* usque somni tempus, & cum experrecti sunt, tum exponere. \* eadem agrotantium notitiæ sub. \* adusque

## ENARRATIO.

**E**PHEMERAS seu diarias Hippocrates simplicissimas vocare solet, quod brevissima, lenissima, mitissimaq; sint ac mini-

mè malefica, cum securitatis indicis, sine malis accidentibus, ut plurimum diem integrum non excedunt, ob id quod materia in



qua consistunt, nempe spiritus facillime diffunditur. Mala autem accidentia easdem commitari non solent; sequidem calor in blando vapore mitis ac suavis est, quo fit ut Galenus primo artis curatine ad Glanconem, febricitantes ex diaria statim ad balneas visitatamque victus rationem ducendos suadeat, quod ex longiore inedia, febres & accenduntur & redderentur aciores, atque adeo in putridas facile degenerarent.

### caque, vel ex inguine.

IN bubonibus, inquit Hippocrates, febres omnes male, præter diarias. Celsus suo more ex inguine, pro inguinum bubone dicere maluit; forte quod suspectas habuerit febres ex bubone ortas, quod ha videlicet ex delitescente intus causa (vixuta viscerum inflammatione, plenitudine humorum, aut malignitate, aut pestilenti etiam humore) ortus sui causam habeant, ac proinde, non in diarium, sed putridarum genere potius recensenda sint. Quo fit ut Aetius quoque febrientibus ex inguinum inflammatione vanam statim iundat priusquam materia putrescat, & febrem putridam accendat. Verum quandoquidem (ut de febrium differentiis cap. VII. Galenus) sunt nonnulla febres ex bubone in genere diarium, utpote quæ ex evidentibus causis ortum habent (evidentes causas voco, hinc, dolorem, ictum, & similia quæ iuxta magnas venas vel arterias existunt) ut cruris quidem, si in inguine, manuum vero, si in alis, quemadmodum & capitis, si secundum aures affectus sit: recte Celsus inter diarias eas quoque quæ ex inguine sunt, constituit; easque potius quam quæ sub alis aut secundum aures consistunt asseripit, quod iisdem frequentiores sunt.

### vel ex lassitudine.

AETIVS brevissimam & exactissimam diaria febricitantium victus rationem prescribit. Dicit autem: Dieta in febribus diariis omnibus communem scopum habet, ut sit ex edulis boni succi, & quæ omnino concoquantur, & nusquam circa meatus detinentur. His quidem quæ ex ardore aut ira

februnt, quæ simul frigescent & humescant, frigescentis vero minus alentia & moderate calefacientia: His autem qui vigilarunt aut tristes fuerunt, aut curis vexati, humidus aut somnificus cibus congruit; fatigatis autem plurimus & maxime nutrens. At quibus intemperatura corporis calidior & siccior facta est, eos oportet aliquando circa principium exacerbationis impetum nutrire.

### ut interior nulla causa.

ITA enim suspicio esset repetitivam accessionem, atque adeo aut putridam aut hecticam in periculo esse.

### At si ex alto calor venit.

HOC iam manifestam atque evidentem viscerum inflammationem, atque adeo innascentem febrem denotat: nam neque ex alto venit calor, nisi admodum extraneo calore accenso corde, neque præcordiorum gravitas subsequetur, nisi eorundem inflammatio orta sit, aut per consensum hepar cordi coafficiatur: & in summa, capitis gravitas non aderit, nisi calore cordis atque hepatis petum caput, eisdem condoleat.

### expectandus est dies tertius.

CELSVS hic passim methodicos sequutus, diatrilo plus satis tribuit, carnisficis potius hac in re, ut docet Galenus, officium, quam medici, exerceens: nam præterquam quod commodi nequicquam asserat febrientibus exacta mirificaque diatrilos, etiam ex longiore inedia acerrimas acutissimasque parit febres, à quibus promptus est in hecticas transitus, atque ab his rursum in torridam marasimum, aut si os ventriculi facile iniuriis patet, eum qui *συνεργῶν*, id est animi defectum, infert. Ceterum de hac diatrilo qui plura desiderat, quartum, octavum, undecimumque Methodi Galeni libros consulat. Porro cibandi methodus ex primo Aphorismorum petenda est: nam ubi peracutus est morbus, inquit, statim etiam extremos habet labores, & extrema tenuissima victus ratione



ratione vii necesse est; ubi verò non, sed plenius licet reficere, tantum indulge, quanto morbus extremus est mollior; ubi morbus in vigore consistit, vivendi ratione tenuissima tunc vii necesse est. Observare autem oportet etiam agrotantem, an sit huiusmodi rationi ad morbi vigorem usque suffecturus, & an prius defecturus sit, & non suffecturus prescripto victui, an morbus ante sit defecturus, ac futurus hebes. Quibus ergo statim vigor est, statim eos tenuiter refice; quibus autem vigor erit postea, his & in ipso vigore, & paulo ante illum auferendum, sed ante uberius reficere, ut sit suffecturus agrotans. Usque adeo perpetuum ac firmum nihil est, quin usu ac ratione interdum id variari non contingat: nam quis in hoc rigido sepiemissione agrotis (nihil minus quam inedia assuetis) irriduanam illam cibi potusque abstinentiam prescribat? quis pueros voraces admodum, a cibis, nisi omnino carnis, abstinere cogat? quis in summa aetate, & vere eandem victus rationem prescribere audeat? quis peracutos acutosque & ex decidentia acutos dictos, eadem victus norma sustentet?

### Ferè verò graviorem accessiorem.

SENTENTIA sumpta est ex Hippocratis secundo Aphorismorum: Quibus crisis, id est, indicatio sit, iis nox gravis ante accessiorem; qua verò subsequitur, magna ex parte lenior sit. neque id mirum est, quum indicationem præcedant deliria, spirandi difficultas, oculorum caligo, temporum gravitas, & alia innumera, natura se ipsam a supernaculis humoribus corpus molestantibus exonerante: quò fit ut & qua sequitur dies, aut nox lenior quoque sit.

### At si continuatur.

CONSVETUDINIS hic potissima habenda ratio est: nam si quò consueverint tempore cibum assumere, cibaveris; opportunissime id feceris: nam & tum ipsi agroti tolerantissime eosdem acceperint. Quare non usque adeo magnipendendum est, ve-

spertinum ne an matutinum, meridianum an pomeridianum tempus sit; quum ipsa agroti tolerantia & antea vite consuetudo ratio, ut recte monet Celsus, in continentibus & similibus, quæ unicam tantum accessiorem habent, si vires in mediam non serant, tempus opportunum cibationi denotent.

### Si verò febres vagæ sunt.

FEBRES vagas videntur eas intelligere, quæ incertas habent accessiones, neque certum aliquam materiam motum; ut quas neque simpliciter tertianas, nec quotidianas dicere possis: quarum natura ferè talis esse solet, ut interim eodem die duas aut plures accessiones faciant, interim etiam post aliquot dies, non habito certo aliquo ordine, quemadmodum in tertianis & aliis intermittentibus fieri consuevit. Fiant autem ob victus rationem non rectè institutam, aut quia variè in variis corporis partibus humores putrescunt; hos siquidem humores partes quædam citius, alia tardius accendunt, ex quibus etiam alij ut accendantur promptiores sunt, alij minus prompti. Ceterum quando hic cibandum sit, & ipsa morbi constitutio & consuetudo & agri vires docebunt; si etenim consent vires, alternis tantum diebus tenuiter quidem, non tamen in extremo, quod frequenter in longum protrahantur tempus, nutricabimus. Id interim curandum est, quemadmodum auctor noster docet, ut statim ubi ad insecrificationem ventum est, cibemus; ne videlicet cibationem noxa statim subsequatur accessio.

### At si plures accessiones.

SEMITERTIANAS intelligit: hæ etenim vii nunquam febre vacans tempus relinquunt, ita plures interdum eodem die accessiones faciunt; quarum altera quidem longior iniquaque ferè est, altera brevior quidam, verum vehementior. Porro cibationis tempus hic quoque, ut in præcedentibus, à consuetudine, virum robore, & morbi constitutione petendum est, limitatione habita, quemadmodum auctor noster docet: ut si per omnia pares sint accessiones, post eam potius



potius cibus detur, quæ non inter meridiem & vespæram definit, quod satius aliquanto sit aut prandij tempore, aut paulo ante illud cibasse, observata nimirum hypothesi quæ à consuetudine sumitur, quam inter omnes maximi semper faciendâ docet Hippocrates.

### Etenim perpetuum est.

EIVS medicina partis quæ victui medetur (inquit Hippocrates libro De ratione victus in morbis acutis) maximum est, febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutis modò, verum & in longis quoque, observare, ut tempora quibus cibi offerendi non sunt, & tunc, & quibus offerendi existunt, cognoscas, atque adhuc quando plurimum ab intentione aberint. Cognoscemus autem in acutis morbis nutriendi tempus ex pedum caliditate: nam, ut eodem libro testatur Hippocrates: Quum purgaveris, sorbitionibus quibusdam utitor, observatis ita febrium accessionibus, ut nunquam quum adsint, neque quum finire sunt, exhibeas; sed vel quum cessent, vel quæ fuerint, & maxime à principio recesserint. frigentibus ergò pedibus, neque potum neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum astimato, si id tantisper observaveris, donec valde incaluerint, deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessura signum existit: quo tempore si quid porrigas, prorsus peccabis; nempe & morbum non parum augeris. At vero quum febris defuerit, pedes reliquo corpore calidiores sunt; nempe quum augetur, pedes refrigerat, intensaque ex thorace ad caput flammam mittit. Calore igitur toto ad supernas partes concurrente, atque ad caput expirante, non absque causa pedes frigescent, vixit qui natura & carne vacent & nervis abundent; præterea & à calidissimis separati locis refrigerantur, sese ad thoracem colligente calore.

### Sed cum sit aptissimum.

EX hoc colligere licet Celsum nostrum diuturno methodicorum multum tribuere solium, sed ita tamen ut eadem laceffendas

agri vires haud quaquam censuerit: siquidem si vires non consistent, atque corpus infirmum sit, non habita mirifica illius diuturni ratione, quotidie cibatur.

### Si protinus venæ con- ciderunt.

SIGNVM hoc exhausti exuccique corporis est, quod per inediã ad talem facillimè deduceretur. Sic Galenus x. Methodi, iuneni (qui re ita postulante plus itineris consecerat) horrenti iam ac febricitanti proximo, in ipso horrore dilutum panem exhibuit: atque ita non solum horrorem, sed ingruentem etiam febrem compestuit; idque experientia à se compertum affirmat, atque eò securius inhiberi febrem, quanto citius eodem cibaveris.

### si inter plures accessiones.

VNICVS fere in morbis nutritionis scopus est, virium robur: nam frustra in peracutis, nisi cum virium robore, summe tenuem victum præscribemus; virium siquidem imbecillitas sapius quidem, sed paulatim cibandum dicitur; sed & corpus benè diffabile ad cibationem stimulat, & quod tenue habet succos, id cibandum indicat.

### deinde in decessione.

EXEMPLAR TORMESUM, contra quam reliqua exemplaria, decessione habet; idque melius: quemadmodum rectè annotavit Panthius.

### Si tamen propter &c.

CONSISTENS incrementum febris, non ipsum vigorem propriè dictum, sed particularem ipsius augmenti statum, appellat; sic ut quivis paroxysmus in quatuor tempora distinguitur, principium dico, augmentum, statum, & declinationem; quod innuisse videtur, quum consistens incrementum ab incrementum distinguit: nam aliqui Hippocratis theorematibus paulo ante recitatis planè repugnantia dixerit; siquidem is in morbi vigore omnino abstinendum suadet.

neque



Neque hercule satis est.

HIPPOCRATES libro De morbis acutis: Coniicere oportet & robur & morbi cuiusque speciem, hominis item naturam, atque ægrotantis in victu consuetudinem, non in cibis solum, verum etiam in potionibus.

Cum verò semper ægros securos.

HÆC sunt quæ Hippocrates τ' ἐξωβίτ

sine externa vocare solet: atque ea quidem quam vim atq. efficaciam habeant in ægris, auctor est Hippocrates tum primo Aphorismorum, tum sexto Epidemion: nam quum affectus animi tales sint, ut valens corpus alterare possint, & diariam statim concitare; quomodo eadem valedudinarium, & febribus subiectum non afficient, ac citandi omnem occasionem, si non surripient, saltem subvertent; quum & cibi concoctionem impediant, & nouo paroxysmo iter sternant?

## CAPUT VI.

*Quando potiones febricitantibus dari expediat.*

SEd de cibo facilius quidem cum ægris ratio est, quorum sæpe stomachus hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione verò ingens pugna est, eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maximè aquam exigit cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieuerit, protinus sitim quoque quieturam, longioremque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quàm sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo verò, cæterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen si magna sitis vrgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret, ubi aut bilis ægrum, aut cruditas malè habet, expedire quoque per medicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque: ubi sine illo datur, \* deligantur, aut cum \* delig. cum ægrum dormire cupiemus. Quod ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor



mor alienus sit, tum præcipuè esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo potionique febris & remissionis ratio det, non est expeditissimum scire quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat. Sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maximè credimus fallacissimæ rei, quia sæpe istæ \*leniores, celerioresve sunt, & ætate & sexu & corporum natura. Et plerunque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam etiam incipiente febres subeunt & quiescunt, ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & resoluit sol, & balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus, ad eò, ut cum primum medicus venit, sollicitudo ægri dubitantis quomodo \*illi \*ille se habere videatur, eas moueat. Ob quam causam periti medici est, non protinus ut venit apprehendere manu brachium, sed primum residere hilari vultu, percunctarique quemadmodum se habeat, & si quis eius metus est, eum probabili sermone lenire, tum deinde eius corpori manum ad-mouere. \*Quam Quas venas autem conspectus medici mouet, quàm facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus, calor, æquè fallax. Nam hic quoque excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quidem etiam ista oportet. Sed his non omnia credere, ac protinus quidem scire non febricitare eum, cuius venæ naturaliter ordinatæ sunt, teporquè talis est, qualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore motuque febrem \*posse \*fese concipere, sed ita, si summa quoque arida inæqualiter cutis est, si calor & in fronte est, & ex \*intimis præcordiis oritur, si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit, si color aut rubore, aut pallore nouo mutatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut subhumidi sunt, si sudor cum sit, inæqualis est, si venæ non æquis intervallis mouentur. Ob quam causam medicus neque in tenebris, neque à capite ægri debet residere, sed illustri loco aduersus eum, ut omnes notas ex vultu quoque cubantis \*percipiat. Vbi verò febris fuit, atque decreuit, \*expectari oportet, num tempora, partésve corporis alia paulum madescant, quæ sudorem

Venarum  
pulsus.

\*leniores,

\*illi

Officium  
medici.

\*Quam

\*posse

\*intimis

\*percipiat.  
\*expectare



dorem venturum esse testentur. Ac si qua nota est, tunc de-  
 mum dare potui calidam aquam, cuius salubris effectus est,  
 si sudorem per omnia membra diffundit. Huius autem rei  
 causa continere æger sub veste satis multa manus debet, ea-  
 demque crura, pedesque contegere, qua malè plerique ægros  
 in ipso impetu febris, pessimeque ubi atdens ea est, malè ha-  
 bent. Si sudare corpus cœpit, linteum reperfacere oportet,  
 paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor om-  
 nis finitus est, aut si is non venit, ubi quàm maxime \* potuit,  
 idoneus esse cibo æger videtur, sub veste leniter vngendus est,  
 tum detergendus, deinde ei cibus dandus. Cibus autem fe-  
 bricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certè quàm  
 proximus, utique ex materia quàm leuissima, maximeque  
 sorbitio, eaque si magnæ febres fuerunt, quàm tenuissima  
 esse debet. Mel quoque despumatum huic rectè adicitur,  
 quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, su-  
 peruacuum est, sicut ipsa quoque sorbitio. Dari verò in vi-  
 cem eius potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota, si fir-  
 mus est stomachus: & compressa alius ex aqua mulsæ: si vel  
 ille languet, vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem ci-  
 bo ita satis est: secundo verò aliquid adiaci potest, ex eodem  
 tamen genere materiæ vel olus, vel conchylum, vel pomum.  
 \* Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus \* Ac  
 est. Vbi verò aut desinunt, aut leuantur, semper quidem in-  
 cipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adiaciendum  
 verò aliquid ex media, ratione habita subinde & virium ho-  
 minis & morbi. \* Ponendi verò ægro varii cibi (sicut Ascle- \* Appo-  
 piades præcepit) tū demū sunt, ubi fastidio vrgetur, neq. satis nendi  
 vires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famem vi-  
 ter. At si neque vis, neque cupiditas deest, nulla varietate  
 sollicitandus æger est, ne plus assumat, quàm concoquat.  
 Neque verum est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui ci-  
 bos varios: \* eduntur enim facilius, ad concoctionem autem \* educun-  
 materiæ, genus & modus pertinent. Neque inter magnos tur  
 dolores, ut neque increscente morbo tutum est ægrum cibo  
 impleri, sed ubi inclinata iam in melius valetudo est. Sunt

P

aliæ



alia quoque observationes in febribus necessariae, atque id quoque videndum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat: quorum alterum strangulat quod continet, alterum digerit. Nam si astrictum est, ducenda alius est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Vtile est etiam

\* inducere \* ducere in balneum, prius demittere in solium, tum vngere, iterum ad solium redire, multaque aqua fouere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeque oleribus, qualia sunt lapathum, vrtica, malua, vel iure etiam concharum, muscutorumve, aut locustarum, neque danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis cogget. Poteritque à balneo etiam \* pinguius aut dulcius dari vinum, poterit semel aut bis interponi Græcum salsum. Contra verò si corpus profluat, sudor coercendus, quies adhibenda erit, tenebris, somnoque quodcumque volet utendum, non nisi \* leui gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est. Si verò sudor exercet, duranda cutis est vel nitro, vel sale, quæ cum oleo miscentur. At si leuius id vitium est, oleo corpus vngendum est: si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo cui vinum austerum sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est, cum venit in balneum, prius vngendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum ventum est, dari debet \* is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum \* asperum, vel certè subausterum. Si venter profluit, calidum: si sudores nocent, vomitusque sunt, frigidum.

ENAR-



## ENARRATIO.

**N**ON mirum si famem facilius ferant febrientes quam sitim: quando nausea cibi, fastidium communia quadam accidentia sint omnium in ventriculo redundantium humorum. Sitis autem quoniam duplici de causa fiat; altera videlicet ob humiditatis inopiam; altera ob caliditatis redundantiam; in febribus maxime molesta est, quum in iisdem viraque cause affligant: caliditas enim in illis multa est, & siccitas, ut docet Aëtius, succedis, multa humiditate per violentiam febris consumpta. Si quidem igitur sine detrimento bibere possent quando vellent, hanc sanè sitis medelam amplecterentur statim. quandoquidem verò & mensuram & tempora potus decernere oportet, lenimenta quadam sitis excogitanda sunt: nam intempestive sumptus potus, non solum sitim non extinguit, sed eandem etiam interdum auget. In principiis enim exacerbationum, omnes materia febre accendentes, ad profundum declinant, & propterea sitim intendunt. Datus igitur in illo tempore potus, à materia multitudine superatur, & simul vitiat, accessio fit mali. Quare in principiis & augmentis potus exhibitio nem prohibere convenit; deinde declinatione incipiente potum dare; in remissione verò etiam volentes aliquando cognunt potum assumere, ut ne humore indigi ad exacerbationis accessionem delati, resiccentur atque exsiccantur.

## Sed primo quidem die.

**COLLAPSÆ** vena summam siccitatem & calorem indicant. quare si maximum subterfugere mens est, consultum est huiusmodi non solum potum rescire, sed etiam, uti precedente capite dictum est, plenius quam morbi ratio postulat, & maturius cibare oportet.

**Acne** illud quidem ab  
Heraclide.

**TARENTINVS** hic Heraclides Em-

piricorū posterior atque probabilior omnium apud suos inuenitur, ut auctor est Celsus Siccensis. Ceterum quod is dicebat (ut hic infert Celsus) potionibus medicis nonam materiam misceri corrupta, id quidem non omnino à ratione alienum est in iis febribus quae originem suam humorum cruditati tantum acceptam ferunt. In iis autem quas bilis solummodo concitavit, & quae macilentum strigosumque quodammodo corpus sortitæ sunt, non solum non materiam peccantem augebimus, sed eandem & imminuemus, & eiusdem calorem refrenabimus.

## Satis autem conuenit.

**QVAMQVAM** dicat alio loco Hippocrates victum humidum febricitantibus conuenire, non tamen malè hic infert Celsus, omnibus febrientibus alienum esse nimium humorem; quum tantum detrimenti ipsa humoris copia sit allatura, quantum ipsa qualitas commodi. Ac proinde quod mulieribus quæ ex partu febricitant, inimicissimus sit nimius humor, mirum non est, quando febres originis suæ causam acceptam ferè ferant interceptis humoribus, qui alioqui toto puerperij tempore expurgari solebant. Hic autem obiter admonere lubet, locum hunc non citra mendis suspicionem legi: nam propterea esse mulieribus, hinc mulieribus legere malim.

## Sed cum tempora.

**HIC** quoque locus mendosus esse videtur; siquidem quantum conicere possum, negatina non redundat: Sed cum tempora cibo portioniq. febris & remissionis ratio det, est expeditissimum scire quando æger febricitet. nam nisi ita legamus, sibi ipsi statim contradicet, quum ait, Sine quibus illa dispensari non possunt.

**Venis** enim maxime  
credimus.

**VENAS** hic suo more cum artetis con-

**P 2**

fructus.



fundit, quamquam rectius arterias, aut vasa spiritalia, sicut Hippocrates, dixisset; quas non immerito fallaces appellat Celsus: nam etiamsi quam maxime certa sit de pulsibus disciplina, ei praesertim, qui Galeni de iisdem libris degustavit, tamen singulorum eorum, ad quos accedit medicus pulsuum differentias exacte diiudicare non poterit, nisi sanorum prius probe & exacte exploratum pulsuum habuerit: atque ita tandem discernere possit, quantum a sani pulsui discedat ac discrepet: quod Galenus libro De praesagiis ex pulsibus faciendum suadet: Nam omnium, inquit, alterationum quae corpori accidunt, certissimam assequimur in illis corporibus cognitionem, quorum noscimus naturam.

quomodo ille se habere videatur.

RECTE hic legendum monet Panti-  
nus, illi pro ille.

quam facile mille res  
turbant.

CÆSARIUS in alio quodam exem-  
plari legi dicit, cui facile adhuc laturo.

Altera res est.

BENE monet Celsus fallacem, si quem alium, esse calorem: nam praeterquam quod is in febribus, aliis mitis, aliis mordax, aliis increscens sit, ita nonnunquam oritur ex aliis causis, quas Cornelius noster hic recitat: nam etiamsi quam maxime ab aestu, sole, labore, & similibus exciteretur calor, nisi à corde in totum corpus diffundatur dispergaturque, atque actiones ledat, febrilis calor nequaquam dici poterit.

Igitur intueri.

GALENUS De arte curativa ad Glauconem primo: Maxima signa & praecipua in febricitantibus omnibus ex pulsibus & urinis petuntur: nam partes quas febres maxime occupant, sunt cor, arteria, & vena. Itaque praecipue in febribus notae ex harum partium actione laesa, & excrementis petuntur; hoc est ex pulsibus, urinis & excremen-

tis. Alia omnia signa, quae hic ex Hippocrate Celsus ascribit, obscura, & tanquam minus praecipua vocare solent; quanquam & haec quoque singula consideranda moneat Galenus, quod nimirum morbi magnitudinem aut contra denotent.

Non protinus autem.

CELSVS hic multa diversaque inter se signa confundit: nam neque omnibus commune est cutim inaequaliter aridam esse, sed tertianis nonnullis tantum febribusque potissimum hecticis; siquidem quotidiana febris, ut originem suam à pituita habet, corporis aut pituitosa natura, aut studio, ocio, vitisque intemperantia phlegmatica reddita, inuadit, ita cutim aridam non efficit statim. Et neque arteriarum pulsus inaequalis, omnibus febribus communis est: nam ut ex Galeno Aërius, est etiam in tertianis febribus ordo pulsuum exquisitus, & aequalitas: excitatur autem in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad vehementiam, magnitudinem ac densitatem. In quotidianis autem febribus in pulsibus manifesta ordinis confusio & inaequalitas adest; tempore irruptionis, exacerbationis praesertim, & velocitas ac vehementia motus ipsis non adest. Et rursus tertianarum spiritus ex naribus magni ac densi cum feruore quodammodo prorumpunt, ac velut flammam quandam efflant, quando sunt, si quae alia febris, haec inducat, idque maxime in vigore, hominemque exurat, adeo ut se deundet, & abiciat vestitum. Quotidiana autem neque densam respirationem, neque crebras efflationes excitat. Atque ita de reliquis pronuntiandum confes: quamquam si quis omnia haec signa coniuncta velit, marasmodi febris optime conuenire dixerimus.

Ob quam causam.

IDQUE ex praescripto Hippocratis, qui singula momenta in agrotis perspicenda dicit.

Vbi verò febris fuit.

SVDORIS procreationem breuissime clarissimeque describit Hippocrates libro De flatibus,



statibus, & De morbis; dicit autem: Sudor fit hac de causa, quicunque morbi in indicatorum diebus indicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de punita & bile quod tenuissimum est eliquatur & secerunt, & secedit, partim extra corpus, partim intus, & isthic quod in corpore relinquitur, partim præ caliditate attenuatur, & vapor fit, & cum spiritu permixtum foras procedit; atque hæc quidem huiusmodi sunt, & ab his sudor generatur. Celsus adproliciendum sudorem, calidam potui dat, quod hæc humorum repletionem per balium quodammodo digerat, atque excalfaciat.

### Si sudare corpus cœpit.

NE videlicet sudore iam quodammodo concreto atque frigefacto pori obstruantur, atque adeo naturæ motus inturbetur intercipiaturque.

### At ubi sudor omnis.

QVOD nimirum aduersus vim febris, humiditas quæ unctione comparatur remedio sit: nam etsi Hippocrates libro De dieta, unctionem humectare, calefacere, & molliore dicat, intelligendum tamen est, non usque adeo calefactoriam esse, ut hinc periculum aliquod expectandum sit, quando idem senex quatuor Acutorum, febricentibus quibus inter initia tenues fuerant urinae, non purgabat, sed quieti permittabat, inungebat, & equaliter contegebat, mulsamque aquosam bibendam & prisanæ cremorem sorbendam dabat: quam curandi methodum hic auctor noster expressisse videtur; nisi quod pro aquosa mulsa, calidam aquam suo more substituerit, eamque potui det. Ac proinde, ut edeneniamus unde digressi sumus, non solum quod humectet, febricentibus utilis censetur unctio, sed quod demulceat ac leniat; quibus maxime opus est his quæ concoquuntur maturanturque; ad hæc quod modico calore humoribus vaporibusque discutiendis sit idonea.

### Cibus autem febricitantibus humidus.

FEBRICITANTIBVS (inquit Hippocrates sectione prima Aphorismorum, Apho-

rismo XVI.) omnibus victus humidus conuenit; maxime vero pueris, & iis qui tali victu uti consueverunt: si etenim febris calida, & sicca passio est, victus humidus, qui huic ex diametro opponitur, optime conueniet. humidum autem victum vocat, sicut rectè monet Erysius, eum potissimum qui potentia talis sit: quauquam si actu quoque humidus ac liquidus sit, plus proderit. Quod Celsus quoque voluisse verisimile est, quum dicit, aut humori certè quàm proximus. Proderit autem talis victus non solum ea ratione quod humectet, sed etiam quod facile concoquatur ac distribuatur. Ciborum autem facultates sigillatim hic recensere longius esset, quàm præsens exigat locus. quare si quis eorundem plenioris explanationem desideret, nostras in præcedentem librum Enarrationes consulat.

### ratione habitâ subinde & virium.

CONIECTVRARI enim, ut docet Hippocrates, oportet an æger cum victu sufficiat perdurare donec morbus consistat, & numquid prius ille deficiat, nec possit perdurare cum victu, vel morbus ante deficiat atque hebescat.

### Ponendi verò ægro varii, &c.

CONCEDO varietatem ciborum, si eisdem oculos tantum pascamus, ac varietate ciborum illecti, vnius alienius appetitus teneamur: nam alioqui nihil alienius à natura, quæ simplicissimis contenta est, quàm ferculorum opsoniorumque varietas: siquidem, ut auctor est Galenus commento in Hippocratem De ratione victus in morbis acutis, cibi multiplices, & præsertim qui facultate dissimiles sunt, magnam in ventre prægignunt perturbationem; quæ ad cibi concoctionem nihil aduersatur magis.

### ut neque increfcente morbo.

RECTE dicit impleri cibo, quando ante moderationem præscripserit pro ratione virium hominis & morbi: nam certum est quod



quod ad indicationem usque aliquid subtrahendum sit cito; si vires ferant, tenuissimo extreme victu in acutissimis morbis videntur esse.

atque id quoque videntur esse.

HOC ex methodicorum placitis sumptum est, ut docet Galenus primo De morbis & symptomatibus; illi etenim meatuum obstructioni, atque eorundem resolutioni, ac laxitati omnes morbos acceptos ferebant: quod quam sit à ratione alienum, facile intelligit qui in Galeno utcumque versatus est.

Nam si astrictum est.

OBSTRUCTIO citatiore alio aut urinae subitanea eruptione, aut sudore aut sanguinis etiam missione, nonnunquam discutitur. Caterum an coctio vehemens eidem prodesse queat, nondum satis assequor: nam si in febribus obstructio molesta sit, coctio aut agitatio vehemens adeo nihil profecerit, ut fomitem febrili calori potius addat, atque materiam crudam adhucdum distributioni non satis idoneam in venas totumque corpus rapiat, atque adeo obstructionem potius augeat. Quae de fame, sui vigiliisque subiungit, ante explicata sunt. De balneo autem quamquam praecedente libro abunde dictum sit, hoc tamen dixisse conveniebat, quod obstructionibus praesentissimo sit remedio: nam lassitudinem solvit; praesertim si calidum sit,

& humorum repletionem per halitum digerit, ac poros cutis obstructione liberat.

Contra verò si corpus, &c.

QUIES & somnus concoquunt, purgationes tam arte quam sponte provenientes repriment; motus contra easdem exagitat: nam, ut in Aphorismis Hippocrates, quoties magis purgare volueris helleborum, moueto corpus. indicat autem nauigatio turbatione moueri corpus.

Nam si venter fluit.

VETUS axioma est, fluxum fluxu sedari; sic fluxa alio laborantibus materiam auertimus, & vomitorium exhibemus; quamquam id non semper & ubique tutum sit: nam inflammatione vexatis praecordiis aut latere (ita enim praecordia dolentia intelligit Celsus) inflammatio vomitus exagitatione augeatur, & neque repida potio sufficiens erit ad compefendum malum, quum stomachum plane subuerat: quare & in his quibus nihil continet stomachus, repida nihil alienius est, ut praecedente libro dixi.

rosâ vel melino.

ROSACEI irroratio aut irrigatio non solum sudorem cohibet, sed & quodammodo suum mitigat: nam, ut auctor est Aetius, Inunctio rosacei, melini aut myrtini olei sudores cohibet, non solum sua frigiditate & astrictione; sed & emplastica qualitate praeditum est. Rosam autem hic aliisque locis Celsus pro rosaceo ponit.

## CAPVT VII.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

DESIDERAT etiam propriam animaduersionem in febribus pestilentiae casus. In hanc minimè vtile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere aluum. Si vires fiunt, sanguinem mittere optimum est, praecipueque si eum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut leuata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius,



turius, quàm in aliis morbis, ducere in balneum opus est, vinum calidum & meracius dare, & omnia glutinosa. Inter quæ quoque carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate rapienda sunt. Quòd si puer est qui laborat, neque tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, siti ei utendum est, ducenda aluus, vel aqua, vel ptisanæ cremore, tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri ut viri curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare vigilia, fameve, aut nimia siti, non vino curare satis conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est, deinde dandus cibus ex leuissimis, tum is dormiat: postero quoque die si febris manet, \*abstineatur. Tertio ad similem cibum redeat. Danda-  
que opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam ab-  
stinentiam cibosque opportunos, obmissis cæteris nutriatur. Si verò ardens febris extorret, nulla medicamenti danda portio est, sed in ipsis accessionibus, oleo & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt donec albescant, & conclauitendus, quò multum & purum aërem trahere possit, neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum leuibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est, alendus maturius est, id est, à die tertio, & ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata iam accessione, vomere cogendus est, & tunc dandum frigidum olus, aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum verò in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatem data pro medica-

\* absti-  
neat.



medicamento vtuntur. Vbi vtrumlibet factum est, multa veste operiendus est, & collocandus vt dormiat. Fereque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur, idque presentissimum auxilium est. Sed in his tamen in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non vlcus, non \* deiectio, non profluuium alui fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leuiter tussit, is neque vehementi siti conflictatur, neque bibere aquam frigidam debet, sed eo modo curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

\* deiectio,

#### ENARRATIO.

IN pestilentibus, inquit Aërius, & carbunculosis febribus venæ quidem sectio- nem adhibemus statim in principio; non autem cibi contractionem: fames enim peiorem materiam facit, & vires in his conscindit quas integras seruare volumus, maxime in pestilentibus.

aut medicamentis.

NESCIO quàm rectè Celsus in pestilentibus febribus vereatur medicamentis sollicitare aliam; præsertim quando Galenus, Aegineta, Aërius, & quotquot sunt alij, plenum corpus vacuant, impurum purgant, sicca humectant, vdaque exiccare non verentur; siquidem, vt rectè docet Ruffus, ventris summa habenda ratio est, itemque per urinas & ex toto corpore facta purgatio, aliaque in hoc casu viles sunt. Quanquam si ex debilitate virium malum aliquod in periculo sit, non admodum tuta erit alui per medicamenta purgatio, quemadmodum etiam si ex intemperie medicamenti purgantis plus periculi immineret, quàm lenamini ex materie peccantis ablatione. legimus enim in Epidemius quã fuerit multis perniciofa alui fluxus: Quare, consultissimum erit, ventrem astrictiorem mollire (vt vocat Hippocrates)

sorbitionibus attractorijs, ac cauere à vehementioribus illis pharmacis.

præcipueque si cum dolore.

PER dolorem, vt iam sæpius dictum est, inflammationem aut tensionem alicuius partis intelligere oportet.

Si id parum tutum est.

QUANDO tutum sit venam tundere, præcedente libro dictum est; ac quod in morbis constitutionibusque pituitosis non admittatur sanguinis missio, autè meminimus, & quod stomachus pituita fluctuans vomitu expurgandus sit, primo libro docuit Celsus, & sequenti capite demonstrat, quum dicit, Si pituita in stomacho coit inclinata iam accessione, vomere cogendus est: neque id iniuriã; quando videamus in pestilentibus febribus, sponte vomitiones non solum pituitosas, sed & biliosas fieri: non sunt tamen ad vomitum leui de causa urgendi.

Sed in hoc maturius quàm in alijs.

QUOD nimirum sudores foras euocant, ac materiam venenosam ab interioribus ad exteriora eliciant: quanquã & non inuisa futura



futura sint balnea, si leni fluxione vexetur alius; sicuti inidonea sunt, quibus eadem valde fluxa est, & qui ex sudoris copia animo facile deficiunt.

### vinum calidum & meracius.

**NESCIO** qua ratione in pestilentibus febribus vinum calidum & meracius dare praecipiat; quando alij omnes si ardore astuet eger, & flamma usque ad pectus peringat, potionē frigidam offerant; idque non in parua quantitate, nam magis hoc pacto accenditur febrilis calor, verum confertim, ut flammam exstinguat. nisi forte Celsum nostrum ad arcendam ulteriorem putredinem conservandasque vires meracum propinare dicamus, sicuti primo libro in conservatione à peste, idem alternis diebus modò aquam, modò vinum praescribit. Verum etsi quam maximè hoc concedamus, non poterimus tamen negare, quin vino materia febrilis augeatur intendaturque; adeò ut si deliria phrenitidesque non praecesserint, statim subsequuntur constans suspicio sit: auctor enim est Galenus, nonnullos ob merati vini potum liberaliorem in causam incidisse. Quare si in febribus aliquo modo conservandam virum gratia exhibendum sit, id erit tenue & oligophorum; neque enim quae in prophylactice bono sunt, in morbi curatione semper locum habent.

### & omnia glutinosa.

**GLUTINOSA** omnia carnem quoque eius generis exhibent, quod in stomacho non ita facile corrumpantur; praestaret tamen hoc exhibere quae parua mole multum nutrant, ut ita robori virinum consulum foret, & ne copia cibi vires, cum ad grane aliquod onus fatiscerent.

### Nam quo celerius.

**CELSVS** hic eam quae ex anni temperatibus oritur pestem tantum videtur intellexisse: quae, si Galeno credimus, inter omnes periculosissima est, ac extremos habet labores; ac proinde exirentē exquisitè remedia

efflagitat: adeò ut non oblata commoda occasione, non habita morbi ratione, intemperatum nonnunquam temerariumque remedium (ne vi morbi suffocetur eger) experiri satius sit quam nullum.

### Quod si puer est.

**QVOD** in pueris sanguinem mittere liberum non sit, dictum est: at quod iisdem pestilenti febre correptis sitis iniungenda sit, non omnino verisimile videtur; praesertim quando Hippocrates febricitantibus victum humidum, idque maximè pueris & qui tali victu vii consueverunt, vilem dixit. Nisi forte quis Celsum pueros sui lacessendos dixisse dicat, quod quum temperie humidiorē sint, egeant conversione quadam in diuersum, quod & calor ipse febrilis, & abstinentia potus facillimè efficiant. Pones alios tamen iudicium esto, sitisne an moderata potio iisdem praescribenda sit: nam & paulo post, nimia sitim in pueris suspectam habet.

### ducenda aluus.

**PTISANA** viscositas, ut auctor est Hippocrates, lenis est, continua, iocunda, lubrica, & mediocriter humens, sitim minimè infert; & si quid abluī debet, probe abluī; neque astringit, neque malè turbat, neque in ventre tumescit. Bene ergo Celsus ptisana cremorem ut medicamentum & cibum propinat; neque enim vehementiora tolerint, quum substantia eorum continue differunt. Rectè etiam parcius in eis agendum est, tum ob vitæ antea consuetudinem, tum ob vires, tum ob corporis constitutionem: nam quum ad somnum propensi sint, vigilias non ferent; & quum natura voraces sint, inedia famem nullo modo tolerint: nam qui crescunt, ut ait Hippocrates, plurimum habent calidi innati, plurique indigent alimento. & alio loco, Senes, dicit, optimè ieiunium ferunt; secundo loco qui aetatem consistentem habent; minus adulescentes; omnium minimè pueri, praesertim qui inter ipsos sunt vinctiores.

q.

non.



non vino curare satis

conuenit.

NIHIL pueris eque aduersatur quam vinum; adeo ut Galenus vinum pueris datum aequiparet oleo quod igni infunditur. Vomitus autem provocandus post febres dicitur, tum ut si quæ cruditatis suspicio in ventriculo sit, per vomitum expellatur; tum ut biliosa, quæ stomachi villis adhærere solent, una reiciantur.

Si verò ardens febris.

PANTINVS hic mendum subesse suspicatus, si verò febris ardens exercet legendum censeret: ego sane (ut eius bona eius venia dicam) quemadmodum meum habet exemplar, extorret legere malim, quod tamen τὸ νόστον τοῦ διδασκάλου, (ut sunt lingua ariditas, crassities & nigredo, deiectiones pallide, sitis vehemens, ventriculi rosis, vigilia deliriumque) torrefactionem quandam præ se ferant.

nulla medicamenti  
danda portio.

PRIMA in ardente febre auxilia sunt, ut ex Philumeno Aetius, decubitus in locis frigidis qui ad purum aerem patent ac persflantur, stratum molle ac sæpius renouatum, amicula assidue permutata, & sariæ gracilia non sordida, lectus sit abunde amplius, quæ possint membra calefacta subinde ad alias atque alias eius partes transferri; & per flabellum aer ignior concietur: epithemata pectori ac stomacho conueniunt imposita, palmule cum vino aut rosaceo aut melino trita. sunt & frigescentia comoda; velut sunt pampini vitis triti, seris, polygonum, plantago, ramenta cucurbitæ, ruuex acutus. Singulis autem admisceantur mica panis præmadefacta, aut polenta. oportet tamen assiduos horum usus vitare. Celsus conclauit in quo liberum aerem trahere possit, contentus, lecti, cuius non parua habenda est ratio, non meminit.

alendus maturius est.

MATVRAM cibationem vocat, non præ-

properam, sed quæ cum præmeditatione in tempore, hoc est, post elapsos dies indicatorios, ut virium robur impedimento sit, fiat. sic Hippocrates sorbitionem, nisi dies indicatorij transierint, non dat.

si pituita in stomacho coit.

CELSVS hic per pituitam non quamvis sed saltem tantum quæ ardentis febris nonnunquam origo est, intellexisse videtur. Sic Hippocrates non solum si pituita in stomacho coit, sed & si os amarum fuerit, clysteres & vomitiones conferre dicit, quod videlicet quæ os amarum reddit, vomitione & enematis expurgetur.

& tunc dandum.

SCILICET ut expurgato illo falso humore, robur ventriculo addatur, obviandaque falsedo, & ne vomitione inanius ventriculus exsicceat.

Si siccus manet stomachus.

NIHIL est quod exucis exhaustisque partibus magis commode quam cremor pituitæ hordeaceæ, quum mediocriter humidus sit, lubricus & viscosus; cui recentè adipem admiscendum suadet, ad maiorem humectationem.

Cum verò in summo  
incremento.

SOLO frigide potus extinxisse se ardentissimas in tota febris, auctor est Ægineta. Tempus autem exhibitionis frigide est, in stante vigore totius morbi. Canendum tamen est ne principalis aliquod viscus afficiatur, ut docet Galenus libro Methodi; exhibendumque est quantum æger bibere potuerit: nam, ut docet Hippocrates, hinc aqua melleæ, coctæ, & aquosæ quantum voluerit bibendum datur: siquidem (ut Galenus De differentiis febrium primo XII. capite) in hecticam febrem ferè incidunt ex acuta ardentique febre plerique eorum qui male curantur, maximeque qui frigidam aquam ubi postulassent, adeo nihil eiusmodi biberunt; ut nec



ut nec ullum aliud infrigidans remedium thoraci aut hypochondriis adhibereur.

& cum iam venter.

**AQVA** quod natura frigida sit tarde penetrat; & quum quam plurimo tempore in praeordium maneat, corrumpitur, atque obstructions parit: quare Celsus post perfectam refrigerationem, ne obstructione vexetur hepar aliisque viscera, vomitionem praescribit. Aëtius, si quid sit quod frigida potioem vetat, eandem temperat cum quintuplo aquae calidae, aut cum modico olei rosacei: Nam ipsum, inquit, rosaceum, non valde frigefacit, & oleositas eius corporis inuis obita, non permittit ipsa à frigida aqua ladi; & simul firmitatem quandam exhibet ventri rosaceum, & lubricitatem propter oleaginositatem.

**Ubi utrumlibet factum est.**

**VT** ardens febris perfecte solvatur, è duobus alterutrum fieri necesse est: aut enim extinguendus ardor est; aut biliosi humores excernendi sunt: excernuntur autem vomitione, sudore, & alui excretionem. Sudorem hic mouendum dicit Celsus febre in vigore existente, aut concoctionis signis in urina ap-

parentibus, si non sit visceris alienius inflammatio, aut tumor: quamquam & id quoque balneo tentasse proderit; nam praeterquam quod sudores pronocat balneum, quibusdam etiam per alium biliosas deiectiones mouet.

**Si quis autem in huiusmodi febre.**

**CELSVS** hic Hippocratis Aphorismum quodammodo innertit: nam is sectione quarta Aphorismo LIIII. Quibus, inquit, plurimum secunda tussis leuiter irritantes in febribus ardentibus sunt, non multum siti instantur: neque id mirum est, ut docet Galenus: nam si tussis eiusmodi fiant, aut ob humidam intemperiem instrumentorum respirationi inferuentium, aut ob tenuem aliquem paucumque humorem in faucium asperitates distillantem, necessum est tussim parnam esse, madefactis locis quae ad asperam arteriam pertinent. frustra ergo Celsus monet hosce non granandos vehementi siti, nec propinandam frigidam, quod per se ipsi, ut rectius monuit Hippocrates, siticulosi omnino non sint, & fauces affectae frigidam non admittant. Quo fit ut suspicer periodon hanc à sciolo quodam assutam potius, quam à Celso ita pronunciatam; praesertim quando Pinzani exemplar eam omittat.

## CAPVT VIII.

*Curatio semitertianae febris, quae hemitritaeos dicitur.*

**AT** ubi id genus tertianae est, quod hemitritaeon Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumque frequentiores accessiones, decessionesque, ut aliud morbi genus videri possit. \* porrigiturque febris inter horas viginti quatuor & triginta sex, ut quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quae vera est: & ubi ea venit, protinus dari, plurimique sub alterutro curantis errore subito moriuntur.

\* porrigaturque f. i. h.



tur: ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tum dari cibus, qui neque incitet febrem, & tamen longum eius spatium sustineat.

## ENARRATIO.

**D**E semitertiana natura, prolixè admodum contra Agathinu libro De differentiis febrium secundo, capitibus VIII, IX, X, & XI. agit Galenus. Est autem duplex modus generationis eius, aut dualis exacerbationibus, uno tempore incidentibus, aut statim ab initio utrisque inter sese permixtis. Quando igitur tertiana præpoller febris, magis horrida efficitur febris, & rigoris etiam nonnihil per accessionem affumit; quando autem quotidiana superat, perfrictiones quidem summa exercent, pauci vero horrores. At ubi æquales magnitudine fuerint & tertiana intermittens & quotidiana continua, inuasio exacerbationis cum horrore contingit, vocaturque semitertiana exquisita: Hippocrates horridam vocare solet, quod per totam ferè accessionem prodigatur horror; dicit enim: Febris horrida, continua, acuta omnino non intermittentes; modus erat semitertianus, uno die leniores, altero grauius iterum inuadentes.

## Et magnopere necessarium est.

GALENVS undecimo methodi sub finem, cibandi opportunissimum tempus in omnibus febribus describit. Scribit autem in hunc modum: Porro aptissimum in febribus quæ intermittunt & repetunt, tempus est, quum exhalare iam cœperit febrilis calor; statim enim corpus ad nutrimentum præparant. Huius quoque opportuno tempore ex duplici

coniectato respectu, nempe summo præcedentis accessionis vigore, & futura principio, ad hæc namque spectantes operam dabimus, ut quam longissime ab utroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum; facile est idoneum tempus inuenire. sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, ut aut ægrum admodum adhuc calentem nutrias, aut sequentis accessionis inuisione iam iam affutura.

## Ac nisi magnopere aliqua res prohibet.

SEMITERTIANA quando ex tertiana intermittente & quotidiana continua fit, curationem mixtam quodammodo sortitur, nam neque tantum refrenande bilis acrimonia, atque calori incumbendum est, quantum in tertianis exquisitis; neque usque ad incidentibus atque secantibus medicamentis, ut in quotidianis opus est: sed iis quæ medio quodam ordine inter hæc situata sunt. quare rectè inter initia, quando videlicet in non intermittentibus febribus phlebotomamus, nisi quid obstat, sanguinem mittendum monet. Nam etsi sanguinis missio in tertianis exquisitis à Galeno parum probetur propter bilis acrimoniã, in semitertianis tunc adhibetur, quod bilis aliqua ex parte refrenata sit, accessione pituitosa materia.

## CAPVT IX.

## Curatio lentarum febrium.

**N**ON NVNQVAM etiam lentæ febres sine vlla remissione corpustenent, ac neque cibo, neque vlli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mueret. For-



tet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniam interdum sic euenit, vt horror oriatur, & fiat initium quoddam noui motus, exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo, & sale, salubris videtur. At si diu frigus est, & torpor, & iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercules ista curatio noua est, quæ nunc quidam traditos sibi ægros (qui sub cautiorebus medicis trahebantur) interdum contrariis remediis sanant. Si quidem apud antiquos quoque ante Herophilum & Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit *πέρπον* quidam, • Petro qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis vestimentis operiebat, vt simul calorem ingentem, sitimque exciteret. Deinde ubi paulum remitti cœperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum iudicabat: si non mouerat, plus etiam aquæ frigida ingerebat, & tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam assam, & vinum homini dabat. Si non liberauerat, decoquebat aquam sale adiecto, eamque bibere cogebat, vt mouendo ventrem purgaret. Et intra hæc omnis eius medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est his quos Herophili, vel Erasistrati æmuli, diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principiis excepit, interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, ferè quos ratio non restituit, temeritas adiuuat. Ideoque eiusmodi medici melius alienos ægros, quam suos nutriunt. sed est circumspecti quoque hominis; & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere: quia curationem ubi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurum est.



## ENARRATIO.

**P**ER lentas febres hoc loco Celsus quotidianas continuas intelligit; ea enim si reliquis comparentur, accessiones lentas magis faciunt, & in longius tempus protrahuntur: ac proinde quando quotidiana continua, praeterquam quod ingi paroxysmorum insultu vires prosteruat, ac medicamentis cibationique tempus nullum concedat, & in longius quam vires citra refectioem ferant, protrahatur tempus, medico inprimis id conandum suadet, ut morbus immutetur; ita videlicet, ut ex continua intermittens procreetur: sic enim fiet, ut & cibationi & remedio locus sit.

Saepe igitur ex aqua frigida.

**V**ERVM quidem est horrore superueniente posse sanari febrem continuam: si quidem, ut ait Galenus libro De sympt. causis II. cap. VII. ardentem febrem rigor succedens soluit, auctore Hippocrate, quod bilis qua interim in venis continebatur, a natura per carnes ad cutim indicatorie excutatur. & secundo libro Crisium cap. 111. dicit, In aduentibus febribus singulae accessiones ad integritatem non perveniunt, quoniam qui earum causa est humor, non expurgatur, sed una cum sanguine in venis continetur. Verum quando in his bilis vehementius agitur, ac veluti effervescent, quoniamque a natura invalescente impellitur, tum rigor supervenit, & febris soluitur; idque eo magis si signa concoctionis praecesserint, & die critico fiat: nam aliqui Hippocrates suspectos habet rigores, atque indicium difficile asserere dicit, qui diebus parvis sunt. Et ut ad auctoris nostri sententiam veniamus, nondum induci possum ut credam, laudandum rigorem, qui ex perirratione frigida oritur in continuis febribus, quando is horror fiat po-

ius ex repercussione quadam contractu frigida, quam ab expulsiōe materiae febrilis ad exteriora. Lauderim igitur frictionem magis ex oleo tenui, ut quae possit cutim relaxare, & per halitum digerere.

non alienum est in ipsa febre.

**Q**UI mulsi, febriumque naturam perspectam habuerit, satis intelliget quam conveniat in ipso febris insultu cyathos tres aut quatuor mulsi propinare: sed nec in ipsa febre tutum erit cibum exhibere, etque admiscere vinum admodum dilutum, quamquam consultius fuerit (si modò alterutrum concedendum sit) dilutum vinum exhibere, quam mulsum. quare si reliqua quae sequuntur ordine methodum aliquam praeseferrent, pro mulso, nullam substituerem, acutè febricitans non inconvenientem: verum quoniam quae subiungit, omnia ferè à vera methodo quam alienissima sunt, nihil imminuere statimur; ut videant quibus aliquid iudicij superest, quam liberè quondam (quod & nunc quoque nonnulli aegritae cum maxima impunitate faciunt) aliorum periculis experimenta conquisiverint. Nam quis nisi amens sitim per se aliqui satis molestam excitabit in febribus? quis cyathos aliquot mulsi febrilis caloris fomitem in ipso febris impetu ingeret? quis demum vinum, & suillam assam ex febrilibus conualescenti propinare audeat? Quare si quis exactiorem curandi febres methodum desiderat, Galenum consulat: neque enim consultum est, morbum augere, febreque accendere; sed veri medici est, ardorem ipsum, febreque demulcere, atque obviat in morbo, nec quoquo modo eundem exagitare, ne morbi violentia vires collabantur.

## CAPUT



## CAPVT X.

*Remedia in febris ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem  
& scabritiem lingue.*

CONSIDERANDUM etiam est febre sine sola sint, an alia his quoque mala accedant: id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, \*rosam cum aceto miscere oportet, & in id \*ingere, deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis longitudinemque æquent. Ex his inuicem alterum in aceto & rosa habere, alterum in fronte, aut intinctam iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo: si ista parum iuuant, teri potest vel iris arida, vel nuges amaræ, vel quælibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus, vel cum rosa, cerussa, spumæve argenti. Olfacere quoque vel serpyllum, vel anethum non alienum est. At si in præcordiis inflammatio & dolor est, primò superimponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eò materiæ concurret. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida & humida veniendum est, ut ea quæ remanserint, discutiant. Notæ verò inflammationis sunt quatuor, rubor & tumor, cum calore, & dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum præcordiorum dolor est, protinus calidis & siccis fomentis uti licet. Si verò lingua sicca est, & scabra, detergenda primò penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mistis inter se rosa & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterfa est, ungi ros. debet, cui ceræ sit paulum adiectum.

\*ros. id est,  
rosaceum  
\*ingere  
duo pitacia.

ENAR-



## ENARRATIO.

**H**ic semel monendum est, uniuersalia dicta remedia, particularia semper praeferre debere. Quare nihil applicandum etiam maximè dolenti capiti, nisi post conuenientem materiae euacuationem, & in accessionum declinationibus; ac tum quidem commodè sime rosam, hoc est oleum rosaceum, fronti temporibusque applicabimus; digerit enim atque repellit: atque ei iure admiscemus acetum, tum quod genuina quadam facilitate, capitis doloribus sedandis accommodum sit, tum quod rosaceum oleum sua tenuitate ad interiora deducat. exhibemus autem hac si aestas sit, & febris calida, frigida; si hiems, neque aduersus febris, calida aut tepida.

vel iris arida.

**Q**UOD iris capitis dolores sedet, auctor est praeter alios Dioscoridos; qui eandem cum rosaceo & aceto capite dolentibus utiliter illini dicit: Pliniusque, qui illam cum coronis & struthis illinit. Verum an rectè frigidis ascripserit herbis, alij diiudicent: clarum siquidem est ex ordine calefacientium irin esse. Hic etiam expendendum moneo, num satis rectè amarum nucem inter refrigerantia collocarint; quando omnes quatuor sunt, (sola Anacardos excepto) amara calida esse pronuntiari.

Iuuat etiam panis.

**I**D tantum faciendum est si dolor vehementius ingruat, & si aestas sit: nam, ut docet Aëtius, si dolor capitis vehementius incumbat, hyoscyami folia viridia, aut papaueris cum micis panis conueniunt.

Olfacere quoque.

**Q**UOD serpillum capite dolentibus rectè applicetur, docet Dioscorides: Serpillum, inquit, capitis dolores sedat coctum, adiecto rosaceo, & aceto madefactum, potum & illitum, atque idem plane testatur Plinius & Aëtius, ac Paulus ex Æginâ medicus. At

quod anetho non solum discutiendi, sed & somnum conciliandi facultas insit, priore libro dictum est.

At si in præcordiis inflammatio.

**Q**UID si inflammatio, & quæ eiusdem nature, docet Galenus initio XIII. Methodi Therapeutice; & quod hæc non solum febres subsequatur, sed & easdem pariat, praesertim si viscera occupat, clarius est quam ut longiore egeat enarratione. Adhibemus autem in principis inflammationis reprimentia, quod fluxum materiae impediunt, atque ipsius inflammationis impetum compescant. In augmento post principia, reprimentibus discussoria sunt admiscenda, uti in vigore, dum vehementissimi sunt dolores, mitigatoria applicamus; in declinatione verò ea quæ discutiendi vim habent. Celsus primò cataplasmata reprimentia ponit, deinde ad ea quæ calida & humida sunt venit, ut eadem inflammationis reliquias discutiant.

Ergo si sine inflammatione.

**H**IPPOCRATES ait: Quibus circa præcordia dolor sit absque inflammatione, iis febris superueniens morbum soluit: flatuosus enim spiritus, aut inæqualis interperies, quæ doloris causa fuerat, calore febrili dissipatur.

At si neque.

**C**ALEFACERE præcordia, cataplasmatibus, irrigationibus aut fomentis, non semper tutum est; sed in iis tantum, in quibus nulla superfuit asin corpore oberrat.

Si verò lingua sicca.

**L**INGVA in febribus, ut docet Aëtius, aliquando siccat, & opus habet humectatione; aliquando verò exasperatur magis aut minus, aut diffingit, aut nigrescit, aut carbonis speciem induit, quod a viscerum inflammatione



inflammatione contingere solet. Paulus non solum deterget & inungit linguam, sed sternutationes pronocandas dicit, quod linguas quous alio plenius humectent. Decu-

ritum præterea in latum connenire docet: nam supinus cubitus exiccat. adhuc iubet ut conneniente ore iaceat; hiatus enim madorem assumit.

## CAPUT XI.

*Remedia contra frigus, quod febrem præcedit.*

**S**OLET etiam ante febres esse frigus, idque vel molestissimum morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. Hæc enim paulo antè data, multum mali adiicit. Item maturius veste multa tegendus est: admo- uenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fo- menta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increſcant. Perfricandæ quoque eæ partes mani- bus vinctis ex vetere oleo sunt, eiſque adiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentique medici quidam vna frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissioni- bus, nonnulli tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiam num- vltra manente febre dant. Deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido, & \* leni. Ego tum hoc puto ten- tandum, cum parum cibus semel, & post febrem datus pro- dest. Sed curiose perspicendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis iam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remis- sioni credendum est, quæ etiam immoratur, & iactationem faectoremque quendam oris (quem ὄζον Græci vocant) mi- nuit. Illud satis conuenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie paruum cibum dandum: si impares, post grauiorem, cibum; post leuiorem, aquam mulsam.

## ENARRATIO.

**Q**UOD ante frigus, & in ipso frigore ab omni potione abstinendum sit, capite sexto dictum est.

aliquid ex calefacientibus.

QUALIA sunt, piper, castoreum, ca-

chry, chamæmelum, & id genus alia.

Sæpe enim.

EXEMPLARIA hic variant: nam om- nia ferè iam minimi legunt: Pinzaunum reliquis melius iam minui febris habet.

r

CAPUT



*Curatio horroris in febris.*

**H**ORROR autem eas ferè febres antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoque tutissimæ sunt \* maxime quæ curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alui ductio, neque balneum, neque vinum, neque medicamentum aliud rectè datur. Incertum est enim quando febris ventura sit: ita fieri potest, ut si subito venerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilij causa sit inuentum. Nihilquē aliud fieri potest, quàm ut primis diebus bene abstineat æger, deinde sub decessu febris eius, quæ grauissima est, cibum sumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur, quia facilius proponere nobis & accessionum & decessionum vices possumus. In his autem cum veterauerunt, utilis fames non est. Primis tantummodò diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, & antè horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam, subsalsam, & vomere eum cogere. Nam ferè talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu æquè cessit. Sæpe enim sic discutitur. Iamquē quod genus febris sit, scire licet. Itaque sub expectatione proximæ accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est, dandaquē opera est, ut per tempus horroris in folio sit. Si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat, siquidem eo quoque modo sæpe \* id discutitur: si nec balneum quidem profuit, ante accessionem allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, siquidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequàm inhorrescere possit, operiatur. Fomentisquē protinus validioribus totum corpus circundare conuenit, maximequē inuolutis extinctis testis & titionibus. Si nihilominus hor-

\* maxime-  
que cur.

Vomitus.

\* ita



nus horror perripit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui æquè ex calefacientibus aliquid sit adiectum, adhibeaturque frictio, quantam is sustinere poterit, maximeque in manibus & \* pedibus, & spiritum ipse contincat, neque desistendum est etiam si horror est. Sæpe enim pertinacia iuuantis, malum corporis vincit. Si quid euomuit, danda aqua tepida, iterumque vomere cogendus est, vten-  
 dumque eisdem est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horror quiescit: siquidem id quoque exonerato \* corpori prodest. Ultima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio & \* frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maximè dandus est, qui mollem aluum præstet, caro glutinosa, vinum, cum dabitur, austerum.

\*cruribus,

\*corpore

\*gestatio.

al. itio vel  
deambu-  
latio.

## ENARRATIO.

**I**AM sapius dictum est Celsum indifferenter horrorem, pro rigore ac horrore febrili ponere: Hic autem semel dixisse conuenit nec frigori, nec rigori qui crisis ratione promeruit occurrendum, nec eius vehementiam obtundendam; verum ei tantum qui ex frigidissima copiosissimaque pituita oritur.

## Ideoque tutissima sunt.

**R**ECTE Pantinus hic mendum subesse dicit, legendumque maximeque: nam notus est Hippocratis Aphorismus, Febres quocunque modo intermittentes minus periculose.

## In his autem.

**I**UXTA illud Hippocratis, Viçtus tenuis in morbis longis semper periculosus.

## Primis tantummodò diebus.

**C**IBATIONIS tempora capite sexto abundè explicauimus.

## Igitur cum primum.

**A**N vomitus biliosus horrore magnopere conducatur, deliberandum censeo; præsertim quando materia horrida non in stomacho sed in ventis potius consistat, ut cuius, qui rigoris horrorique originem perspectam ha-

bet, planum est: rigor siquidem fit, ubi à ventis per insensiles partes, bilis veloci motu ad exteriora feritur.

## Itaque sub expectatione proximæ accessionis.

**A**VDI quæso Galenum an ubique conueniat balneum: scribit enim in hunc modum libro decimo Methodi: Horrore sanè causam esse dico rodentium excrementorum confertim actarum citatiorem motum. Proinde quibus est horum abundantia, caro verò ac cutis densa, siue balneum sint ingressi, siue steterint in sole, siue quoquo modo vel gestati vel perfricti vel exercitati fuerint, vel vehementius dimoti, utique iis horror incidet. Contrà quibus hæc pauca sunt, & corporis habitus ut remittatur laxeturque à balnei calore promptus, non modò non horrent, sed etiam meliores redduntur; vitæ excrementis ob id vacuatis. Quo rationalius est, nec in febrilis significationis principio, nec in incremento quisquam agrotantem lauet: Quippe densata est hoc tempore coarctataque & cutis ipsa, & qua sub hac habetur carnea substantia. Frustrà igitur sub expectatione tertie aut quarte accessionis in



uis in balneum deducendus est aeger, nisi morbus ipse iam inclinaverit, ac cutis ipsa rara ac perspirata facilis sit, atque humores tales sint, qui nec copia, nec qualitate motum naturae aliquo modo impedian.

ante accessionem allium edat.

QVOD de balneo iam diximus, idem de allio quoque & aliis quae subiungit Celsus, pronunciandum cenſeo: nam si cutis astricta sit, atque ante totius morbi remissionem, aut allium aut simile quid propines, quod mate-

riam ad exteriora propellat, non solum non curabis horrorem, sed eundem augebis; ex horrore rigorem faciens, materia confertim illuc lata: huc adde, qualitate ipsius allij calida, febrilem calorem auget. Satis igitur fuerit ante accessionem cutem abrotano, calamintha arida, thymbra tum floribus, tum folijs, vel costo vel pyrethro, viroque quidem horum cum oleo perficuisse; id namque optimè conueniet, ut testatur Galenus, tum quod poros aperiat atque referet, tum quod leuiter materiam peccantem euocet atque eliciat, & corporis superficiem vinido quodam colore perfundat.

### CAPVT XIII.

#### *Curatio quotidiana febris.*

**H**AEC ad omnes circuitus febrium pertinent: discernendae tamen singulae sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet, tum cibis altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum & vinum, magisque si horrore sublato haec superest.

### ENARRATIO.

**C**ELSVS hic suo more diatrivo plus satis tribuit: nam quantumuis attenuantem victum desiderent quotidiana febre laborantes, triduanam tamen inedia non facile sustulerint. Danda igitur opera est, ut non solum tenuem, sed & incisiorum praescribamus; deinde sub statum vomitorij &

pituitam purgantibus medicamentis vtendum est; ac demum, si nulla supersit cruditatis suspicio, morbisque ipse in longius protrahatur tempus, non fuerit inconsultum experiri balneum siccum, ut antea noster ostendit.

### CAPVT XIII.

#### *Curatio tertiana febris.*

**S**I tertiana verò, quae ex toto intermittit, aut quartana est, medijs diebus & ambulationibus uti oportet, aliisque exercitationibus & vntionibus. Quidam ex antiquioribus medici.



dicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod quamvis pleraque eius viri præcepta secutus est Asclepiades, rectè tamen præterit. Est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere, quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & vinum. Sexto die in lectulo \* detineri. \* detinere. Sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse verisimile est. Tutius tamen est vt \* ipso ordine vtriusque \* hoc ipso mur. Tria remedia, vomitus, alui ductionis, vini potus per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare, nec vinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si verò primis diebus discussus morbus non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam: postero die, quo \* cibo vacat & ab exercitatione vñctioneque, aqua \* à cibo tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si verò imbecillitas vrgebit, & post febrem vinum, & medio die paulum cibi debebit assumere.

## ENARRATIO.

**L**EUES obambulationes, & qua citra laborem defatigationemq; obveniunt, in febribus intermittentibus concedi possunt; si tamen vehementiores sint, ac lassitudinis sensum quodammodo inducant, periculo non vacant; potissimum quando quies, vt qua humectet, febrientibus optimè conueniat: nam, vt in Epidemias testatur Hippocrates, somnus & quies conueniunt.

## Quidam ex antiquioribus.

**V**IDETVR hic contrarium quodammodo innuere quā Hippocrates segmento Aphorismorum VII. ubi in hunc modum scriptum reliquit: Si febris non ex bile nata sit aqua copiosa ac calida affusa bilis soluitur. nam eo Aphorismo Hippocrates (vt seire do-

cet Philotheus) putridas febres qua in humoribus consistunt, bilem pro reliquorum humorum exemplo ponens, secludit: atque vtile dicit balneum, diuini hecicisq; febribus, & in qua ex lassitudine, vñctione, obstipatione cutis in febrem incidunt. Non nego tamen esse putridas in quibus concedatur balneum, sicut rectè dicit Galenus, sed in habenda ratio est, vt putridi omnes noxique humores prius expurgati sint; de tum quidem horandi sunt ægri, vt quantum eius fieri potest, in balneo morientur. Sed neque aberrauerimus, si bis lauerimus eos qui balneum amant, & que affueri sunt. Est autem balneum ex aqua potabili & calida; tale enim bilis aliquid educit, & humectat, atque facultate refrigerat.



deinde vinum dabat.

VINUM priusquam morbus concoquat-  
tur (inquiunt Galenus, Aëtius & Aegineta)  
ex toto circumcidendum est, simulatque con-  
coqui cœperit: tenue aquosum modicum pri-  
mo exhibendum est; prope solutionem verò  
uberius. quòd alluisse videtur Celsus, dum  
nisi die septimo post accessionē concedendum  
dicit quando in tertianis concoctionis puris  
manifesta signa apparere solent.

Tria remedia.

QUAE in supremum ventrem confluunt,  
consultum est per vomitum euacuare, in ipso  
accessionis initio, ut auctor est Galenus libro  
Quos purgare oporteat, quòd sub id tempus  
natura illuc bilem protrudat. Quae verò per  
infernum subeunt, similiter per infernam  
excretionem in accessionis remissione, quòd

natura tunc humorem peccantem, aut ad  
cutem, aut ad inferiora pellat: tentabimus  
autem id potius enematis, quam catharti-  
cis per superiora ingestis, ne violentia pur-  
gantis medicamenti angeatur febris. Omi-  
sit autem hic Celsus sudores, & urinae ex-  
cretionem, quae sola nonnunquam à febris  
liberant: quare & diuretica exhibenda sunt,  
& sudor omnibus quo ad fieri potest modis  
eliciendus est.

aqua tantum contentus  
conquiescat.

ISTVD quidem si nulla suspicio sit in-  
flammationis obstructionisve alicuius visce-  
ris, non prorsus alienum erit, ut quod inflam-  
mationem arceat: verum quoties alterutra  
iam inuaserit, non sine periculo sumetur.  
Rectius ergo ptisana cremorem aut acetum  
mulsim exhibuerit.

## CAPVT XV.

### Curatio quartanae febris.

EADEM in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tardè  
admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligen-  
tius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igi-  
tur si cui cum horrore febris accessit, eaque desiit, eodem die,  
& postero tertioque continere se debet, & aquam tantum-  
modò calidam primo die post febrem sumere, biduo proxi-  
mo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die  
cum horrore febris reuertitur, vomere, sicut antè præceptum  
est: deinde, post febrem modicum cibum sumere, vini qua-  
drantem. Postero tertioque die abstinere, aqua tantummo-  
do calida (si \* sitiet) assumpta: septimo die balneo frigus præ-  
uenire, abstinere, continere se debet, & aqua \* tantummodò  
calida, si sitiet: ac tum ita \* septimo die balneo frigus præue-  
nire: si febris redierit, ducere aluum: vbi ex eo corpus con-  
quieuerit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo  
sumere cibum, & vinum, biduo proximo se abstinere, fri-  
ctione seruata: decimo die rursus balneum experiri: & si po-  
stea

\* sitis est)

\* uti tant.

\* nono  
al. octauo



stea febris accessit, æquè perfricari, vinum copiosius bibere: ac si proximum est, \* quies tot dierum, vt abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si verò nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus. Idque agendum, vt quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quominus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam aluum, deinde abstinendum vsque in septimum diem dixit. Quod vt sustinere aliquis possit, tamen etiam febre liberatus vix refectiōni valebit. Ad eò si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante febre, neque post eam tentandum erit, nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem quæ suprà præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febre oportebit vngi, & vehementer perfricari, cibum & validum & fortiter assumere, vino vt quantum libebit, postero die cum satis quieverit, ambulare, exerceri, vngi, perfricari fortiter, cibum accipere sine vino. Tertio die abstinere. Quo die verò febre expectabit, antè surgere, & exerceri: dareque \* operam non oportet, vt in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. Sic enim sæpe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum demum se recipere. In eiusmodi valetudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibum, vinum. Si venter astrictus est, soluendus est. Sed hæc facile validiores faciunt, \* si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est: si hæc quoque vehemens onerat, intra quietem, & vñctionem, & cibum sistendum est, dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem iugular, sed si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est. Quod tamen nisi culpa vel ægri vel curantis \* nonnunquam fit.

## ENARRATIO.

QUANTVM hic passim à vera methode deniet Celsus, qui aliqua ex parte in Galeno versatus est, facile intellexerit: nam præterquam quòd diatrikon quandam hic, vt in alijs, sūdeat inculcare, totam etiam methodum inuertit, ac præposteram quandam



quandam curandi rationem inuebit; in ea præsertim febre, quæ summam diligentiam exactissimamque iudicium, & maximam in morbis exercitationem requirit: quum quæ tanta talis sit, ut leniter blandèque tractari velit, quod nimirum humor qui eam efficit, difficile medicamentis obtemperet: ægrè enim per initia, & antequam concoctionem sit expertus, trahens medicamentum sequitur; tum propter crassitatem ac frigiditatem; tum quod vias angustas per quas transit obstruat; tum quod in carnoso genere resideat, & infarsus meatibus sit. Non sunt igitur quartanarum excuriendi media in principis: & neque post decimum quartum diem crasso cito atque eo fortiter assumpto (ut paulo post dicitur) rescindi; verum per initia (sic tamen ut in accessibus abstinemus) adhibendum est cibis boni succi, omni flatu expers, qui quæ vires quæ longitudo morbi sufficiant seruet æqueatque, atque sanguinem sua substantia augeat. In vigore tamen morbi, ut in reliquis omnibus febribus, tenuiore victu utendum est, inbendique sunt ægrum diu quiescere, tantum abest ut exercitia hic quicquam prosint. Ceterum quod de calide propinatione dicit, id quidem nonnunquam, si natura ad vomitum propiniores sit, a cibo faciendum est, ut quæ cum ingesto cibo per vomitum noxi humor educatur.

### Septimo die balneo frigus præuenire.

GALENVS De arte curatiua ad Glauconem primo, A frictionibus inquit, balneis, ambulationibus, aliisque consuetis, ægrum penitus non sunt; verum si a balneis abstinere omnino possent, solis contenti frictionibus, plurimum inuarentur, quod videlicet, quatenus refrigerent, balnea obsum; quatenus autem foras euocant, obstructionis periculum afferunt, maximeque si corpus redindat excrementis crudis.

### si febris redierit, ducere aluum.

QVVM atra bilis, quæ quartanæ origo est, alias ad entim feratur, nunc ad stomachum.

chum, nonnunquam etiam in venis visceribusque, lique præsertim, deliceat; diuersos purgandi scopos requirit. Bene igitur adhibetur frictio ad euocandum si quid ad eum latum sit: nec inconsultum est propinare medicamenta purgantia, ut si quid per aluum expurgari possit, purgeatur. Verum an id a septimo statim die faciendum sit, non possum induci ut credam; præsertim quando, ut iam dictum est, humor non sit expurgandus ante concoctionem, continuatioremque sit quam ut tantillo temporis intervallo incidi atque expulsionem idoneus reddi possit.

### Deinde post febrem oportebit vngi.

QVAMVIS Galenus loco iam ante citato; frictiones, ambulationes, & id genus alia consuecia, non penitus intermittenda dicat, non tamen admittit vehementiores obambulationes aut frictiones, quod obstructionis periculum faciant: verum permittendas tantum dicit, idque minus quam per sanitatem consueuerimus: neque enim tam crebro tamque vehementer fricare, ambulare, aut alio quouis modo corpus exercere licet, quam per sanitatem; & neque id statim post febrem tentandum est, sed inter accessiones, & quam potest feri ab eisdem longissime.

### vinum.

CVIVS generis est tenue, album, mediocriter calidum; hoc enim sua tenuitate, crassitudinem humoris melancholici exiennat, caloris mediocritate, corpus humore melancholico refrigeratum sic satis calefacit, & urinas pronocat. Crassum verò & calidum humiditatem resoluit, crassum humorem gignit, atque difficulter concoquitur.

### Horror ipse.

IN hunc usum Galenus exhibet iheriacen, & medicamen quod ex liquore Cyrenico fit.

### dandaque opera est.

PER quotidianam quæ ex quartana facta sit, hoc & secundo ab hoc capite, intelligere videtur.



videtur quartanam continuam; eam etenim quod quotidie innadat, atque accessiones suas faciat, quotidianam nominat.

### Nam quartana.

QUARTANA quidem si simplex sit, atque nullius visceris obstructionem cōcomitur, simplex est & neminem ingulat: nam, ut auctor est Hippocrates primo Epi-

demon, quartana omnium est securissima, longissima, facillima; hac enim non est ipsa per se tantum talis, sed etiam magnis aliis vindicat malis; verum si obstructionem aut lienis aut hepatis subsequatur, non solum non mitis est, sed & subinde seuisima superinducit accidentia; qualia sunt, respiratio-  
nis difficultas, & incurabilis hydrops.

## CAPVT XVI.

### Curatio duarum quartanarum.

AT si duæ quartanæ sunt, neque hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est: aut, si id difficile est, leuiter ambulare, considerare diligenter inuolutis pedibus & capite. Quoties febris accessit & desit, cibum modicum sumere & vinum: reliquo tempore, nisi imbecillitas vrget, abstinere. \* Aut si duæ febres penè iunguntur, \* At post utranq. cibum sumere. Deinde vacuo tempore & mo-  
ueri \* aliquid, & post vnctionem cibo uti. Cùm verò vetus \* aliquan-  
quartana raro, nisi vere soluatur, utique eo tempore atten-  
dendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Pro-  
destque in vetere quartana mutare subinde victus genus, à  
vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab  
acribus ad lenes transire, esse radicem, deinde vomere, iure-  
ve pulli gallinacei ventrem resoluerè, oleum ad frictiones  
adiicere, calefacientia ante accessionem sorbere, vel aceti  
cyathos duos, vel vnum sinapis, cum tribus Græci vini salsi,  
vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, casto-  
reum, laser, myrrham. Per hæc enim similiaque corpus agi-  
tandum est: ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris  
quieuit, diu meminisse eius diei conuenit, eoque vitare fri-  
gus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuer-  
titur, nisi à sano quoque aliquandiu timetur.

f

ENAR-



## ENARRATIO.

**B**ENE admodum hinc maiorem quietem iniungit, quod corpus maiore humectatione opus habeat, & quod quies ipsa per se duorum dierum continuatis accessibus, recreandis viribus summe sit necessaria.

## Cum vero vetus quartana.

INTER anni tempora autumnus, si quis alius, quartana procreanda idoneus est: quare quæ extra autumnum quartana invadere solent, raro in longum tempus protrahuntur; nam & æstiva quartana brevis sunt, ut ante dictum est, autumnales vero longæ, & maxime quæ hiemem attingunt, neque ante ver solvuntur, & si vere non finiantur, in integrum annum prorogantur: Nam, ut docet Hippocrates, qui vere gignuntur morbi, eos in autumno solum iri expectandum est; autumnales morbos vere terminari necesse est. Bene igitur sub ver cavendum monet Celsus, ne quid attentemus quod valetudini nocuum sit: nam & lenissima causa naturam crisi morbi intentam in officio retardaverimus, & incipiam iam crisin impedimus, morbumque non solum annum (praesertim si duplex quartana sit,) sed & exitalem prorsus facimus.

## Prodestque in vetere quartanâ.

VICTVS ista alteratio non omnino aliena erit, si incisoria attenuansque, ac nullius lentior sit particeps: nam hinc unice studendum est, ut precedente capite dictum est, ut materia expulsiōi aliqui rebellis ac contumax, quoniam modo incidatur attenueturque.

## à vino ad aquam.

NESCIO quàm sit hæc mutatio à vino ad aquam libera, ei praesertim qui longa quartana detineatur, cui magna ex parte solet esse comes visceris alicuius obstructio, frigida (si quod aliud) respoens.

## Si febris quicuit.

QUARTANÆ origo est melancholica, quæ ut tardè accenditur atque accessiones facit, nunquam etiam dies aliquot intus delitescit, febriſque suspicionem omnem amonet; ita ut nisi conveniente victus ratione utatur patiens, post multos dies regredi soleat.

## CAPUT XVII.

## Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit.

\* initio

**A**T si ex quartana quotidiana facta est, cum id \* vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, frictione vti, aquam tantummodo vespere potui dare. Tercio die sæpe fit, ne febris accedat: sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessions tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinentia, quanta \* maximè imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

\* maxima

ENAR-



## ENARRATIO.

**Q**UARTANA continua, si quæ alia febris, pernicioſa eſſe ſolet, quod acceſſionum continuo inſultu vires labſcant, neque perdurare poſſunt dum morbus conſiſtat. Cæterum an hic biduana illa aſtinentia, quam nuſquam non Celfus noſter inculcat, conueniat; & an frictio ſit ex re, nondum induci poſſum ut credam; præſertim quando

Galenus in febribus quidem quartanis frictiones admittit, in longis autem, quales continua eſſe ſolent, non uſque adeo commendat. Cibandum igitur quotidie, quantum vires ac morbus eſſagiat, frictionibusque utendum non quotidie, ſed quando naturam expulſionem moliri coniectura eſt.

## CAPVT XVIII.

*De tribus inſania generibus, & primò de eius curatione, quæ à Græcis phrenitis dicitur.*

**E**T febrium quidem ratio expoſita eſt. Superſunt verò alii corporis affectus, qui huic ſuperueniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non poſſunt, protinus iungam. Incipiam ab inſania, primamque huius ipſius partem aggrediar, quæ & acuta, & in febre eſt, Græci phrenitis appellant. Illud ante omnia ſcire oportet, interdum in acceſſione agros deſipere, & loqui aliena. Quod non quidem leue eſt, neque incidere poteſt, niſi in febre vehementi, non tamen æquè peſtiferum eſt. Nam plerumque breue eſſe conſuevit, leuatoque acceſſionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud deſiderat, quàm quod in curanda febre præceptum eſt. Phrenitis verò tum demum eſt, cum continua dementia eſſe incipit, aut cum æger, quamuis adhuc ſapiat, tamen quaſdam vanas imagines accipit: perfecta eſt, ubi mens illis imaginibus addicta eſt. Eius autem plura genera ſunt. Siquidem ex phreneticis alii hilares, alii tristes ſunt, alii facilius continentur, & intra verba deſipiunt, alii conſurgunt, & violenter quaſdam manu faciunt: atque ex his ipſis alii nihil niſi impetu peccant, alii etiam artes adhibent, ſummamque ſpem ſanitatis in captandis maiorum operum occaſionibus præbent, ſed exitu deprehenduntur.

\* curatio

\* his

\* aſſig. poſſunt,

Phrenitis.

f 2

Ex his



Ex his autem eos qui intra verba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant, onerare asperioribus coërcitionibus superuacuum est. Eos verò qui violentius se gerunt, vincere conuenit, ne vel alteri vel sibi noceant. Neque credendum est, si vincus aliquis, dum leuari vinculis cupit, sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est. Ferè verò antiqui tales ægros in tenebris habebant, eò quòd eis contrarium esset exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades, tanquam tenebris ipsis terrentibus, in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuum est. Alium enim lux, alium tenebræ magisturbant, reperiunturque in quibus nullum discrimen deprehendi vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est vtrunque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce, eum qui lucem, in tenebris. At vbi nullum tale discrimen est, æger si vires habet, loco lucido, si non habet, obscuro continendus est. Remedia verò adhibere, vbi maximè furor vrget, superuacuum est: simul enim febris quoque increscit. Itaque tum nihil nisi continendus æger est. Vbi verò res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quòd neque insania esset, nisi febre intenta: neque sanguis, nisi in remissione eius rectè mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit, cum & intentio febris somnum impediat, & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaque hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo rectè fiunt, aliàs omittenda. Et continuata quoque febris habet tempora, quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, vt non optimum, sic tamen secundum remedii \* genus. Quod si vires ægri patiantur, sanguis quoque mitti debet. Nec minus deliberari potest, an aliud ducenda sit: tum interposito die conuenit caput ad cutem \* radere, deinde aqua fouere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint, vel \* aliud ex reprimentibus: aut prius fouere, deinde tondere & iterum fouere, ac nouissimè rosa caput nareisque implere,

\* tempus.

\* radere.

\* aliud ex



implere, offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, mouere sternutamenta medicamentis \* in id efficacibus. \* ad id  
 Quæ tamen faciendæ sunt in his, quibus vires non desunt. Si verò imbecillitas est, rosa tantum caput, adiecto serpyllo, similique aliquo madefaciendum est. Vtiles etiam in quibuscunque viribus herbae duæ sunt, Solanum & Muralis, simul ex vtraque succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione vtendum est, parcius tamen in his, qui nimis hilares, quàm in his qui nimis tristes sunt. Adversus omnium autem sic insanientium animos, gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus leuandi sunt, sicut in homine prædiuite famem timente \* accidit, \* incidit, cui subinde falsæ hereditates nuntiabantur. Quorundam audacia coercenda est, sicut in his fit, in quibus continendis plagæ quoque adhibentur. Quorundam etiam intempestius risus & obiurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutiendæ tristes cogitationes, ad quod symphoniarum, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quàm repugnandum est, paulatimque & non euidenter ab his, quæ stultè dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio, vt fit in hominibus studiosis litterarum, quibus liber legitur, aut rectè, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim, conuertere animum incipiunt. Quinetiam recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus verò sic affectis, somnus & difficilis, & præcipuè necessarius est. Sub hoc enim plerique faneſcunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum vnguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant hi, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papauer, aut \* hyoscyamos decocta sit: alii mandragoræ mala puluino subiiciunt: alii vel amomum, vel fycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc tamen apud medicos reperio. Sed cum Græci morum fycaminum appellant, mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma



\* sycomor-  
son

\* compell-  
lerent.

\* & aqua

\* saliens.  
Georgius Val.  
Silanum pro  
vino exponit.

\* ieiunio

\* valentis-  
simam  
remouen-  
dam.

lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam ibi \* morosycon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in lethargum sæpe \* conuerterent. Præcipit autem ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur, vespere ei daretur potui aqua, tum frictio ad moueretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio \* ex aqua, rursusque frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem ad eum, ut illo consistente nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoque necessaria est, ne quem obdormire volumus, excitare. postea non possumus. Confert etiam aliquid ad somnum \* Silanus iuxta cadens, vel gestatio post cibum & noctu, maximeque suspensi lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis antè missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam ad mouere. Quæ quia leuare morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda. Nam neque implendus æger est, ne insaniat, neque ieiunio utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeque sorbitione, potione aquæ mulsæ, cuius ternos cyathos bis hieme, quater æstate dedisse satis est. Alterum genus insaniam est, quod spatium longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas excitat, & consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinencia, secunda per album veratrum vomitumque purgatio, post utrumlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio. In \* ieiunio vomitus, cibus sine vino dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari posse, dum ne ea sola quis utatur, \* valentissima tantummodo esse \* remouenda. Præter hæc seruanda aliud



da alius est quàm tenerrima, remouendi terrores, & potius bona spes afferenda, quærenda delectatio ex fabulis ludisquæ, quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda vana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non potius lætitiæ, quàm sollicitudinis causa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliæ febres, curanda est. Tertium insaniam genus est ex his longissimum, aded vt vitam ipsam non impediatur, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiace vel Orestem poetarum fabulæ ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia nigrum veratrum deiectionis causa, in hilaritate album, ad vomitum excitandum dari debet. Idque si in potione non \* accepit, pani adiiciendum est, quo \* accipit. facilius fallat. Nam si bene se purgauerit, ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum veratrum, parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum risu, quàm ferid insanientium. Illud quoque perpetuum in omnibus morbis, vbi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ventrem eius antè soluendum esse: vbi à superiore, comprimendum. Si verò consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optimè curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. Sic enim fiet, vt paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subitò etiam terreri & expauescere, in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum vehementer perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio, cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Inter est etiam si ipse sine causa subinde rideat, an moestus, \* di- \* demit- missusque sit. Nam dementis hilaritas terroribus his (de \* fulque quibus supra dixi) melius curatur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio. Item per caput aqua frigida infusa, \* demissumque corpus in aquam & oleum. Illa \* demit- communia \* tique



communia sunt, insanientes vehementer exerceri debere, multa frictione uti, neque pinguem carnem, neque vinum assumere, cibis uti post purgationem ex media materia quàm leuissimis. Non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant, mutare debere regiones, & si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Rarò, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium \* specie similiq̃ue victus genere curandum est, praterquàm quòd in hoc insanix genere solo rectè vinum datur.

\* sp. simile, simile vict.

### ENARRATIO.

**C**ELSVS insanix species inter se confundit; primò tamen de phrenitide mentionem facit, quòd hac acuta sit; & cum febribus (quarum comes esse solet) quippiam commune habet. Est autè phrenitis membrarum cerebri inflammatio; sic ut ipsum quoque cerebrum, eodem modò consistitur, modò calore remoto aestuet. Causa morbi esse solet vel sanguis superans, vel biliosus humor, nonnunquam etiam flava bilis perusta.

Illud ante omnia scire oportet.

Hoc nemo rectè phrenitidem appellavit aut insaniam, qui unica accessione, & nonnunquam ante paroxysmi solutionem finitur.

Eius autem plura genera sunt.

**P**LVRA quidem sunt phrenitidis genera: attamen Galenus libro De locis affectis quarto, tres tantum ponit phrenitidos differentias: Nam sunt quidam, inquit, phrenitici, qui de iis quæ oculis offeruntur (quantum ad sensitivam notitiam pertinet) indicant, cogitando verò à naturali iudicio aberrant. Alij verò cogitatione falluntur minimè, sensibus tamen difformiter moriuntur. Sunt praterea qui simul & sensus, & cogitationis vitio laborant.

alii hilares.

**Q**UIBUS sanguineus humor morbum facit, cum risu insanunt; quibus flava bilis, ferociter; quemadmodum quibus atra vitium contraxit, tam immaniter saniant, ut coerceri nequeant, omnia quæ dicunt faciunt, & obliuiscuntur.

Ex his autem eos.

**L**ENITER enim blandèq̃ue tractandi sunt atque alloquendi; quanquam si ita non proficimus, acerbius nonnunquam increpandi sint.

Eos verò qui violentius se gerunt.

**N**ON solùm vincendi sunt, ne se aut alios ledant, sed ut in quiete, quoad fieri potest, contineantur: nam inordinata motio vires conuellit. Pedes autem non ob hæc tantummodò carum devincendi sunt, sed & ut deligaturis constrictioneq̃ue humores deorsum reuellantur: quapropter non incon-sultum fuerit extremas quoque eorundem particulas manibus contrèctasse.

Ferè verò antiqui.

**I**NTER hos fuit Heraclides Tarentinus Empiricus, is etenim phreniticum obscuro loco iacere inebat; siquidem luce, inquit, eorum mens exasperatur.

At



## At Asclepiades.

HOC quidem recte, si quid aliud, Asclepiades: id enim curandum est, ut docet Trallianus, ut domus in qua eger decumbit, neque crassum, neque statulentum, neque vaporosum aerem recipiat; sed & cavendum monet, ne idem frigidus admodum sit, quod conspiciet; neque adeo calidus, ut caput teneat; verum studendum, ut quasi in medio utrorumque redactus sit, quo frigidior spiritus evadat, & remittatur temperie. Nam quantumvis alij fere omnes amicorum ad patientem consilium admittant, Trallianus tamen eorundem quantumvis maxime necessariorum frequentiam suspectam habet, quod nimirum hominum frequentia aerem turbet ac crassorem reddat. Non negaverim tamen esse nonnullos (ut bene hic subiungit Celsus) qui tenebris melius afficiantur, aliosque qui libero aere rectius habeant; atque in his vitandas intutiones curatorias, quare qui ad lucem offerantur, ut auctor est Aetius, in tenebrosa domo decumbant; qui vero ad lucis splendorem respiciunt, in lucida domo degant.

## Asclepiades perinde esse dixit.

ASCLEPIADES hic eos qui cum dolore fuerant & egrotantes phlebotomabatur, alios omnes a phlebotomia alienissimos esse dicit, & magis specialiter phreneticos: quod quam sit verum, norunt qui Hippocratis aliorumque scripta excusserint: nam quod in phreneticis statim in initio, nisi aliud quid obster, mittendus sit sanguis, auctores sunt Galenus, Paulus, Aetius & Trallianus; idque aut ex cubito faciendum sunt, aut ex vena qua in medio frontis est. Cavendum tamen est ne ad animi usque deliquium sanguine mittamus: nam satius est minus quam oportet detrahi, propter plurimam in illis ex vehementi motu factam resolutionem.

## tum interposito die.

Id quoque supernacum dixit Asclepiades: Accurrit enim, inquit, incisuris capil-

lorum materies, & poro denique & capilli post tonsuram crassescunt, atque fortiores sunt: quapropter etiam si homines, si post cibum toronderint, inspicula, atque catarrho vel lippitudine vexantur; dehinc si lanis caput post tonsuram tegere chrismus, quanto melius si naturali tegmine capillorum lateat obiectum? quasi vero ea vitia non sint potius accepta ferenda crapula, qua tonsuram statim avertit, quam ipsi tonsura, qua poros aperit, curiusque perspiratu facilem reddit. Et etiam si quammaxime per se nihil prodesset, eo tamen nomine commendata esse debebat, quod sine illa localia commodè adhiberi non possint.

## Deinde aqua fouere.

FOMENTA hac non usque adeo inta sunt quod partes subiectas refrigerent: quare si quando eorundem usus sit necessarius, cautio adhibenda est, ne qua pars frigore afficiatur.

## offerre etiam naribus rutam.

Id quoque non in omni phrenitide tentandum est, sed in ea tantum qua cum virium robore in longius prorahatur tempus; ita enim fiet ut crassi vapores facilius transpirent.

## Si vero imbecillitas est.

HIC variant exemplaria & rosa tantum capite adiecto. Pyrizani ac Torne-sium caput (idque, alius rectius) legunt: Ceterum in phreneticis oxymorcho efficacius nihil exhiberi potest, cui si serpillum quoque addas, discussorium magis medicamen efficitur: curandum autem est ut si quando applicetur, actum tepidum sit, quod cerebri membrana, quam *perispha* vocant, frigiditatem rosacae non admittat; constat enim frigidum densare, ac prohibere ne superfluitates e capite exhalent. At si actum calidum sit, & id quoque noxium erit, quod calorem atque adeo inflammationem adaugeat duplicemque. Exacte igitur tepidum adhibendum est rosaceum, estate quidem cum modico aceto, hieme vero moderate calidum.

## Vtiles



### Vtiles etiam in quibuscunque.

MURALIS seu perdicium, vim habet abstergendi, ac refrigerandi; quare phlegmones omnes inter iniuria & in augmento usque ad statum sanat; idq; potissimum calidas, ut auctor est Galenus. Quo fit ut recte in omnis adhiberi dicat auctor nosster: sicuti etiam solanum quod hortense vocant; id vanaque a Celso tantummodo intellectum existimo, refrigerat siquidem & astringit, & capitis dolores illitum per se sanat.

### cum se febris remiserit.

LONGA frictione, inquit precedente libro, neque in acutis morbis, neq. in incrementibus viti conuenit; praterquam quum phrenitici somnus ea requirit: parcius tamen in his fricandum qui nimis hilares sunt, quod periculum sit ne frictione sanguis exagietur, atque ad locum affectum regurgitet.

### Quorundam enim vani metus leuandi.

HIC Pinzanum exemplar perperam lauandi legit.

### ad quod symphonia & cymbala.

CELIUS Methodicus, Virtutem etiam, inquit, decantationis tibiarum uaria modulatione, quarum alteram Phrygiam vocant, que sit iocunda, atque excitabilis eorum qui ex lassitudine in furore noscuntur: Aliam chram, vel qua occupata mente puriorem suadeat, injecto rigore, ut in bello, quam *Δαξον* appellant, in his qui risu vel puerilibus cachinnis afficiuntur, quum cantilena sonus caput impleat; ut etiam recte valentibus apertissime videatur, vel recte, ut plerique memorant, accendant aliquos in furore, quo sepe vaticinantes deum accipisse videantur. Sic Pythagoras, quemadmodum in Miscellaneis nostris meminimus, ebrium adulescentem sub Phrygij modi sono

incitatum, spordei incentu reddidit mitiorem, & sui quodammodo compotem.

### & præcipue necessarius.

NECESSARIUM dicit, quod duplici compendio phrenitici proficiat, somno enim humectatur & refrigeratur cerebrum; quibus accedit quod quicquid ad se quodammodo redeant laborantes.

### Si nihilominus vigilant.

ISTUD non tentandum est in omni phrenitide, sed vehementi tantum, neque quouis tempore, sed solammodo in declinatione exacerbationis. si enim datum fuerit in vigore, prouocat quidem somnum, ceterum febris excitatur: quo fit ut aeger ad ambo partitus grauius ferat quod contingit. Auctores sunt Posidonius & Aerius.

### Asclepiades ea superuacua esse dixit.

NON immerito stupefacientium, pharmacorum videlicet, potionum, ilitionum, irrigationum; vsum suspectum habuit: præsertim si assiduus continuusque sit: facillime enim in his qui immodice refrigerantur, transitus est a phrenitide in lethargum, quem sepe numero interitus subsequi solet.

### Præcipit autem.

ASCLEPIADES, eisi quammaxime sub vespere accessiones augeri fateatur (vesperum enim, inquit, ob aeris crassitudinem densata inflat corpora, atque initium generat accessionis), prater omnem tamen rationem, sub vespere cibis, fricat, atque gestationem adhibet; quum neque sanis a cibo frictio aut gestatio conueniat.

### Confert etiam aliquid ad somnum.

IOHANNES Cæsius in annotationibus suis in hunc modum scribit: Erat quando hic saliens riuus legendum putarem: ac sanè hoc loco Silanus, saliens riuus subituisse; nisi forte fortuna incidissem in Sextum Pompeium libro XXIII. ubi sic legitur: Tullios alij dixerunt Silanos: quem



quem ex Sexto reperit Georgius Valla, & Silanum pro vino exponit.

### Neque alienum est.

NON solum si sanguis non sit missus, sunt adhibenda cucurbitula; verum etiam post phlebotomiam, si facies rubicunda & incontracta, occipitio ante exacerbationem easdem affigemus, ac moderata scarificatione facta sanguinis quod satis est auferemus; auertunt enim, ut auctor est Trallianus, per partem diuersam materiam ad superiora tendentem.

### Moderatio in cibo.

CIBVS esto humectans & frigesaciens, tantumque nutrens quantum conseruationi virium opus: videndum tamen est, ne aut in accessionibus aut vigore eundem exhibeamus; cauendaque omnibus modis inedia est, quod vires prosteruat, ac corpus exerceat ac biliosum reddat, quo alienius in phreniticis nihil est.

### Alterum genus insaniae.

ALTERVM genus insaniae vocat, quam nos melancholiam dicimus; ea siquidem magna ex parte sine febre sit, & consistit in tristitia, timore ac sollicitudine. Nam quum melancholicus humor per se ater sit, rationis locum non secus ac tenebra obumbrat, ac timores maestitiamque generat: sicuti videmus pueris in profundis tenebris accidere. Sunt autem, ut docet Galenus & Aetius, melancholica deliria multiformia, ob particulares corruptae imaginationes. In genere tamen a vene sectione auspicanda curatio est, si totum corpus sanguine melancholico abundet; quod si minus fiat, eadem opus non erit, sed alia via aliisque ratione eisdem subueniendum est: nam aut purgandi sunt per veratrum, aut hieram dictam; aut abstinentia coercendi sunt, ut terrens ille humor tandem absorbeatur. frictio, motus exercitiumque ante cibum admodum conuenientia censentur, & si ventriculus non probe concoquat, non fuerit inconsultum uti balneo.

### In ieiuno vomitus.

RYFFVS, Vomant, inquit, ex longioribus internallis, etiam a cibis; verum a rha-

phano, aut thymo, aut origano ieiunium. Non tamen vomitoribus vomitoriis vrendum est, sunt enim talia his notoria, erumnam ventri ac stomacho addentia iam antea ex morbo afflicto; videntur enim aliqui ex efficacioribus vomitoriis melancholia correpti.

### cibus sine vino.

ADMITTITVR tamen vinum quod ὀλκός vocant Graeci, hoc est tenue & album, & quod non sit admodum vetus. Ceterum quauisunque tandem potus sit, moderate exhibendus est, ne cibus in ventre fluctet.

### Tertium insaniae genus.

PER tertium insaniae genus videtur accipere eam quam nos simpliciter insaniam aut maniam vocare solent: nam ea quoque bisaniam dispecitur; siquidem in omnibus leditur imaginatio & ratio, integra seruata memoria: ridet namque alij immodice, versantibus ipsis ob oculos imagunculis visu dignis; alij etiam sanguine illo magis adusto reddito, terrores & spectra quaedam somniat, sicuti Orestes Electrae furiales vultus expansisse dicitur. Rursus sunt alij ab his plane diuersi quos animo desipere dicit; atque hi quidem serena quadam dementia detinemur, quod accidit quoties bilis fuerit superassata, & crassior facta, atque adeo substantiae cerebri eiusque membranarum visci instar agglutinata.

### Neque ignorare oportet.

SYMPTA est haec sententia ex sexto Aphorismorum Hippocratis, ubi sic dicit: Deliria quae cum risu accidunt, interiora; quae vero serio, periculosa: nam quae cum risu fiunt, a solo sanguine paululum adusto aut sola caliditate sine vitioso humore oriuntur; quae serio fiunt, ab aera vel flana bile superassatis nascuntur.

### Illud quoque perpetuum.

Hoc quoque ex Hippocratis Aphorismis mutatum est: siquidem Hippocrates sectionis VII. Aphorismo LXVII. Corpora, inquit, ubi quis purgare voluerit, oportet fluida



fluida facere; & si per superiora, aluum sistere; si vero per inferiora, humectare.

fame.

METHODICVM id est: suspicabantur enim illi fame compesti insatiantes, non secus ac bruta animalia inedia cicuramus; quod à vera curandi ratione longè alienissimum est, quum periculum sit ne inedia praestratis viribus, eadem ferende morbi longitudo impares reddantur, ac eger ipse succumbat: adde quod nonnulli multos insatiantes, quibus cibis omnis suspectus est, & qui nisi coacti edant.

vinculis.

SATIVS tamen esset, si res familiaris admitteret, famulorum aut astantium opera in officio detineri, quod denique partes quodammodo concutiantur. Quamquam non inconsultum sit in omni insanía specie, ut iam antè dixi, extremos artus vinculis constringere ad auerendam materiam.

Cogendus est.

EANDEM ferè curandi methodum habet Celsus Methodicus libro Chronion; verum paulo prolixius, quam & hic ascribere opere precium visum fuit, dicit autem: Tunc acopis & malagmatis veterum, quæ nulla nimietate percutiant, motum quoque gestationis adhibentes: & primò gestatoria sella, tunc vehiculo manibus actò, atque totò fortificato corpore, erunt in deambulationem cogendi, & votis exercitium quod cuique conueniat. Nam literalis etiam lectio adhibenda est, & quæ sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem exerceant egrotantes. Quapropter interrogationibus quoque erunt satigandi, ut nunc mendacii causa, nunc promendi quod quarimus, exerceri videantur. Tunc sibi dimittendi, data lectione, quæ non sit intellectu difficilis, ne plurimo labore vexentur. Hæc enim si supra vires fuerint, non minus afficiunt, quam corporis immodicæ gestationes. Item post lectionem aliqua composita vel mimica sunt

offerenda, si mæstitudine furentes laborent; aut rursus tristitiam vel tragicum timorem habentia, si puerili luxu furentes afficiantur. Oportet enim contrarietate quadam alienationis corrigere qualitatem, quo animi quoque habitus, sanitatis mediocritatem agnoscat. Tunc proficiente curatione erunt pro possibilitate meditationes adhibenda, vel disputationes; nunc quoque similiter ordinata, ut principia leni voce promantur; narratio verò & demonstrationis extensio atque maiore; tunc epilogus demissa & indulgenti: sicut hi qui de exercenda voce, quam avaporneto Græci vocant, tradiderunt. Adhibendi denique auditores sunt egrotanti assueti, qui favore quodam atque laude dicta prosequentes, dicentis animum laxent. Etenim iocunda exercitamenta corporis adiuvant sanitatem. Tunc post meditationem vel disputationem deducendus mox est atque perungendus leniter egrotans, & deambulatione leni movendus. Ei autem qui literas nesciat, immittende quæstiones erunt, quæ sint eius artis propriæ, ut rustico rusticationis, gubernatori navigationis; ac si ex omni parte iners fuerit curandus, erunt vulgaria quedam quæstionibus tradenda, vel calculorum ludus, habet enim quiddam quod animum exerceat, & magis si peritior egrotans colludat. Tunc post requiem adhibita deambulatione, erunt diligentius perungendi; & primò parva atque simplici defricatione mulcendi, dehinc profecti apparente, etiam deuexo ductu post humeros atque colla defricatione potiore ac leni deductione, quam Græci *peragmas* vocant: vltimò fricandum etiam caput; quod si fuerit relenatum, lauacrum erit adhibendum. Hæc Celsus ille Siccensis. Verum quod Celsus dicit insatiantes omnes multa frictione esse exercendos, quàm sit verum, antè dictum est; & quid tenuis vini portio concedatur, diximus: illis tamen magis ex usu erit, qui flatibus distenti hypochondrii in vitium inciderint.

CAPIT



## CAPVT XIX.

*Cardiaci morbi curatio.*

**H**VIC morbo præcipuè contrarium est id genus, quod Cardiacum à Græcis nominatur, quamuis sæpe ad eum phrenetici transeunt. Siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente, immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui, imbecilli que pulsus sunt. Sudor autem supra consuetudinem, & modo & tempore, ex toto thorace & ceruicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo & cruribus siccioribus atque frigentibus. At ubi id morbi genus est, curatio prima est, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata: secunda, sudorem prohibere. Id præstat acerbum oleum vel rosa, vel melinum aut myrteum. Quorum aliquo corpus leuiter perungendum, ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor vincit, delinendus homo est, vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti vel rubi foliis, aut ex austeri, & boni vini arida fæce. Pluraque similia sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex via puluis iniectus. Super hæc verò, quo minus corpus insudet, leui veste debet esse contactus, loco non calido, fenestris patentibus, sic, ut perflatus quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis, vino ciboque succurrere. Cibus non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die dandus est, ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum est ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue meracum. Egelidum subinde & liberaliter dandum est adiecta polenta, si modò is æger parum cibi assumit. Idque vinum esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium: recteque tota die ac nocte,



\* duas, vel

cte, \* vel tres heminas æger bibet. Si vastius corpus est, plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum antè perfundere aqua frigida conuenit, & tum dare. Quòd si stomachus refo- lutus parum continet, & ante cibum & post eum sponte vo- mere oportet, rursusque post vomitum, cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora sumere alterum: si id quoque stomachus reddiderit, to- tum corpus bulbis contritis superillinendum est. Qui ubi inaruerunt, efficiunt, vt vinum in stomacho contineatur, ex- que eo toti corpori calor, venisque vis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ vel alicæ cremorem ex infe-  
 \* iniicere, rioribus partibus \* indere, siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque æstuantis admouere, quod reficiat, \* id est rosam, & vinum. Et si qua in extremis  
 \* vt est ro- partibus frigent, vinctis & calidis manibus fouere. Per quæ si  
 sa, consequi potuimus, vt & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse videtur, verendum est tamen, ne ad eandem imbecillitatem citò recidat. Itaque vino tantum remoto, quoti- die validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

## ENARRATIO.

**C**ARDIACVS morbus, si affectum la- cum spectes, & mentem, quæ serè con- stat, insania contrarius morbus dici potest: nam sicut omnes insania species, præter eam quæ hypochondriaca dicitur, cerebro pri- mario affecto originem suam acceptam fe- runt, ita cardiacus ore ventriculi (quem & e- diæ veteres Græci vocauerunt) affecto acci- dere consuevit; vt auctor est Hippocrates, qui eundem καρδιακὸν solet nominare. Fñere tamen alij quibus opinio hæc suspecta esset, atque aliam loci affecti sedem consti- tuerent: nam Erasistratus, & Asclepiades, cor (ipsius morbi magnitudine, & καρδιακὸν nomine, quod cor quoque significat, decepti) in cardiacis pati dixerunt; alij membranam quæ cor circumambit, περικαρδιον vocant;

nonnulli, diaphragma; alij iecur; nonnulli etiam pulmonem. Porro cognoscimus eos qui cardiaci dicuntur, vt docet Aetius, quum acuta febre & maxime æstiosa affliguntur, hoc modo: Pulsus si inueniatur densus & obscurus (Celsus imbecillum & exiguum vocat) & extremarum partium frigiditas, sudores circa faciem & ad pectus usque glutinosos, & odorem corporis terrestrem nares usque percipientem, & pulsus circa ipsum & vehementiores & magnos, & ad- hæc accedant desperatio, angor animi, cor- poris iactatio. Os verò ventris primum est quod in ipsis afficitur, per assensum vehe- menter oblaens cor ipsum, propter vici- nitatem.

Si fu-



## Si sudor vincit.

IMPRIMIS verò thoraci, collo, ac locis  
sub alis atque inguinibus sunt adhibenda.

## gypso.

GYP SVM, si quod aliud, siccatoria  
atque obducens meatu facultatis est: quare  
non solum sudori compeſcendo, sed & san-  
guinis fluxu cum omni candido commodè  
adhibetur. Argenti quoque spuma, quam  
lithargyron vocant, siccatur: qua ratione  
sudoribus restringendis erit accommodatissima,  
preſertim si cum cimolia, amylo aut omni can-  
dido circumalimatur.

## Super hæc verò.

MEDICI studium in cardiacis est, ut  
cutis densetur ac refrigeretur: quapropter  
aërem frigidum domus paramus, frigidos  
ventorum status inducentes: aut si id non  
possumus, ventilatione corpus frigescentes,  
pavimenta sternentes, irrorantesque iis que  
astringente, & frigida facultate prædita  
sunt: quare in umbrosis & subterraneis lo-  
cis collocandos docet Soranus. Atque in  
summa, si sudoribus exolvatur corpus, stra-  
gula ipsa tollere oportet, & operimenta ipsa,  
quibus integuntur, mollia esse debent, & usui  
prioris destituta, hoc est, ut dicit Celsus, lenia,  
ita ut lenia non solum ad pondus, sed & ad  
qualitatem referatur. Lecti etiam latitudo  
atque spatium probatur, quantum sufficiat  
agro alterna conversatione alterius loci fri-  
gus accipere.

## Tertium auxilium est.

CIBVS in morbi remissione incunctan-  
ter offerendus est qui corruptioni quam ma-  
ximè aduerſetur, & qui nutriet, non oneret  
stomachum; in quem usum summè commen-  
dantur pedes suilli, ac mala punica.

## Nisi autem necesse.

ACRES siquidem humores qui os sto-  
machi vellicant, vino magis exasperarentur:  
quare non nisi summa urgente necessitate  
vinum exhibemus; id nimirum quod auste-  
rum simul & dilutum sit, ut astrictioni  
patitur, & virilium robori studeamus. Neque  
fuerit inconsultum, potentiam panem, ary-

zam, halicam aut quidvis aliud eius generis  
infusum vino (id enim per irrita intelligit)  
exhibere, quod vires maximè recreent atque  
reficiant, stomachumque robovent; aded ut  
memorie proditum sit Democritum his in-  
tritis ab orco quodammodo renouatum.

## recteque tota die ac nocte.

COTVLA vel hemina continet vini  
uncias decem: qua sit ut nimis quam con-  
ueniat liberalis, Celsi hæc moderatio esse vi-  
deatur.

## Sic cibum non accipit.

NAM perunctione blanda & moderata  
totius corporis frictione eliditur cibi fasti-  
dium; ut auctor est Ægineta.

Quod si stomachus re-  
solutus.

ANTE cibum sollicitandus vomitus est,  
ut materiam stomacho innatantem, ac eius  
subuersionem facientem educamus, ac deinde  
post cibum iterum vomitum ciet, ut quod  
iam tenacius stomacho adharebat, una cum  
cibo expellatur: vinum autem postmodum  
dat, quod subausterum sit & mediæ etatis;  
hoc siquidem stomachum roborat, & si quod  
aliud, amicum est. Ceterum quod de bulbis  
scribit, animadversione dignum est: neque  
enim usquam legisse memini tantum præro-  
gatam iisdem ascriptum esse: nam quan-  
tumvis Eudemus, Asclepiades, Themison,  
aliique eius farinae, cataplasmata ex bulbis,  
pipere, cacti & ammoniaco prodesse dixe-  
runt; non tamen bulbos eo quo Celsus noster  
elogio extulerunt. Nam quum ea sit bulbo-  
rum natura, ut in cataplasmatibus glutinent  
simul & siccent, rectè languenti stomacho  
(quamvis id neget Siccensis Celsus) adhibet:  
verum an tantæ sint efficacie, ut quum in-  
truerint, vinum in stomacho contineri faci-  
ant, nondum experientia comprobare con-  
tigit.

## Ultimum auxilium.

ET SI præter vulgi opinionem esse vi-  
deatur, alimentum per posticum suggeri  
posse, ratione tamen & auctoritate com-  
probari



probari potest: nam si enema quod vigorosius sit (ut secundo De medicamentorum compositione, & XIII. Methodi ostendit Galenus) reuelando non solum ventriculum & mesenterion euacuat, verum etiam simam hepatis expurgat; cur alimentorum facultates per alium iniectione in ventriculum atque hepar non subibunt, natura ipsa attractricem facultatem sollicitante? quod & post Galenū Abenozar libro I. tract. X. cap. XVIII. fieri posse demonstrat. Rectus, inquit, & certus & verax est ex prefatis causis gule paralysi affectus nutriendi modus, ut prius intestina cum clysteribus absteris purges, & vesicam capra lacte, aut decocta ex tritico sorbitione referam, per cannulam argenteam eius collo alligatam, annique insertam manu coarctatam totam exprimas, quod minuta successione per intestina vis ventriculi attractrix & intestinorum alimenti anida, ad stomachi fundum usque alliciet. Idem quoque Oribasius libro VIII. cap. XXXVII. indicatum voluit: Alia calamitas quandoque contingit, inquit, ad quam tollendam clysteribus est opus: nonnulli tam vehementer ab alimentis abhorrent, ut periculum consequatur, ne ob alimonia defecationem pereant, quibus clysteres ij sunt idonei, qui alere corpus possunt: quales ij sunt, ptisana cremor, aut tritici aut farina ablutio, aut halica cremor, aut res quæ sunt generis eiusdem: Debet autem cornu clysteris, si usquam alibi, tunc hoc loco esse quam longissimum, & manibus compellendus magna vi clyster est, ut ad remotas supernasque partes quam maxime conscendat. Celsus tamen Methodicus hic ptisanam susce-

ptam habet quod intestina lubrica facit: Nam si omnis spes, inquit, fuerit absumpta, erit per clysterem cibui iniiciendus; sed neque ptisana, aut cuiusquam labilis qualitatis, quod facile lubrica faciat intestina: est enim hoc in cardiacis perniciosissimum; quippe fastidio attestante ventris fluorem commouere. quapropter erunt hæc ex lenticula adhibenda, & primò paruisima: tunc vino cum aqua panis attritus & expressus. sic enim corpori fiet additio, atque vires resurgent, & stomachus iamdudum supinus roborabitur. Nos felici admodum successu non semel tentauimus cum contuso pulli, & iure caruini, in quo dissoluta essent omnia lutea.

### Neque alienum est.

Id, si quod aliud, in cardiacis faciendum est; siquidem si accessioni vehementia cibationem prohibeat, hoc tunc obiri potest.

### Et si qua in extremis partibus.

NON solum calidis manibus extremas partes sanandas docet Aetius, sed & illiendas (si duriora corpora sint) pipere, bulbis, pyrethro, sulphure vino, & similibus: nam mollibus corporibus sufficere testatur inunctiones ex glaucino aut scyonio cum multa frictione.

### Vbi in tuto.

VINUM si ansterum sit, nulla ratione remouendum est; verum aqua potius attemperandum: id enim, si quod aliud, vires totius corporis auget, atque stomachum roborat.

## CAPVT XX.

### De Letargo, & eius curatione.

**A**LTER quoque morbus est, aliter phrenetico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis pænè dormiendi necessitas (Λιθαργος Græci nominant) atque id quoque



quoque genus acutum est, & nisi succurritur, celeriter iugulat. \* Hos ægros quidam subinde excitare nituntur, admotis \* Hoc his, per quæ sternutamenta euocantur, & his, quæ odore fœdo mouent, qualis est pix \* cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum \* vsta, & lana incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. Si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, \* odore fœdo mouer, nempe sternutamenta. \* exercitantur odorem fœdo mouer, nempe sternutamenta. \* exercitantur.

leuata quoque ea somnus vrgeat. Nam si expergiscitur, adhibere ei vt sopito superuacuum est. Neque enim vigilando melior fit, sed per se, si melior est, vigilat. Si verò continens ei somnus est, vtiq; excitandus est, sed his temporibus quibus febris leuissima est, vt & excernat aliquid, & sumat. Excitat autem validissimè repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaque perunctum oleo multo corpus tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc vtemur, si æqualis ægro spiritus erit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum, deinde postea fouendum est aqua, in qua laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccæ, aut hederæ cum rosa & aceto. Præcipueq; proficit & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti frontive impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; opportunè cibus datus, id est in remissione, quanta \* maxime inueniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic, vt si quotidie grauis accessio est, hæc quotidie datur. Si alternis, post grauiorem sorbitio, post leuiorem, mulsæ aqua. Vinum quoque cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. Quod si post longas febres eiusmodi torpor



por corpori accessit, cætera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem tribus quatuorve horis castoreum (si venter allicitus est) mixtum cum scammonia: si non est, per  
 \* Et si seipsum cum aqua dandum est. \* Si præcordia mollia sunt, cibis vtendum est plenioribus. Si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum, imponendumque est præcordiis, quod simul & reprimat, & emolliat.

## ENARRATIO.

VETERNUM vocant Latini, quem Greci ληθαργιον. Est autem lethargus, si morbi causam & accidentia consideres, phrenitidi prorsus contrarius: sin affectum locum spectes, contrarium nequaquam recte dixeris; quum in utroque cerebrum rationis sedes afficiatur. Sunt autem contrarie cause: nam in phrenitide febris acuta est, membranarum cerebri inflammatio atque calor; Lethargum contra febris lenta comitatur, sitq; quoties pituita sua frigidityte & humiditate cerebri imbuerit: unde pro materie peccantis varietate ac differentia, æquum est inter se discrepare accidentia; siquidem in lethargo sopita, pigra, atque ad omnes quodammodo actiones inepta membra conspiciuntur; in phrenitide agitationem, concussionemque totius ferè corporis percipimus: in utrisque tamen ratiocinatoris anime noxa est.

## Hos ægros quidam subinde excitare nituntur.

ID faciebat Asclepiades. Præstat tamen ab odoramentis incipere; deinde, si hac non proficiant, consultum erit ad sternutamenta veniri ex pipere, struthio, veratro: ceterum eadem crebrius adhibenda non sunt; ut quidam temerè faciunt, quod concussione atque exagitatione ægrorum vires prosteruantur, atque suffocentur, ac longè plus periculi inde expectandum sit, quàm commodi ex materia peccantis euacuatione: quare quum laborandum sit, ut materia expellatur, & locus affectus corroboretur, in ipsis

morbi primordiis oxyrrhodinum in quo castoreum, pulegium, nepita, aut aliud quid eius generis decoctum sit, capiti infundunt; id siquidem caput plurimum confortat, & dum reprimat, humorum confluxum arceat, & incisoriæ facultatem nanciscitur per ea quæ incoquantur. Hoc non inferius est quod Galenus faciendum suadet, dum in aceto origanum, pulegium, aliæque id genus incidendi facultate prædita decoquit, atque navitus odoranda exhibet, ut vapor ad cerebri delatus crassitudinem humorum diffuset.

## Itaque eos qui subinde excitant.

SENSILES enim atque delicata admodum sunt cerebri membra facillimèque afficiuntur: videndum igitur est ut & τὸ κατὰ φύσιν quod factio opus est faciamus: nam sicuti morbus præceptis admodum est atque acutus, ita tempus & occasionem exhibendorum remediis valdè præcipitem habet: nam quantumvis intentio medici esse debet, ut XIII. Therapeutica methodi docet Galenus, excitare naturam, ac noxæ humoris crassitudinem diffecare; id tamen nulla violentia tentandum est: sed primùm à mitioribus pederentim, natura morboque ita exigente, ad vehementiora deueniendum est.

## ut &amp; excernat.

INIECTIS videlicet acritus enematis. Cibandum autem est post statum solummodo, nisi diuturnior sit morbus, atque vires debilio-



debiliores. Cibus autem talis esto qui simul incidat, reficiat, & vires conferat.

### Excitat autem.

IDEM suadet Soranus: verum utrum agrotantis ex usu fuerit, nondum induci possum: ut credam; potissimum quando in confesso sit, frigidum densare, atque meatus obstruere: nam quantumvis repentina illa frigida affusio egrum possit excitare, nihil tamen de morbo tollit.

### Itaque perunctum.

IN hunc usum commodissimum erit hyssopium, aut aliud quodvis simile oleum; quanquam ante perfusionem aut inunctionem praestiterit perficuisse coxendives extremosque artus.

### Medendi autem causa.

ID Soranus affirmabat; Asclepiades hic, ut in nephriticis quoque, suspectum habuit; Alexander Trallianus tendendum caput dicit, si morbus perniciosus admodum & atrox & diuturnus sit.

### deinde postea fouendum.

LAUDAVIT id Heraclides Tarentinus, & neque in simplici aqua decoquebat, sed in posca, ut esset renniorum partium: Aerius quoque atque Aegineta parvi affecta infusiones & cataplasmata adhibent, quod Tralliano quodammodo suspectum est: nam etiam si balneum convenire dicat, quod habet mores qui eam obsederunt, eo facillime disjunctantur, cavendum tamen monei, ne caput agrotantis aqua perfundatur: nam si id factum fuerit, dicit, tantum abest ut

tantillum opis sentiat, ut longe maioribus cruciatibus infestetur, quam si calidum nunquam vidisset.

### Gestatio etiam.

UBI morbus inclinare coeperit, gestatio continua utilis est: atque hanc ita vehementem esse volebat Soranus, ut ad viginti vel xxx. stadia agitaretur.

### Apertissima autem sorbitio.

QUALIS est tum pituita, tum ipsius cremor; proderit etiam sorbitiunculas preparare quae incisoria sint facultatis, utpote in quibus aut hyssopum aut pulegium, aut simile quippiam decoctum sit; haec modo quotidie, modo alternis diebus danda sunt.

### Vinum quoque.

VINUM esto subaquosum, tenue, album, & subastringens, quod in declinatione tantum utile esse docet Trallianus.

### Ante accessionem autem.

HOC in vehementibus tantum leibargis faciendum suadent alij, exhibebantque ante unam accessionis horam, ut fuit Trallianus; Celsus tribus aut quatuor ante accessionem horis propinat. Est autem calefaciens & extenuans castoreum, marcescentemque ac molestantem in corpore pituitam arefacit. Addebant autem eadem dactydim aut scammonium, si astrictior esset albus & corpus cacothymus; ita ut dabunt castorei scrupulis dactylis ʒ. ss, commissurent: sic enim fieri, ut materia expulsionis rebellis citra molestiam subsequatur.

## CAPUT XXI.

### De Aqua inter cutem; hoc est Hydropico morbo.

SED hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet, nisi primis diebus discussus est, & *Asperitas* Graeci vocant. Atque eius tres species sunt. Nam modo ventre vehementer inten-



to, creber intus ex motu spiritus sonus est. Modò corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus. Modò intus in \* vnum aqua contrahitur, & moto corpore ita mouetur, vt impetus eius conspici possit. Primum *τυμπανίτην*, secundum *λιδιοφλεγματίαν* vel *υποσάρκα*, tertium *ἀσκήτην* Græci nominant. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia, ob quam ne vlcera quidem in his agris facile sanescunt. Sæpe verò hoc malum per se incipit. Sæpe alteri vetusto morbo, maximeque quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quàm in liberis tollitur, quia cùm desideret famem, sitim, mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur, qui facile coguntur, quàm quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonom regem, amicum quendam eius notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negauit posse sanari. Cùmque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum ægri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cùm summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua deuorando, bibendoque \* sese suam vrinam in exitium \* se præcipitauit. Inter initia tamen non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori, quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt, cùm hoc morbo tentaretur, neque æquo animo ferret necessariam sitim, vbi diu abstinerat, bibere solitum, deinde euomere. Quòd si redditur quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. Ideoque in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, hæc in primis submouenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. Atque hæc quoque quæcunque species est, si nondum nimis occupauit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulan-



ambulandum, currendum \*aliquando est. Superiores ma-  
ximè partes sic perfricandæ, vt spiritum ipse contineat, euo-  
candus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam  
in arena calida, vel laconico vel clibano, similibusque aliis,  
maximèque vtilis naturales & siccæ sudationes sunt, quales  
super Baias habemus in myrtetis: balneum atque omnis hu-  
moralienus est. Ieiuno rectè catapotia dantur facta ex ab-  
sinthii duabus, myrrhæ tertia parte. Cibus esse debet ex me-  
dia quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non  
vltrà danda est, quàm vt vitam sustineat, optimaque est, quæ  
vrinam mouet. Sed idipsum tamen molliri cibo, quàm me-  
dicamento melius est. Si tamen res coget, \* ex his aliquid,  
quæ id præstent, erit decoquendum, eaque aqua potui dan-  
da. Videntur autem hanc facultatem habere iris, nardum,  
crocum, cinnamum, amomum, cassia, myrrha, balsamum,  
galbanum, ladanum, cœnanthe, panace, cardamomum, he-  
benus, cupressi semen, vua tyminia, quam *σαφίδα ἀγρία*  
Græci nominant: abrotanum, rosæ folia, acorum, amaræ nu-  
ces, tragoriganum, styrax, \* costum, iunci quadrati, & rotun-  
di semen, illud cyperon, *χοῖνον* hoc Græci vocant. Quæ  
quoties posuero, non quæ hîc nascuntur, sed quæ inter aro-  
mata afferuntur, significabo. Primò tamen quæ \*leuissima  
ex his sunt, id est rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vi-  
num quoque vtile est & \*austerum, sed quàm tenuissimum.  
Commodum est etiam lino quotidie ventrem metiri, & qua  
comprehendit aluum, notam imponere, postero die videre,  
si plenius corpus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuatur,  
medicinam sentit. Neque alienum est metiri & potionem  
eius & vrinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assu-  
mitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades  
in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinentia  
bidui & frictione vsum, tertio die iam & febre & aqua libera-  
to, cibum & vinum dedisse, memoriæ prodidit. Hactenus  
communiter de omni specie dici potest. Si vehementius  
malum est, diducenda ratio curandi est. Ergo si \*inflamma-  
tio & ex ea dolor creber est, vtilis quotidianus aut \*alterno  
quoque

\* vt ex his  
aliquid de-  
tur, præ-  
stanter id  
decoquen-  
dum,

\* costus,

\* lenissima

\* lenè &  
auft.

\* inflatio

\* altero



quoque die post cibum vomitus est. Fomentis siccis, calidisque vtendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his vtendum. Vltimum auxilium est, si cucurbitulae nihil profuerunt, per alium infundere copiose aquam calidam, eamque recipere. Quinetiam quotidie ter quaterve opus est vti frictione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum verò in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat, ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, & seruanda vlcera diutius. Vtiliter etiam scilla cocta delinitur cutis, sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus inflantibus. At si id vitium est, cui leucophlegmatias nomen est, eas partes quæ tument, subiicere soli oportet, sed non nimium, ne febricula incidat: si is vehementior est, caput velandum est, vtendumque frictione madefactis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum, sicut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem tota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata, quæ reprimunt, maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quatuor ferè digitis ex parte interiore, quæ per aliquot dies frequens humor feratur, atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque vbi inductæ vulneribus cicatrices sunt, adiciendum & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad pristinum habitum reuertatur. Cibus valens esse debet, & glutinosus, maximeque caro. Vinum (si per stomachum licet) dulcius. Sed ita, vt inuicem biduo triduoque, modò aqua, modò id bibatur. Prodest etiam lactuca marinæ (quæ grandis iuxta mare nascitur) semen, cum aqua potui datum. Si valens est qui id accipit, ei scilla cocta (sicut supra dixi) delinitur. Auctoresque multi sunt inflatis vesicis pulsandos tumores, esse. Si verò id morbi genus est, quo in vterum multa aqua contrahitur, ambulare,

\*inflatio-  
nes.



bulare, sed magis modicè oportet, malagma quod digerati-  
 positum habere, idque ipsum super imposito triplici panno,  
 fascia non nimium tamen vehementer astringere. Quod à  
 Tharria profectum, seruatum esse à pluribus video. Si iecur  
 aut lienem affectum esse manifestum est, ficum pinguem  
 contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia ven-  
 ter non siccat, sed humor nihilominus abundat, celeriore  
 via succurrere, ut is per ventrem ipsum emittatur. Neque  
 ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi viam. Morbum  
 enim hunc iocinoris putauit. Ideoque \* ita illum esse sanan-  
 dū, frustra que aquam emitti, quæ vitiato illo subinde nasca-  
 tur. Sed primū non huius visceris vnus hoc vitium est.  
 Nam splene affecto, & in totius corporis malo habitu fit:  
 deinde, ut inde cœperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ con-  
 tra naturam ibi subsistit, & iocinori & cæteris \* interioribus  
 partibus nocet. Conuenitque corpus nihilominus esse cu-  
 randum. Neque enim sanat emissus horror, sed medicinæ  
 locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud qui-  
 dem in controuersiam venit, quin non omnes in hoc morbo  
 sic curari possint, sed iuvenes robusti, qui vel ex toto carent  
 febre, vel certè satis liberales intermissiones habent. Nam  
 quorum stomachus corruptus est, quive ex atra bile huc de-  
 ciderunt, quique malum corporis habitum habent, idonei  
 huic curationi non sunt. Cibus autem quo die primū hu-  
 mor emissus est, superuacuum est, nisi si vires defunt. Inse-  
 quentibus diebus & his vinum meracius quidem, sed non ita  
 multum dari debet, paulatimque euocandus æger est ad exer-  
 citationes, frictions, solem, sudationes, \* nauigationes, &  
 idoneos cibos, donec ex toto conualescat. Balneum rarum  
 res amat, frequentiore in ieiunio vomitum. Si æstas est, in  
 mare natare commodum est. Vbi conualuit aliquis, diu ta-  
 men alienus ei Veneris usus est.

\* antea  
al. non ita

\* inferiori-  
bus

\* fatiga-  
tiones,

ENAR-



## ENARRATIO.

**A**SCLEPIADES Hydropem acutum vocavit, non qui cito finiretur ( ut rectè hic acutum morbum definit Celsus ) sed qui repente constituitur; ut tardum, qui cum tarda passione vexat; rursumque hydropem alium cum febris, atque alium sine iisdem definiuit.

## Atque eius tres species.

**DIOCLES** tamen tantum duplicem esse hydropem dixit, hypofarcam videlicet, & ascitem: vanum nanque esse & intellectum carens sine ullo humore superfluo laborantem hydropem vocare. Demetrius tamen Herophili sectator, alium hydropem sine ullo humore constitui dixit, sed sola inflatione surgente, alium ex alio humore, & eum quidem nunc per totum corpus diffundi, nunc inter peritonæum & intestina. Idem asserere videtur Hippocrates libro De ratione victus in morbis acutis, dicens: Hydropum due sunt nature; quorum alter sub carne si fieri aggreditur, inenitabilis est; qui verò cum inflationibus sit, multa bona fortuna habet opus, maximè autem ætatis & temperantia. Galenus locum hunc suspectum habet, & Hippocratis esse negat. Proculus aliter hydropis differentias confundeat: Initium enim aqua intercutis esse dicebat leucophlegmatiam, quum videlicet secundum carnem fieri mutationes viderimus; statim verò tympanitem, quando summa tensio secundum ventrem fuerit facta; declinationem verò ascitem, quum quadam indulgentia inflatio fuerit relaxata. Dura admodum nec satis conueniens collatio: nam quantumvis aliquis statui appositæ tympanitem, ut qui reliquis molestior & periculosior sit, collatum dixerit; assequi tamen non possum, cur ascitem declinationi, anasarcamque principio compararit.

## Communis tamen.

**IN** tympanite tamen est stultenti potius humoris abundantia: ob quam causam Hippocrates quarta sectione Aphorismo-

rum, eandem siccam aquam inter cutem vocauit.

## ob quam.

**ID** in anasarca potissimum, deinde in ascite, locum habet: nam si, ut ait Hippocrates, vlcera non prius ad cicatricem perducuntur, quam sufficienter exiccata sint, in anasarca, in qua totius corporis miscella, spongia instar, humida & laxa existit; & in ascite, in qua inter peritonæum & intestina potissimum copiosus humor aquosus continetur, vlcera difficillimè cicatricem admittunt: quibus si addas totius sanguinis vitium ( cuius, si quod aliud, bonitas requiritur ad inducendam cicatricem, atque substantiam deperditam restaurandam ) nihil difficilius erit in omnibus etiam hydropis speciebus, quam vlcera carne implere, ac iisdem cicatricem obducere; adeo rectè ex Hippocrate hic insert Celsus, aqua inter cutem laborantibus, vlcera qua in corpore sunt, non facile sanari.

## Sæpe verò hoc malum.

**HEPATIS** nimirum functione primario vitata, quum egiendo sanguini parum valet: unde in alienam quandam substantiam mutato succo, alendo corpori vsum esse non potest; quem dum in subiectas ac maximè vicinas partes reiecit, in vastum tumorem corpus attolli necesse est, secundum ventrem præsertim & viscera.

## Sæpe alteri vetusto morbo.

**MULTI** enim ex podagra aut coxendicum dolore, alij ex orthopnea, nonnulli ex peritonæi aut vulue in mulieribus scirrhus, aut duricie, alij ex dysenteria, plurimi etiam ex arquato, & malo corporis habitu in hydropem inciderunt; vti etiam multi ex mensibus hæmorrhoidibusque suppressis; facile enim aliis visceribus, puta lieni, pulmone, ventriculoque, coarctantur hepar.

## maximeque quartanæ.

**QUARTANA** si longior sit, ferè in aquam



aquam inter cutem, ut ante dictum est, degenerat, quod in ea magna sit lenis obstructio.

### Facilius in seruis quam in liberis tollitur.

ISTHVC quam sit verum, docet Antonius Beniuenus capite XIII. Siquidem is à rustico quodam interrogatus, qua potissimum ratione à morbo iam inueterato liberari posset, subridens respondit, opus esse non vltra biberet, quam ut vitam sustineret. Discessit ille, ac toto anno ab omni potu abstinens, reuertitur ad Beniuenum, rogatque an ulteriore potus abstinentia opus esset. Admiratus ille hominis constantem abstinentiam, inquit paulatim vino assuescere, ac ita tandem curiosa portione usus pristina sanitati restitutus est.

### Inter initia tamen.

SI lenis tantum obstructio sit hepatis, citra scirrhum aliquam duriciem, facile inter initia citroque curatur hydrops; praesertim si quiete ad concoquendos cibos sufficiente, siti, atque inedia agrotantem detineamus; ita enim fiet, ut & aquosus humor dissipetur, exicceturque, & vires ex ingesto cibo reficiantur; alioqui semper in longissimum tempus producet, & difficillime medicamentis cedit.

### Quod si redditur.

VOMITVS si quo modo pronocari potest, in hydropicis commodissimus est: quare in incipiente hydropisi omnibus modis sollicitandum monet Aetius. Non mirum igitur, si Methrodorus ille Epicureus ex aqua quam vomitu reiecit, lenamen sensit, ut puta qua simul & sitim sopierit, & vomitione peccantis materia portionem aliquam expurgarit.

### Si febris quoque.

AB aqua inter cutem, inquit Hippocrates, non valde fortis febris, neque diuturna oritur: nam igni non valde bonum alimentum ex aqua praebet. Studendum tamen est, ut si qui hydropici febricent, febris intermissione cessent, ac tum quidem,

ab acrioribus, calidioribusque cibis abstinendum est: quinetiam nocuum est, cataplasmata, inunctionesque calefacientes admo-  
nere praecordis; neque ita sunt cuiuscunque generis pharmaca acriora. In summa, ita actionem nostram moderari studebimus, ut vehementiori magisque urgenti omnibus, quoad fieri potest, modis subueniamus.

### Atque hic quoque.

NON tamen omnes Hydropis species inter initia iisdem auxiliis opus habent: siquidem etsi purgationem omnes requirant; sola leucophlegmatia (potissimum quae sup-  
pressos aut menses, aut haemorrhoides sequitur) sanguinis missione ante omnia flagitat.

### Multum ambulandum.

HIPPOCRATES libro De morbis vul-  
garibus, etiam defatigandos laboribus dicit hydropicos; id enim exiccat, & cutem poroque, sicut frictio reliqua quae subin-  
git, laxiores reddit, ac serofos humores per sudores elicit. Frictio autem ipsa mediocris esse debet, ut docet Trallianus, ut humores facilius enaporent, & tanquam ex superficie summae cutis extrahantur: nam alio-  
qui si vehementior sit, violentia quadam materia ex imo raperetur.

### sed etiam in arena calida.

QVAM sit salubris post euacuationem Hydropicis arena suggestio, praecedente li-  
bro, ubi de insolatione egi, abunde declaratum est: multi etenim fatentur sese aqua inter cutem laborantes ad pristinum reduxisse statum, solius marinae arenae aggestione: ea autem ita faciendae est, ut agroti corpus deficiatur sub arena, ac eadem obruatur, solo excepto capite: quod tamen velatum esse conuenit, ne calore solis ledatur, porrigendaque ab astante ministro frequentius recens arena est; ita enim fiet ut sudor felicius subsequatur, & aquosus humor educatur. Si autem marina arena ad manum non sit, in eius locum substituere licet flumiatilem, cui modicum salis admixtum sit, est tamen marina lenior & magis rescicans.



**Potio non vltra danda est.**

PLVRIMVS frequensq; potus incommodus, ut qui maxime est Hydropicus; neque enim (ut ait ille) sitim pellunt, nisi causa morbi. Dandum igitur tantum, quantum & ad sustentandam vitam, & infringendam sitim satis sit. Potus ergo esto vinum vetus, tenue, & austerrum; id enim non modo urinam pronocat, sed & humiditatem superfluum exiccat: à dulcibus recentibusque vinis in totum abstinendum est.

**Sed id ipsum.**

NAM praterquam quod citius familiarior natura est, etiam in propriam substantiam facilius alteratur; medicamenta vero omnia quatenus talia sunt, à natura aliena censentur; alia enim vesicam commonent, alia intestina lacerando ulcerant, alia termina faciunt, alia stomachum subvertunt, fastidiumque cibi generant, & sitim extendunt.

**iris.**

EXTENVANDI calefaciendique vini obtinet: succus autem eius maxime hydragogum medicamen est, si denariorum duorum pondere sumatur; ut multiplici experimento compertum est.

**nardum.**

CALEFACTORIVM & exiccans est, compositum ex substantia multum astringente & acri, calida non multa, & quadam modica subamara; iecori amicum, atque urinae pronocande utilissimum.

**crocum.**

ID quoque urinam pronocat: eiusdem plane energia sunt, cinamomum, amomum, casia, myrrha &c. atque id quidem alia aliis intensius.

**vuva tyminia.**

TAMINIA legendum est: nam, ut ait Plinius, Staphidagrian, aut Staphin quidam falso vuam taminiam vocant: maturescit cum vindemia, nigrescitque cum taminia rubentes nonerit acinus. hoc Plinius. Prodest autem Hydropicis, quod, si intus sumatur,

per vomitum crassam ac pituitosam materiam reiiciat. Cupressi autem semen, quomodo hoc elogio celebravit, non video; nisi forte ideo prodesse dicat, quod cum astringente caliditatem quandam coniunctam habeat; unde & exiccet, & robur laxi pariculis subministret.

**rosæ folia.**

ROSARVM vis ex aquea calida substantia, duabus aliis qualitatibus, astringente videlicet & amara mixta, composita est: quo fit ut & fluentem alium compescant, praesertim si sicca atque exicca fuerint; & vice versa, longo rerum usu compertum habeamus, eandem succum, bilem & aquas expurgare: quanquam id veterum nonnulli non animadverterint, aut saltem non meminerint.

**Neque alienum est.**

NAM, ut Hippocrates libro De indicationibus, in his qui hydropes detinentur, si aquositas per ventrem ad vesicam aut ventrem sit, solutio fit; & si à pituita alba occupato alui profluvium vehemens acciderit, solutio fit: nam etiam si copiosa mictio morbo nihil adimat, quod tamen ferè facit; indicat tamen bonam concoctionem: nam, ut in Aphorismis Hippocrates, mictio nocturna plurima facta, parvam significat fore deiectionem.

**Asclepiades in eo.**

LONGIOR ac difficilior ex quartana est hydrops, quam ut tantillo negotio curari posse credam.

**Ergo si inflammatio.**

HIC variant exemplaria: nam Pinzanum inflatio legit; reliqua male, ut bene annotavit Paracelsus, inflammatio substituerunt; ita ut per inflationem hydropem tympanitem intelligamus: huic etenim fomenta sicca calidaque optima sunt, & cucurbitula saepius repetita presentissima sunt remedia, siue cum scarificatione, siue absque eadem affigantur.

**Vltimum auxilium est.**

SI simplicem aquam iniicias, parum profeceris;



profeceris; sin discutientia eidem adieceris, plurimum adiuveris.

### Quin etiam quotidie.

**C**VR totum corpus, solo exceptio ventriculo, qui flatibus maxime distenditur, fricari velit, mirandum est, alius contrarium longe asserentibus, ac dicentibus ventrem tantisper perfricandum aspero linteo, dum vinido quodam colore cutis efflorescat, atque rubore suffundi incipiat: neque id inintia; nam si frictio continentes meatus aperit, humores desiccat, flatus discutit, extenuat, disiccat, recte eidem parti quæ maxime afficitur adhibetur, ac nisi adhibeatur, obstructis meatibus flatuosi spiritus peritonæum ipsumque ventrem magis distendunt; quod sentiens Celsus, sibi per omnia non satis constans ventri sinapisimos applicat, candentibus plumbeis exulcerandum ventrem pluribus locis admonet, eademque ulcera diu aperta seruanda docet: quo sit ut omphalo inducar ut credam, locum hunc non citra mendæ suspensionem legi, atque sic, ni quid obster, restituendum: Sed in hac frictione, à ventre abstinendum non est, imponendumque in eum crebrius sinapi. quanquam si quis aliam lectionem seruare malit, per me integrum est; præsertim quando ex antedictis constet satis Celsum hinc inde, modo ex empiricorum, nunc methodicorum placitis sine ordine in suum volumen redegissem.

### Vtiliter etiam scilla.

**Q**UOMODOCUNQUE viamur, scilla maximi usus est: nam quum acris sit & tenuium partium, extrinsecus apposta, cutim quodammodo exulcerat: in vino autem ad tertias decocta, cochlearis vniue aut alterius mensura sumpta, citra molissimam aquosum humorem euacuat.

### At si id vitium.

**L**EVCOPHLEGMATIAM modò anasarcam, nunc hyposarcam & hyposarcidion nominant.

eas partes quæ tument.

Non solum velandum capni est, si sol

calidior sit, sed totum etiam corpus ab insolatione arcedum est; periculum enim esset si supercalesceret corpus, ne febres accenderentur, unaque cum ipsarum febrium generatione tumores duplicarentur, atque id multo magis, ut auctor est Aëtius, quum febres remittunt, ac tumores refrigerationem capiunt.

### Vtilia etiam.

**E**A videbunt quæ robur visceribus ad-  
dunt, & reficere simul possunt: qualia sunt quæ ex cotoneis, myrti bacca, malicorio, & similibus consunt.

### Incidendum quoque est.

**I**STHVC præsentissimum esse in hydropicis remedium affirmabat Asclepiades, peracta incisione ea profunditate, qua venam secare soleamus: nam posteaquam tenuis quidam aquosusque sanguis effluxerit, sensim indefinenterque aquosus humor effluere incipit, qui non compescitur antequam totus euauerit. Atque id quidem adeo necessarium nonnulli esse contenderunt, ut nisi statim fieret, aliis in locis, quæ breui intumescerent (puta seroto, & similibus) obeunda esset scitio.

### Concutiendumque.

**I**D post inunctionem faciendum est, ac tum quidem si sudor premānet, linteis abstergendus est, ne obstipentur meatus.

### Cibus valens esse debet.

**H**OC ex præscripto Hippocratis libro. De ratione victus in morbis acutis facere videtur, qui suillas carnes hydropicis dandas dicit, ut aduersus arduas resisterent obambulationes: quanquam id quoque non in omnibus faciendum suadeat Galenus; verum in iis tantum qui & validi sunt & florentes ætate: nam alioqui concoctioni repugnabunt, & viscerum obstructions parient.

### Vinum (si per stomachum, &c.

**D**VICIA vina nullumque, si quod aliud, vitanda sunt, nisi eadem substantia tennea sint, atque urinam pronocent; siquidem



dem hydropicis id tantum vinum ex usu est, quod tenue sit & pauciferrum, quodque lotium cieat.

### Auctoresque multi sunt.

AVCTORES sunt Archigenes, & Herodotus, qui pulsandos tumentes locos vesicis bubulis, aut etiam aliis magnis ac probe inflatis ac vacuis afferebant; inde enim citra molestiam carnem condensari, neque dolore neque reperensione duriore resultante.

### Si verò id morbi genus.

CVR in ascite, quam tympanite aut anasarca, minus ambulandum dicat, valde demoror; præsertim quando hic, si usquam alibi, exercitium, ut quod exiccet, & poros referet, usui esse possit.

### malagma quod digerat.

ITA ligamenti constringendus est ager, ut ab inferioribus partibus incipiamus, ac ligamentorum distributionem ad superiores partes faciamus, ita ut sæpe (sicut monet Aëtius) super ipsa ligamenta spongas posita imbutas in xta tumefactas maximè partes imponamus.

### Si per talia.

HIPPOCRATES sexto Epidemion, ὁδὴ τὰ δάκρυα τῶν ὀφθαλμῶν, hoc est hydropicos citius secare oportet: aut per τὸ τῶν ὀφθαλμῶν, punctiones intelligens, quas Græci πνεύματα nominant.

### Neque ignoro.

QVAMVIS non solum Erasistrato, sed & Ptolemao & Thessalo atque Euenori

eorumque sectatoribus suspecta fuerit hydropis ascites per paracentesin curatio, quod quum passionis causam dicant esse iecinoris duriciem, supercreatam verò humoris infusionem, paracentesis humorem detrahens passionem non minuat, siquidem non auferat causam ex qua humor sit creatus. Hippocrati tamen, Aëtio, Paulo Æginetæ, atque aliis summè semper commendata est: nam præterquam quod tensionem difficultatèmq; spirandi amoveat, medicinæ etiam locum facit, dum enacnato humore, tutum sit localia medicamenta applicare, quæ alioqui irrita essent. Non ferunt tamen omnes hanc curandi rationem, verum ij tantum, qui & viribus polleant, & ætate floreat; tales enim sola paracentesi restitutos legimus.

### Nam splene affecto.

QVANTUM obstructionem splenis, malum corporis habitum, mensum aut redundantiam, aut suppressionem, & id genus alia innumera hydrops comitari soleat, ex simplici tamen lienis obstructione, cachexia, & similibus nunquam superueniet, nisi per sympathiam coaffecto hepate: quare bene Erasistratus hepatis affectum esse dixit.

### Si æstas est.

LOCORVM & aquarum mutatio est adhibenda, & peregrinatio magis maritima, inquit Galienus: est enim lacerantior, & corporis apertionibus magis efficax maritimus aer, ob salsedinem.

## CAPVT XXII.

### De Tabæ, & eius speciebus, & curationibus.

DIVITIJS sæpe & periculosius Tabes eos malè habet, quos inuasit. Atque huiusquoque plures species sunt. Vna est, qua corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis verò in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur, & nisi occurratur, tollit: αἰσθητικὴν hanc Græci vocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit.

Aut



Aut enim nimio timore aliquis minùs, aut auuiditate nimia plusquàm debet, assumit: ita vel quod deest, infirmit: vel quod superat, corrumpitur. Altera tabis species est, quam Græci καχεξία appellant, vbi malus corporis habitus est, ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Quod ferè fit, cum longo morbo vitiata corpora, etiam si illo vacant, refectiorem tamen non accipiunt, aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria defuerunt, aut cum inusitados & inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidve simile incidit. Huic præter tabem illud quoque nonnunquam accidere solet, vt per assiduas pustulas aut vlcera summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeque periculosissima species, quam Græci φθίσις nominauerunt. Oritur ferè à capite, inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit, ex hac febricula leuis fit, quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est, pus excreatur, interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaque qui de morbo dubitant, hac nota vtuntur. Cum hæc genera tabis sint, animaduertere primùm oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam eius attendere: & si cibi minus aliquis quàm debet, assumit, adicere, sed paulatim, ne si corpus infuetum, subita multitudo onerauerit, concoctionem impediat. Si verò plus iusto quis assumere solitus est, abstinere vno die, deinde ab exiguo cibo incipere, quotidie adicere, donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quàm minimè frigidis, sole vitato, per manus quoque exerceri. Si infirmior est, gestari, vngi, perfricari, si potest, maximè per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum & post eum sic, vt interdum oleo quædam adiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque ieiuno prehendere per multas partes cutem, & attrahere, vt relaxetur, aut imposita resina & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio rectè cibi aliquid assumitur, aut si sine hoc frictio fuit, post eam



protinus. Cibi verò esse debent ex his, qui facile concoquuntur, qui maximè alunt. Ergo vini quoque, sed austeri necessarius vsus est, mouenda vrina. At si malus corporis habitus est, primùm abstinendum est, deinde aluus ducenda, tum paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, vnctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est, sed ieiunis etiam vsque ad sudorem. Cibi verò opus est copiosis, variis, boni succi, quiq̃ue etiam minùs facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed paulatim quotidieq̃ue pluribus diebus, cum eo, vt cætera quoque eodem modo seruentur. Quòd si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est. Neque enim facilè is morbus cùm inueterauerit, euincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa nauigatione, cæli mutatione, sic, vt densius quàm id est, ex quo discedit ager, petatur. Ideoq̃ue aptissimè Alexandriam ex Italia itur. Fereq̃ue id posse inter principia corpus pati debet, cùm hic morbus ætate firmissima maximè oriatur, id est ab anno \* duodecimo ad annum quintum & trigessimum. Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longè gestari commodissimum est. Si nauigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus dimouendum est, tum à negotiis abstinendum est, omnibꝫq̃ue rebus, quæ sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cauendæ destillationes, ne si quid cura leuaret, exasperetur, & ob id vitanda cruditas, simulq̃ue sol & frigus. Os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remediis finienda, & quàm diu quidem febricula incurSAT, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis medendum. Eoq̃ue tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcordia tument, siue biliosa vrina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est, in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibꝫq̃ue febribus, rectè dari potest. Quòd si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit, recurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq̃ue ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet

\* duodecimo  
ecclimo



bet primò acer, vt allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocymum, lactuca. \* Dein lenis, vt sorbitio \* Deinde ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adiecto. Idem oryza quoque, & si nihil aliud est, far præstat. Tum inuicem, modò his cibis, modò illis vtendum est. Adiciendaque quædam ex media materia, præcipueque vel ex aprugna, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprinove mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet lene, austerum. Hactenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est, ac neque febricula neque tussis quiescit, tenuarique corpus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti, vno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam vtramque: item sub imis ossibus scapularum (quas *ὀμοπλάτας* Græci vocant) sic ne sanescere vlcera sinamus, nisi tussi finita. Cui per se quoque medendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterque die vehementer extremæ partes perfricandæ, thorax leui manu pertractandus, post cibum intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaque. Interpositis denis diebus deimitendus est ager in solum, in quo sit aqua calida, & oleum: cæteris diebus bibenda aqua, tum & vinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si æstas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari, frictiones, gestationesque similiter adhiberi: \* itemque acria \* eadem acria quarto aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, vel plantaginis succus, per se, vel marrubium ex melle concoctum, ita vt illius cyathus sorbeatur, huius cochleare plenum paulatim delingatur, vel inter se mista & incocta resinæ terebenthinæ pars dimidia, butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, & nauis, & sorbitio. Alius cita vtique vitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit, adicere debet exercitationes, frictiones, cibos, deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare, diu abstinere à vino, balneo, Venere.

ENAR-



## ENARRATIO.

**Q**UÆ Latinis tabes vocatur, Græcis φθίσις aut φθορά dicitur: ea autē quam varias causas diversosque morbos subsequatur, ferē pulmonis ulcerationem adiunctam habet: nam siue sanguinis spuitiones, siue empyicos, siue peripneumonicos, seu etiam pleuriticos subsequatur tabes; unus tamen idēque morbus est, atque eandem sedem affectam habet. Quare improprie admodum malum corporis habitum & nutrimenti cessationem, quam ἀτροφία vocant, inter tabis species recensuit Celsus: rectius congeneres, ut qui longa strigosaque macie corpus consumant, vicināsque phthisi passionēs dixisset: quo loco haberi etiam posset empyema, peripneumonia, atque pleuritis; ut quæ, nisi recte curentur, in eandem, ut dixi, degenerent.

## Ατροφία.

**A**B accidenti nomen sumpsit malum; estque potius morbi symptoma quam morbus dicendus, quum longis morbis succedere soleat.

## Altera tabis species.

**VITIUM** hoc aqua intercuti potius quam phthisi ascripseris, quum tota corporis miscella laxior, mollior ac fungosior, in modum leucophlegmatici, quodammodo reddatur; quin & si diutius perseneraverit vitium, in aquam intercuti converti solet.

## Tertia est.

**PERICULOSA** dicitur tabes ex ulcere pulmonis, tum quod pharmacorum vires ad ulcus pervenire nequeant, prius quam in ventre permulentur; tum quod propter continuum pulmonis motum ulcera difficillime conglutinentur, sed tusiendo quodammodo laniantur: nam quum pulmo alias expurgari nequeat, quam per sreatum aut tusim, sit ut tusus vehementia labra ulceris quæ iam quodammodo coharebant, iam iterum disellantur, atque disrumpantur: quin etiam (quod rarius tamen fit) si di-

urna pulmonis ulcera curationem admittant, perfectam tamen cicatricem nunquam obduxis, sed quæ fistulosa quodammodo sit, & quam lenissima occasione refricueris.

## Quicquid exscreatum est.

**EXTREMAM** enim humorum putrefactionem qui in pulmone sunt denotat. Sumpta est sententia ex quinta sectione Aphorismorum Hippocratis, ubi sic scriptum reliquit: Si is qui tabe infestatur, sputum quod tusiendo exscreant, graniter olet carbonibus impostum, & capilli à capite defluunt, lethale est. Celsus defluuij capillorum non meminit; quod non secus ac ipsum sputum considerandum monet Galenus, ut quod alimenti defectionem, & humorum corruptionem denotet.

## Deinde, si tantum modò.

**TRANSGRADITUR** ad atrophiam; cuius curationem optima methodo proficitur.

## sole vitato.

**CONTRARIUM** assererat Themison, quanquam male, qui loco igneo vel ferventi, atque sole torrente, praefatigatos, sudoribusque dissolutos fricari vult.

## Prodestque ieiuno.

**I**N hunc usum dropacibus, malagmatisque, & articulorum lenibus complicationibus viebantur.

## mouenda vrina.

**I**D recte adhiberi docet Paninus, in atrophia orta à copia alimenti.

## At si malus corporis habitus.

**CACHECTICI**, si viziofi humores in causa sunt, statim in principio purgandi sunt: frustra ergò hîc Celsus Methodicorum Cyclum inculcat; siquidem quorsum hic



hic (ubi, si usquam aliis, opus est viribus) primis diebus mediam praescripsi.

tum paulatim tibi dandi.

VICTVS tenuis sit & siccus, cum moderata deambulatione, vociferationes, gestationes, frictionesque siccae per linteola ex lino crudo, deinde per inunctionem ex oleo, cui quadam quae humorem resiccant, sint infusa, cachecticis utilissima sunt, ut quae vires restituant atque recreant.

Vtilius his frequens balneum.

Hoc ad lassitudinis curationem adhibendum docet Aetius, efficaciusque energiam suam exeret, si ex aqua aluminosis, sulphurentis, aut aliqui nitrosi sit.

Cibis verò opus.

VARIETAS ciborum in morbi tantum declinatione conceditur.

Sinihil reliqua proficiunt.

NON semper differenda est sanguinis missio, dum reliqua nihil proficiunt, sed est ubi statim in ipso principio à sanguinis missione curationem ordinatur, puta si ex nimis, haemorrhoidum, vel suppressione ortum sit malum, aut si plenitudo illo modo molestia sit.

Idcoque aptissime Alexandriam.

NAVIGATIO maritima, vii vehemens est exercitatio, ita phthisicis parum conveniens; quum eisdem exercitia medicaria, latentesque, ut sic dicam, motus concedantur tantum: quo fit, ut etiam quam maximè celi mutationem concedamus, eam quam minima fieri potest, corporis conurbatione promouendam dicamus: quare & si curantur navigationes, & quae in vicina portu fiunt, commendantur. Inter reliqua tamen primas obtinent lecti pensiles, ut qui infensibili assidueque, & sibi per omnia simili motu corpus moueant, atque adeo conuersionem admittunt.

id est ab anno.

LOCVM hanc precedente libro explicabimus, ubi singularem aetatis morbos enarrauimus. Ceterum Celsus hic iterum non recedit ab Hippocratis sententia, nonnihil recedere, quum à duodecimo anno ad trigessimum quintum tamen in periculo esse dixit: nam Hippocrates libro quinto Aphorismorum, Tabes, ait, sunt maxime etatibus à decimo octavo anno usque ad trigessimum quintum. Et libro tertio: Totum perueniens ad aetatem, & obdormit. Et ubi per totam aetatem, Galenus intelligi docet eam aetatem, quae inter pubertatem & consistentem media est, quae sub decimo octavo annu magna ex parte incipit, non autem XIIII, aut aliqui XIII, ab eo cauendae distillationes.

QUVM caput, ut auctor est Hippocrates De internis affectionibus, punita impletum, & rotatur, calorque accesserit, punita in capite computrescit, ut quae materiam non potest, ut decedat, postea quum crassescit & putrescit, & hyperexplete veniunt, fluxio in pulmonem fit, & ubi pulvis suscepit, statim agrotat, ut quia punita mordetur, quia falsa est ac putrida. Non iniuria totum cauendas docent distillationes Celsus, ut quae morbi causa existunt, & quare & caput ipsum purgandum, & pharmaco ad nares posito.

Lac quoque

PETITVS est locus ex quinto Hippocratis Aphorismorum segmento, ubi sic ait: Lac dare caput dolentibus & febricitantibus malum est, & quibus hypochondria soluta murruntur, ac sitibundis. Nocet etiam quibus in acutis febribus biliosae sunt deiectiones, & quibus sanguis in iugulo facit. Prodest autem talibus qui non admodum febricitant, & in febribus diuturnis, & quibus si nullum praedictorum si- gnum affuerit. Id præter rationem tenuatis. Prodest autem talibus lac, quod pus, si quod in pulmone est, aspergat, & sic.

y

iriat.



triat. Veteres, ut quinto Methodi docet Galenus, phthoe laborantibus mulierem lactantem astare voluerunt, cum quod id familiare nobis esse censuerint, cum quod sumi voluerint, antequam ab aere nos ambiente refrigeraretur. Quare & hodie à medicis observatum video, ut recens multum lac, astante etiam animale, reliquis magis commendatum habeant, atque id usu ita exigente bibendum dent; cui modò salem, ut libro De alimentorum facultatibus docet Galenus, modò mel admiscant.

### Cibus esse debet.

CAVENDVM tamen est ne nimis acer cibus sit: nam, ut Hippocrates, cibaria & opsonia dentur neque pingua, neque nidiorosa, neque valde acra. Porrum tamen alliumque pulmonis ulceribus conveniunt, propter abstergendi vim aliquam, quã peccatoris excretaiones eliciunt. Præstiterit tamen eadem, ut docet Paulus, exhibere posteaquam chondri & ptissane iure macerata contabuerint.

### apruna.

BENE monet hic Pantinus legendum esse aprugna.

### cum seuo ouillo.

HIS non inefficacior erit adeps cernuus recens in sorbitionibus eliquatus.

### Exulcerandus est ferro candenti.

CAVENDVM tamen est ne prius confer-

tim effluat; periculum enim esset, ut sexto Aphorismorum Hippocrates, ne interirent aut vitam cum morte commutarent: nam, sicut idem libro De internis affectionibus docet, Si pus in thoracem prorumpat, quã tibi monstrare videtur; illic potissimum secans aut urens, primum id exiguum puris emit-  
tito.

### scapularum.

PERPERAM hic Pinzanum exemplar omotidas legit: verum, sicut reliqua exemplaria habent, ἀπομαρτάς legendum est.

### ceteris diebus bibenda aqua.

CÆLESTIS potissimum aqua, si quæ alia, danda est, atque inde confecta resalsa.

### Medicamentum etiam est.

INTER reliqua omnia medicamentum hoc exasperata lenit, fluxus cohibet, ac dissulsa conglutinat.

### Aluiscita vitanda.

HIPPOCRATES septimo Aphorismorum: A puris spuro tabes & fluxus; quum verò sputum retinetur, moriuntur. & sectione quinta, XII. Aphorismo: Quibus-  
cunque tabe laborantibus capilli à capite desinunt, ite alui profluuium superveniens lethale.

## CAPVT XXIII.

### De Comitialis morbi curationibus.

INTER notissimos morbos est etiam is, qui Comitialis, vel maior nominatur. Homo subito concidit, ex ore spuma mouentur, deinde interposito tempore ad se redit, & per seipsum confurgit. Id genus sæpius viros quàm foeminas occupat, ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & vitæ non periculosum. Interdum tamen cum recens



cens est, hominem consumit; & sæpe eum, si remedia non  
sustulerunt, in pueris veneris, in puellis menstruorum ini-  
tium tollit: modò cum distentione membrorum aut neruo-  
rum prolabitur aliquis, modò sine \* illa quidem. Hos \* ac modò  
quoque iisdem, quibus lethargicos excitare conantur: quod \* illa. Qui-  
dam hos  
admodum superuacuum est, & quia ne lethargicus quidem  
his sanatur, & quia cum possit iste nunquam expergisci, atque  
ita fame interire, hic ad se utique reuertitur. Vbi concidit  
aliquis, si nulla neruorum distentio accessit, utique sanguis  
mitti debet. Si accessit, non utique mittendus est, nisi alia  
quoque hortantur. Necessarium autem est ducere aluum,  
vel nigro veratro purgare, vel vtrumque facere, si vires pa-  
tiuntur: tunc caput tondere, oleoque & aceto perungere, ci-  
bum post diem tertium, simul cum transit hora, qua concidit,  
dare. Neque sorbitiones autem his, alii que molles &  
faciles cibi, neque caro, minime que suilla conuenit; sed me-  
dicæ materiæ. Nam & viribus opus est, & cruditates ca-  
uendæ sunt, cum quibus fugere oportet solem, balneum,  
ignem, omniaque calefacientia: item frigus, vinum, vene-  
rem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrentium,  
vomitum, lassitudinem, solitudines, negotia omnia. \* Vbi \* & vbi  
tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem  
alterum quenque, eadem hora cibi seruata, donec quatuor-  
decim dies transeant. Quos vbi morbus excessit, acuti vim  
deposuit. At si manet, curandus iam ut longus est. Quod  
si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is  
qui cadere consuevit, \* ei traditus est, protinus eo genere vi-  
ctus \* habito, qui supra comprehensus est, expectandus est  
dies, quo prolabor, vtendumque tum vel sanguinis missio-  
ne, vel ductione alui, vel nigro veratro, sicut præceptum est.  
Insequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui, vi-  
tatis omnibus, quæ cauenda dixi, nutriendus. Si per hæc  
morbus finitus non fuerit, confugiendum erit ad album ve-  
ratrum, ac ter quoque aut quater eo vtendum, non ita mul-  
tis interpositis diebus: sic tamen, ne iterum vnquam sumat,  
nisi conciderit. Mediis autem diebus vires eius erunt nu-  
triendæ,



\* supra  
scripta

ebom 22 \*  
10 Q. 111 \*  
20 111 \*

trienda, quibusdam, præter ea quæ \* scripta sunt, adiectis. Vbi manere expectatus est, corpus eius leuiter ex oleo vetere, cum capite (excepto ventre) permulceatur, tum ambulatione quàm maximè longa & recta vtatur; post ambulationem loco tepido, vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur, paulum cibi assumat, conquiescat, rursus ante noctem ambulatione vtatur, iterum vehementer perfricetur, sic vt neque venter, neque caput contingatur, post hæc coeet, interpositisque tribus aut quatuor diebus, vno aut altero acia assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur, yngatur oleo vetere, adiecto aceto & nitro, perfundatur aqua salsa, bibat ieiunus ex aqua castoreum, nulla aqua nisi decocta potionis causa vtatur. Quidam iugulati gladiatoris calido sanguine epoto, tali morbo sese liberarunt. Apud quos miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum verò pertinet, vltimum est iuxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere, occipitum incidere, & cucurbitulas admoovere, ferro candente in occipitio quoque & infra, quæ summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, vt per ea perniciosus humor euadat. Quibus si finitum malum non fuerit, prope est, vt perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo vtendum erit exercitatione multa, frictione, cibisque his, qui supra comprehensi sunt, præcipueque vitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

#### ENARRATIO.

**C**OMITTALIS morbus variis atque inter se differentes omnino sortibus est denominationes: siquidem modo Sacer appellatur, vel quod diuinum quid eidem inesse crediderit antiquitas, vel quod magnus ac vehemens sit, maiora siquidem vulgus Sacra vacare solet: sic Sacrum mare, Sacram domum dicimus. Apuleius autem ieger hoc est sacrum morbum à Græcis dictum esse vult, quod anima partem ratio- nalem, quæ longe diuinissima est, violenter. Pueri autem dicitur, quod sensum ac mentem simul apprehendat: Puerilis verò morbus, quod eidem ætati familiaris: Herculeus autem, vel ab ipsa morbi magnitudine; vel quod Herculem eidem morbo obnoxium fuisse fama sit: Comitialis ideo nominatus est, quod si quis illo correptus in comitiis contidisset, eadem interrumpere- tur: Lunaticus autem vocatur, quod si quis interlunio



interlunio concepti aut nati sunt, eodem morbo fere torripantur: de quo Sammonicus: Est subita species morbi, cui nomen ab illo est. Quod fieri nobis suffragia iusta recuset, Sape etenim membris atro languore caducis Concilium populi labes horrenda dimit. Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ Conceptum, talis quem sæpe ruina profudit.

ex ore spumæ.

E A oriri solet ex motus agitationisque vehementia.

Id genus sæpius viros.

ISTHVC an verum sit ambigo; præsertim quando mulieres viris temperie sint humidior ac frigidiore, morbusque sit pituitosus & in pituitosis consistens naturis, ut docet Hippocrates.

Interdum tamen.

VT si acutas admodum faciat accessiones: nam tum ferè hominem consumere, atque lethalis esse solet, nisi magna adhibeatur diligentia, atque impetus morbi refrenetur.

in pueris.

HIPPOCRATES Aphorismorum sectione secunda, Aphorismo XLV. Quicumque, ait, iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis, & temporum, & locorum, & victum quoque liberantur. & libro quinto Aphorismo VII. Quicumque morbi comitiales ante pubertatem eueniunt, mutationem capiunt; quibus autem vigesimo quinto, iis magna ex parte commorantur. Solet namque hic affectus pubertatis tempore, siue noue in foeminis purgationis, aut primi partus puerperio aboleri, critica quadam atque naturali expurgatione peccante materia educta.

Vbi concidit aliquis.

THESSALYS statim in principio phle-

botomandos afferebat, alij in tertium diem differendam phlebotomiam censuerunt. Soranus alios statim in initio, ut si morbus urgeret, neque ciborum cruditas obflaret, sanguinis eductione curabat; aliis quibus cibos crudos & inconditos adhucdum inesse putabat, tertio tantum die tundendam venam arbitratu est. Aegineta post accessiones, si nihil prohibeat, sanguinem è cubito mittit.

Neque sorbitiones.

VICTVS enim incidens attenuansque epilepticis conuenit: quare neque qui facile corrumpitur aut in alienam qualitatem transmutatur, neque crassi succi cibis, neque qui stultulentus est, iisdem conuenit.

Balneum.

PAVLVS tamen Aegineta, ubi satis purgati sunt, balneo eosdem credit.

Venerem.

NIHIL æque epilepticis nocuum est, atque concubitus seu Venus: quam non immerito quidam paruam epilepsiam vocauerunt, quodam similem faciat membrorum motum, diuerso contractu, anhelatione & sudore attestante, & oculorum conuersione, cum rubore vultus, ac deinde post effectum displicere faciat sibi, corpus cum pallore & quadam debilitate vel inæstidine.

loci præcipitis conspectum.

NON solum præcipites loci, sed & gurgites rapidique flumines, ac rotarum circumrotationes nocua sunt, sicuti omnis strepitus, terror, nimia perspiratio, odores aut nimis boni, aut mali, quorum aliqui sufficit epilepticos statim concidere faciunt, ut est bitumen, gagates, cornu cerui, bdellium, storax, atque id genus alia.

Vbi tertio die.

ET hic suam diuisionem obseruat, quum tamen tam opus esse viribus dixerit: sed neque si decimum quartum transgrediatur diem, acuti vim deposuerit, quum & vigesimo & quadragesimo indicari possit, atque absolute curari. Talis enim non est epilepsia, ut inter acutos simpliciter, quos Hip-

ocrates



poocrates in xliij. diebus finiri docet, recenseri debeat; verum potius inter actus ex decidentia: quanquam interdum, licet rarius, eosdem etiam ante decimumquartum diem finiri videamus.

#### tum ambulatione.

NON solum obambulationes, sed & omnis generis exercitationes in palastra, & gestationes quae equo fiunt, utiles sunt, si ante cibum fiant: incipiendum tamen semper à blandioribus minoribusque exercitiis, sensimque ad vehementiora deveniendum est; terminus autem seu finis obambulationis exercitationisque sit anhelitus alteratio.

#### deinde per caput multa aqua frigida.

ID suspectum habet Alexander Trallianus: Nam si quando, inquit, in solium descendit, neque caput identidem immergat, neque larga aqua madefaciat; verum semel atque iterum, seu tertio ad summum.

#### sic ut neque venter.

FRITIONIS ratio haec sit: Primum à brachiis auspicandum est; secundo ad pe-

ctus descendendum, & ad ventrem; deinde ad coxendices: sit autem valida frictio, ut aliquid caloris corpori accedat, atque humores euocentur. postremo quando particulis robur aliquod aut firmitas affuerit, caput quoque, sed lenius, perfricandum est; periculum enim esset ne si primo à capite frictionem ordiamur, omnis materia confestim eò consueret. Ventrem autem quare intactum esse voluerit Celsus, nondum assequor.

#### castoreum.

CALEFACIT, exiccat, extenuandisque vi prae dictum est castoreum, nervis laborantibus, affectibusque ex copia humorum ortis utiliter exhibetur.

#### Quidam iugulati.

HIC Plinium videre licet, apud quem eadem fere quae hic dicit Celsus, leguntur in praefatione libri XXVIII. Sanguinem, inquit, quidam gladiatorum bibunt, ut bibentibus populis procul sint comitiales morbi, quod spectare facientes eadem arena feras quoque horror est. Scribonius Largus idem tribuit hepati gladiatoris iugulati.

### CAPUT XXIII.

#### De Regij morbi curatione.

**•: quemque;** **A**EQUE notus est morbus, quem interdum Arquatum, interdum Regium nominant. \* Quem Hippocrates ait, si post septimum diem febricitante agro superuenit, tutum esse, mollibus tantummodo praecordiis substantibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur, etiam prodesse: si post hunc febris, occidere. Color autem eum morbum detegit, maximè oculorum, in quibus quod album esse debet, fit luteum. Solerque accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & praecordiorum dextra parte durities, & ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumque resolutio, atque ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere agrum



ægrum oportet, secundo ducere aluum, tum si febris est, eam victus genere discutere. Si non est, scamoneam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulsâ nucas amaras, absinthium, anisum, sic ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoque falsam, & quidem per biduum, purgationis causa bibere cogebat, iis quæ urinam mouent reiectis. Quidam superioribus omissis, per hæc & per eos cibos, qui extenuant, idem se consequi dicunt. Ego ubique, si satis virium est, validiora, si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modicè cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere græcum, falsum, ut resolutio ventris maneat; tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse; intra aquam manere, deinde ad superius genus victus reuerti, cum eo, ut magis satietur, omisso græco vino, bibere integrum austerum: atque ita per hæc variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad falsum vinum redeat. Per omne verò tempus utendum est exercitatione, frictione, si hyems est, balneo; si æstas, frigidis \* nationibus: lecto etiam & conclauis cultiore clauso loco \* uti, ludis, lasciuiâ, per quæ mense hilaretur. Ob quæ Regius morbus dictus videtur. Malagma quoque quod digerat, super præcordia datum prodest, vel arida ibi ficus imposita, si iccur aut lienis affectus est.

\* nationibus  
\* ut & la-  
dis

## ENARRATIO.

**V**ARIA item nomina & hic morbus sortitus est: nam nunc Icterus dicitur, à similitudine ad animalculum quod in ne appellatur, siue vinerra, hoc est mustela sylvestris, quæ auricolores habet oculos, ut habet Aëtius; vel potius, sicut Plinio placet, ab ictero aue, quæ, ut idem dicit, à colore sic vocatur: quæ si spectatur, sanari id malum tradunt; auem autem mori. hanc putat Latine vocari Galgulum. Arquatius verò à celestis arcus similitudine: Aurigo autem ab auri pallore, quem bilis per vniuersum corpus dispersa representat, dictus est. Re-

gius autem signatur nomine morbus, ait Serenus Sammonicus, Molliter hic quoniam celsa curatur in aula; hoc est, quod mulsi potione, quæ in regum erat deliciis, curetur.

## Quem Hippocrates ait.

**H**IPPOCRATES sectione quarta Aphorismorum: Quibus in febribus regius morbus ante diem septimum accidit, malum est. & paulo post: Quibus in febribus septimo, vel nono vel XI, vel XIIII. morbus regius successerit, bonum; nisi dextrum hypochond-



*hypochondrium durum fuerit: Celsus molliem praecordiorum adesse voluit, quod idem est: nam ut durities hepatis, si in dextero latere; lientis, si in sinistro, inflammationem denotat; ita mollicies securitatem ab eadem pollicetur.*

### Drocles.

IDEM Plinius & Auerrhoës senserunt, qui etiam ante septimum diem, superuenientem in febribus icterum non formidauerunt.

### Color autem.

SIC Plinius libro XXVI, Morbum regium, inquit, in oculis praecipue mirari est, tenuitatem illam densitatemque tunicularum felle subeunte.

### praecordiorum dextrâ

#### parte.

NON semper sequitur praecordiorum dextra parte durities: neque enim semper (ut De locis affectis docet Galenus) in morbo regio locus affectus est: hepar: siquidem videmus nonnunquam icterum nequaquam affecto, per morbi indicationem effundi ad cutem bilem pallidam: quo modo abscessus quoque aliqui enenire consueverunt. Videmus etiam aliquando citra morbi indicationem, sanguinem ab extraneâ aliquâ occasione corruptum, biliosum effici: qualis etiam à feris mordentibus fieri solet. Accidere

etiam potest, ut icterus secundum naturam temperatura mutata, humores huiusmodi vitio afficiantur. & quidem citra obstructionem, aut inflammationem, aut scirrhum. Quinetiam manifeste, quandoque videmus, uniuersum corpus herbis candenti pallore similari, interdum plumbeum, aut etiam magis fuscum colorem referre, interdum etiam alias quasdam ineffabiles colorum proprietates, quae ictere suo munere non fungente accidere solent. Sic ob splenis quoque vitia huiusmodi colores eneniunt, sed multo nigriores quam ab hepate. Hæc Galenus.

### secundo ducere aluum.

IN principio tamen, ut recte monet Aërius, purgandum non est, sed statim depilantibus utendum; hisque attendenda est, ac quodammodo ad intestina reducenda; atque tum demum medicamento fortiducenda alui est: qua ratione & scammoneam potui dandam auctor est Celsus.

### lecto etiam & conclau.

SIC ut iam dixi, Serenus Sammoniacus, Regius est, inquit, signatus nomine morbus, Molliter hic quoniam celsa curatur in aula. Varro autem ac Plinius quod mulsi potione, quæ in regum erat delictis, curaretur, Regium morbum dictum voluit.

## C A P V T XXV.

### De Elephantia curatione.

IGNOTVS autem penè in Italia frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem *ἰλεφαντία* Græci vocant, isque longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque; quæ si squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, suræ, pedes intumescunt.

Vbi



Vbi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur, febricula oritur, quæ faciliè tot malis obrutum hominem consumit. Protinus ergo inter initia sanguis per \*biduum mitti debet, aut nigro veratro venter solui, adhibenda \*tum quanta sustineri potest, inedia est; paulum \*triduum tamen deinde vires reficiendæ, & ducenda aluus: post hæc, vbi corpus leuatum est, vtendum est exercitatione, præcipueque cursu, sudor primùm labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus euocandus, frictio adhibenda, moderandumque inter hæc, vt vires conseruetur, balneum rarum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine inflantibus. Vinum præterquam primis diebus, rectè datur. Corpus contrita plantago, & illita, tueri optimè videtur.

## ENARRATIO.

PLINIVS Historia Naturalis libro xxvi. Diximus, inquit, elephantiasin, ante Pompeij Magni aetatem non accidisse in Italia; & ipsam in facie sæpius incipientem, in nare prima veluti lenticula, mox inualescente per totum corpus maculosa variis coloribus, & inæquali cute, alibi crassa, alibi tenui, dura seu scabie aspera, ad posterum verò nigrescente, & ad ossa carnes ap-primente, intumescitibus digitis in pedibus manibusque. Egypti peculiare hoc vitium; & quum in reges incidisset, populis funebre; quippe in balneis solia temperabantur humano sanguine ad medicinam eam. Galenus Satyriasis appellat, quid eo morbo affecti faciem habeant Satyris similem; nasum videlicet sinum, & labia crassa: alij Leontiasin nominare maluerunt. Anicennas, vt ante Fuchsum doctissimè disserit Ioannes Mainardus, lepram nominat; sciti etiam ad vnum omnes Arabes elephantiasin Gra-

corum in suam lepram conuerterunt, ita vt certum sit longè aliam esse Græcorum elephantiasin, ab elephantiasi Arabum; & rursum aliud esse Arabum lepram, aliud Græcorum.

aut nigro veratro.

Id interpositis aliquot diebus post sanguinis missionem faciendum est, neque semel tantum, sed bis, ter, & amplius; sic tamen vt intermedio tempore, conueniente victus ratione, egroti vires reficiantur.

adhibenda.

Idque potissimum vt tota corporis miscella immutetur.

Vinum.

PAVLVS à vino & Venere per totum morbi curriculum, abstinendum docet; si tamen vires à purgatione superflua labascant, ad easdem refacillandas pauxillum vini tenuis ac diluti dumtaxat concedit.

## CAPVT XXVI.

De Attonitis, & eorum curatione.

ATTONITOS quoque rarè videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo,



morbo, *ἀποπληξία* hunc Græci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alui duactione utendum. Tum adhibendæ frictiones, & ex media materia minimè pingues cibi, quidā etiam acres, & à vino abstinendum.

## ENARRATIO.

**A**TTONITI modò dicuntur qui tonitru aut fulminis ictu obstupefunt; eaq; est nominis propria significatio: interdum etiam dicuntur ij qui morbo (quem *ἀποπληξία* Græci vocant; quòd tanquam ex lethali percussione repentinū faciat casum) correpti, motu & sensu particularum totius corporis privati sunt; idq; quando commune nervorum principium, nempe cerebrum, affectum est.

His sanguis mittendus est.

POTISSIMUM si à sanguinis copia confertim in cerebrum irruentis, apoplexia orta sit; ac tum quidem tantum sanguinis detrahendum est, quantum vires citra iacturam ferre possint: commovere enim sanum oportet, non exoluere vires, aut innatum calorem extinguere. Inspectendus enim agri pulsus & faciei color, & respiratio in euacuatione, & si nihil mali ex viriū im-

becillitate subsequatur, non verebimur iam iteratò venam tundere.

Veratro quoque albo.

HELLEBORVM album exhibet ad educendum, si fieri potest, per superiora, hoc est, per vomitionem. Per alui autem deiectionem eam intelligit quæ per enemata obitur.

Tum adhibendæ frictiones.

NON modò adhibenda sunt frictiones, sed & innationes illitionesq; ac magna cucurbitula.

& ex media materiam.

CVIVSMODI erit qui mollis ac lenis est, nec distributioni rebellis, & qui simul calidus sit, ac exterforia vi præditus. A vino autem in totum abstinendum; locòque eius mulsæ, aut simile quid propinandum est.

## CAPVT XXVII.

De resolutione nervorum, quæ Apoplexia  
vel *παράλυσις* dicitur.

**A**T resolutio nervorum, frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres auctores illud *ἀποπληξία*, hoc Paralyfin nominauerunt. Nunc utrumque Paralyfin appellari video. Solent autem qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi, ac si \*correcti non sunt, diutius quidē viuunt, sed rarò tamen ad sanitatem perueniunt, & plerunque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. In partibus verò nunquam acutus, sæpe longus, fere \*sanabilis morbus est. Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud curationis genus, vix unquam sanitatem

\*correpti

\*insanabilis



tatem restituit, sæpe mortem tantum differt, vitam interim infestat. Post sanguinis missionem, si non redit & motus & mens, nihil spei superest. Si redit, sanitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta est, \* proderit malo corporis, vel sanguis missus, vel alius ducta. Cætera eadem in utroque casu facienda sunt. Siquidem vitare præcipue convenit frigus, paulatimque ad exercitationes reuertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet, vel gestetur, vel motu lecti concutiat, tum id membrum, quod deficiet, si potest, per se: si minus, per alium moveatur, & vi quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest etiam \* torpentis membri summam cutem exasperasse, vel vrticis casam, vel imposito sinapi, sic ut ubi rubere cœperit corpus, hæc remoueantur. Scilla quoque contrita, bulbiq; contriti cum thure rectè imponuntur. Neque alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulas admouere. Vnctioni verò aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo mistum. Quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen salsa magnopere necessarium est. At si quo loco vel naturales, vel etiam manufactæ tales natationes sunt, iis potissimum utendum est, præcipueque in iis agitando membra, quæ maximè deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeque ex venatione: potio sine vino aquæ calidæ. Si tamen vetus morbus est, interponi, quarto vel quinto die purgationis causa vinum Græcum salsum prodest. Post cænam utilis vomitus est. Interdum verò etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet vomere, non medicamentis urinam mouere, \* non sine exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento \* spiritu, ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ, balneo raro utendum, mutandum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est, deinde inuolunda, &

\* providet  
al. pro vi  
& m. c. v. f.  
mittendus,  
v. a. ducen-  
da.

\* torpenti-  
bus mem-  
bris

\* non exer-

\* spiritu,  
exer.



da, & subiicienda pruna lenis, & sulphur, atque ita id suffu-  
 migandum, idque aliquandiu faciendum. Sed ieiuno, cum  
 bene iam concoxerit, cucurbitulæ quoque sæpe dolenti parti  
 admouendæ sunt, pulsandusque leuiter inflatis vesicis bubu-  
 lis is locus est. Vtile est etiam seuum miscere cum hyoscy-  
 ami & vrticæ contritis seminibus, sic, vt omnium par modus  
 sit, idque imponere, fouere aqua, in qua sulphur decoctum  
 sit. Vtricoli quoque rectè imponuntur aqua calida repleti,  
 aut bitumen cum hordeacea farina mixtum, atque in ipso  
 potissimum dolore vtendum gestatione vehementi est, quod  
 in aliis doloribus pessimum est. Tremor autem neruorum  
 æquè vomitu, medicamentisque vrinam mouentibus\* inten-  
 ditur. Inimica etiam habet balnea, assasque sudationes. Bi-  
 benda aqua est, acri ambulatione vtendum, item vnctioni-  
 bus, frictionibusque maximè per seipsum, pila, similibusque  
 superiores partes dimouendæ, cibo quolibet vtendum, dum-  
 modo concoctioni vtique studeatur. Secundum cibum cu-  
 ris abstinendum. Rarissima Venere vtendum est. Si quan-  
 do quis in eam prolapsus est, tum oleo\* leuiter diuque in le-  
 ctulo perfricari manibus puerilibus potiùs, quàm virilibus  
 debet. Suppurationes autem, quæ in aliqua interiori parte  
 oriuntur, vbi notæ fuerint, primùm id agere oportet per ea  
 cataplasmata quæ reprimunt, ne coitus inutilis materiæ fiat.  
 Deinde, si hæc victa sunt, per ea malagmata quæ digerunt,  
 dissipentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur vt euo-  
 cetur, deinde vt maturescat, omnis tunc vomicæ finis est, vt  
 rumpatur. Indiciumque est, pus vel aluo, vel ore redditum:  
 sed nihil facere oportet, quominus quicquid est puris exce-  
 dat. Vtendum maximè sorbitionibus est & aqua calida. Vbi  
 pus\* fieri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen  
 validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam, sic vt ab ege-  
 lidis tamen initium fiat, primoque cum melle quædam eden-  
 da, vt nuclei pinei, vel Græcæ nuges, vel æuellanæ. Postea sub-  
 mouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit.  
 Medicamentum eo tempore vlceri est succus assumptus, vel  
 porri, vel marrubii, & omni cibo porrum ipsum adiectum.

Oporte-



Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandum erit, ne velluctando, vel currendo, vel alia ratione sanescentia vlcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, idcoque omnimodo cauendus sanguinis vomitus est.

## ENARRATIO.

**I**N quo differat apoplexia à nervorum resolutione, quæ παραλυσος dicitur, docet Galenus libro tertio De locis affectis: nam in apoplecticis sensus & motus simul deperditur; in paralyticis motus tantum: siquidem, Μάστις μὲν οὖν inquit, ἡ παραλυσος ἐστὶ τῆς κινήσεως ἀπολλυμένης: & soluta apoplexia creberrime succedere solet paralyxis, sensu videlicet recuperato, motuque abolito. Non negaverim tamen nonnunquam apud veteres, atque adeo ipsum Hippocratem, denominationes hæc confundi: nam in segmento septimo Aphorismorum, Aphorismo XL: Ἡ ἡ γλῶσση ἐξείσθης ἀπεκτὸς γίνεσθαι, ἢ ἀπὸ πλῆτος π τοῦ σώματος, μὲν γὰρ ἡ γλῶσση τὸ πρῶτον γίνεσθαι. hoc est: Si lingua subito infirma fiat, aut pars aliqua corporis resolvetur, hoc à melancholico humore accidit. Clarius tamen est quam ut longiore egeat explicatione, aliud esse Hippocrati apoplexiam, aliud resolutionem vel paralyxin. Themison autem capitis vel in capite paralyxin cum mentis impedimento proprie apoplexiam vocabat: Diocles verò, Praxagoras, ac Titiensis quidam Asclepiades, dicebant apoplectos toto corpore vitiatos paralyxi, paraplectos verò particulis. At quod paralyxis & pro resolutione, & pro fideratione dicta usurpetur, nondum apud quinquam, quod sciam, præter Celsum nostrum, legisse contigit.

## Solent autem.

**SENTENTIA** hæc de apoplecticis potius quam paralyticis intelligenda est: nam quantumvis sensus motusque privationem paralyticis concedamus, raro admodum, aut nunquam cerebrum, animæ principem, in eisdem affici concedemus.

## Si omnia membra.

**HABITA** tamen ratione plenitudinis: nam nisi hæc infestet, ab humorum purificatione curationem ordini expedit. Cæterum oportet moderatam esse, si quando fiat, sanguinis detractionem; ne dum prodesse studemus, ægrotum ingulemus nimia perfictione, quæ ex superflua, aut copiosa aliqui sanguinis profusione, facile subsequeretur: quod voluisse Celsum verisimile est, dum dicit vel occidit vel liberat. occidit enim si plus iusto auferatur, aucto morbo nimia perfictione; solet enim frigiditas contrahere aut siccitati, aut humiditati affectionem inducere; unde & paulo post frigoris summe vitandum dicit.

## At ubi pars resoluta.

**AB** incolumiore parte, semper detrahendus sanguis est.

## Scilla quoque contrita.

**EFFICACIOR** erit, si XL. diebus in oleo vetere in sole macerata fuerit.

## pluribus etiam locis.

**SI** plures partes resolutæ fuerint, pluribus etiam locis, distinctisque post purificationem applicande sunt cucurbitule; sin pauca, vni tantum: sed neque eas sine ferro, hoc est sine scarificatione, ut hic infert Celsus, verum grandes primò cum cutis incisione, ut multum sanguinis auferant, ac deinceps moderatores, ut docet Aëtius, adhibebimus. Cæterum sunt affigenda parvis affectis, si aptæ sunt; si minus, vicinis.

## præcipueque in iis.

**NIHIL** aquæ instrumentales partes roborat,



borat, ac exercitium: nam & ad actiones reddit fortiores, & ut affectionibus potenter resistent, praepravat: nam, ut Galenus libro methodi sanitatis tuende, Exercitationibus firmitas quaedam membris accedit; quum & naturalis calor accenditur, & ex partium inter se attritu, duritia quaedam indolentiâque comparatur. sic sexto Epidemion Hippocrates: Labor, inquit, articulis & carnibus; cibus verò ac somnus visceribus prodest.

### potio sine vino aqua calida.

QVOD vinum resolutis donec morbus defuerit, inconueniens sit, notum est: at quòd isdem ex usu sit aqua calida, non ita receptum puto. Nam quum morbus mali originem ad frigiditatem ac humiditatem referat, parum hic proderit aqua calens, nisi ad prouocandum vomitum eadem utamur. Quo fit ut nesciam, cur hic, & paulo post, bis in die aqua potui dandam dixerit: rectius mulsam, cui aut salvia, aut cinamomum, aut simile quippiam incoctum sit, exhibuerit.

### non medicamentis urinam mouere.

AETIVS tamen alimentis admiscenda monet qua urinam mouent.

### pulsandusque leuiter.

ALII cucurbitulas corneae in hunc usum commendarunt, quòd ore sugentes ex alto humores citra tensionem aliquam, aut inflammationem euocent.

### atque in ipso potissimum dolore.

VERVM est quòd labor aut vehemens exercitatio nervosis partibus conueniat: at utrum eadem expediat in nervorum dolori-

bui, nondum induci possum ut credam; praesertim quando immodica illa agitatio facillimè defluxum materia ad partes dolentes concitavit.

### Tremor autem nervorum.

VARIIS ex causis oritur tremor; ut auctor est Galenus libro De tremore & palpitatione; quas ut varias diuersasque sortitur, ita variam atque eam diuersam curationem postulat: si tamen à valido violentoque frigore occupante oriatur, eandem omnino curationem cum paralyti efflagitat. Porro per assam sudationem, nisi eam intelligamus quam Virruinus concameratam nominat, (in qua erat fornacula quam Graeci *κλιμακον* vocant) & quam Cicero in alterum apodyterij angulum promouet, ac nonnulli *πυρεξία* πύρεξιν, hoc est à stipando suffocandoque, Propnigeeon dictum volunt; non scio quomodo tremori nervorum obesse possit; praesertim quando praecedente libro ex Aërio ischiadicis, sideratis resolutisque sudationes, quae per insolationem, aut calida arena aggestionem fiunt, non inuiles pronuncianerimus: nisi ex stipatione illa ac suffocatione plus expectemus incomodi, quam utilitatis ex transpiratione.

### Suppurationes autem.

ADDVBITO vehementer num qua hic subsequuntur, antedictis cohaereant: mihi certe fini XXI 1. capitis annexenda videntur, quòd eodem capite de tabidis, & pulmone suppuratis agat.

### Indiciumque est pus.

HIPPOCRATES septimo Aphorismorum: A tuberculi intus ruptione, exolutio aut vomitio, aut animi defectio fit. in cuius Aphorismi explanatione Galenus dicit suppurationum ad intestina ruptiones, puris facere deiectiones.

AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I

D E

R E M E D I C A

L I B E R Q V A R T V S,

A B A L D V I N O R O N S S E O *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

C A P V T I.

*De humani corporis interioribus sedibus.*



A C T E N V S reperiuntur ea genera mor-  
borum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut  
iis certæ sedes assignari non possint. Nunc  
de iis dicam, quæ sunt in partibus. Faci-  
lius autem omnium interiorum morbi cu-  
rationesque in notitiam venient, si prius  
eorum sedes breuiter ostendero. Caput

igitur, eaque quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, pa-  
latoque terminantur, sed etiam quatenus oculis nostris expo-  
sita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venæ grandes,  
quæ *σφαγίτιδες*, nominantur, itemque arteriæ (quas *\* paroti-*  
*\* carotidas* vocant) sursum procedentes ultra aures feruntur. Atque  
in ipsis ceruicibus glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum  
*\* excip.* dolore intumescunt. Deinde duo itinera *\* incipiunt.* Alte-  
rum asperam arteriam nominant, alterum stomachum. Ar-  
teria exterior ad pulmonem: Stomachus interior ad ventri-  
culum fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit: à quibus cum  
diuersæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis fauci-  
bus lingua est, quæ cum spiramus attollitur, cum cibum po-  
tionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria,  
dura,

*Stomachus hic  
pro ipsa gula  
accipitur, ut et  
infra libro 4.  
c. 5. quædam  
aliquando et  
pro ventriculi  
parte inferiori  
stomachi voca-  
bulo utatur  
Celsus, ut cum  
ait, stoma-  
chus vero  
intestino-  
rum præci-  
puum est.*



\*residit.

\*residet. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarum, quæ in spina sunt: ita tamen, ut ex parte exteriori aspera, ex interiori stomachi modo laevis sit, eaque descendens ad præcordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoque spiritus capax & à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras vngulæ bubulæ modo, diuiditur. Huic cor annexum est, natura musculosum in pectore, sub sinistro mamma situm, duosque quasi ventriculos habet. At sub corde atque pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod à præcordiis vterum diducit æquè nervosum, multis etiam venis per id discurrentibus à superiore parte, non solum intestina, sed iecur quoque lienemque discernit. Hæc viscera proxima, sed infra tamen posita dextra sinistraque sunt. Iecur à dextra parte sub præcordiis ab ipso septo ortum, intrinsecus cavum, extrinsecus gibbum, quod prominens leuiter ventriculo insidet, & in quatuor fibras diuiditur. Ex inferiore verò parte ei fel inhæret, at lienis sinistra non eidem septo, sed intestino innexus est, natura mollis & rarus, longitudinis, crassitudinisque modicæ, isque paulum à costarum regione in vterum excedens ex maxima parte sub his conditur, atque hæc quidem iuncta sunt. Renes verò diuersi, qui lumbis sub imis coxis inhærent, à parte earum resimi, ab altera rotundi, qui & venosi sunt, & ventriculos habent, & tunicis super conteguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt. Stomachus verò, qui intestinorum principium est, nervosus à septimæ spinæ vertebra incipit, ac circa præcordia, cum ventriculo committitur. Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus, isque inter lienem & iecur positus est, utroque ex iis paulum super eum ingrediente. Suntque etiam membranulæ tenues, per quas inter se \*tria ista connectuntur, iungunturque ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde ima ventriculi pars paulum in dexteriores partes conuersa, in summum intestinum coarctatur. Hanc iuncturam *πυλωρον* Græci vocant, quoniam portæ modo in inferiores partes, ea quæ

Renes.

Stomachus.

Ventriculus.

\*omnia



quæ excreturi sumus,emittit. Ab ea ieiunum intestinum in-  
cipit, non ita implicitum: cui tale vocabulum est, quia nun-  
quam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes  
transmittit. Inde tenue intestinum est, in sinus vehementer  
implicitum. Orbes verò eius per membranulas singuli cum  
inferioribus connectuntur, qui in dexteriores partes con-  
uerſi, & è regione dexteroris coxæ finiti, superiores tamen  
partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore  
altero transuerso committitur, quod à dextra parte incipiens,  
in sinisteriorem peruium & longum est, in dexteriores non  
est, ideoque cæcum nominatur. \* Ad id quod peruium est,  
latè fufum atque ſinuatum, minusquè quàm superiora inte-  
ſtina neruoſum ab vtraque parte huc atque illuc volutum,  
magis tamen ſiniſteriores inferioresquè partes tenens, con-  
tingit iecur atque ventriculum. Deinde cum quibusdam  
membranulis à ſiniſtro rene venientibus iungitur, atque hinc  
dextra recuruat in imo dirigitur quæ excernit, ideoque id  
ibi rectum intestinum nominatur. Contegit verò vniuerſa  
hæc omentum ex \* interiore partè leue & \* ſtrictum, ex ſupe-  
riore mollius. Cui adeps quoque innasçitur, quæ ſenſu, ſicut  
cerebrum quoque & medulla, caret. At à renibus ſingulæ  
venæ colore albæ ad veſicam feruntur, ἐπιτρίπας Græci vo-  
cant, quòd per eas inde deſcendentem vrinam in veſicam de-  
ſtillare concipiunt. Veſica autem in ipſo ſinu neruoſa & du-  
plex, ceruice plena atque carnoſa, iungitur per venas cum in-  
teſtino, eoquè oſſe, quod publi ſub eſt. Ipſa ſoluta atque libe-  
rior eſt, aliter in viris atque in fœminis poſita. Nam in viris  
iuxta rectum intestinum eſt potius in ſiniſtram partem incli-  
nata. In fœminis ſuper genitale earum poſita eſt, ſuperquè  
\* elapſa ab ipſa vulua ſuſtinetur. Tum in masculis iter vrinæ  
ſpatioſius, & compreſſius à ceruice huius deſcendit ad colem.  
In fœminis breuius & plenius ſuper vuluæ ceruicem ſe oſten-  
dit. Vulua autem in virginibus quidem admodum exigua  
eſt. In mulieribus verò, niſi vbi grauidæ ſunt, non multo  
maior, quàm vt manu comprehendatur. Ea recta conti-  
nuataque ceruice (quem canalem vocant) contra mediam

Ieiunum in-  
teſtinum.Tenue in-  
teſtinum.\* At id  
Cæcum in-  
teſtinum.Rectum in-  
teſtinum :  
Omentum.

\* illapſa

Canalē.

A A

aluum



aluum orsa, inde paulum ad dexteriolem coxam conuertitur, deinde super rectum intestinum progressa, illis foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt, à quibus ac pube abdomen sursum versus ad praecordia peruenit, ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori laxi membrana inclusum, quae omento iungitur, *σπερματικός* autem à Græcis nominatur.

## BALDVINI RONSSEI

## ENARRATIO.

itemque arteriae (quas  
parotidas, &c.

**P**AROTIDES glandulae sunt iuxta aures sitae, carotides confirmantes: quo fit ut hic mendum subesse suspicer, substituentiumque carotides: siquidem quum experientia compertum sit, arterias has aliquo modo pressas, ligatas, aut complicatas, veterosum somnum, & torporem quendam apoplecticum, quem *κατάληξις* Græci vocant, afferre; carotides appellarunt: alij apoplecticas nominare maluerunt.

## Stomachus.

IOANNES Caesarinus suis in Celsum annotationibus, sic scriptum hinc reliquit: Adheras, inquit, hic lector, stomachi vocabulum non pro ventriculo accipi, ut ferè vulgo solet, nec pro extrema gula parte, ut apud Plinium libro XI. capite XXXVII. sed pro ipsa gula; ut & infra libro IIII. capite V. quum dicit: Stomachus verò intestinorum praecipuum est. Qua in significatione accipitur & à Galeno libro Therapeuticae methodi, ubi scilicet quum ventris & splenis, & stomachi mentionem fecisset, ita protinus subiungit: *Δέξω δὲ τὸν σπέρματικον, ὅντιν ἐν τῇ κοιλίᾳ ὁνομάζουσι. ἐν ᾧ τὸ οὖρον καλεῖται καὶ τὸ σπέρμα τὸν γαστρὸς*: quod sic Linacer vertit: Voco autem hoc loco stomachum, gulam; quam

stomachum propriè Græci appellant: nunquam etiam & ita vocatur & os ventris. Nec minus tamen stomachi vocabulo, infra pro ventriculi parte inferiore abutitur Celsus; quum ait: Stomachus verò intestinorum praecipuum est. huc usque Caesarinus.

longitudinis crassitudinisque modicæ.

Vide ne non hic mendum sit, atque legendum latitudinis crassitudinisque modicæ. siquidem quum splenis innata figura sit oblonga, non dixeris eam longitudinis crassitudinisque modicæ.

& tunicis.

RENES peritonæo inunguntur; eoque crasso satis: non deest tamen præter peritonæi velamē propriam venibus tunica, ad quam parvus nervulus à sexta nervorum syzygia peruenit.

## Hanc iuncturam.

CONFVNDIT hic duodenum intestinum cum pyloro, quod tamen initium ephryseos seu duodeni intestini est; similiter & rectum intestinum cum colo. Leonarthus Fuchsius libro tertio Paradoxorum, capite primo, locum hunc ex professo excutit, atque auctorem nostrum erroris convincere nititur.

CAPVT



## CAPVT II.

*De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: Et primò de eius dolore, deinde de morbo, qui circa faciem nascitur, tum de linguae resolutione, postremò de destillatione, ac grauedine.*

**H**is veluti in conspectum quendam (quatenus scire curant neceffarium est) adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite: sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ \*capillis  
 oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, aliàs erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem *κεφαλαίαν* Græci vocant. Cuius notæ sunt horror \*validus,  
 calidus, neruorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic vt vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic vt corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque grauis neque periculosa, per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neque tamen mortiferus, qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hi quæ omnes dolores modò \*cum  
 hac sunt, modò in toto capite, modò in parte, interdum sic, vt oris quoque proximam partem excrucient. Præter hæc etiam vnum inuenitur genus, quod potest longum esse, vbi humor cutem inflat, eaque intumescit, & prementidigito cedit, *ὄσπονέφαλον* Græci appellant. Ex iis, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum dixi, cum persequerere ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ verò auxilia sint capitis, vbi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curationis exposita est. Nunc de cæteris dicendum: Ex quibus id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, id quæ quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen

AA 2

vehemens



vehemens est; primam curationem habet qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est. Satiusque est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione. Si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, aluum ducere, sternutamenta euocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies vnus aut alter totum dolorem hac ratione discutit, utique si ex vino \* vel cruditate origo est. Si verò in iis auxilii parum est, tonderi oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit: si calor, *Aqua frigida.* aqua frigida multa perfundere caput expedit, spongiam concavam imponere subinde in aqua frigida expressam, ungere rosa & aceto, vel potius iis tinctam lanam succidam imponere, aliaque refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida maritima, vel certè salsa, aut in qua laurus decocta sit, tum caput vehementer perfricare, deinde calido oleo implere, veste velare. Quidam etiam id deuinciunt. Alii ceruicalibus vestimentisque onerant, & sic leuantur, alios calida cataplasmata adiuuant. Ergo etiam ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, & iis uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discernitur, perfundere caput primum aqua calida, sicut suprà præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tum frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare iis, quæ saliuam mouent, cucurbitulas temporibus & occipitio ad mouere, sanguinem ex naribus detrahare, resina subinde tempora peruellere, & imposito sinapi exulcerare ea quæ malè habent, antè linteolo subiecto, ne vehementer \* arroat: cudentibus ferramentis, ubi dolor est, vlcera excitare, cibum \* permodicum cum aqua sumere: ubi leuatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reuerti, sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est. Deinde imponere sinapi,

\* erodat:

\* semper modicum



sinapi, sic ut exulceret. Si id parum \* profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibis potionibusque utatur, urinam præcipue mouentibus.

## ENARRATIO.

## In capite autem interdum.

**A**CVTVM vocat propter vehementes exacerbationes; nam aliqui, si morbum ipsum, ac tempus consideres, longum potius quam acutum dixeris; quando, ut docet Galenus, cephalæa inneteratur & ærè cedens capitis dolor appelleretur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet; adeo ut neque strepitus, neque vocem vehementiorem, neque lumen splendidum, neque vini potum, neque odora menta caput repletia tolerare possit.

## sic ut vox supprimatur.

**R**ARO admodum aut nunquam in cephalicis id conspicitur: nam quantumvis inter morbos qui caput infestent, ab Hippocrate talis annumeretur, in quo statim vox interceptatur, non tamen sequitur in cephalæa vocis priuationem sequi; quum nec Galenus, nec Aëtius, nec Paulus, nec quisquam alius præter Celsum nostrum, aphonias cephalæa ascripserit.

## Præter hæc dolor.

**C**VM cephalæa cephalagiam, hemisphericam reliquosque capitis dolores confundere videretur: siquidem ubi circa tempora, vel occipitum tantum dolorem esse dicit, hemisphericam subintelligit; quæ in hoc à cephalæa tantum differt, quod in illa altera tantum capitis pars excruciarı videatur, in hac autem totum caput.

## Interdum autem in capite.

**H**IC cephalagiam intelligit, quæ modo

ex sola corporis intemperie, modo ex humorum copia; interim ex utraque causa oritur: Nunc vero ex primitiva & foris incidente causa alia, nempe solis æstu, frigore, ebrietate, aut ictu &c.

## Præter hæc etiam.

**M**ALVM hoc ab aquoso humore in capite collecto denominationem sortitum est: plerumque autem aquosus humor qui colligitur, aut seculentus est, aut cruentus; semper vero lentum existit: sitq; aut ab obscura, aut manifesta causa, ut auctor est Aëtius: peculiare malum, ut docet Ægineta libro sexto, pueris iam primum in lucem editis, capite à nutritibus parum dextrè presso.

## Sed id, nisi &amp;c.

**S**ANGVINIS tamen misio etiam si quammaximè non sit intolerabilis dolor, intermittenda non est, præsertim si vena ample suat, & ex sanguine ortum habeat malum; nam tunc nullum est præsentius remedium, quamquam etiam nulla instanti plethora, sanguinis misio ut reuulsorium medicamentum, maximè necessaria sit.

## ungere rosa &amp; aceto.

**I**NTELLIGIT, ut iam antè sæpè dictum est, per rosam, rosaceum oleum: porro id efficacius erit, si ex oleo crudo confectum, neque nimium vetus sit.

## vel potius iis tinctam.

**H**OC enim, ut auctor est Galenus De medicamentis secundum loca, mitigatissimum est auxilium, quum vehementer infestus dolor, una cum hoc quod subiectæ commoet affectioni.

AA 3

Illa



**Illam in omni vetusto.**

**HÆC** curandi methodus ab Archigene desumpta est, ut docet Galenus secundo medicamentorum localium libro, ubi ad examen singula vocat. Dicit autem sic Archigenes: Quod si affectio perseneret, vena sectione à naso aut fronte, aut cucurbitis ad caput affixis vitior, aut sternutatorio quopiam concutito, aut per nares purgato. At vero in vehementer inueteratis, sinapi, ut moris est, adhibe, & perire: quod in materia frigida & humida plurimum prodesse Galenus quoque affirmat; in calidis vero, &

siccis, temperaturis, plurimum obesse testatur. Cucurbitulas autem occipito adhibet, ianquam venulorum medicamen, ut humores ad oculos, aut anteriorem capitis partem ferri consuetos auertere conentur.

**Dissimile est id genus.**

**CAVENDVM** tamen monet Aërim si sub temporum musculis collectio fiat, ne autè hydrocephalices incidamus, quàm humor redimdat; esset enim periculum ne musculus incidereetur: ac post collectionem quidem iam factam à lateribus musculi sectionem facit.

*De morbo qui circa faciem nascitur, quem*

*Græci xuvindv avas pōv vocant.*

**CIRCA** faciem verò morbus innascitur, quem Græci *xuvindv avas pōv* nominant. Is cum acuta ferè febre oritur. Os cum motu qupdam peruertitur, ideoque nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio. Somnus in promptu est. In hoc sanguinem mittere, optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere aluum: si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum mouere: præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Sed si discussum iis non est, utendum est cursu, frictione, in eo quod læsum est, leni & multa, in reliquis partibus breuiore, sed vehementi: prodest etiam mouere sternutamenta, caput radere, idque perfundere aqua calida, vel marina, vel certè salsa, sic ut ei quoque sulphur adiciatur: post perfusionem iterum perfricari, sinapi manducare, eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris idem sinapi, donec arrodar, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

item  
erodar,

**ENARRATIO.**

**S P A S M V M** cynicum hodie torturam oris vocant; est autem musculorum mandibularum resolutio: conueniunt

ei omnia medicamenta, quæ resolutis utilia esse diximus: quo fit, ut, nisi, quid prohibeat, à sanguinis missione aspiciendum sit: exhibenda



exhibenda purgationes, & alia quæ capite de resolutione enarravimus. Ceterum quod ad topica seu localia dicta remedia attinet, ea resoluta adhibenda sunt parti, ut docet

Acutus, non opposita, quod decipiantur qui mandibulam ab opposita parte distrahi contendunt.

### De resolutione lingue.

**A**T si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non explicetur, oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit, aquam bibere, caput, & os, & ea quæ sub mento sunt, & cervicem vehementer perfricare, laesere linguam ipsam linere, manducare quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam, magna vi luctari, ut verba exprimantur, exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculam, deinde vomere.

### ENARRATIO.

caput, & os.

**N**ON solum hic vrendum est, sed & post purgationem expedit venas sub lingua latentes rundero, cucurbitulaque sub mento adhibere.

caput sæpe aqua.

QUAM sit isthuc ex usu, nondum satis

intelligo; præsertim quando epithemata illitioneque acres, & sinapismos magis commendatos sciamus. Vereor itaque ne hic mendum subsit: at quomodo resistendum sit locus, valde dubito; potissimum quando simpliciter calida aqua perfusio, nisi eadem acris sit, utilis esse non possit.

### De Destillatione ac Grauedine.

**D**ESTILLAT autem humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares destillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmonem, præter sternutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa vrina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) Grauedo est. Hæc nares claudit,



\* autem  
breu.

\* minus

\* quantum  
maxima

\* multo  
mag.

dit, vocem obtundit, tussim siccam mouet, sub eadem falsa est salua, sonant aures, venæ mouentur in capite, turbida vrina est. Hæc omnia *κορυζας* Hippocrates nominat. Nunc video apud Græcos in grauedine hoc nomen seruari, destillationes *κατασχυμεις* appellari. Hæc \* autem & breuia, &, si neglecta sunt, longa esse consueuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere à sole, balneo, vino, Venere debemus. Inter quæ vnctione, & assueto cibo nihilominus vti licet, ambulatione tantum acri, sed tecta vtendum est, & post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, vt si biduo, vel certè triduo nobis temperauimus, id vitium non leuetur. Quo leuato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in grauedine nares \* magis patent, balneo vtendum est, multaue aqua prius calida, post egelida fouendum os, caputque, deinde cum cibo pleniore vinum bibendum. At si æquè tenuis die quarto pituita est, vel nares æquè clausæ videntur, assumendum est vinum amineum, austerrum, deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum & ad consuetudinem reuertendum est. Neque tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquam ægros agere, sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquam si diutius aliquem & vehementius ista sollicitare consueuerunt. Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillauit, præter ea quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricandæ vehementer inferiores partes, leuior frictio adhibenda thoraci erit, leuior capiti, demenda assueto cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum similiaque, quæ pituitam faciunt crassiorem. Siti \* quanta maximè sustineri potest, pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoque vsus est, adiciendus est cibo pisciculus, ant caro, sic tamen ne protinus iustus modus cibi sumatur. Vino meraco copiosius vtendum est. At si in pulmonem quoque destillat, \* multoque magis & ambulatione, & frictione opus est, eademque adhibita ratione in cibis, si non satis illi proficiunt,



ciunt, acrioribus vtendum est, magis somno indulgendum, abstinendumque à negotiis omnibus aliquando, sed serius, & balneum tentandum. In grauedine autem primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare, postero die surgere, diu abstinere à potione, aut si res coegerit, non ultra heminam aquæ assumere. Tertio die panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel leni carne sumere, aquam bibere. Si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu vtatur, vomere. Vbi in balneum ventum est, multa aqua calida caput & os fouere vsque ad sudorem, tum ad vinum redire: postquæ vix fieri potest, vt idem incommodum maneat. Sed si manserit, vtendum erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore quàm minimo, seruatis frictionibus, exercitationibusque, quæ in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

## ENARRATIO.

**V**IDETUR Celsus noster paulo aliter distillationum species distinxisse, quàm Galenus: siquidem Celsus distillationem modò ad naves fieri contendit, quæ rogula appellatur; interim ad fauces, quæ βεζυζα; nunc ad thoracem vel pulmonem, quæ φδόν vel φδὴς nominatur. Galenus autem libro De sanitate tuenda sexto, & tertio De morborum symptomatis, capitis excrementa ad os & naves promptissimè ferri auctor est. Caterùm excrementi in os decursum, tum gulam, tum asperam arteriam excipere: ac proinde quoties ad os excrementum defluxit, distillationem; & grauedinem seu coryzam, quoties naves occupet; rancitatem vocat, quoties distillatio in fauces procumbat: nam quum in faucibus opportunissimè se exhibeat ad suscipiendas distillationes summa aspera arteria pars, quam larynx vocant, si vt is decidit ex capite humoribus madefactus, primò quidem rancam vocem (est enim larynx instrumentum vocis) deinde procedente tempore paruum faciat; & si longius

prorogetur malum, eandem intercipit: siquidem & cum larynge ipsa quoque arteria humectatur. Quòd si acris quoque fluxio sit, non solum ad vocem inepta sit cum larynge arteria, sed etiam grauisima quædam erosio eis accidit; quæ talis est natura, quales sunt quas subinde in cute citra externam causam lesa, factas videmus. Ita verò & pulmo hic exulceratur, & morbus tabes dicitur. Græcè φδόν: Celsus & cum eo Caelius Methodicus eam distillationis speciem quæ ad os fertur, sub ea quæ in fauces procumbat, comprehenderunt; quanquam id non satis propriè.

## Hæc autem &amp; breuia.

**PESTIFERVM** omnino est quod pulmonem exulcerauit: nam, vt ait Galenus libro Therapentica methodi quinto, Si vas aliquod in pulmone ruptum non conglutinetur, protinus antequam phlegmon procreatus sit, id sanabile non foret. Neque enim possunt quæ in pulmone continentur, citra iussu expelli; & si iussu excitaueris, la-

BB

GERANIS



ceraueris atque exacerbaueris ipsum, vlcus: quibus accedit, quod ingi respiratione agitur pulmo, & quod medicamenta curandis vlcibus accommodata contingere vlcus, sicut in ventriculo, non possint.

### Vbi aliquid eiusmodi.

HÆC enim, ut libro primo capite secundo auctor noster docet, sunt quæ distillationes pariuind.

### ambulatione tantum.

HÆC tantum in distillatione ex materia frigida, quum calefaciant, conueniunt: nam, ut Hippocrates libro De veteri medicina, Omnibus quidem liberatio hæc est (de distillationibus sermonem faciens) ut ex frigidityte quidem affecti, percalescant; ex ardore vero perfrigerentur: atque hæc breui accedunt, & concoctione nulla opus habent. quod alludens Celsus, raro fieri dicit, ubi nobis temperauerimus, ut intra triduum non lenetur malum.

### balneo vtendum est.

SI quidem materia calida sit, balnea calida potabilium & dulcium aquarum con-

uenient; ita enim temperatura in melius transmutatur, & generati in capite vapores disciuntur; si frigida est materia distillationem faciens, tum balnea aquarum natura sua calidarum conueniunt; neque fuerit inutile oleo irino aut simili aliquo caput illinere.

### Siti quanta maximè.

SI QUIDEM, ut libro secundo inquit Theodorus Priscianus, procurata sitis plurimum confert; & sitiendo, ut inquit Galenus Siccensis, siccantur.

### Si non satis illi proficiunt.

QUOMODO aciores cibos hic commendat, non intelligo: præsertim quando acris omnia hic cane penus & angue fugienda sint.

### Sed seriùs & balneum tentandum.

IOHANNES Cæsarius, sed seriùs balneum tentandum est, legendum existimat. Pantino lectio hæc non satis placuit, sed rò tentandum in rò tentandum conuertendum suspicatus est.

## CAPVT III.

### De cervicis morbis, curationibusque.

**A**CAPITE transitus ad cervicem est, quæ grauibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius importunior, acutiorque morbus est, quàm is qui quodam rigore neruorum, modò caput scapulis, modò mentum pectori annectit, modò rectam & immobilem cervicem intendit. Priorem Græci *ὁμοδότριον*, insequentem *ἐν τοποδότριον*, vltimum *ῥέτριον* appellant, quamuis minus subtiliter, quidam indiscretis his nominibus vtuntur. Ea sæpe intra quartum diem \* tollunt. Si hunc euaserunt, sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur, idque conuenit. Sed Asclepiades vtique mittendum sanguinem credidit. Quod quidam vitandum esse dixerunt, eò quod maxime tum corpus calore egeret, isque

\* tollit. ex Hippoc.



isq̃ue esset in sanguine. Verũm hoc quidem falsum est. Neque enim natura sanguinis est, vt vtiq̃ue caleat, sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrimè vel calefcit, vel reffigescit. Mitti verò necne debeat, ex iis intelligi potest quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq̃ue autem rectè datur castoreum, & cum hoc piper vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaque plerique aqua calida multa ceruices subinde perfundunt. Id in præsentia leuat, sed opportuniores nervos frigore reddit. Quod vtiq̃ue vitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primũ ceruicem perungere, deinde ad mouere vesicas bubulas, vel vtriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. Quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, ad mouere ad ignem, vel si æstas est, in sole, ægrum oportet, maximeq̃ue oleo vetere, si id non est, syriaco, si ne id quidem est, adipe quàm vetustissima ceruicem, & scapulas, & \* spinas perfricare. Frictio cum omnibus in homine vertebis utilis sit, tum iis præcipuè, quæ in collo sunt. Ergo die nocteq̃ue, interpositis tamen quibusdam temporibus, hoc remedio vtendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendum verò præcipuè frigus. Ideoq̃ue in eo conclau, in quo cubabit æger, ignis continuus esse debet, maximeq̃ue tempore antelucano, quo præcipuè frigus intenditur. Neque inutile erit, caput attonsum habere, idq̃ue irino vel cyprino calido madefacere, & superimposito pileo velare, nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua fœnum græcum decoctum sit, & adiecta olei pars tertia. Alius quoque ducta sæpe superiores partes resoluit. Si verò etiam vehementius dolor creuit, ad mouendæ ceruicibus cucurbitulæ sunt, sic, vt cutis incidatur, \* eadem aut ferramentis, aut sinapi \* adurendæ. Vbi leuatus est \* adurenda dolor, moueriq̃ue ceruix cœpit, scire licet cedere remediis morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus vtendum, itemq̃ue ouis forbilibus, aut \* à pul- \* hapalis, i. moll.



lis mollioribus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamque ex toto recte se habere ceruices videbuntur, incipiendum erit à pulicula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quàm vinum gustandum. Si quidem huius vsus præcipue periculosus, ideoque in longum tempus differendus est.

## ENARRATIO.

Neque tamen alius.

**Q**UÆM Græci tetanum vocant, Celsus vigorem, Cælius Methodicus distentionem, uti hodiè ferè appellatur, dicere maluit. Procreatur autem tetanus musculis corporis, præsertim spinæ, gelu modo concretis, frigido nimirum humore, ut auctor est Ægineta, à foris & intus, partes eas astringente; ideoque hoc malo occupati secedere sese nequeunt. Sunt autem variae distentionis species; siquidem quoties particula corporis antorsum distenduntur, emprosthotonus affectio appellatur; quum reuersum, opisthotonus; atque quoties in utranque partem, tetanus seu rigor.

Ea sæpe intra quartum.

**Q**UICUNQUE tetano corripitur, inquit in Aphorismis Hippocrates, in quatuor diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani fiunt. Reddit causam Galenus in Commento, quoniam tetanus morbus peracutus sit, ut qui compositus est ex emprosthotono & opisthotono; & propterea citim in eo sit indicatio, non ferente natura longiore tempore tensionis laborem.

Sed Asclepiades.

**N**ON semper probabat vena sectionem Asclepiades; siquidem, ut auctor est Cælius Siccensis, aiebat cucurbitulam vtilem magis quàm phlebotomiam probari huic passioni: Nisi febris, inquit, prohibuerint materiam detractionem; vel in venis plurima fuerit plenitudo: tunc enim erit phlebotomia adhibenda in ipsa vehementia summæ. Hæc ex Asclepiade Cælius Methodicus.

Quod quidam vitandum.

**ET**SI Galenus curationem distentorum aut convulsorum, à sanguinis missione auspiciandam dicat, modò non penitus à sanguine secretus pituitosusque fuerit succus redundans; tamen cum præcautione id faciendum monet, atque vnicè cauendum docet, ne sanguinis missione omnino prosterantur vires: quare non vniuersim, sed pluribus repetitis vicibus sanguinem extrahendum dicit: nam quantumvis morbus ipse (inquit) copiosam sanguinis missionem efflagitet, symptomatibus tamen aliquid relinquendum est.

Itaque plerique.

**N**ON solum opportuniore vernos frigori reddit; verum etiam caput inde repletur, ac distentioni maiorem occasionem suppeditat.

Si verò etiam vehementius.

**N**ON modò cervicibus adhibenda sunt cucurbitula; verum etiam, & vtrique spinæ parti, ut docet Paulus: adhæc pectori, qua est musculosius, & præcordiis. Affigenda autem sunt cum incisione aut scarificatione, quod leues, ut idem testatur, nonnam inferant.

Sed diu vitandus cibus, quisquis madendus est.

**LEGENDVM** hic monet Pantinus quisquis mandendus est; alij, meo quidem iudicio,



iudicio, non omnino peius, quisquis mendendus est, legere maluerunt.

### Sorbtionibus utendum.

TVM quod facilius alterationem in corpore suscipiant, tum quod dentes propter convolutionem aut distensionem, solidiorem cibum non ferant.

### Celerius tamen etiam panis.

CIRCA initia à vini potu omnino ab-

stinendum est; ubi tamen effectus bene processerit, atque remediis cesserit, licebit eo uti; in parva tamen quantitate, quod & humores attenuet, & calefaciendo conferat. cavendum interim est, ne sua quantitate aliquo modo obstit: nam quemadmodum Galenus commento Aphorismi: Si ebrius quispian de repente obmutuerit, &c. vinum sua substantia copia nervis affert convolutionem, rursus sua qualitate sanat eam quam fecit dispositionem, nervos calefaciendo, atque exiccando.

## CAPUT IIII.

### De faucium morbis, ac curationibus, & primum de Angina, deinde de Difficultate spirandi, ultimò de Tussi.

VT hoc autem morbi genus circa totam cervicem, sic alterum æquè pestiferum acutumq. in faucibus esse consuevit. Nostri Anginam vocant, apud Græcos nomen prout species est. Interdum enim neq. rubor neq. tumor ullus apparet, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvantur, id *συνδύχην* vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultus est, id *ὡς συνδύχην* vocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare, non potionem potest, spiritus eius includitur. Leuius est, ubi tumor tantummodo, & rubor est, cætera non sequuntur: id *παρσυνδύχην* appellant. Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est, si non abundat, secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoque rectè sub mento, & circa fauces admouetur, ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam sicca spiritum elidunt. Ergo admoovere spongas oportet, quæ melius in calidum oleum, quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusque est hic quoque salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, vel nepeta, vel thymum, vel absinthium, vel etiam furfures, aut



\* circa

\* inficari,

ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere, eaque gargarizare: post hæc, palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est, polline etiam piperis id rectè respargitur. Si per hæc parum proficitur, ultimum est incidere fatis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato \* citra vnam, vel eas venas, quæ sub lingua sunt, ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit æger adiutus, scire licet; malo victum esse. Si verò his morbus leuatus est, iamque fauces & cibum & spiritum capiunt, facilis ad bonam valetudinem recursus est. At interdum natura quoque adiuuat, si ex angustiore sede vitium transiit in latiore. Itaque rubore & tumore in præcordiis orto, scire licet fauces liberari. Quicquid autem eas leuauit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulsæ decocta, deinde assumendi molles & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum reuertantur. Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederit, angina toto anno non periclitari, seruatumque eum ex sale, cum is morbus vrget, comburi, carbonemque eius contritum in aquam mulsam (quæ potui datur) \* inficari, & prodesse. Id cum idoneos auctores ex populo habeat, neque habere quicquam periculi possit, quamuis in monumentis medicorum non legerim, tamen inferendum huic operi meo credidi.

## ENARRATIO.

ANGINA seu synanche Græcis sortita nomen est, à suspendij similitudine, quod non aliter quam laqueum præfocans interficiat: ἀγγωγας enim laqueum strangulationem, aut etiam anginam vocare consueverunt. Auctor est Aurelius Methodicus Sicensis, libro Celerum passionum, varia nomina hanc affectionem sortitam esse: nam modò σφαγγισμὸν, à canibus, quos κύνας; modò λυγισμὸν, à lupis, quos λύκους; interim δαγγισμὸν, à suis, quas δαίνας nominauerunt; quod frequenter canes, lupos, suos, hoc vitium apprehendat, & quod synanchici quum strangulari cœperint, voces aut ulula-

tus caninis lupinisque similes edere solent. Alij synanchen dicere maluerunt, ἀπὸ τοῦ σπινθῆρος, quod spiritum continendo spirationem præpediat. Galenus libro De locis affectis, quatuor anginae species describit: Primam videlicet, ubi fauces inflammantur; alteram, quum neque fauces, neque reliquæ oris partes, neque etiam externarum partium vlla inflammata videatur, laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit: tertiam, ubi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: quartam, ubi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter affectæ sunt. Paulus Ægineta peculiaribus nominibus



nomnibus ita distinguit, ut angina que musculis faucium interioribus inflammatis accidit, synanche appellatur; que exterioribus, parasyanche: Cynanche autem muscularum gutturis interiorum una cum ambiente tunica inflammatio dicatur; Paracynanche vero exteriorum phlegmane. Aurelius autem Methodicus, post Aretam ita distinguit: ut alia sine manifesto tumore dicatur, quam simpliciter anginam nominat; alia cum manifesto tumore, qui si in utraque parte interiorum musculorum fuerit, cynanchen vocandam dicit, si quidem faciat difficultatem spirationis, atque oculorum prominentiam, & linguam procidentem, sicuti canibus atidis sæpe usu venire videmus, quum ea qua minime transhorare possunt, admovente natura auditate impatida minas contemnentes, innadunt, que sæpe faucibus inherant, atque ancipiti reversione tardata, neque percipere, neque redde valuerunt. Porro eam qua in altera fuerit parte, paracynanchen, sicuti in exterioribus atque utraque parte tumore constituta hyanchen appellamur, quod summi colla his inflationibus sepiissime afficiantur. At si in internis atq. externis & in utraque parte fuerit tumor, tunc proprio nomine synanchen nominant; & si in altera tantum parte, parasynanchen. Hac Aurelius ille Sicensis: Aurelius Priscianus libro 2. cap. 6. Duplex, inquit, synanchitum species. Celsus noster tres tantum species ponit: *συνανχὴν, ἢ παρασυνανχὴν, ἢ κυνανχὴν*. Hippocrates quoque de morbis, tres angina differentias describit. Subiungit tamen quartam insequente libro, quam *παρὰσυνανχὴν* vocari dicit. Præterea libro De morbis vulgaribus sexto, anginosos ita partitur, ut quodam evadere, alios mortis periculum vix subterfugere dicat: nam qui solum, inquit, deglutire non poterant, his valde mites ac tolerati faciles erant; qui vero insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores; quibus vero etiam vena circa tempora & cernicem attollebantur, his aliquantum male erant; pessima vero his erat, si præterea *κοιμῆμα* exeret, hoc est

quibus & spiritus sublimis coëleuabatur, quod Celsus noster, quibus vix spiritus trahitur, reddidit.

### Quicquid est, si vires.

HIPPOCRATES è venis primum que in brachio sunt sanguinem mittendum dicit: ac simul per inferna ducendam alium, libro De locis in homine. Ceterum sanguis ipse non confertim ac universim ducendus est; sed pluribus interpositis vicibus, ne videlicet confertim facta evacuatione animo deficiat ager; quo alienius in anginosi nihil est.

### Cucurbitula quoque.

EADEM rectè cervici quoque applicabitur: quod statim in ipso principio faciendum suadet Hippocrates; quanquam alij tum primum tentandum dicant, quum iam inneterauerit morbus. sed & in eundem usum iisdem locis non inutiliter sanguisuga adhibebimus.

### salis calidi succus.

QVOD per calidi salis succum velit, non satis assequor; nisi salis intelligat spumam, que spumosa quidam flosculus est, attenuantis simul, & discentientis facultatis; neque enim, sicut sal, densat, nec usque adeo compactæ substantia est.

### vel felle taurino.

IDEM attribuit Galenus felli asserino, cum elatario & melle.

### vel eo medicamento.

QVALE sit id medicamentum diamoron quod illitioni gutturis aptum sit, nondum legisse memini: nam quod in pharmacopoliis passim asseruatur, linctibus magis quam illitionibus conveniens, parum cum felle, aut sequenti medicamento convenit.

### Si per hæc parum proficitur.

ISTHVC quamvis ex usu sit, atque Hippocraticum; methodicis tamen nequam placere potuit, quod, uti dicunt, laqueus præfocet, & strangulationis periculum afferat.

Vulgo



## Vulgò audio.

IDEM testatur Plinius libro xxx. Naturalis Historia capite iij: Sed efficaciores, inquit, ad omnia quæ ex hirundinibus monstrantur, pulli syluestrium: figura nidorum eos deprehendit. Multo tamen efficacissime ripariarum pulli: ita vocant in riparum cauis nidificantes. Sunt qui cuiuscunque hirundinis pullum comedendum censent, ne toto anno metuantur id malum. strangulatos cum sanguine comburunt in vase, & cinerem cum pane aut posu dant. Acinius

viuos, non deplumes nec strangulatos, cum salis iusta quantitate in nouum vas fictile bene obturatum, hirundinum pullos coniciendos dicit, ac tantisper super prunas relinquendos, dum in cinerem conuertantur, usque exigente propinandos. Hodie non solum pulli, atque eorundem cineres in usu sunt, sed & eorundem nidi, cum oleo amygdalarum, rosarum, liliorum, aut simili aliquo in cataplasmatibus formam redignantur; unde summum quoque lenamen consequuntur agrotantes.

## De Difficultate spirandi.

EST etiam circa fauces malum, quod apud Græcos aliud atque aliud nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit. Sed hæc dum modica est, neque ex toto strangulat, δύσπνοια appellatur. Cum vehentior est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit, ἀσπνγ. Cum accessit id quoque, ne nisi recta ceruice spiritus trahatur, ὀρθόπνοια. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo insequentia acuta esse consueuerunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit, fribulum elidit, dolor in pectore præcordiisque est, interdum etiam in scapulis, isque modò \*decidit, modò reuertitur, ad hæc ruficula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractio. Neque id satis est, sed lacte quoque venter soluendus est. Liquanda aliis, interdum etiam ducenda, quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublime habendum est, thorax fomentis, cataplasmatibusque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuuandus est, & postea vel malagma superimponendum, vel certè ceratum ex cyprino vel irino vnguento. Sumenda deinde ieiuno potui multa aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel contrita capparis radix sit. Datur etiam vtiliter, aut nitrum aut nasturtium, \*allium frictum, deinde contritum & cum melle mistum, simulque coquantur mel, galbanum, resina terebinthina, & ubi coierunt, ex his quod fabæ ma-

\*decidit,

\*anr all.



bæ magnitudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut  
 sulphuris ignem non experti \* pondo & quadrans abrotani  
 pondo in vini cyatho teruntur, idque tepefactum forbetur.  
 Est etiam non vana opinio vulpinum iecur, ubi ficcum & ari-  
 dum factum est, contundi oportere, polentamque ex co po-  
 tionis aspergi, vel eiusdem pulmonem quam recentissimum  
 assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. Præter hæc sor-  
 bitionibus, & lenibus cibis vtendum est, interdum vino te-  
 nuï austero, nonnunquam vomitu. Profunt etiam quæcun-  
 que vrinam \* augent, sed nihil magis quam ambulatio lenta  
 pænè vsque ad lassitudinem, frictio multa, præcipuè inferio-  
 rum partium, vel in sole, vel ad ignem & per seipsum, & per  
 alios, vsque ad sudorem. In interiore verò faucium parte in-  
 terdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinse-  
 cus cataplasmatibus calidis, fomentisque humidis vtuntur. Vo-  
 lunt etiam vaporem calidum ore recipi, per quem molliores  
 alii partes eas fieri dicunt, opportunioreque virio iam hæren-  
 ti. Sed si \* bene sic vitari morbus potest, tuta illa præsidia. Si  
 metus eius est, superuacua sunt. Vtique autem perfricare  
 fauces periculosum est: exulcerat enim, neque vtilia sunt,  
 quæ vrinæ mouendæ sunt apta, quia possunt dum transcunt,  
 ibi quoque pituitam extenuare, quam suppressi melius est.  
 Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti su-  
 mus, auctor bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorben-  
 dum: hoc enim sine vlla noxa comprimit vlcera. Sed id sup-  
 primere sanguinem potest, vlcera ipsa sanare non potest. Me-  
 lius huic rei lycium est, quod idem quoque æquè probat, vel  
 porri, vel marrubii succus, vel nuces Græcæ cum tragacan-  
 tho contritæ, & cum passo mistæ, vel lini semen contritum, &  
 cum dulci vino mistum. Exercitatio quoque ambulandi,  
 currendique necessaria est. Frictio à pectore vehemens toti  
 inferiori parti adhibenda. Cibi verò esse debent, neque ni-  
 mium acres, neque asperi, mel, lenticula, tragum, lac, prisa-  
 na, pinguis quoque caro, præcipueque porrum, & quicquid  
 cum hoc mistum est. Potionis quam minimum esse conue-  
 nit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum \* cydo-  
 nium,

\* pondo do-  
 narij & qua-  
 drans, abrotani  
 pondo donarij  
 in vinum

\* agūt, al.  
 vrgent,

\* bene vit.

Asclepiades.

\* cotoneū,

CC

nium,



nium, palmulæve decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes: sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum, curationem tamen maturam, ne vehementer & diu lædat, desiderat.

## ENARRATIO.

**C**ONGENERES ferè passionēs sunt, suspirium, seu asthma, & orthopnoea, quibus spirandi difficultas comes esse solet. Est tamen ubi citra suspirium, aut rectam spirationem spiritus difficilis trahatur: idq; frequenter in aliis morbis accidit, ac tum quidem morbi symptoma est, dyspnœa; verum ubi aut a virium imbecillitate, aut viarum spiritus angustia, aut aliunde, nullo precedente morbo spiritus difficilis sit, tum demum longus morbus esse consuevit, in quo albo etiam censentur asthma, ac orthopnoea: nam quantumvis acutos appellet auctor nosser, id non de temporis breui spacio, sed de suffocationis potius periculo (quod quantumvis egrotos diu traxerint, tandè minantur) intelligendum est: nam sicui crassos & lentos humores originis sue causam habent, sic non tum facile, nisi strangulent, cedunt.

## Auxilium est.

**I**D tamen non nisi urgente necessitate faciendum suadet Ægineta; ac tum quidem tantum sanguinis demendum quantum vires patiniunt. Galenus quarto De ratione victus in morbis acutis, id potissimum audet in orthopnoea sicca, sine spu et vel tussi, citra puris collectionem. Post sanguinis missionem ducenda alius est, aut per chylmos, aut pharmaca: in quem usum validiora medicamenta exhibent. quare an ad solvendam aluum lactis usus suffecerit, alij viderint.

## Sumenda deinde.

**V**T crassi videlicet, & viscosi humores incidantur atque consumantur.

## aut nitrum.

**A**CTIVS tamen nitri spumam magis

in usu esse dicit; & Ægineta aphronitri drachmas tres cum tribus hydromelitis cyathis, atque cardamomo subito auxiliari auctor est.

## Est etiam non vana.

**E**O quidem elogio celebratum vulpium iecur, nondum legisse memini; pulmonem tamen suspiriosis prodesse, apud omnes in confesso est.

## interdum vino tenui austero.

**A**VSTERVM hic expungendum existimo: quando id nulla ratione anhelosis conveniat: ita ut tenue vinum appellemus, quod & tenuium sit partium (qua ratione incidet) & quod oligophoron sit.

## frictio multa.

**E**GO non minoris fecero frictionem thoracis, atque adeo agitationem brachiorum; ut humor facilius per poros ad exteriora euocetur.

## In interiore verò.

**I**D accidit quoties fauces teneras destitutus humorum petiverit: nam & tum exasperantur fauces, & spiritus qui easdem ingreditur, ad pectus usque procedit, ac rursus effertur per eandem viam: quum autem spiritus ingrediens, in fluxum qui intus est inciderit, tussis vixit, & repellitur sursum pituita: quæ quum sic habent, fauces exulcerantur, exasperantur & inflammantur, attrahuntq; calefacta humorem de capite. caput autem ab aliis corporis partibus rursus attrahens, his transmittit: Auctor est Hippocrates libro De flatibus.

## Melius



## Melius huic rei.

LYCIVM ex diuersi generis substantiis  
coalitum est; altera tenuius, paritum, ac  
dissensoria & calida; altera frigida & ter-  
rea, ex qua & moderatam astrictionem ha-

bet: unde non solum glutinationi ulceris  
utile erit, verum etiam incidendo humori.  
Reliqua deinceps quæ subiungit, purgabit  
magis ulcera, atque viscosam materiam e  
pulmone educant.

## De Tussi\*.

\* & san-  
guinis ef-  
fluuio.

**T**VSSIS verò ferè propter faucium exulcerationem molesta  
est, quæ multis modis contrahitur. Itaque illis restitutis  
ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque malè ha-  
bere, & vix cùm vetus facta est eliditur, ac modò arida est,  
modò pituitam citat.\* Oportet hyssopum altero quoque die  
bibere, spiritu retento currere, sed minimè in puluere, ac le-  
ctione uti vehementi, quæ primò impeditur à tussi, post eam  
vincit, tum ambulare, deinde per manus quoque exerceri, &  
pectus diu perfricare. Post hæc quàm pinguißimæ ficus vn-  
cias tres supra prunas incoctas, esse. Præter hæc si humida  
est, profunt frictiones validæ, cum quibusdam calefacienti-  
bus, sic, ut caput quoque siccum vehementer perfricetur.  
Item cucurbitulæ pectori admotæ, sinapi ex parte exteriore  
faucibus impositum, donec leuiter exulceret potio ex men-  
tha, nucibusque Græcis & amylo, primoque assumptus panis  
aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cùm  
ea vehementissimè vrget, adiuuat vini austeri cyathus as-  
sumptus, dum ne amplius id interposito tempore aliquo,  
quàm ter aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum  
deuorare opus est, porri vel marrubij succum assumere, scil-  
lam delingere, acetum ex ea, vel certè acre sorbere, aut cum  
spica alij contriti duos vini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi  
est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, narationes.  
Cibus interdum mollis, ut malua, vel vrtica: interdum acer,  
ut lac cum allio coctum, sorbitiones quibus laser sit adie-  
ctum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit, ouum sorbi-  
le sulphure adiecto, potus primùm aqua calida, deinde inui-  
cem aliis diebus hæc, aliis vinum. Magis terreri potest ali-  
quis, cùm sanguinem expuit. Sed id modò minus, modò

\* Si arida  
est, oportet



plus periculi habet. Exit enim modò ex gingiuis, modò ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingivarum vllò vitio, ita vt nihil excreetur. Verùm vt ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is à summis faucibus fertur, modò exulcerata ea parte, modò non exulcerata, sed aut ore venæ alicuius ad aperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex \* his sanguine erumpente. Quod \* quicquā ex vbi incidit, neque lædit porio aut cibus, neque \* quicquam aut ex ulcere excreatur. Aliquando gutture & arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque \* extundit. Interdum etiam fieri solet, vt aut ex pulmōe, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinore feratur. Sæpe foemina, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc exspuunt, \* auctoresque medici fuerunt, vel ex ea parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam *διαίρωσιν*, secundam *πυρρόχυσμον*, tertiam *αισθόμωσιν* appellant. Vltima minimè nocet, prima grauissimè. Ac sæpe quidem euenit, vt sanguinem pus sequatur: interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum sunt. Si verò sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neque ignorari oportet, eis quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæve, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocre profluuium, idque per vrinam redditum, ipsam quoque lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit, si tamen in eius vrina nihil nouabit. Neque vomitum huius afferre periculum, etiam cum repetit, si ante confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neq. tussim aut calorem mouet. Hæc pertinent ad vniuersum. Nunc ad ea loca quæ proposui veniam. Si ex gingiuis exit, portulacam manducasse satis est: si ex ore,

\* hisque

\* quicquā  
ex

\* extundit.

\* veteresq.  
medici fe-  
runt,



ex ore, continuisse eo merum vinum: si id parum proficit, acetum: si inter hæc quoque grauitè erumpit ( quia consumere hominem potest) commodissimum est, impetum eius adnota occipitio cucurbitula, sic vt cutis quoque incidatur, auertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, euenit, eandem cucurbitulam incisus inguinibus eius ad mouere. At si ex faucibus, interioribusve partibus processit, & merus maior est, & cura maior adhibenda: sanguis mittendus est, & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioque, & quotidie paulum aliquid. protinus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plantaginis aut porri succum, imponendaque extrinsecus supra id quod dolet lana succida ex aceto est, & id spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque & femora, brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, vt etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commodè respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est, sed sat est infra inguina & super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum si febris vrget, danda est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex iis quæ aluum astringunt, decoctum sit: \* ac si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ouum dari potest potui, vel idem quod supra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua frigida, sed sic bibendum erit, vt sciamus huic morbo sitim prodesse: præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublimè esse debet, recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fouenda est. At inimica sunt vinum, balneum, Venus, in cibo oleum, acriora omnia, item calida fomenta, conclaue calidum & inclusum, multa vestimenta corpori iniecta, etiam fricationes, vbi bene etiam sanguis conqueuit. Tum verò incipiendum est à brachijs, cruribusque à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per æstatem mediterraneis opus est,



## ENARRATIO.

**F**AVCES Græci φάρυγξ appellat, intelliguntq; locum illum intra os, ubi tum gula, tum aspera arteria extrema conveniunt: quo fit ut aut necessum sit generalius faucium appellatione abutimur Celsum, aut male eundem tussis pleraque causas earundem exulcerationi ascripsisse: nam etiam si quammaximè humore in fauces decumbente, aut iisdem exasperatis tussis oriatur: non raro tamen eandem accidere videmus, ut docet Galenus libro secundo De symptomatibus causis, si instrumenta respirationi servientia, intemperie frigida detineantur: quin & stomachus ipse lubricis infestatus, aut acri humore gravatus, tussis causa esse potest. Oribasius ita distinxisse videtur, ut tussis in alto nascatur, tussicula verò in faucibus.

## spiritu retento currere.

**CAVENDVM** tamen est ne dum ultra modum cohibent, ac retinent spiritum egrotantes, tussim potius exasperent atque alterent, quam mitigent.

## profunt frictiones validæ.

**VALIDAS** frictiones pectoris admiserim; capitis autem temperie sicci nequaquam: nam valida frictione caput ipsum, alioqui natura siccum, cogetur, indurabitur, astringeturque, & si quid humoris in inferioribus sit, frictione ad superiora allucietur, quod pro tempore quidem tussim lenabit, sed eandem rursus concitabit, capite humores rursus ad inferiores partes propulsante.

## nucibusque Græcis.

**QVID** unces Græcas vocet, nondum mihi certò constat: sunt enim qui easdem amygdalas esse putent, quas & Thasias dicunt; in qua opinione Plinius fuisse videtur, qui libro Naturalis historie xv. capite xxii: Tertia, inquit, ab his natura amygdalis, tenuiore sed simili inglandinum summo operimento; item secundo putami-

nis. Nucleus dissimilis latitudine, & acriore callo. Hac arbor an fuerit in Italia Caronis ætate, dubitatur; quoniam Græcas nominat; quas quidam in inglandinum genere servant. Idem libro xxiii. cap. viii, unces Græcas ab amygdalis distinguit, atque amygdalis subiungit: nam posteaquam de utrisque amygdalis sermonem fecisset, Nucibus Græcis, cum appositum semine, inquit, ex aceto sumptis, morbus regni sanari dicitur: item illis per se vitia sedis, & prænati condilomata, item tussi & sanguinis reiectioni prodest. Quare sine amygdalas, sine alias unces intelligat, alij indicent.

## At si sicca tussis.

**SICCAM** tussim vocat, ut docet Galenus, in qua nihil exspuitur: fit autem aliquando ob intemperiem instrumentorum, quæ inferniunt respirationi; aliquando verò in faucium asperitate aliquo tenui, & paucò humore distillante: sed hæc tussis neque violenta esse solet, neque coacta; sed adeò exigua, ut & supprimi, & ne eveniat prohiberi possit, idq; vel in totum vel magna ex parte. Si igitur intemperies frigida siccam tussim excitat, spiritum cohibere imperat Galenus: Nam spiritus retentione, inquit, nisi vehemens admodum tussis fit, prohibetur, spiritus retento calorem in instrumentis spiritalibus augente. quibus accedit, quòd quum spiritus facile abditissimas partes penetret, totam spiritalium membrorum compagem, ad inflam temperiem quam ocysimè reducat. Contrà si calida sit intemperies, proderit aërem frigidum recipere; tantum abest, ut vel austerrum vinum, aut acida, aut acria in sicca tussi, uti facit Celsus, exhibeamus, quando iisdem magis irritandos egros pro comperto habeamus, magisque reficiendos lenientibus, ac mordacitatem arcentibus.

## Vtilis est etiã in omni tussi.

**NAM** si ex influxu humorum fiat, exercitio discutitur ac dissipatur materia pec-

ca 15;



canis; si tussis heca sit, mutatione loci ad contrarium sanitas recuperatur.

### Magis terri potest.

QVIA, ut docet Trallianus, vix est mortuus periculosior, quam sanguinis reiectio aut spuitio; non tam quod per se ingi inanitione hominem exanimat, quam quod exitialis atque chronica cum horrenda mentis vacillatione, nascitur affectio.

### Exit enim modò ex gingiuis.

GALENVS reiectionis sanguinis differentias sic distinguit: Sanguis, inquit, qui ex pectore, aut pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reicitur; si verò ex locis circa fauces aut gurgulionem sanguis feratur, per excreationem excernitur; si verò ex aliquo loco oris aut gingivarum, simpliciter expuitur. Aliquando autem & à capite, aut partibus gurgulionis delatus sanguis ad aspera arteria extremum incidit, & rursim commonet, imaginationemque facit velut ex pectore educatur. Itaque si pluribus ex ordine diebus sanguinem excreet & emungat, neque capitis dolore aut gravitate aliqua quæ etiamnum adsit, antegressis, aut plaga isthic illata, considerare oportet diligenter omnium narium meatum, atque etiam oris locum illum ubi nares ad palatum sunt perforatæ. contingit enim aliquando hæc accessio hiruine ad locum hunc affixa. Est præterea ubi ex iecore, liene, ventriculo, vena iecoraria aliisque partibus corporis sanguis expuitur. Solent tamen ita distinguere spuitum à fluore sanguinis, ut spuitio sanguinis dicatur, quoties pituita permiscetur, modicumque ac congestum id est quod excernitur: Fluor autem quando sub quantitate multa sanguis expuitur, rutilans non congestus.

### auctoresque medici.

SIC distinguunt Hippocrates, Galenus, Erasistratus, eorumque sequaces. Bacchius quidam, ut auctor est Caelius Methodicus, quartam adiecit, quam expressionis, seu su-

ditionis vocavit, asserens ex gingiuis expui sanguinem sine ulla vulneratione, aut ulceratione: vel in curationibus fracturarum, sæpe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiri.

### vel exesâ parte.

PANTINVS recte hic restituit exesa aliqua parte: cum antea esset, ex ea parte.

### Neque ignorari oportet.

HIPPOCRATES septimo Aphorismorum Aphorismo XXXVII. Sanguinis, inquit, vomitus si sine febre est, salubrior est; cum febre verò, peior. curari verò hunc oportet cum astringentibus & refrigerantibus. Celsus hic quod Hippocrates το σπέρμαον dixit, non inutile, quanquam non satis propriè, reddidit: nam quum antè Hippocrates sanguinem supra emissum, qualiscunque tandem is fuerit, malum esse dixisset; nunc, ut distingueret quis fluxus sanguinis magis periculo vacaret, & quis facilius curaretur, hunc qui sine febre est, σπέρμαον, hoc est magis salutarem, dixit. Quod autem de cruento loquio subiungit, quum nihil ad præsens negotium faciat, nescio cur ascripserit; neque enim sanguis cum vrina repente redditus, rursim aut expuitionem sanguinis lenit, aut alioqui sequitur: verum solet potius oriri, ut sectione quarta Aphorismo XLVIII. Hippocrates, ubi venula in renibus rupta sunt.

### Nunc ad ea loca quæ proposui.

GALENVS libro De medicamentorum compositione secundum loca: Curatio, inquit, eius quæ ex apertione osculi alicuius vasis contingit, per obturationem fit oris dilatati; eius verò quæ ex vasis ruptura, per eiusdem conglutinationem; quemadmodum eius quæ ex erosionem per renuentionem erosionem. Obturatur igitur osculum dilatatum per astringentia; conglutinatur autem ruptum, per eadem; & quæcumque ipsis in compositione miscentur citra mordicationem resiccantia, & glutinosum quid habentia.



benia. Renutritur verò corvosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem generantia, sarcotica dicta.

**portulacam manducasse.**

ASTRINGIT enim optimè portulaca comesta; atque eà magis eiusdem succus; sicuti & acetum.

**merum vinum.**

ID astringens admodum sit necesse est: nam aliqui prorsus erit alienum.

**admota occipitio cucurbitula.**

ALII id tantum tentandum autumant, postquam iam omnino innoctaverit, ac sedes fixerit malum.

**aut porri succum.**

ETSI porrum cum præsana coctum pefforis vitis mederi dicat Dioscorides, per se tamen nunquam sanguinis reiectiones cohibuerit porri succus, quum extenuet, atque urinam moveat: si tamen aliis quæ astringoræ sunt facultatis simul admisceatur, accommodissimum erit remedium. Sic etenim Dioscorides cum aceto, thure aut manna sanguinis profluvia sistere assenerat; atque ea præsertim quæ è naribus fiunt. Et Celsus cum succo plantaginis aut thure dat.

**Erasistratus horum crura.**

ASCLEPIADES libro Parascuasicon vituperabat, tanquam materiam imprimeret, & coercendo in latum renocaret; non intelligens per ligationes maximum emolumentum asserri, tum diversione materia,

tum quòd densitatem quandam facerent; sicuti contendebat Erasistratus.

**vel vinum dulce.**

NESCIO quàm conveniat hic vinum dulce; quando certum sit astringentia omnia, hic magis ex usu esse: nam quantumvis aliquis dulce vinum sua crassitie commendatum habeat; mihi certè, ut quod calore excedat, nisi temperatum sit aqua, aut mihi (quod Celsus noster frequenter inculcat) alternis vicibus modò aqua, modò vino utatur æger, non satis placuerit.

**sed sic bibendum erit.**

OMNIMODAM sitim non probat hic, sed ita bibendum dicit, ut ne quid nimis: ac quod ad quantitatem attinet, modicus quidem sit potus; quod ad facultatem, emplastica si fieri potest, eaque frigida, prædiis sit.

**In hoc casu per hiemem.**

MIRVM admodum est, cur in hoc casu per hiemem locis maritimis, per æstatem mediterraneis opus esse dicat. Nam si, ut libro Problematon scribit Aristoteles, hieme mare calidius est, atque æstate frigidius, ac proinde necesse esse, ut spiritus omnes maritimi æstate frigeant, hieme tepeant; contra verò æstate caleat, hieme frigeat terra, etsi maritima loca propter repentem spiritum concesserimus hieme; mediterranea certè parum ex usu erunt æstate, si conclave calidum, aliæque calida suspecta sunt: quare cur æstate mediterranea, hieme maritima laudantur, alij coniciant.

## CAPVT V.

### De stomachi morbis, & curationibus.

**FAUCIBVS** subest stomachus, in quo plura longa vitia incidere consueverunt. Nam modò ingens calor, modò inflatio hunc, modò inflammatio, modò exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumque est eius



est eius malum, quo resoluitur, neque vllare magis aut afficitur, aut corpus afficit. Vt diuersa autem vitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi exaestuatur, aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est, imponendusque puluis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & molliunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua præstanda. Si inflatio est, profunt admotæ cucurbitulæ: neque incidere cutem necesse est: profunt sicca & calida fomenta, sed non vehementissima. Interponenda abstinencia est. Vtilis in \*ieiunio potio est absinthij aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio primò lenis, deinde maior adhibenda est, maximeque quæ superiores partes moueat. Quod genus in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Post exercitationem opus est vñctione, frictione, balneo quoque nonnunquam, sed rarius, interdum alui ductione. Cibus deinde calidis, neque infantibus, eodemque modo calidis potionibus, primò aquæ, post, vbi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis præciendum est, vt quo modo se quisque æger refecerit, eo vt sanus vtatur. Nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam ferè tumor & dolor sequitur, prima sunt quies & abstinencia, lana sulphurata circumdata, in \*ieiunio absinthium. Si ardor stomachum vrget, aceto cum rosa subinde fouendus est, deinde cibus quidem vtendum est modicis. Imponenda verò extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde his detractis, vtendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerant. Interdum aluus ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certè leni vtendum, sed neque præfrigido, neque nimis calido. Si verò pituita stomachus impletur, necessarius modò in ieiunio, modò post cibum vomitus est. Vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio,

DD



\* symbrui  
natumque  
De aquis cu-  
tiliis, Plinius  
lib. 2. cap. 95.  
item lib. 31.  
cap. 2. & 6. de  
ijsdem, & Vi-  
truvius lib. 8.  
cap. 3.

gatio, frictio. Nihil edendum, bibendumque, nisi calidum, vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt. Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus hanc, & quidem quod pessimum est, atram vomere. His rectè aliud ducitur, potiones ex absinthio dantur: necessaria gestatio, navigatio, & (si fieri potest) ex nausea vomitus, vitanda cruditas, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum verò pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est cum cibi non tenax est, soletque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae. Item vnctiones, frictionesque, hinc perfundi frigida, atque in eadem natare, canalibus eiusdem subiicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis, id quod contra stomachum est. Consistere in frigidis, medicatisque fontibus, quales cutiliarum \* subcutiliarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquantur, quàm facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque autem, neque venationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est vinum frigidum, vel certè bene calidum meracum, potissimum rheticum, vel allobrogicum, aliudve, quod & austerum & resina conditum est: si id non est, quàm asperissimum, maximeque signinum. Si cibis non continetur, danda aqua, & eliciendus plenior vomitus est, iterumque dandus cibus, & tum admouenda duobus intra stomachum digitis cucurbitula, ibique duabus aut tribus horis continenda sunt. Si simul & vomitus & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, vel sponsia ex aceto, vel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda verò non diu, sed vehementer brachia, & crura, & calefacienda. Si plus doloris est, infra præcordia quatuor digitis cucurbitula utendum est, protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit, post vomitum lene aliquid ex his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne id qui-



id quidem tenuit, singuli cyathi vini singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicula succus, valentius acidi punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adiecto etiam intubi succo & mentha, sed huius minima parte, quibus tantundem, quantum in his omnibus est, aqua frigida quam optimè miscetur. Id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest, suppressendus autem vomitus est, qui per se venit, \* sic, si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut computruit, quorum vtrumlibet ructus ostendit, eiiciendus est, protinusque cibus assumptis iisdem quos proxime posui, stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est, quae supra praepcepta sunt. \* sic, & si

## ENARRATIO.

**E**TSI iam ante ex Ioannis Casarii annotationibus ostensum videatur, stomachum hic pro gula accipi, varietas tamen ac differentia morborum quos Celsus eidem ascribit, stomachum non pro gula (quod bona venia doctissimi viri dixerim) sed pro ventriculo accipi demonstrat.

## Vbi exaestuât.

**S**IC Galenus septimo Methodi multos quibus exaestuaret ventriculus, se curasse spacio vnius aut alterius diei auctor est, solum aqua frigida aut fontana, aut eius quae in nix refrigerata esset, exhibitione.

## profunt admodum cucurbitulae.

**E**AS ex Galeno, Paulus medio ventriculi copiosa flamma, ita applicandas dicit, ut totum umbilicum comprehendant; ita enim, ut XII. methodi Galenus, in flatuosis affectibus incantamenti quid simile obtrinent admodum cucurbitulae, siue in intestinis, siue in alia quavis corporis parte flatuosi spiritus collecti fuerint.

## Interponenda abstinencia est.

**N**AM inedia actioni huic necessaria existit, ut ait Aëtius, praesertim ubi ex dissolutis in vaporem cibus, orta fuerit inflatio. Quod si abstinenciam ferre non possit ager, exhibendi sunt calidi, flatuque discutientes cibi, quantitate exigua, & qui facile alterentur, atque boni sint succi.

## At si inflammatio aliqua.

**S**TOMACHI inflammatio morbus compositus est in magnitudine, & intemperie, & in soluta continuitate: quo fit ut eam sequatur tumor praeter naturam adeo magnus, ut a medico tactu percipi possit, grauitas ac multi caloris sensus, & dolor vehemens circa partem affectam.

## abstinencia.

**S**I vires admittant (est enim in ventriculi morbis virium maxima habenda ratio) accuratissimo omnino vitendum est vitium in phlegmone ventriculi, ut docet Galenus XI. methodi Therapeutica, quia in ventriculo, aqua ac iecinore, alimentum concoqui



coqui debeat : quod si non probe fiat, praeterquam quod non nutritur corpus, phlegmon etiam ipse augetur, & febres accenduntur.

### lana sulphurata.

SULPHURATAM lanam Plinius pectori ipsi si cibi fastidio corripitur, prodesse auctor est, non tamen inflammationi.

### absinthium.

IDEM prorsus faciendum suadet Galenus XI. methodi Therapeutica : nam si vel minima suspicio sit, inquit, iecur ventriculi, ne laborare, apsinthium protinus oleo incoquimus, atque eas particulas perfundemus. Vitandum autem semper pontico est.

### Imponenda verò extrinsecus.

REPRIMENTIA astringentia vocat : siquidem quod in inflammationibus ardoribusque ventriculi, necessum sit astringentia relaxantibus immisceri, auctor est Galenus; periculum enim esset, ne si solis relaxantibus uteremur, animi deliquium subsequatur.

### Interdum aliud ducenda.

ISTHVC tamen cum praecautio faciendum est, semper habita virium ratione, ut sub finem methodi Therapeutica Galenus.

### cibus plenior.

COMPARATIONE videlicet eius quem in phlegmone praescripsit.

### Adhibendi leues & glutinosi cibi.

IN cibis exhibenda modò sunt, quae vlcera expurgant, unde prisa mellis aliquid admiscere solent ad extersionem, nonnumquam etiam quae dolores mitigant, & moraciditatem obtrundunt. Post repurgationem verò quae carno implent, ac postremum ea quae ad cicatricem perducunt; qualia sunt quae astringunt.

### Si verò pituita.

STOMACHVM Galenus libro Methodi medendi duobus modis expurgari auctor est :

siquidem si quid in eo molestum est, id modò per secessum, modò per vomitum educit. Celsus si quando stomachus pituita grauetur, eandem per superiora purgat, quod ea si quando in stomacho supernaret fluctuaret, atque per se nauseam pariat, vomitorium medicamentum statim subsequatur. si tamen stomachi villis tenacius adhaeserit, frustra vomitoria tentauerimus; ac tum quidem natura ductum sequentes, per inferiora eandem ducere conabimur, medicamentis quae modicè purgant, & quorum vis super ventris & intestinorum loca non ascendat.

### Molestius est.

QVVM res in ventriculo humores gignantur, qui bilis speciem praeseferant (puta enim qui quod porri colorem imitatur *πεποροειδής* nominatur; sicuti quoties arugini similis est, *ἰώδης*, quasi dicas aruginosum; & quoties glasti glaucum colorem representat, *ιωροειδής* dicitur) per bilem non simpliciter *χολή* dictam intellexisse videtur; verum unam aliquam ex iam dictis, atque eam praesertim, quam aruginosam appellari diximus. Nam aliqui si simpliciter dictam bilem intellexisset, satius esset eam ex Hippocrati praescripto per superiora expurgare : siquidem si bilis natura calida & sicca sit, sursum rapitur, & facillimè per vomitum educitur. Quamquam si quis de alia bile, ut ex Herodoto infert Aëtius, intelligere velit, per me integrum est. Hoc tamen sciendum est, tum non per inferiora, sed superiora, sine ea atra, sine flava sit, expurgandam : nam si flava bilis vomitiones accidant, accessiones mitigant; sin atra, solunt.

### interpositis.

NAM, ut habet Herodorus, accessiones cardiacis similes patiuntur.

### Vulgatissimum pessimumque.

PESSIMUM verò vitium dicit, quod quum stomachus nihil retineat, venter interim suo officio non fungatur, atque astrictior solito sit.



fit. Nam et si gratissima stomacho exhiberis edulia, post duos aut tres dies alium inde astringentur. Balneum autem inutilissimum esse dicit, ut quod resoluat: si tamen imo ventri adhibeatur tantum, & inferioribus partibus, non video quomodo non ex usu esse possit.

### Quales cutiliarum subcutiliarumque, &c.

IOANNES Cæsius suis in Celsum annotationibus, Cutiliarum subcutiliarumque legendum existimat, non autem, ut hactenus, subruinarum. atque sic quidem & ipse Pantinus legisse videtur. Caterum de subcutiliis ita scribit Plinius: Sed subcutilia in Sabinis gelidissima, sunt quodam corpora innadunt, ut prope morsus videri possit; aptissima stomacho, nervis, uniuerso corpori. Cutiliarum autem, (Cælius Merhodicus Cutillas dicere maluit), alia temperies est: nam, ut idem Plinius, Bituminata aut nitrosa, qualis cutilia, utilis est bibendo, atque purgationibus: plerique in gloria ducunt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimicissimum; namque paulo diutius quam habens vii oportet. Facit & Vitruvius libro octavo capite tertio, Cutiliarum mentionem, ubi de aquæ ductibus tractat. Si igitur, Cutiliarum subcutiliarumque legamus (neque enim

subruinos fontes me usquā legisse memini) ad diuersa respexisse Celsum verisimile est, ita ut frigidos fontes, quales subcutiliis sunt, calide intemperiei; medicatos autem (in quo albo Cutiliis censentur) frigida utiles dixerit.

### Cibi quoque.

SATIVUS tamen est ex Galeni & Aëcij præscripto, olera ex oleo & garo condita, & alia quæ ventrem emollire solent, primum exhibere; atque tunc demum ad alia transire.

### & eliciendus plenior vomitus.

IVXTA illud: Vomitus vomitu, & fluxus fluxu sedatur. saepe etenim accidit, ut in ipso ventriculi sinu contentus humor vomitum exciret; qui quidem per vomitum expurgatus causa est, ut prior vomitus facile quiescat & sedetur.

### Sed si coacuit intus cibus.

NAM, ut capite tertio libri primi auctor noster dicit: Utilis est vomitus plenis & biliosis omnibus, si vel nimium sese repleverint, vel parum concoxerint. Nam siue plus quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet; si vero corruptum est, nihil commodius est, quam id qua via primum expelli potest, eicere.

## CAPUT VI.

### De laterum doloribus.

STOMACHVS lateribus cingitur, atq. in his quoq. vehementes dolores esse cōsueuerunt, & initium vel ex frigore, vel ex igne, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est. Sed interdū id malum intra dolorem est, isque modò tardè, modò celeriter soluitur: interdum ad perniciem quoq. procedit, oriturque acutus morbus, qui pleuriticus à Græcis nominatur. Huic dolori lateris febris, & rufis accedit, & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est, si grauis, sanguis.

DD 3

Inter-



\* emolitur Interdum etiam sicca tussis est, quæ nihil \* emollitur. Idque primo vitio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium vero est magni & recentis doloris, sanguis missus. At siue \* lenior, siue vetustior casus est, vel superuacuum, vel serum id auxilium est, confugiendumque ad cucurbitulas est, antè summa cute incisa. Rectè etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec vlcera pustulasque excitet, & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circumdare primum oportet latus \* ipsum lana sulphurata: deinde cum paulum inflammatio se remisit, siccis & calidis fomentis uti. Ab iis transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, nouissimè resina imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusque calidis, vitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum, & extremas partes oleo & sulphure perfricare. Si leuata tussis est, leni lectione uti, iamque & acres cibos, & vinum meracius assumere. Quæ à medicis præcipiuntur, ut tamen sine his, rusticos nostros epota ex aqua herba trixago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore communia sunt: plus negotij est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc præter ea quæ suprà posita sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quam maximè tenuis, & lenis, præcipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum, aut ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Idque non nisi tertio quoque die detur, si tamen per vires licebit: potio verò aqua mulsa, in qua hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ quibus temporibus danda sint, ex ratione vel adiectæ, vel leuata febris apparebit, sic ut in remissione quàm maxima dent, cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis tussi aridas fauces committendas. Sæpe enim, ubi nihil est quod \* excreatur, continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam peius id genus esse, tussis, quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hic vinum sorbere, ut supra præcepimus, morbus ipse non patitur, in vicem eius cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi feruore sustinendus æger est, sic ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora & vini quoque aliquid dari potest, dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut

\* hapso lana sulphurata:

\* excreatur,



pus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque manserit tussis, intermittere oportebit vno die, posteroque cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum (vt supra quoque positum est) vini cyathos forbere. Sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certè lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico victu corpus firmandum est.

## ENARRATIO.

PER latera intelligit Celsus eas partes quæ costis circumscribuntur; non eas, quas Græci λασίνας, æγὲ πνεύμας, veluti quidam intelligi voluerunt.

& initium vel ex frigore.

GALENVS libro De locis affectis quinto cap. 11. sub finem lateris dolores hoc modo distinguit: Sunt (inquit, postquam de pleuritide verba fecisset) præterea alij laterum dolores cum febre, per quos spirationem exiguiam reddi necesse est, sed nullum redditur sputum, vt in ea re nihil à pleuritide sine sputo constante differre videatur: verum hi facile ab illis discerni possunt; in his enim nulla omnino tussis est; illi verò qui sine sputo pleuritide laborant, sicca tussis molestantur; deinde quod neque duriciem neque tensionem ullam refert pulsus. Est & alius costalis morbus (vt capite ultimo octauo libri refert Aetius) quoties crudi, crassi, glutinosi, humores generantur in corpore ex cruditatibus plurimis, & cibis crassis atque pituitosis; atque ij quidem humores modo in vacuum thoracis locum sese repente ingerant, nonnunquam etiam in ipsum pulmonem, qui sua multitudine succingentem costas inuiscus membranam distendentes inferunt dolorem, spiritusque diffinitionem innehant, adde vt suspicionem vera pleuritidis præbeant; hodie pleuritidem notam vocant. Celsus Methodicus lateritios dolores ita distinguit, vt modo sine febre sint, & longo tempore perdurent; interdum celer quidam passio sit, sine varietate tamen

sputorum vel excrementorum, contra quam in pleuritide accidere solet.

Si tolerabilis morbus est, pituita.

MIRVM est hic Celsum pleuritidem eam in qua sanguis exspuitur, periculosiorem pronuntiare ea in qua pituita expurgatur; quando Galenus Commento tertio De morbo vulgar. dicat eam pleuritidem esse mitem in qua cruenta exspuitur sputa: adde quod idem asserat omnes morbos qui à sanguine (vt pote omnium succorum mitissimo) sunt, aliis qui à reliquis oriuntur humoribus esse mitiores. hinc lib. secundo De febrib. dicit febre ex sanguine reliquis esse mitiorem, & simpliciorem. Quare, nisi metathesi duarum dictionum sic legamus, Si tolerabilis morbus est, sanguis; si grauis, pituita: dicendum erit Celsum hic locum Hippocratis ex libro De locis in homine, in suam sententiam traxisse, ubi dicit sanguinem quando morbum facit, dolorem inferre vltimum; pituitam verò grauitatem: ac proinde quanto dolor grauitate ipsa molestior ac grauior est, eo quoque pleuritidem sanguinea pituitosa perniciosiorem & acerbiorē esse, vt quæ vehementissimos inferat dolores; qualem Galenus magna ex parte lethalē esse dixit.

Remedium verò.

HIPPOCRATES vult simul & enacuat sanguinis missione, si ad iugulum dolor extendatur; aut grauitas brachium vel manillas, vel partes quæ supra septimum trans-

uersum



nersum sunt, infestat. Nam aliqui si ad praecordia dolor pertigerit, medicamento purgat, cui contra Galenum astipulatur Trallianus; is etenim propter perturbationem in pleuritidis medicamenta suspecta habet. Dicit autem in libro De ratione victus in morbis acutis sic Hippocrates: Si vero dolor ad claviculam pertigerit, aut molesta sit vel brachio, vel mamma, vel partibus septo transuerso superioribus grauitas, internam cubiti venam secare expedit: neque vero, ut copiose sanguis detrahatur, est cunctandum; sed eoque auferendus, donec rubicundior multo, vel pro puro rubidiorque linidus effluerit: nam utrumque contingit. Si vero eas quae sub septo transuerso sunt partes dolor infestat, nullumque ad claviculam signum fuerit, ventrem vel nigro veratro, vel peplio mollire oportet, &c. Hodie lenientibus, vel enematis, si strictior sit aluus, etiam ante sanguinis missionem, non inutiliter aluum ducimus.

vel superuacuum id.

FOMENTIS enim non raro sedatur.

confugiendumque ad cucurbitulas.

SI dolor post septimum diem consistat, neque minuat, praesentissimum remedium afferent cucurbitulae natibus affixae, aut hypochondriis: quanquam etiam non inutiles erunt, vel in principio morbi, si aegri sanguine non abundet, aut aegri vires sanguinis missionem recusent.

Recte etiam sinapi.

ISTHVC quam sit ex usu, non video, quod periculum sit ne calore sinapis materia potius recrudescat atque exasperetur: post suppurationem tamen, tanquam causticum, ad euocandam materiam non inutiliter adhibuerimus; sicut de pectore suppuratis dicit Hippocrates.

Vtendum cibis.

CALIDIS videlicet actu: quia semper per sudores, aut insensiles meatus resoluitur aliquid, quod sumptione frigidi cibi aut po-

tus praepediretur; quando certum sit frigore poros densari.

Si acutus quoque morbus.

HVCVSQVE de omni lateritio dolore sermonem fecisse videtur: nunc autem de eo qui proprie pleuritidis. Est autem pleuritis exquisita, & propria inflammatio membranae intrinsecus latera succingentis, dolorem pungitium vehementer inferens cum acutissima febre.

Porrus cum pullo galinaceo.

PORRVS genere masculino usurpat; sicut paulo post cappari, neutro. Est vero porrum ad omnia pectoris vitia efficax, multiplicique coctura vsui humano magis accommodum redditur, ut secundo libro diximus: Dioscorides, vti etiam Celsus, ptisanam in qua porrum incoctum sit, vitia pectoris sanare auctor est.

Idque non nisi tertio.

SI phlegmonem tantum consideremus, tridua inedia non omnino inutilis erit: verum quando (ut x. Methodi docet Galenus) vna salus tum pleuritidis, tum peripneumonici, tum synanchici, aut iecinore inflammatis sit virium robur, tantum cibi concedendum est, quantum viribus satie esse possit.

In qua hyssopum.

SI ferat tempus, ad incisionem non inutilis erit tum ruta, tum hyssopum: signidem Galenus in Commento Aphorismi, concocta medicari & mouere, non cruda, in acutis etiam morbis, si detur occasio, decoctum tragorigani, hyssopi, origani, & similia non veretur exhibere. Exhibenda tamen maxima cum cautela sunt, ne videlicet acrimonia ipsorum, febrili calori fomus addatur.

& strangulat.

HVIS rei causa est, ut libro De ratione victus in morbis acutis Hippocrates, quoniam prius quam dolor solvatur, pereunt; celeres siquidem sunt respirationes: vnde viscosum & incoctum effectum sputum, intus retinetur;



retinetur, quod intrò retentum est, prohibet  
aeris ad interna delationem, cogitque ipsam  
celeriter egredi: unde cum difficultate spi-  
randi, plerumque suffocatio aut strangula-  
tio sequitur.

### Ob quam causam.

IDEM testatur libro De morbis tertio  
Hippocrates, atque sicca pleuritis causam  
recitat libro De locis in homine.

### Si in refectione.

SIC Hippocrates libro De morbis, post  
balnea vinum dulce & aquosum bibendum  
dat, non frigidum, modicum ex angustis oris  
potillo; & ubi tussis inuaserint, amplius

bibendum, & quammaximè siccandum, &  
potum humectandum dicit, quo pulmo humi-  
dior factus, facilis ac citius spiritum reddat,  
& tussis minùs affligat.

### Si malum inueterauerit.

NON video quò in inueterato lateris  
dolo summe plenus victus (qualis athle-  
tarum est) conuenire possit, quando non  
pura corpora quanto magis nutries, tanto  
magis lades. Non negauerim tamen hic  
paulo pleniorum victus rationem virium  
robur efflagitare, ut quæ nisi sustententur,  
violenta ac longitudini morbi impares sint  
futura.

## CAPUT VII.

*De viscerum morbis, & primò de Pulmone;  
deinde de locinore, tum de Liene,  
postremò de Renibus.*

**A**COMPAGINE verò corporis ad viscera transeundum  
est, & in primis ad pulmonem veniendum, ex quo vehe-  
mens & acutus morbus oritur, quem peripneumonicum  
Græci vocant. Eius hæc condicio est. Pulmo totus afficitur,  
hunc eius casum subsequitur tussis, bilem vel pustrahens,  
præcordiorum, totiusque pectoris grauitas, spiritus difficul-  
tas, magnæ febres, continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id  
genus morbi plus periculi, quàm doloris habet. Oportet, si  
satis validæ vires sunt, sanguinem mittere: si minores, cucur-  
bitulas sine ferro præcordiis admoouere. Tum si satis valet,  
gestando ægrum, digerere: si parum, intra domum tamen di-  
mouere. Potionem autè hyssopi dare, cui ficus arida sit inco-  
cta, aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum vel ruta decocta  
sit. Erictione uti diutissimè in scapulis, proximè ab his in bra-  
chiis, & pedibus & cruribus, \* leuiter contra pulmonē, idque  
bis quotidie facere. Quod ad cibum verò pertinet, huic nec  
salsis opus est, neque acris, neque amaris, neque aluum  
astringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus dan-  
da est.

EE

da est.



Aqua mul-  
sa.

\* purum

\* ventri-  
colorum,  
vel, tyrannu-  
colorum,

da est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac sorbile ouum, nuclei pinei ex melle, panis, vel elota alica, ex aqua mulsa: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida: aut si æstas est, etiam frigida, nisi quid obstat. Hæc autem altero quoque die incrementum morbo dare satis est. Vbi in incremento consistit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa, profuntque aduersus dolores imposita calida fomenta, vel ea quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mistus, quia leuiter cutem erodit, eoque impetum materiæ, quo pulmo vexatur, euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex iis quæ materiam trahunt. Neque alienum est dum premit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus est, ter aut quater die, fenestris aliquanto apertis, \* parum aërem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus à vino abstinere, gestatione, frictione uti, sorbitionibus, & prioribus cibis adiacere, ex oleribus porrum, ex carne vngulas, & summa \* trunculorum, atque pisciculos, sic ut diu \* nihil mole & lene sumatur. \* nihil nisi

#### ENARRATIO.

**P**ERIPNEUMONIA, ut ait Hippocrates, talia facit: febris acuta tenet, & spiritum frequentem, & calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & inactio, & dolor sub scapulis, & ad claviculam, & ad mammam, & grauitas in pectore est, & quandoque etiam delirium; quidam dolorem non sentiunt, donec insire inceperint.

alias pulmonis partes læsas esse dicunt. Illud apud omnes in confesso est, non statim in peripneumonia totum pulmonem occupari: neque enim verisimile est ex defluxu synanches in pulmones, etiamsi quammaximè iam confirmata sit pulmonia, totum pulmonem, sicuti hic infert Celsus, affici.

#### Id genus morbi.

#### Pulmo totus afficitur.

**SIC** Herophilus peripneumoniam tumorem in toto pulmonis corpore definiuit: Soranus totum quidem corpus in pulmonia affici, pulmonem verò vehementius vexari dixit: Asclepiades bronchia tantum: alij

NAM si pellicula pulmonis, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexa, sunt inflammata, dolorem percipiunt ægri, & surrecti sedere volunt; pulmo etenim cordi incumbens, suffocationem infert. alioqui peripneumonicos grauitas tantum absque dolore consequitur.

Oportet,



## Oportet, si satis.

UTILIS, si quod aliud remedium, (quanquam id negarit Asclepiades) phlebotomia, si nullum aliud subsequatur morbum; ac tum quidem pro ægri viribus sanguis detrahendus est, etiam ex utroque brachio. At si alios subsequatur morbos peripneumonia, aut si antequam in eam inciderint, phlebotomati fuerint, sanguinis missione alienius nihil est, quum periculum sit deliqui animi, cuius in omnibus inflammationibus maxima habenda est ratio.

## si minores, cucurbitulas.

LEVES cucurbitæ, quas ῥοφᾶς vocant, in omni morbi tempore tuto applicari possunt; reliquæ non nisi in remissione.

## etiam frigida.

FRIGIDAM non concessero, quod in omnibus inflammationibus, (ut precedente capite diximus) actu frigida potiones inutilis sint, tanquam meatus obstitantes, impediensque motum natura, ut quæ per

poros insensilesque meatus materiam digerit, atque per sudores resoluit.

## Profuntque aduersus dolores.

SIC balneum peripneumonia non inutile (ut quod lateris, pectoris, dorsiq; dolores demulceat, & quod spiritum maturum educatque, & spiritum facilem reddat) dicit in libro De ratione victus in morbis acutis Hippocrates, & fomentis lateritios dolores sedari auctor est.

## reprimunt &amp; emolliunt.

LOCVS hic mendoſus esse videtur; neque enim quæ reprimunt, ex usu aliquo modo esse possunt: quo fit ut leniunt & emolliunt, legere malim: atque eandem puto esse geminam auctoris nostri lectionem; præsertim quando in fine huius capituli, sic vinendum dicit, ut diu nihil nisi lenè & molle sumatur: nam & hic quoque (ut bene annotavit Pantinus) inferenda est dictio, nisi, in hunc modum: sic ut diu nihil nisi molle & lenè.

## CAPVT VIII.

## De iocinoris morbo, &amp; curatione.

ALTERIVS quoque visceris morbus, id est, iocinoris, æquè modò longus, modò acutus esse consuevit, ἰππᾶτινόν Græci vocant. Dextra parte sub præcordiis vehemens dolor est, idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoque dextra torquetur, horror \*calidus est. Vbi malè est, biliseuomitur, interdum singultus propè strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt: longioris verò, vbi suppuratio in iocinore est, dolorque modò finitur, modò intenditur: dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quædam resolutio, vbi inueterauit malum, venter & crura pedesque intumescunt, pectus atque humeri, circaque iugulum vtrumque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est, tum ven-

EE 2

ter sol-



\* diducāt,  
i. digerant,

\* ligni

\* iactui,

\* ultra id  
f. a. i. v.  
vel adu-  
runt.

ter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum veratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ repri-  
mant, deinde calida quæ \* deducant, quibus rectè iris vel ab-  
sinthium adiicitur, post hæc malagma. Dandæ verò sorbi-  
tiones sunt, omnesque cibi & calidi, & qui non multum  
alant, & ferè qui pulmonis quoque dolori conveniunt, præ-  
terque eos qui urinam mouent, potionisque ad id efficaces.  
Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepe-  
ta, amyllum, sisamum, lauri baccæ, \* pini flos, herba sangui-  
nalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ iecur re-  
cens & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adii-  
cere vel sorbitioni, vel potioni licet, sic tamen ut parçè assu-  
mantur. Neque alienum est absinthium contritum ex mel-  
le, & pipere, eiusque catapotium quotidie deuorare: absti-  
nendum utique est ab omnibus frigidis: neque enim res vlla  
magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis parti-  
bus, vitandus omnis labor, omnis vehementior motus, ne  
spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pon-  
dus, \* ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa  
prodest ex aqua: si hyems est, calida: si æstas, tepida. Item li-  
beralis vinctio, & in balneo sudor. Si verò iecur vomica labo-  
rat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppu-  
rationibus. Quidam etiam \* contra id scalpello aperiunt,  
ipsam vomicam adurant.

### ENARRATIO.

ἡπατιδὲν Græci.

**A**FFECTIO hepatica peculiariter ap-  
pellata, citra tumores præter naturam  
circa ipsas partes contingit, inflammatum  
enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut  
induratum esse, medici dicunt, aut aliud  
quippiam tale; non tamen hepaticum vocant  
hominem ipsum, cui tale quippiam accidit:  
verum quando citra manifestum aliquid in  
viscere malum, in propriis actionibus debi-  
litatur, tum hepaticum appellant eorum.  
Auctor est Galenus libro VII. capite VI.

De compositione medicamentorum secun-  
dum loca.

#### Dextra parte.

**I**ECINORIS inflammationem intelli-  
git: in hac enim dextera parte sub præcor-  
dis dolor est; idemque ad ingulum supra,  
infra ad spurias costas pervenit, eoque magis  
intenditur, si in gibba eiusdem parte inflam-  
matio consistat; tum etenim usque adeo ve-  
hemens dolor est, ut conuelli eger videat-  
ur: quod voluisse Celsus videtur dum di-  
cit nonnunquam magis dextra tor-  
quetur.



quetur. Contrā si in sinu parie sit inflam-  
matio, plus fastidij & nausea oboriatur, &  
vomitiones biliosas, & vehementem sitim  
inducet.

longioris verò.

LONGIOR quidem morbus est iecin-  
oris suppuratio, quam eiusdem inflammatio,  
quum hæc in illam non raro degeneret. Ve-  
rum non minus doloris aut periculi affert  
suppuratio, quam inflammatio. Nam post-  
quam inflammatio principium permutatio-  
nis ad suppurationem iam suscepit, omnes  
ad unum de inflammatione recensite acce-  
ssiones augentur atque ingrauescunt, dolores,  
inquam, febres, delirium, cibi fastidium; &  
à rigoribus in totum febriles accessiones ini-  
tium faciunt.

dolorque modò finitur.

ISTHVC ab hepatis suppuratione seclu-  
dendum arbitror, annectendumque iis que  
subsequuntur: atque ita graphice scirrhum  
hepatis depinxerit; quippe si inueterauerit,  
aqua inter cutem protinus comitatur, &  
tota præcordia humiditate conteguntur.

Initio sanguinem mittere.

MULTITVDINEM mittendi sangui-  
nis meriti oportet ex corporis qualitate, ata-  
te, viribus, regione, temporis constitutione,  
ac magnitudine morbi: nam si vires impa-  
res sunt vehementie morbi, partienda erit  
phlebotomia.

primùm quæ reprimant.

IN omnibus iecorariis medicamentis,  
tum quæ intro sumuntur, tum quæ foris ap-  
plicantur, obseruandum est, ut aliquid ex  
astringentibus admisceatur, quo firmitas &  
robur visceris conseruetur. auctor est Ga-  
lenus libro XIIII. Methodi medendi.

qui urinam mouent.

QVOTIES enim cana iecoris pars af-  
fecta est, purgantia medicamenta; contrā si  
quando sinu laborat, dimetica adhibenda  
sunt, ut docet ad Glauconem secundo Ga-  
lenus.

columbæ iecur.

LVPINO id attribui video à Diosco-  
ride, Galeno atque Aëtio; nusquam tamen,  
quod sciam, hoc elogio celebratum columbi-  
num iecur, præterquam apud Celsum, in-  
uenio.

abstinendum vtrique.

HIC locus rursus de acta frigidis in-  
telligendus est: certum enim est multa po-  
testate frigida iecinori esse accommodissima;  
quanquam & à vehementer refrigeranti-  
bus atque astringentibus omnino cauendum  
sit; præsertim si in cano visceris phlegmone  
consistat, propterea quod arctant os meatus  
bilis, ac bilem ipsam externi prohibent.

Quidam etiam.

VIDE sectionem septimam Aphoris-  
morum, Aphorismus XLIIII. & XLV.

## CAPVT IX.

De lienis morbo, & curatione.

**A**T lienis vbi affectus est, intumescit, simulque cum eo  
pars sinistra, eaque dura est, & prementi renititur, ven-  
ter intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor. Vlcera aut  
omnino non sanescunt, aut certè cicatricem vix recipiunt.  
In intenta ambulatione, cursuque dolor, & quædam diffi-  
cultas est. Hoc vitium quies auget. Itaque exercitatione &  
labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mista, si ni-

EE 3

mium



mium processerit, excitetur. Vnctiones, frictionesque, & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. Item lac & caseus. Acida autem maximè conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, & magis etiam, quod scilla conditum est, expedit. Edenda sunt fassamenta: vel oleæ ex muria dura, tinctæ in aceto lactucæ, \* intubi que & betæ ex eodem, ex sinapi asparagus, armoracia, pastinaca, vngulæ, rostra, aues maræ, eiusdem generis venatio. Potui verò ieiuno dari debet absinthium incoctum, at post cibum aqua à ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hæc enim vel præcipuè lienem coërcet: quod animaduersum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum, omniaque in cibis & potionibus quibus vrinæ mouendæ sunt, præcipueque ad id valet, vel trifolij semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cythifus, vel portulaca, vel nepeta, vel thymum, vel hyssopum, vel satureia. Hæc enim inde commodissimè videntur humorem deducere. Lienis quoque bubulus vtiliter esui datur: præcipueque eruca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ leuent. Fit ex vnguento & palmulis, quod *μωροβα* cum quo, *λαγος* Græci vocant. Fit ex lini & nasturtij semine, \* quo vinum & oleum adiicitur. Fit ex cupresso viridi, & arida ficu. \* e Fit ex sinapi, cui seui hircini \* à renibus quarta pars ponderis adicitur, teriturque in \* sale, & protinus imponitur. Multisque modis huic rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum capparum cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

\* cum quo,  
vel cui

\* e  
\* sole,

## ENARRATIO.

intumescit.

SCIRRHOSI lienis signa sunt quæ hic enarrat. Paulus ulcera in cruribus cicatricem non accipere. auctor est: atque hoc

idem confirmat Aëtius, quum dicit: Immedicabilia enim ulcera hoc modo affecti habebunt, maximè circa crura, & colorem corporis vitiatum ad nigredinem vergen-



vergentem. Huius loci qui plenior emar-  
rationem desiderat, nostrum De sceleribz  
commentariolum consulas.

### Itaque exercitatione.

PLVRIMVM etenim fiducia in exerci-  
tamentis, ut ait Aëcius, ponendum, quibus  
ante cibum vti convenit, corpore superflui-  
tatibus non abundante. Ex eorum porro ge-  
nere ex superabundanti faciunt, deambula-  
tiones & cursus. & noui sanè aliquos, qui  
ex his solis ab omni affectione sunt liberati.  
Gestationes omnes conveniunt, præsertim  
quæ sunt in equo: sic & opportuna vocife-  
rationes, quas sub exercitiij quoque nomine  
comprehensas volumus. Habenda tamen  
semper in exercitationibus ratio febris: si-  
quidem si ea adsit, aut nihil aut leniter ad-  
modum exercitandum est, ne agitatione at-  
que concussione, febris irritetur augeaturq;.

### Ergo acetum acre.

ACETVM contra Dioscoridem mixta  
esse facultatis dixit Galenus libro De simpli-  
cium medicamentorum facultatibus: ac-  
proinde, quum in spleneticis opus sit at-  
tenuantibus pharmacis, citra manifestam  
tamen caliditatem, ut ne vehementius in-  
traffescat succus crassus in ipso obtinatus,  
acetum (ut quod mixta sit facultatis, nempe  
calide pariter & frigida) & quod tenuius  
sit partium, atque ex incidentium ordine,  
ultra quod discutiatur, existat; optimè indu-  
rato spleni tam per interiora sumptum, quam  
exterius applicatum conducet.

### at post cibum aqua.

IDEM consulit Archigenes: verum ita  
temperabat, ut non febrientibus cum vino;  
febricitantibus verò solam aquam daret:  
Paulus febre carentibus cum aceti & vini

cyatho uno dat: Aëcius ferrum quod extin-  
guitur, stomoma esse vult: atque sic qui-  
dem convenientissimum spleni in scirrhum  
indurato, remedium esse dicit, gustuque non  
inincundum.

### Lienis quoque bubulus.

RELIQVORVM quidem viscerum, ut  
auctor est Galenus, lien est suavissimus; est  
enim in eo perspicua quadam acerbitas.  
merito autem pravi quoque succi esse credi-  
tur, ut qui sanguinem melancholicum ge-  
neret: quare qua ratione bubulum lienem  
inter reliquos maxime melancholici succi  
prodesse dicat, nondum assequor; nisi id ex  
occulta proprietate, & analogia quadam  
tanquam amuletum præstare affeneret: quem-  
admodum splenem catelli manducatum lie-  
nicos sanare dicunt; alij efficacissimè auxi-  
liari contendunt splenis asinini torrefacti  
panxillum quotidie ieiuno sumptum. Hic  
interim monendus mihi lector est, locum  
hunc non citra mendii suspicionem esse, le-  
gendumque lien quoque bubulus his  
utiliter esui datur: neque enim usquam  
præterquam hic, in nominandi casu rō lie-  
nis me legisse memini, nisi apud An. Gel-  
linum lib. 3. ubi sic habet: Si iecur aut lie-  
nis sit affectus. quanquam & illic syllaba  
is adiecta videri possit.

### Fit ex vnguento.

BENE annotavit Pantinus hic mendium  
esse, substituendumque ex vnguentariis  
glandibus quas *μυγβαλάνους* Græci  
vocant.

### cappari.

NON solum fructus, sed & eiusdem  
cortex: nam ultra quod diffecatur & ex-  
purgatur, etiam lienem corroborat.

## CAPVT X.

### De renum morbis, & curationibus.

**A**T renes ubi affecti sunt, diu malè habent. Peius est, si  
frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquies-  
cere, cubare molliter, solvere aluum, si aliter non respondet,  
etiam



\* potius,  
al. acidis,  
pomis,

\* ad hæc

\* at super

etiam ducere: sæpe desiderare in aqua calida, neque cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus falsis, acribus, acidis\* pomis, bibere liberaliter, adiciere modò cibo, modò potioni piper, porrum, ferulam, album papauer. Quæ maximè inde urinam mouere consueverunt. Auxilio quoque his exulceratæ sunt, si\* adhuc vlcera purganda sunt, cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinu syluestri duodecim, anisi, quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita, & in duas multi. potiones diuisa. Si verò dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, iidem nuclei viginti, nuces Græcæ quinque, croci paululum, contrita & cum lacte potui data, \* ac insuper quoque rectè quædam malagmata iniiciuntur, maximeque ea, quæ humori extrahendo sunt.

#### ENARRATIO.

QUATVOR renales morbos libro De internis affectionibus describit Hippocrates, quorum priores primo hoc §. comprehendisse videtur; atque eorundem inflammationem subaudit, quum dicit peius est. nam etiamsi quammaximè lithiasis grauissimos dolores inferat, atque in longum protrahatur, vitæque morte frequenter permulet; iure tamen peius, hoc est, periculosius est, quoties renes aut inflammantur, aut suppurentur: nam præterquam quòd grauissimas accessiones faciant, citò etiam, ut omnis phlegmone, dubium ancepsq; periculum minatur.

#### Oportet conuiescere.

QUIES in omnibus renum affectionibus maximè laudatur: nam agitatione aut exercitiis crudi humores ad ipsos facile transmitterentur.

#### cubare molliter.

IDEM suadet Trallianus, qui culcitram

deplumem in inflammatione renum plurimum obesse dicit. Ego tamen, si mollicies omnino admittenda sit, culcitram lanugine gossypij infartam, potius quàm plumis turgidam laudauero, quòd mollis lectus calorem, atque adeò inflammationem renum augere soleat.

#### sæpe desiderare.

EVOCAT enim humores ad exteriora, & meatus laxiores reddit; tum & ipsam inflammationem mitigat.

#### bibere liberaliter.

QUAM conueniat liberalis aut copiosa potio, inducent alij; mihi certè placere non potest.

#### piper.

SI singula per se obtuleris, nocebis; sin ex omnibus simul mixtis pharmacum componas, accommodatissimum remedium efficitur: nam & dolores mitigabit, & materiam à loco affecto per lotium expurgabit.

#### CAPVT



## CAPVT XI.

*De intestinorum morbis, & primò de Cholera.*

**A**VISCERIBVS ad intestina veniendum est, quæ sunt & acutis, & longis morbis obnoxia. \* Primò æque faci-  
 cienda mentio est cholera, quia commune id stomachi, at-  
 que intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deie-  
 ctio, & vomitus est, præterque hæc inflatio est, intestina tor-  
 quentur, bilis supra infraque erumpit, primum aquæ similis,  
 deinde vt in ea recens caro lora esse videatur, interdum alba,  
 nonnunquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine, morbum  
 hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea verò quæ supra  
 comprehensa sunt, sæpe etiam crura manusque contrahun-  
 tur, virget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus non mi-  
 rum est, si subitò quis moritur. Neque tamen vlli morbo  
 minori momento succurritur. Protinus ergo vbi ista cœpe-  
 runt, aquæ tepidæ quàm plurimum bibere oportet, & vome-  
 re. Vix vnquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non inci-  
 dit, miscuisse tamen nouam materiam corruptæ prodest,  
 parsque sanitatis est vomitum esse suppressum: si id incidit,  
 protinus ab omni potione abstinendum est. Si verò tormina  
 sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum foue-  
 re: sed si venter dolet, iisdem egelidis, sic vt venter ipse me-  
 diocriter calentibus iuuetur. Quod si vehementer & vomi-  
 tus, & deiectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt quæ  
 vomuntur, nondum vino maturum tempus est, aqua, neque  
 ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, ad mouendumque  
 naribus est pulgium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel  
 mentha, si nondum matura est. At cum discussa cruditas est,  
 tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum con-  
 fugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum,  
 cum aqua frigida mistum, vel polenta adiecta, vel melle quo-  
 que assumere expedit, quotiesque aliquid aut stomachus, aut  
 venter effudit, toties per hæc vires restituere. Erasistratus  
 primò tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem

FF

esse



esse dixit, deinde paulatim merum adiiciendum. Is \* si & ab initio vinum dedit, & \* metum crudelitatis secutus est, non sine causa fecit. Si vehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putauit, errauit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda potio absinthii est. Si extremæ partes corporis frigent, vngendæ sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit adiectum, calidique fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admouenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi his constitit, dormire oportet, postero die utique à potione abstinere, die tertio in balneum ire, paulatim se cibo reficere \* : somno, quisquis facile acquiescit, itemque lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est, tum cibis, vinoque vtendum est, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumque versatur, sic ut cuius potissimum partis sit, non facile dici possit.

\* somnoque  
qui fac. ac-  
quiescit,  
vitataque  
lass.

### ENARRATIO.

**D**VBIUM admodum est, quis locus primario affectus sit in choleris: siquidem Celsus viuium commune stomacho & intestinis dicit, quod per superiora æque ac inferiora fiat excretio: Paulus id negat, ac solius ventriculi immodicam perturbationem supra infraque erumpentem esse dicit: alij primario affici dicunt stomachum, ventrem, & intestina, aliæque omnia corporis membra isdem consensire: Galenus libro De causis symptomatum ultimo, ventriculum quidem primario, stomachum vero proprie dictum, ac ianitorum, vel pylorum secundario affici docet, expultrice facultate humorum mordacitate irritata: nam quum summis intestina torminibus vexari contingat, ideo non statim intestinorum morbus dicendus erit, quando eadem non in principio, sed ubi iam consisterit morbus, primum inuadant.

#### Primum aquæ similis.

QUI paulo exactius cholicorum vomitiones perpenderunt, eo ordine easdem ferri prodiderunt, ita ut primo corrupti cibi sicut frequenter occurrit, & humoris atque flauæ bilis vomitio fiat: dehinc vitellis oñorum similis, tunc præsij atque aruginosi; ac ultimo etiam nigri, quæ ventris turbatio cum dolore, & fecibus vomitioni non dissimilibus, subsequuntur. Quod si increseat passio, loturæ carnis similis, spumosa etiam & albicans erit egestio.

#### Ergo eo nomine.

SIC Galenus libro Methodi Therapeutica secundo, Sæpe, inquit, à causa putata, morbi denominationem sortiti sunt, ut melancholia omnibus; & aliæ his qui à Chido medicis. Alexander Trallianus id reprehendit: Siquidem nemo, inquit, credat, & aliæ appellari à Græcis, ob bilis, ut vult-



gus putat, abundantiam, & χαλεκὰ νο-  
minari biliosa; sed à multo materia biliosa  
fluxu, qui per inferna & superna fit, hoc  
est intestina & ventrem & os. Prisci nam-  
que Greci χαλὰς intestina laxiora, quòd  
in eis χαλὰ fundatur, appellabant, & hinc  
affectum hunc cholericum nominant. Hesi-  
chius ita definit: χαλὰς ἐστὶ ἰκκερσις  
πάντων διὰ τοῦτος, καὶ ἀνάγει διὰ τοῦτος  
ἐκ τούτου: hoc est, Cholera est per inferna  
deiectio, supràque per os vomitum.

### non mirum est.

EST enim cholera, ut sentit Theodorus  
Priscianus, omnibus acutis passionibus velo-  
cior: & Galenus commento XII. Aphor.  
sección prima, anginam & cholera, & ner-  
vorum distentionem peracutos morbos no-  
minat.

### & vomere.

NIHIL enim alienius est, ut docet  
Aëtius, quàm ea quæ efferuntur in princi-  
pio, aut coacturatum velle cohibere: nam  
quum inutilia sint, opus habent euacuatione:  
quare quando per se facillè sequantur, &  
eger ipse nauisabundus sit, motum naturæ  
promovere studebimus, egelidamque aquam  
bibendam dabimus, cauentes interim à mul-  
sa, aut hydrelao, quòd hoc fluxiones augeat,  
illa verò mordacitatem operetur, & torsio-  
nes augmentet.

### pariſque sanitatis est.

VERVM quidem est si humor noxius  
aliqua ex parte expurgatus sit: nam alio-  
qui periculum esset, ne grauioribus accessiones  
pareret.

### aqua.

IDEM suadet Aëtius, qui frigida qui-  
dem cyathum bibendum dat; sed interim  
cauendum dicit, ne nimis frigida sit: quare  
egelidam, hoc est eam quæ tepida frigidior  
sit, tanquam stomachi confortatiuam dan-  
dam tradit Celsus.

### vel mentha.

VARIANT hic exemplaria: Pinza-  
num enim non omnino malè, vel mentha

secundum naturam est: alij vel men-  
tha quæ nondum matura est, legunt.  
quod qua ratione fecerit nescio: nam neque  
Dioscorides, neque alius quisquam, quod  
sciam, præter Celsum nostrum, vsquam im-  
matura mentha eam facultatem tribuit,  
nisi quòd libro III. capite XXXV. idem  
ternos mentha ramulos cum acidi granati  
succo potos, vomitiones choleraeque sedare,  
stomachoque per se vilem dicat.

### Id esse oportet tenue.

QVALE est quod auferum, & me-  
diocriter astringens est, neque viribus vali-  
dum: atque ob id Aëtius, contra quàm Cel-  
sus, odorum vinum suspectum habet.

### Erasistratus primò.

ERASISTRATVS hic, ut auctor est  
Calim Methodicus, si sitis, & animi defectio  
coegerant, vino potabat Lesbio cum aqua  
frigida: verum in aqua cyatho vini guttas  
duas aut tres ad summum admiscendas in-  
bens, Vt solum, inquit, odorem vini aqua  
habere videatur, atque hoc bibendum possit  
singulos imperat vomitus, & post singulas  
ventris effusiones: siq; febres irruerint, plus  
aqua admiscendum contendit.

### vngendæ calido oleo.

QVALE est sicyonium, irinum, aut  
castoreum.

### cucurbitula admouenda.

EA enim tanquam incantamentum  
quoppiam, ut docet Galenus, fluxum com-  
pescit: & si diutius adhæreat, concoctionem  
adinuabit, ut auctor est Trallianus.

### Vbi his constitit.

LOCVS hic parna dictionum metathesi  
sic restituendus videtur, quòd aliqui, meo  
quidem iudicio, sensus non constet: vbi is  
constitit, dormire oportet; postero  
die vtique à potione abstinere, item-  
que lassitudine, & frigore; die tertio  
in balneum ire, paulatim se cibo re-  
ficere, somno quisquis facillè ac-  
quiescit, &c.



## CAPVT XII.

## De Cœliaco ventriculi morbo.

\* nomina-  
tus.\* vniuer-  
sim\* propor-  
tione\* arrodan-  
tur & ru-  
beant,

IN ipſius verò ventriculi porta conſiſtit is qui & longus eſſe conſuevit, κοιλιοειδὲς à Græcis \* nominatur. Sub hoc ven- ter indureſcit, dolorq̃ue eius eſt. Aluus nihil reddit, ac ne ſpiritum quidem tranſmittit. Extremæ partes frigefcunt. Difficulter ſpiritus redditur. Commodiſſimum eſt inter ini- tia calida cataplaſmata toto ventri imponere, vt dolorem le- niant, poſt cibum vomere, atq̃ue ita ventrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas ſine ferro, ventri, & coxis admouere. Ventrem ipſum liquare dato lacte, & vino falſo frigido. Si tempus anni patitur, etiam viridibus ficis, ſic tamen, ne quis aut cibus aut humor \* vniuerſus detur, ſed paulatim. Ergo per interualla temporis ſat eſt cyathos binos ternosve ſumere, & cibum \* proportionē huius: commode- q̃ue facit cyatho lactis cyathus aquæ miſtus, & ſic datus. Ci- biq̃ue inflantes, & acres vtiliores ſunt, adeo vt lacti quoque rectè contritum allium adiciatur. Procedente verò tempore opus eſt geſtari, maximeq̃ue nauigare, perfricari ter aut qua- ter die, ſic vt nitrum oleo miſceatur, perfundi aqua calida poſt cibum, deinde ſinapi imponere per omnia membra, ex- cepto capite, donec \* arrodatur & rubeat, maximeq̃ue ſi cor- pus durum & virile eſt, paulatim deinde faciendus eſt tranſi- tus ad ea, quæ ventrem comprimunt. Aſſa caro danda, va- lens, & quæ non facile corrumpatur: potui verò pluuialis aqua decocta, ſed quæ per binos ternosve cyathos bibatur. Si vetus vitium eſt, oportet laſer quàm optimum ad pipēris magnitudinē, deuorare, altero quoque die vinum, vel aquam bibere, interdum interpoſito cibo ſingulos vini cy- athos ſorbere, ex inferiori parte infundere pluuialem egeli- dam aquam, maximeq̃ue ſi dolor in imis partibus remanet.

CAPVT

P. 2

ENAR-



## ENARRATIO.

**D**VM ea quæ Celsus noster de cæliaca passione scribit, cum iis quæ aut Græci, aut Latini posteritati reliquerunt, confero; videtur mihi alium longè affectum quàm ij sub cæliaci nomine intellexisse, adeo ut Alex. Benedictus distinctionem quandam comminisci coactus fuerit, duasque diversas cæliacas statuere: Nam quem Celsus ventriculi portæ (pyloron vocant) morbum esse dicit, alij quotquot sunt, simpliciter ventriculi morbum esse asserunt, adeo ut Græci quo ore omnes diarræas vocant, Latini cõtra, ut sunt Plinius Secundus, & Cælius Methodicus, à ventre, vtpote parte corporis quæ patitur ventriculosam passionem, nominant: dicuntque, quemadmodum ante alios testatur Aretæus, fieri ob concoquentis caloris imbecillitatem, frigisque ventriculi, atque adeo vitium esse concoctionis & digestionis; unde contingat ea quæ per os assumuntur, non probè confici nec distribuiri, verum per alium cõtinuè deici, colore, odore & consistentiâ in primum mutata: ea siquidem quæ egeruntur, aliquando fœtida sunt, cum animi deliquij sensu; aliquando versicoloria, & instar lutei sanguinis, idque in extremo vitæ periculo: quæ aliquando subsequuntur, ut auctor est Trallianus, & ego seu torsiones circa umbilicum. Quod fortè transversum egit Celsus nostrum, ut dum ventris torsionem, & tensionem nonnunquam morbum subsequi intelligeret, inferret etiam distento ventre statim, nihil egeri, ac nec spiritum ipsum commodè reddi, confundens, sicuti ego conicere possum; cæliacam cum borborismo seu rugum intestinorum.

## Commodissimum est.

ALII actum calida cataplasmata suspecta habent, atque eadem repida adhibenda dicunt, ferèque aliqua quæ astringunt miscent.

## post cibum vomere.

ALIQUANDO, inquit Aetius, largi

potione vitendum est, agerque ad reuocandum cogendus, maxime si humores in ventre collectos percipiamus: mirabiliter enim vomitus efficaces sunt, tam à cena, quàm à ieiunio facti; viximur quæ corrupta sunt euacuant, & quæ ad intestina delapsa sunt, attrahentes, & conuercentes, ac proprias ventris actiones reuocantes. Et si recens morbus sit, vitiolissiq; humoribus corpus abundet, leni purgatione iidem expurgandi sunt, præcauendumque ne regenerentur.

## Ventrem ipsum.

ISTHVC quàm sit ex usu, nescio: siquidem si serosi atque acres humores tantis ventriculi insarti fuerint, aut si strictior sit alius, ut inferre videtur Celsus, lacte nequaquam liquabimus alium, ni pro lacte feram lactis intelligamus. Non negauerim tamen lactis potum plurimum facere in his qui cum mordacitate ventris fluxionibus infestantur, præsertim si in principio calidum ac recens multum exhibeatur, ac deinceps ad medicatam, aut ad tertias decoctum; ita enim non in cæliaci modo, sed & in omnibus fluxibus redditur accommodum.

## etiam viridibus ficis.

VT inutiles omnino reicienda sunt, quando & flatulenta sunt, & stomacho aliena.

## sic tamen.

COPIA enim fluxionibus inimicissima est.

## Cibi que inflantes.

ET hi quoque cæliaci non conveniunt quod stomachum replent morbumque augeant.

## perficari ter aut quater.

POST exercitia fricatio simplex adhibenda est, ac maxime perfricandus venter est. Calida persufusionem vituperat Aetius, nisi ad labundantiam, aut alterius rei medelam ea vitentur.

FF 3

CAPVT



## CAPVT XIII.

*De tenuioris\* intestini morbo.*\* & ple-  
nioris int.

**I**NTER ipsa verò intestina consistunt duo morbi, quorum alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est. Insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum *χρόναιον*, plenioris *εἰλεόν* nominavit. A plerisque video nunc illum priorem *εἰλεόν*, hunc \* *πάλαιον* \* *χρόναιον* nominari. Sed prior modò supra vmbilicum, modò \* in sub vmbilico dolorem mouet. Fit \* ex alterutro loco inflammatio, nec aluus, nec spiritus infrà transmittitur. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, stercus per os redditur: si vtrumlibet vetus est, adiicitur periculo vomitus biliofus, mali odoris, aut varius, aut niger. Remedium est sanguinem mittere, vel cucurbitulas pluribus locis admouere, non vbique cute incisa. Id enim duobus aut tribus locis satis est. Ex cæteris spiritum euocare, abunde est. Tum animaduertere oportet, quo loco malum sit. Solet enim contra id tumere. Et si supra vmbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est, aluum ducere (vt Erasistrato placuit) optimum est, & sæpe id auxilii satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo & melle, sic vt præter ea nihil adiiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet, supra summum ventrem, paulatimque deducere. Inuenietur enim mali locus qui necesse est renitatur, & ex eodem deliberari poterit, ducenda necne aluus sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata admouere, eaque imponere à mammis vsque ad inguina & spinam, ac sæpe mutare: brachia cruraque perfricare, demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quatuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus, vt iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsam tepidam non multam. Nam antè magna curauitandum est, ne quid bibat. Si id commodè cessit, adiacere sorbitionem. Vbi dolor & febricula quierunt, tum de-  
mum



num uti cibo pleniore, sed neque inflante, neque duro, neque valido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur, potui verò nihil præterquam puram \* aquam. Nam siue quid vinolentum, siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac potestæ quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosque corporis motus. Nam faciliè id malum redire consuevit, & siue cum frigus subit, siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

## ENARRATIO.

**E**λάος, à symptōmate, ut secundo Methodi auctor est Galenus, nomen sumpsit: nam ἐλάω verbum Græcum, Latine idem quod voluo significat; inde ἐλάος, quasi circumuolutus, quando agris dolor circumuolutus accedit: hunc Latini voluulm nominant, Celsus intestini tenuioris morbum dicere maluit: Calius Siccensis, acutum tormentum appellat, quod in eo torqueantur intestina. Salimachus ait quosdam Pythagoricos medicos φεγγὸν vocitasse, quod obrutis naturalibus ventris officiis fiat.

χόρδος-ζορ.

**Q**UOTIES nimirum tumor aliquis eminet in tenuiorum intestinum parte, ut videatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum: nam & præci Græci, ut auctor est Calius, intestina chordas vocauerunt.

## stercus per os redditur.

**R**ATIONEM huius reddit Galenus libro III. De natural. facultat. dicit enim, ipsum quod phlegmone laborat intestinum, nec pondus nec acrimoniam tolerat excrementorum, eoque excernere, expellereque ea quam longissimè à se nititur, prohibitum verò deorsum persequi, quum scilicet hoc loco grauissima pars phlegmones fuerit, in proxima suprapositorum intestinum re-trudit, itaque iam excreticis facultatis momento per continuum intestinum sursum verso, excrementa sursum ascendunt: a quo

affectu, ut sexto De locis affectis, vix unquam aliquis potuit sanus enadere.

## adiicitur periculo.

**H**IPPOCRATES sectione septima Aphorismorum, Apho. x. Ab eileo vomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delirium, malum portendit; quod, ut in Commento ait Galenus, alijs vomitus semper non adfit, sed tum demum quando exitiales sunt, & vehementer distorquentur.

## Remedium est.

**S**I quidem inflammatio sit, hic, ut in omnibus inflammationibus, à sanguinis missione aspiciendum erit: at si à crudis crassissq; humoribus fiat, tum à vomitione, aut purgatione per inferiora iniectione aut enematis, aut inditis glandibus incipiendus est.

## Si dolor non quiescit.

**N**ON fuerit inuile si in eodem aliquid fenugraci, seminis lini, aut radicem althææ cum modico aqua, ad aquæ consumptionem decoquamus.

## ut iam ex inferiore.

**V**IDENDVM tamen est, inodorus sit nec ne: nam si per pedicem redditus ventus odorem tetrum præ se ferat, salutem ac morbi solutionem portendit; sin absque tetra odore reddatur, perniciosum valde est.

potui verò nihil præterquam puram aquam.

**C**VR præter aquam puram nihil concedat,



cedat, dubito: nam etsi ad arceidam inflammationem utilis aqua potio sit, periculum tamen est, ne cruditati materiam suppediet, qua voluuli causa non raro existit: quare aut *ὀδυσσώδην*, aut dilutum aliqui vinum potius pro ratione temporis exhibero.

## CAPVT XIII.

*De morbo intestini plenioris.*

**I**s autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quam cæcam esse proposui. Vehemens \* inflatio, vehementes dolores dextra magis parte, intestinum quod verti videtur, prope spiritum elidit. In plerisque post frigora, cruditateque oritur, deinde quiescit, & per ætatem sæpe repetens, sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admouere sicca & calida fomenta oportet, sed primò lenta, deinde validiora, simulque frictiones, ad extremas partes, id est, crura, brachiaque materiam reuocare. Si discussum non est, qua dolet cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum, quod *κωλικόν* nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum, sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. Nisi finito verò tormento, rectè neque cibus neque potio assumitur. Quo victu sit vtendum \*, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *κωλικόν* nominatur, ex his constat: Costi, anesi, castorei, singulorum P. denariorum *ii i.* \*. petroselini P. denariorum *ii i.* piperis longi, & rotundi, singulorum P. \*. \* *ii i.* papaueris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, hardi, singulorum P. \* *vi i.* \*. quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

## ENARRATIO.

**C**OLON, inquit Paulus, crassioris intestini pars est: in dextra iliorum parte collocatur, & in sinistram deferitur in zona modum. in hoc vehementissimi dolores fiunt, ut primo, secundo, & sexto De locis affectis testatur Galenus, adeò ut ob doloris vehementiam Sammonicus, colon iuuissimum morbi genus non veritus sit dicere.

Vbi is dolor cœpit.

NON semper à fomentis auspicandum est; sed modò à sanguinis missione, modò à pharmaci



pharmacum sumptione, sicuti etiam non raro  
à clysterum infusione: dicit enim Galenus  
libro De locis affectis primo, se quoties mor-  
dax humor ad affectu intestini tunicas defla-  
xisset, medicamento quod ex aloë fit dato  
colicos se penumero curasse.

### cucurbitulas sine ferro.

POTISSIMUM si à spiritu flatulento  
concitatus dolor fuerit: nam, ut iam ante  
ex Galeno libro XI. therap. methodi re-  
tulimus, propriam quandam curationem  
sortitus est hic dolor, ex cucurbitula cum  
flamma copiosa, subinde admota: videtur  
que tibi, ut inquit, presidium hoc in eius-  
modi affectibus, incantamenti cuiusdam si-  
mile quid efficere, sine in intestinis, sine in  
quavis corporis parte excitetur.

rectè neque cibis neque.

Id enim unice cavendum monet Pau-

lus, ut & satietas & cruditas vitetur.

### Confectio medicamenti.

GALENUS libro De compositione medi-  
camentorum localium, duo pharmaca colica  
Cassio ascripta parum cum hac Celsi con-  
fectione convenientia describit. Scribimus  
Largus capite CXX. colicen Cassij quam ab  
eius sermo Atimeto se accepisse testatur, à  
secunda Galeni non omnino dissimilem de-  
scribit: Recipit autem Apij seminis p. feli-  
bram, anesi p. quadrantem, spica nardi in-  
dica p. sextantem, opij p. quadrantem,  
croci p. seunciam, piperis longi p. sex-  
tantem, piperis nigri pondo sextante, scheni  
p. seunciam: hæc omnia confusa cribrata  
melle Attico decocta miscentur. Datur, in-  
quit, ex hoc medicamento quantum nux anel-  
lana media patet ex aquæ calidæ cyathis tri-  
bus: Galenus natis pontice magnitudine æ  
aqua calida totidem cyathis exhibet.

### CAPUT XV.

#### De Torminibus, id est, Duoreteia.

PROXIMA his inter intestinorum mala, tormina esse con-  
sueverunt, *Duoreteia* Græcè vocatur, intus intestina exul-  
cerantur. Ex his cruor manat. Isque modò cum stercore ali-  
quo semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis  
excernitur, interdum simul quædam carnosæ descendunt.  
Frequens deiiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum  
eodem dolore exiguum aliquid emittitur. Atque eo quoque  
tormentum intenditur. Idque post tempus aliquod leuatur,  
exiguaque requies est, somnus interpellatur, febricula oritur,  
longoque tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit  
hominem, aut etiam (si finitur) excruciat. Oportet in pri-  
mis conquiescere. Siquidem omnis agitatio exulcerat, dein-  
de ieiunum sorbere vini cyathum, cui cōtrita radix quinque-  
folij sit adiecta, imponere cataplasmata super ventrem, quæ  
reprimunt, quod in superioribus ventris morbis non expedit,  
quotiesque desidit, subluere aqua calida, in qua decoctæ ver-

GG

benæ



\* astringant. At  
c. q. v. mouent, si id  
conf.

\* illa

\* & p. f. in  
terdū pro-  
flu.

\* cancerē

\* Sin

\* indatur.

benæ sint, portulacam vel coctam, vel ex dura muria ediss,  
cibos, potionesque eas, quæ astringunt aluum. Si vetustior  
morbus est, inferioribus partibus tepidum infundere, vel pri-  
sanæ cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam  
ceruinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem  
album crudum ex ouis, vel aquam, in qua lini semen deco-  
ctum sit: vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua  
rosæ floris folia cocta sint. Leuant enim dolorem hæc, &  
mitiora vlcera efficiunt, maximeque vtilia sunt, si cibi quo-  
que secutum fastidium est. Themison muria dura quam as-  
perrima sic vrendum memoriæ prodidit. Cibi verò esse de-  
bent, qui leniter ventrem \*distingant & ea quæ vrinam mo-  
ueant. Si ea consecuta sunt, in aliam partem humorem  
auertendo, profunt: si non sunt consecuta, noxam augent.  
Itaque nisi in quibus promptè id facere consueuerunt, non  
sunt adhibenda. Potui si febricula est, aqua pura calida, vel  
ea quæ ipsa quoque astringat, dari debet: si non est, vinum  
lene, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia \* alia iuue-  
runt, vetusque iam vitium est, aquæ bene frigida potio as-  
sumpta vlcera astringit, & initium secundæ valetudinis facit.  
Sed ubi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem  
reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies  
pessimi que odoris descendere, solet purus sanguis profluere.  
Si superius vitium est, aluus aqua mulla duci debet, tunc  
deinde eodem infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valens-  
que est etiam aduersus vlcera intestinorum minij gleba, cum  
salis hemina contrita. \* Si minus, mista his aqua in aluum  
datur. Ac si sanguis profluit, cibi potionesque esse debent,  
quæ astringant.

#### ENARRATIO.

**D**YSENTERIA, aut, sicuti Celsus & Plinius Latine reddiderunt, tormina, nihil aliud est quam intestinorum exulceratio: Celsus Aurelianus intestinorum rheumatismam cum exulceratione esse dicit. *Setim vero, Dysenteria, inquit, propriè ex*  
ulceratio est intestinorum serpendo des-  
pascens.  
Isque modus.  
GALENVS De locis patientibus primo,  
ex secum varietate locum affectum diuidit.



eat: Siquidem infimarum partium ulcera, inquit, nullas omnino notas habent alii excrementis admixtas: eorum verò partium quæ aliis collocata sunt ulcera, mixtas quidem cum stercore habent notas, sed id leniter duntaxat, quemadmodum si multo sint altiores, vehementior erit mixtura, præcipue in supremis intestinis, ulceris nota vehementer stercore videntur admixta. Aërius ab excrementis morbi magnitudinem diiudicat: nam quum superficies intestinum fuerit densata, exulceratioque superne consistit, faculenta ac cruenta, bilio- saque excrementa: ubi autem aliis penetravit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur: & si non celeriter cohibeatur, compendio vicinos locos depascitur, saniosa verò quadam excrementa, qualia ab occisorum corporibus effluere consueverunt.

### longoque tempore.

HIPOCRATES libro De affectionibus, fit, inquit, hic morbus, & laboriosus, ac lethalis, & si quidem robusto adhuc corpore curetur, spes est fuga: si verò colliquatio iam, & ventre omnino exulcerato, nulla vite spes superest.

### Oportet in primis.

Id recte, si quid aliud, mea quidem sententia, præcipit Celsus, quantumvis Hippocrates libro tertio De dieta, cursum pluribus & luctis, & deambulationibus videntur dicat, tum ab exercitiis, tum mane.

## CAPVT XVI.

### De laxitate intestinorum.

Ex torminibus interdum intestinorum laxitas oritur, quæ continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt. Id interdum ægros trahit, interdum præcipitat. In hoc utique adhibere oportet comprimementa, quò facilius tenendi aliquid intestinis vis sit. Ergo

GG 2

&amp; lu-

### imponere cataplasmata.

SVNT qui id vituperent, quò ob- structis poris natura motus præpediatur, atque adeo quòd si quid humoris in venis contentum sit, per reprimentia ventri applicata ad intestina regurgitet, atque per consequens morbum suumque augeat.

### ex dura muria.

QVOMODO dura muria fiat, doceet Columella De re rustica libro XII. cap. VI. dura autem ob id dicta videntur, non quòd consistentia dura sit, sed quòd aqua in salem energiam aut vini suam amplius exorcere non possit, ac quòd hæc pota dysenteriam canumat. Docet præter Celsum Paulus Aegineta, & Dioscorides, sicut & Themison quoque per inferna huiusmodi commode infundi auctor est: Galenus tamen id spectum habet libro XII. Methodico.

### lib& ea que urinam.

ADHIBENDA aliqua sunt que modice astringunt: he si fonte non succedat urinae excretio, recrudescat malum.

### Soler autem interdum

GALENUS cruentam dysenteriam nominat, ac icteroris, non intestinorum, accedens esse dicit libro II. & sexto De locis affectis.

### mini gleba.

HERMOLAVS Barbarus Lepnium si- gillum hoc loco intelligit, quem quidam bolum Armenum esse volunt, vide commentaria Matthioli in Dioscoridem.



\* decocta  
in aq.  
desidat, sub-  
audi æger; sic  
infra ca. prox.

& super pectus ponetur sinapi, exulcerataq. cute, malagma, quod humorem euocet, & ex verbenis\* decoctis aqua desidat, & cibos, porionesque assumat, quæ aluum astringunt, & frigidis vtetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere, ne simul his omnibus admotis vitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debent, aliquibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc præcipuè necessarium est, non quoties libet desiderare, sed quoties necesse est, vt hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque, quod æquè ad omnes similes affectus pertinet, in hoc maxime seruandum est, vt cum pleraque vtilia insuauia sint, qualis est plantago, & rubi, & quicquid malicorio mistum est, ea potissimū ex his dentur, quæ maxime æger volet. Deinde si omnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem interponatur aliquid minus vtile, sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessariae sunt, & cum his sol, ignis, balneum, vomitus (vt Hippocrati visum est) etiam albo veratro (sicætera parum proficient) euocatus.

## ENARRATIO.

INTESTINORVM lauitas, aliud nihil est, sicut Galeno placet, quam velox exitus eorum quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiiciuntur, qualia fuerit denorata; quum neque secundum consistentiam, neque secundum colorem vel odorem in vllam omnino qualitatem in ventriculo facta fuerit ciborum permutatio. Hæc, vt auctor est Paulus, duplici continetur discrimine: siquidem modò ex summa intestinorum vlceratione contrahitur, cicatrice densa, & leui succedente, quæ deinde ob densitatem suam, ciborum per corpus digestionem fieri nõ permittit, quum venarum ora, quæ alimentum ex intestinis ad se anellunt, sint obstruata. Alterum discrimen est, quoties ex infirmitate & languore virium alimenta in ventriculo continentium, creatur; atque liente-

ria speciem hanc cum cæliaco morbo nonnunquam confundi idem auctor est.

Ergo & super pectus.

ID non antè faciendum putat Paulus, quam ubi iam inueterauerit morbus: nam inchoante morbo, cataplasmata ex lini semine cum palmulis imponenda dicit.

vomitus (vt Hippocrati, &c.

SI quidem materia peccans in stomacho sit, vtilissimus erit vomitus; sin in intestinis eadem contineatur, nescio quàm erit ex usu: præsertim quando vellelacione hellebori, plinæ offeceris, quam remissione in contrarium profeceris, quod & Hippocrates voluisse videtur, qui post veratri summptionem ventrem lacte cocto eluit. vide Hippocratem De affectibus, unde locum hunc mutauit est Celsus.

CAPVT



## CAPVT XVII.

*De Lumbricis aluum occupantibus.*

**N**ON VNQVAM autem Lumbrici quoque occupant aluum, hiq̃ue modò ex inferioribus partibus, modò fœdus ore redduntur. Atque interdum latos eos, qui peiores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit, contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamoneæ paulum. Vel etiam pridie cum multum allium ederit, vomat. Posteroque die mali punici tenues radículas colligat, quantum manu comprehenderit, easque contusas in aquæ tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adiiciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas portionesumat, aut aquæ, vel muricæ duræ sic adiectæ, tum desidat subiecta calida aqua in pelui. Si verò teretes sunt, qui pueros maximè exercent, & eadem dari possunt, & quædam leuiora, vt contritum semen vrticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel mentha cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinū, & allium prodest, vel malucæ oleum subter dedisse.

## ENARRATIO.

**Q**VVM tres sint lumbricorum differentie, ascarides scilicet dicti, rotundi, & lati: Celsus duorum tantum, vti etiam Scribonius Largus, meminit: forte quod indignum putauit, de ascaridibus quicquam scribere, quando iidem parui admodum sint, & circa extremas intestinorum partes consistentes, nullumque noxium symptomata, præterquàm in iisdem partibus pruritum inferentes. Hippocrates latos lumbricos infantibus in matris vtero nasci auctor est; neque verisimile esse, eosdem generari posse ab excrementorum putrefactione, posteaquam quotidie excernat, atque aluum expurget homo: ac proinde sicuti iudè in vtero materno consistente adhucdum infante parui

sunt, ita sensim eosdem auferere cum intestinis, adeo vt nonnunquam duorum cubitorum longitudine excernantur. Plinius xii. cubitorum longitudinis, latum lumbricum visum auctor est. Aetium latum lumbricum sic describit: Latum lumbricus est, si ita dicere libeat, permutatio pelliculæ intrinsecus tenuia intestina ambiens in corpus quoddam vinum, quod continuos stomachi morbus infert, & ad cibos incorrigibilem appetitum: Græci latos lumbricos *χολεικὰς* *ἐντερίδας* ad similitudinem fasciarum, & instillarum nominant; teretes autè *εγγυράδας*.

& quædam leuiora.

IDEM testatur Galenus libro XIII. Methodi.

GG 3

CAPVT.



## CAPVT XVIII.

De *tenesmo* intestinorum morbo.

EST autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod *tenesmos* Græci vocant: id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet, cum & facile tollatur, neque vnquam per se iugulet, in hoc æquè atque in torminibus frequens desidendi cupiditas est, æquè dolor vbi aliquid excernitur. Descendunt autem pituitæ, \* nuciſque ſimilia, interdum etiam leuiter subcruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque rectè \* coacta: desiderare oportet in aqua calida, sæpiusque \* ipsum manu nutrire, cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod *ῥοσά φάρμακον* Græci vocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & \* iea appositum, eademque ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, \* eadem verbenæ decoctæ, vt inferiores partes foueantur, alternis verò diebus aqua, alternis \* leuè & austerrimum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida: propior ratio victus talis, qualem in \* tormina supra præcepimus.

## ENARRATIO.

TENESMVM Plinius *Tenasium* vocat: alij *Tensionem* dicere maluerunt: Græci priorem syllabam modo per *n*, interim per *e* scribunt. EST autem *Tenesmus* inferioris intestinorum partis, vt ait Alexander Trallianus, longanoniſque ipsius lenius malum; crebra videlicet, & inanis desidendi cupiditas, assiduus egerendi impetus. solet autem interdum dysenteria præcedere: nonnunquam verò & ipse solus parlatim generatus, desinit. Celsus interim dum omnibus antedictis lenius malum esse dicit, per *tenesimum* tantum intellexisse videtur tumorem quendam œdematosum ante exulce-

rationem: nam quoties exulceratus est *tenesmus*, parui faciendus non est: solet enim interdum non minus molestia asserre, quam lenis dysenteria.

desidere oportet in aqua calida.

VIDENDVM tamen est num ad multitudinem stercoreum in caco intestino retentionum causam suam referat desidendi cupiditas: nam tum quidem hisce medicamentis plus exacerbaueris quam iuueris; quando ablato stercore statim compeſcatur morbus.

## CAPVT



## CAPVT XIX.

*De ventris fluxu & curatione.*

**L**EVIOR etiam dum recens deiectio est, vbi & liquida aluus, & sæpius quàm ex consuetudine fertur: atque interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idque peius est: sed vno die fluere aluum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris ablit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat vtiliter effunditur, verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat, viresque consumit: primo die quiescere satis est, neque impetum ventris prohibere: si per se desit, balneo vti, paulum cibum capere: si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die si nihilominus liquida aluus est, æquè conquiescere, paulum astringentis cibi sumere, tertio die in balneum ire, vehementer omnia præter ventrem perfricare, ad ignem lumbos, scapulasque admouere, cibis vti, sed ventrem contrahentibus, vino non \*multum meraco. Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, vt post hanc animaduersionem, aluus non contrahatur. Alia via est vbi velis suppressere, cœnare, deinde vomere, postero die in lecto conquiescere, vesperi vngi, sed leniter, deinde panis, circa selibram, ex vino amineo mero sumere, tum assum aliquid, maximeque auem, & postea vinum idem bibere aqua pluuiali mistum, idque vsque ad quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores auctores Asclepiades affirmavit, & quidem quàm frigidissimam. Ego experimentis quenque in se credere debere existimo, calida potius an frigida vratur. Interdum autem euenit, vt id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere, deinde postero die vesperi, tepido \*loco vngi, cibum modicum assumere, vinum meracum quàm asperrium, imposi-  
tam;



Myrrhappia  
Plinius ab edo-  
re hēta esse d-  
cit li. 15. ca. 15.

\*quando-  
cunque

\*pipere,  
quod ab h.  
c. est pult.  
\*malico-  
rio

Potio quæ  
astringat.

tam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis, neque ambulatione, neque frictione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam equo prodest. Neque enim vlla res magis intestina confirmat. Si verò etiam medicamentis vtendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore in grande vas coniicienda sunt pira, atque mala siluestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrhappia, hisque adicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, & quibus magis vtimur, etiam torminalia, sic vt hæc tertiam ollæ partem teneant, tum deinde ea musto implenda est, coquendumque id, donec omnia quæ indita sunt, liquata in vnitatem quandam coëant. Id gustui non insuaue est, & quodocunque opus est, assumptum leuiter, sine vlla stomachi noxa ventrem tenet: duo aut tria cochlearia vno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus est, myrti baccas legere, ex iis vinum exprimere, id decoquere, vt decima pars remaneat, eiusque cyathum sorbere. Tertium quod \*quandoque fieri potest, malum punicum excuare, exemptisque omnibus seminibus membranas, quæ inter ea fuerunt, iterum conicere, tum infundere cruda oua, rudiculaque miscere, deinde malum ipsum super prunam imponere, quod dum humor intus est, non adurit. Vbi siccum esse cœpit, remouere oportet, extractumque cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaque etiam in piperatum coniicitur, misceturque cum sale, & \*pipere: est quid ex his edendum, est pulcra etiam cum qua paulum ex fauo vetere coctū sit, & lenticula cum \*malo corio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt, atque ea aqua, in qua vel palmulæ, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. Quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ astringat. Tritici quoque hemina in vino amineo austero decoquitur, idque triticum ieiuno, ac sitienti datur, superque id vinum id sorbetur, quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest, atque etiam potui datur vinum



vinum signinum, vel resinatum austerum, vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus, seminibusque suis punicum malum, vinoque tali miscetur, idque vel merum forbet aliquis, vel bibit mistum. Sed medicamenti uti, nisi in vehementibus malis, superuacuum est.

## ENARRATIO.

**FLUXIONEM** alui, ut auctor est Galenus Commento in secundum Epidemiorum, vocat Hippocrates, quoties sine tenesmo dysenteria, henteria, deiciantur, & semper & assidue liquida excrementa; vel, ut ait auctor libri De definitionibus medicis, ventris fluxus nominatur, copiosior alui fluxus diuturna sine phlegmone & exulceratione.

sed vno die fluere.

**SIC** in Aphorismis Hippocrates, a pituita alba detenta, alui fluor superueniens agriuidinem tollit.

**Interdum enim tormina.**

**PUTA** si sincera biliosaque deiectione sit; bilis enim acrimonia facile afficiuntur rodenturque intestina; nam, ut septimo Aphorismorum Hippocrates, a cholero feces, aut deiectione sincera, dysenteria superueniens, malum.

ac febriculas.

**FEBRICITANT**, inquit Galenus VIII. Methodi medendi, nonnulli ex iis quos diarrhoea post cruditates male habet: quibus utique non minime prouocatur febris ex deiectionis frequentia: quod si etiam roscia & dolor, aut calor immodicus in ventre & intestinis adsit, huic utique vel longe magis accessio febrilis increfcat.

**primo die quiescere.**

**NAM** qui sipticas potiones sumunt non perpurcato corpore, profluvium magis irritant: si quis tamen quietem qua motus privatione fiat intelligere malit, id non absurdè fecerit: quando in omnibus fere fluxibus, quies, nisi fluxionem promouere velimus, conueniat: nam agitatione moueri corpora auctor est Hippocrates.

balneo uti.

**NON** quous, sed eo in quo qua poros aperiri decocta sunt; ut si quid humeris virulenti in corpore reliquum sit, his vaporibus dissoluantur, atque ad exteriora trudentur: nam aliqui si astringens balneum sit, maximam noxam inferes, cutem condensando, & vapores materiamque ad interiora regerendo.

vino non multum meraco.

**GALENUS** in virinum tantum defectu vinum concedit; ac tum quidem austerum, ex aqua pluviali propinat: quanquam ubi ex intemperie frigida vitium obortum fuerit, vino veteri facultatis calida exhibitio curare soleat; sicut frigida potu, in hoc Asclepiadem imitatus, si calida intemperies in causa sit.

vehiculo sedisse.

**CAVENDVM** tamen est ne vehementior fiat agitatio: nam siue ea vehiculo, siue equo fiat; ut consessorium quid habet, ita ventris fluore laborantibus inutilis erit: leuis contra, intestina ventremque roborabit.

malo corio.

Malicorio legitur.

**Contunditurque.**

**PLINIVS** Naturalis Historia XXIII. libro, ante furno torrendum dicit: Punium, inquit, malum in olla nona operculo indito in furno tostum, & contritum, potumque in vino alnum sistit. Dicit autem paulo ante, non quodvis, sed vinosum tantum accipiendum esse, quod alia fere stomacho nocua sint: nam dulcia, ait, inflationes pariunt, ac stomacho amica sunt.

HH

CAPVT



## CAP. V. XX.

De vulua morbo, &amp; curationibus.

**E**x vulua quoque foeminis vehemens malum nascitur, proximeque ab stomacho vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitiali morbo prosterнат. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur: sopor tantum est, idque quibusdam foeminis crebro reuertens, perpetuum est. Vbi ineidit, si satis virium est, sanguis missus adiuuat. Si parum est, cucurbitula tamen defigenda sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit, admouere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex iis quæ foedioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemque aquæ frigida perfusio efficit, adiuuatque ruta contrita cum melle, vel ex cypri-  
no ceratum, vel quodlibet calidum, & humidum cataplasma, naturalibus pubetenus impositum. Intra hæc etiam perfricare coxas, & poplites oportet. Deinde ubi ad se redit, circuncidendum vinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie vtendum totius quidem corporis, præcipue verò ventris & poplitum. Cibus ex media materia dandus. Sinapi super imum ventrem, tertio quoque, aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commodè videtur solanum in lac demissum, deinde contritum, & cera alba, atque medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, vel caprinum cum rosa mistum. Dandum potui etiam vel castoreum est, vel git, vel anethum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato: si verò vulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet, & recens suilla adeps, & ex ouis album misceatur, idque apponatur, vel album ex ouo cum rosa mistum, adiecto, quo facilius consistat, contrita rosa puluere. Dolens verò ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae cute incisa, inguinibus, vel etiam  
TV 42
HH
sub



sub mammis admotæ: si maligna purgatio est, subiicienda sunt \*coercentia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptum, & gummi cum trito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus \*vesicæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia, similibusque. Idemque etiam decocta lentiscus præstat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est, aut certe coxis admotæ cucurbitulæ cute incisa. At cum vrina super potionum modum etiam sine dolore profluens, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione & frictione, maximeque in sole vel ad ignem. Balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora, cibis comprimens. Vinum austerum meracum, per æstatem frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum, quantum minimum sit. Infima aluus quoque vel ducenda, vel lacte purganda est. Si crassa vrina est, vehementior esse debet & exercitatio, & frictio, longior in balneo mora: cibus opus est \*tenuibus. ris, vinum idem. In utroque morbo vitanda omnia sunt, quæ vrinam mouere consuerunt. \*vulue.

## ENARRATIO.

**G**ALENVS De locis affectu sexto, multis dicit esse differentias suffocationis ad vitæ, vel pro causa efficiens magnitudinem, vel pro specierum quarundam variatione. Semper tamen inferne oritur vieri strangulatio: verum superna partes, & principales præsertim per consensum coeuntur: nam ad cor per arterias, quas vocant carotidas, ad cerebrum, per spinæ membranas ac nervos, ad hepar, per venas affectio communicatur, videnturque vitæ velut ad supernas partes ascendisse.

vt. tamquam comitali.

MOYETVR enim morbus hic per circumcitur, sicut comitalis, id est, vulua repleta, aut seminali, aut alia materia: aut si hæc imus computuerit. auctor est Aërius.

nec spumæ profluunt.

Id apud omnes in confesso est: quam apud Hippocratem libro De morbis muliebribus contrariis inuenias: Nam ubi lenis habuerint, inquit, spumant.

Vbi incidit.

METHODVS, medendi in hoc confisus, vt reuellamus enaporationem à principibus partibus: quare si quando vires atque occasio permittant, vena circa malleolos secanda sunt. hic tamen non inuiliores erunt scyæ seu cucurbitulæ femoribus affixæ, quod valide reuellant.

circumcidendum vinum est.

CVR in totum annum circumcidendum.

HH 2

dum.



dum vinum dicat, non video: nam quum  
attenuans & incidens victus ratio, modi-  
cumque exercitium, iisdem non inutile sit,  
nescio quomodo vinum quod pauciferum  
tenuiūque partium sit, non conueniat.

### Si duricies manet.

AETIVS emplastrum, aut episthema  
emolliens pectini applicandum dicit: cate-  
rhim an tale sit quod ex solano in lac de-  
misso fieri docet Celsus, alij iudicant: ego  
certe nondum mollientem vim, aut dura  
resoluentem in solano comperire potui.

### At quum vrina.

HIPPOCRATES libro De morbis se-  
cundo, multitudine vrinae rationem reddit:  
quam, etsi ad proposuit nostrum parum  
faciat, non gravabor ascribere. Multum  
vrinae emittitur, dicit, ubi caput nimium  
incaluerit, quiescit enim in ipso pituita: li-  
quefcus autē partim secedit ad naves, par-  
tim ad os, partim per venas quae ducunt ad  
pudendum. quum autem ad pudendum per-  
uenierit, mingit homo, & partim quemad-  
modum ab stillicidio vrinae. Aetivarius aliam  
causam addit, quae huic loco magis conue-

nit: nam posteaquam varias causas super-  
fluitatis vrinae recensuisset, illud quoque ad-  
dendum est, inquit, quod maxime fieri solet  
tam in colligatione totius corporis habitus-  
dinis, quam in morificatione contentivae  
virtutis: quandoquidem ubi defatigata na-  
tura est, ob pessimam aliquam egritudinis  
affectionem, virtus humorum contentiva,  
sanguinem abiceret illos dissolvit, ac modo  
per lotium, modo per sudorem, interdum  
etiam per dentrem excretionem facit. Quo  
fit ut hic Pinzani exemplar sequi malim;  
quod sine sudore profuena legi: ne-  
que enim posset natura viramque vacuatio-  
nem ferre citra animi deliquij periculum: ita  
ut hic nihil alienius quam exercitium, ut  
quod sudorem provocaret, censendum sit.

### Infima alius quoque.

VARIANT hic exemplaria: alia siqui-  
dem infinita, alia infima legunt: verum  
vrinae legeris, obscurus admodum hic est; ita  
ut coniectandum omnino sit quid velit, at-  
que opus quodammodo Oedipo aliquo sit, qui  
enigma soluat: nisi quis legendum dicat  
per infima alius: nam sic aliquo modo  
constabit sententia.

## CAPVT XXI.

### De nimia profusione seminis ex naturalibus.

EST etiam circa naturalia vitium, nimia profusio seminis,  
quod sine venere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut  
interposito spatio tabe hominem consumat. In hoc affectu  
salutares sunt vehementes frictiones, perfusiones, natationes  
que quam frigidissima, neque cibi, nec potio, nisi frigida  
assumpta. Vitare autem oportet cruditates, omnia infantia,  
nihil ex his assumere, quae contrahere semen videntur, qua-  
lia sunt, siligo, simila, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa,  
piper, eruca, bulbi, nucleipinci. Neque alienum est fo-  
uere inferiores partes, aqua decocta ex verbenis comprimen-  
tibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibus  
que circumdare, praecipueque ex aceto, rutam vitare, etiam  
ne supinus obdormiat.

HH

ENAR-



## ENARRATIO.

QUAMVIS Aristoteles discrimen inter semen & genituram posuerit, ita ut genitura, maris semen dicatur; semen vero, mixtio geniturae & sanguinis menstrui; Celsus, sicut & Galenus, & alij, indifferenter seminis profusione dixit, quae Graecis *σπέρμα*: estq; multa, seu inuolutaria, atque eadem assidua seminis excretio, cole haudquam extento; oriturque ex reitricis natura facultatis imbecillitate, aut ex vasorum seminariorum tensione aut conuulsione.

praecipueque ex aceto  
rutam.

Id quam sit verum, nescio: valet

enim ad comprimendum semen, non solum temperamento, sed tota ipsius substantia, licet calida sit ruta: eadem namque comesta semen coagulat & corrumpit, ut auctor est Aëlius. quod & confirmat libro VII. Simplicium Galenus: qui non solum semen, sed & Veneris appetentiam extinguere testatur. Verum ut Celsum nostrum ab errore vindicemus, immutatis distinctionibus locum hunc sic legemus: praecipueque ex aceto rutam, vitare & ne lupinus obdormiat. sic enim sententiam planam reddemus, quando supinus cubitus plurimum oblit, & ruta ex aceto perfusio plurimum prodest.

## CAPVT XXII.

*De coxarum morbis, & curationibus.*

SUPEREST ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conferuntur. initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit. Isque hominem saepe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoque id genus difficillimè curatur, quod ferè post longos morbos vis pestifera huc se inclinat, quæ ut illas partes liberat, sic hanc ipsam quoque affectamprehendit. Fouendum primùm aqua calida est, deinde vtendum calidis cataplasmatibus. Maximè prodesse videtur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mistus capparis cortex concisus, vel lolij farina ex vino diluto cocta, & mista cum acida facie: quæ, quia refrigescunt, imponere coctum malagmata commodius est. Inulæ quoque radix contusa, & ex vino austero postea cocta, & latè super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non soluerunt, sale calido & humido vtendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admouendæ sunt cucurbitulæ, mouenda vrina. Aluus si compressa est, ducenda. Vltimum est, & in vereribus quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus

\* alias

\* quæque  
refrigescunt,

HH 3

tibus



\*digeran-  
tur.

\*opitula-  
mur.

tibus ferramentis exulcerare. Sed frictione quoque utendum est, maximè in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea, quæ cõuundo nocuerunt, \*dirigantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis, sicut & cæteris partibus adhibenda est. Cùm verò sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis euocetur, illud perpetuum est, non ut primùm fieri potest, huius generis vlcera sanare, sed ea trahere, donec id vitium, cui per hæc \*opitulantur, conquiescat.

### ENARRATIO.

**C**ELSVS per Articulum, sicuti Græci per ἄρθρον, naturalem osium compositionem intelligit: quemadmodum & ipse Galeus libro De osibus facit. Si igitur crassus pituitosusque humor, in coxarum articulo concretus insideat, gravissimos exci-  
tat dolores: atque qui ita affecti sunt, ischiadici, & coxendiculi dolore vexati nominantur: Plinius enim articulum in quo ossis femoris caput cum osse coxendicis alligatur atque dearticulatur, coxendicem appellat.

quod ferè post longos.

**S**IC Hippocrates quarto Aphorismorum, longas febres per abscessus ad articulos interdum terminari auctor est.

incisa cute admovente.

**Q**UANTQVAM omnes in hoc enim Celsus conveniant; Hippocrates tamen libro De locis in homine, contrarium asserere videtur eo loco ubi dicit, Quum coxendiculi morbus à fluxione fiat, cucurbitam medicam affigere oportet, & foras trahere, & non scarificando perungere, & calefactoris medica-

mentis in potu exhibitis, intus calefacere, quo exitus fiat tum foras ad entem per cucurbitæ attractionem, tum intus ad ventrem per caliditatem.

Ultimum est.

**H**IPPOCRATES sexto Aphorismorum sub finem sectionis, Quibuscumque, inquit, à coxendiculi dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit, iis musculos superueniunt: & quibuscumque coxendiculi diuturno dolore molestatis excidit coxa, iis crux tabescit, & claudicant, si non urantur; vitione etenim humiditatis copia absumitur, atque exiccatur, & ligamenta solidiora efficiuntur. Et libro De affectionibus sic scribit: Si in unum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, vitiò quocunque loco fuerit dolor, vitiò autem crudo limo. Dioscorides stercore caprino fervefacto ad vitionem vititur, atque hac vitione summos coxendiculi dolores, & qui quibusvis medicamentis rebelles sunt, per sanatos post eum scribit Anylus.

### CAPVT XXXIII.

De genuum doloribus, & cura.

**C**OXIS proxima genua sunt, in quibus ipsis nonnunquam dolor esse consuevit. In eisdem autem cataplas-  
matis, cucurbitulisque præsidium est, sicut etiam cùm in hu-  
meris



ENARRATIO.

Equitare ei cui.

NON solum genu dolenti inimica est equitatio; sed & omnis articuli morbus; quando certum sit ingem equitationem ischiadii, & podagra causam frequenter fuisse.

C A P V T . XXIIII.

*De articolorum doloribus, in manibus, pedibusque.*

\* bonamy  
\* lacte



ria interpositis rebus vrinam mouentibus, quotiesque plenior est, euomere. Vbi dolor vehemens vrget, interest sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram ferue facere oportet, deinde in peluem conicere, & cum iam homo pati potest, pedes demittere, superque pallam dare, & vestimento tegere, paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadem aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat, ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque hibisci radicem ex vino coctam. Sin verò tumor calorque est, vttiliora sunt refrigerantia, recteque in aqua quam frigidissima articuli continentur: sed neque quotidie, neque diu fit, ne nerui \* lædantur. Imponendum verò est cataplasma quod refrigeret. Neque tamen \* in hoc ipso permanendum, sed ad ea transeundum, quæ sic reprimunt, vt emolliant. Si maior est dolor, papaueris cortices in vino coquendi, miscendi que cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit. Vel ceræ & adipis suillæ tantundem vnâ liquandum, deinde his vinum miscendum, atque vbi quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, & subinde imponendum aliud est. Si verò tumores etiam obcaluerunt, & dolent, leuat spongia, quæ imposita subinde ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur, aut pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea manibus, pedibusque malagmata. Quòd si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet spongia, quæ in aquam calidam demittatur, in qua vel papaueris cortex, vel cucumeris syluestris radix decocta sit, tum inducere articulis crocum cum succo papaueris, & ouillo lacte. At si tumor est, foueri quidem debet aqua \* calida, in qua lentiscus, verbena, aliæque ex reprimentibus decocta sint: induci verò medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis, aut ex cerussa, cui contritæ herbæ muralis succus sit adiectus. Lapis etiam qui carnem exedit, quem *σπεροφάγον* Græci vocant, excisus, sic vt pedes capiat, demissoseos cum dolent, re-tentosque ibi leuare consuevit. Ex quo in Asia lapidi Asio-  
gratia

\* indure-  
scant.

\* in hoc  
quotidie  
perm.

\* egelida,



gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta sit, nisi vitium hominis accessit, modicis exercitationibus, abstinentia, vntionibus lenibus vtendum est: sic, vt etiam acopo vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus verò articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hos antè & curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est, velalui ductione vti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes replet, cum euident sit omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunque autem morbo quis inualefcit, si tardè confirmatur, <sup>\* conuale-</sup> vigilare prima luce debet, nihilominus in lecto conquiescere, <sup>fcit,</sup> circa tertiam horam leuiter vntis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa (quantum iuvat) ambulare, circuncisa omni negotiosa cogitatione vel actione, tum gestari diu, multa friatione vti, loca, calum, cibos saepe mutare. Vbi triduo, quatrìduo ve vinum bibit, vno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & vt mature vires suas recipiat. Cum ex toto verò conualuerit, periculose vitæ genus subito mutabit, & inordinate aget. Paulatim ergo debebit omissis his legibus, eò transire, vt arbitrio suo viuat.

## ENARRATIO.

HIPPOCRATES sectione sexta Aphorismorum Aphorismis XXVIII, XXXIX, & XL. Eunuchi neque podagra laborant, neque calui fiunt: & mulier podagra non afficitur, nisi menstrua deficiant; & puer podagra non laborat, antequam venere viatur.

## Vbi sentiri cœperunt.

IDEM asserit Galenus libro De curatione per sanguinis missionem: cui suffragantur Paulus & Aëlius, & Trallianus; præsertim si sanguinis copia in causa sit: nam non solum a presenti, sed & a iam instanti liberat morbo. At si acres & biliosi humores

in causa sint, phlebotomia alienius nihil esse potest, quam potius pharmaco leuiter ducere aluum, vt auctor est Alexander, materia purganda sit; sic tamen, vt ante purgationem corpus humectantibus fluidum fiat, biliosique humoris acrimonia adempereur, cum alimmo lacte.

ISCHIADICIS id tunc exhiberi tradit Hippocrates libro De internis affectionibus.

## Quidam cum toto anno.

COITVS enim articulos, pedes, ac nervosas partes maxime laedit: sicut etiam vi-



num, si immodicè sumatur; iis præsertim qui sanguine multo præditi sunt. auctor enim post Celsum nostrum Trallianus est, se multos nonisse, qui sola vini abstinentia, non amplius fuissent morbum experti.

### Quod ferè vere.

HIPPOCRATES sectione sexta, Aphorismo LV. Dolores podagrici vere & autumno maxime moventur; in vere quidem ex copia: nam vere mediocriter calido existente, materia per hyemem antea congesta fit effusa, & à validioribus partibus ad imbecillas, nempe pedes derunditur; ideoque minime mirum, tum podagricos, & articulares morbos generari. Autumno verò reuertuntur, tum ex inæqualitate, tum ex qualitate humorum.

### maximeque hibisci radicem.

HIBISCVM, ut auctor est Plinius, libro XX. capite IIII. paslinace simile est. quod & molochon agrian vocant, & aliqui pistolochiam. Vlcibus, cartilagini, ossibus fractis medetur. & in fine capitis locum hunc ex Celfo allegat: Celsus, inquit, podagricis qua sine tumore sunt, radicem eius in vino decoctam imponi inbet.

### recteque in aqua.

HIPPOCRATES sectionis quinta Aphorismo XXV. Tumores, inquit, articulorum sine ulcere, podagricos quoque dolores, & conuulsiones: horum quidem plurima, aqua largè superfusa lenat, doloremque minuit ac soluit; stupor enim mediocris lenat.

### Quòd si nihil.

APPOSITE admodum dictum est, pro eo quòd si dolor adeo urgeat ut nihil superimponi patiat, ad ea quæ anodyna vocantur deueniendum est: hæc enim, nec temere, nec quauis de causa in usum recipienda sunt; sed tum demum, quando dolor usque adeo vehemens est, ut laborans ferendo dolori amplius sufficere non possit.

### Lapis etiam qui carnem exedit.

Σαργόμας, & Assim dictum lapidem eundem esse puto; præsertim quando Galenus ab Asso oppido Asia, in quo potissimum inuenitur, Assim lapidem per duplex s. nominatum dicat. atque id ut credam, facit auctoritas Plinij libro XX. capite XCVI. qui ibidem sic scriptum reliquit: At circa Assum Troadis lapis nascitur, quo consumuntur omnia corpora; sarcophagus vocatur. & libro XXX. capite XVI. Assim gustu salsum, podagras lenit, pedibus in vase ex eo canato inditis. Præterea omnia crurum vitia in iis lapidibus sanantur, quum in metallis omnibus crura vitientur. Ab hoc non discrepat Dioscorides, qui postquam ex Asio lapide cataplasma cum lomento fabarum podagricis vilissimum concinnari dixisset, statim subiungit, Podagrici inuantur pedibus in solio ex eo lapide excavato inditis; sunt quoque ex eo loculi qui corpora erodunt.

### Vbi dolor & inflammatio.

HIPPOCRATES, libro De indicationibus, Quicumque podagrici morbi sunt, hi in XL. diebus ab inflammatione liberi sedantur. & sexto Aphorismorum, Quicumque podagrici morbi sunt, hi sedata inflammatione, in quadraginta diebus restituntur.

### Quibus verò articulorum dolor.

CVRIOSVM vittum appellat, non qui exquisitus, aut delicatus, verum qui fragilis ordinatusque, ut sic dicam, sit, & qui pro patientis habitu, summo studio atque cura præscriptus sit: nam sicuti arthritici, carnosi, crassi, & pingues, extenuantem vittus rationem requirunt; ita graciles grauissimè eadem offenduntur, quo fit ut diuretica in obesis, & pituitosa arthritide conueniant; in biliosa contra maxime aliena sint.


### AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R Q V I N T V S

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

P R O O E M I O N .



IXI de his malis corporis, quibus victus ratio maximè subuenit. Nunc transcendum est ad eam medicinæ partem, quæ magis medicamentis \* purgat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se Empiricos nominauerunt, præcipuè tamen Herophilus, deductique ab illo viri, adeò vt nullum morbi genus, sine his curarent. Multaque etiam de facultatibus medicamentorum memoria prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andreæ, vel Apollonij, qui Mys cognominatus est. Horum autem vsum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit: & cum omnia ferè medicamenta stomachum lædant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verum vt illud in plerisque morbis vtilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicinæ partes ita \* innexæ sunt, vt ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo vt illa quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet, & illa quæ præcipuè medicamentis \* purgat, adhibere etiam rationem victus

\* pugnat.

\* con.  
al. an.

\* pugnat.



victus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mista, non alienum videtur antè proponere & nomina, & vires, & mixturas eorum, quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

## BALDVINI RONSSEI

## ENARRATIO.

Apollonij qui Mys.

**H**IC ab aliis Mix vocatur: conscripsi libros De secta Herophili.

Herophilus.

HEROPHILVS hic inter maximos quondam habitus est medicos. tantum medicamentis tribuit, ut palam assereret medicamenta deorū esse munus: neque id absque ratione, ut testatur Scribonius; nam prorsus idem præstant medicamenta, quod tactus diuinus efficere potest.

Horum autem vsu.

IDEM asserit Scribonius Largus in epi-

stola ad C. Iulium Callistum: Asclepiades, inquit, febricitantibus, virisque præcipitibus correptis, quæ ὀνεία Græci dicunt, negavit medicamenta danda, quia cibo, vinoque aptè dato interdum remediari intus eos existimabat: ceterum libro qui μαγικὰ ἐκείνων, id est Preparationum inscribitur, contendit vltima sortis esse medicum, qui non ad singula quæque vitia, binas ternasve compositiones, & expertas protinus paratas habeat. Idem de eodem testatur Plinius libro XXVI. capite III. ut libro secundo retulimus.

## CAPVT I.

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta fiunt, & primò de his quæ sanguinem supprimunt.

**S**ANGVINE M suppressunt, atramentum sutorium, quod Græci χαλκάνθοι appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë, gummi, plumbū combustum, porrū, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel \*figuralis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squama & ferri, & æris, atque huius quoque duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

ENAR-



## ENARRATIO.

**E**A quibus sanguis cohibetur, alia refrigerando, alia astringendo, alia glutinando, alia siccando, alia aduendo id efficiunt: Initium tamē à refrigerantibus, & astringentibus ducendū est; & ad extremum adhibenda adurentia sunt. Solet autem sanguis effluere, aut apertis, aut ruptis, aut exesivis vasis. apertis igitur astringentia; ruptis glutinantia; exesivis sarcotica & boni succi alimenta remedio sunt.

## CAPVT II.

*Quæ vulnus glutinent.*

**G**LV TINANT vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipue-  
que acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum,  
bulbi, lini semen, nasturtium, oui album, gluten, ichthycolla,  
vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum,  
spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa,  
ex iisdem lana succida, si levis plaga est, etiam aranea: reprimunt alumen & scissile (quod *χυσίον* vocatur) & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum sutorium.

## ENARRATIO.

**G**LV TINANTIA Græci modò *καταλπηκὰ*, nunc *συμφορικὰ*, aliàs *σρεγαντικὰ* vocant: siccant omnia ad secundum ferè gradū, media ratione inter ea quæ cicatrice trahunt, & quæ carnem regenerant, non detergent, sed astringunt, prohibentque ne quid humoris labris ulceri obueniat; nec in cruentis solummodò usurpari solent, sed & ad sinus, ad fistulas, maligna ulcera, verustaq; transferuntur: sunt autem huiusmodi, ut tertio Methodi medendi docet Galenus, ea quæ austera sunt atq; astringentia.

## CAPVT III.

*Quæ concoquant, & moueant pus.*

**C**ONCOQVUNT & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

## ENARRATIO.

**Q**VÆ pus mouent, quum similem temperiem habeant ipsi temperaturis quæ naturales sunt, eorum substantiam tueri potius quàm immutare possunt; ergo in supurationibus humiditas illa alteratur quidem, itēque si quæ caro conuulsa est: at omnia



omnia quæ secundum naturam sunt, substantiam suam seruant. tale igitur debet esse medicamentum quod ad purum mouendum adhibetur, qualis est in naturis temperatis na-

tus calor. quemadmodum enim alterationes, quæ secundum naturam ab innato calore sunt, à simili calore externo innantur; ita etiam in suppurationibus usus venit.

## CAPVT IIII.

*Quæ aperiant vulnera.*

\* venarum  
ora  
\* quæ ἀρ-  
σμωνικὰ  
Gr. dicun-  
tur,  
\* bdella,  
\* aminia

**V**\* **VLNERA** aperiunt tanquam ora in corporibus, \* quod ὥμα Græcè dicitur, cinnamomum, balsamum, panaces, iuncus quadratus, pulegium, flos albæ violæ, \* bdellium, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, vua \* taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ oscula venarum aperiunt, calida sunt non valde, & crassarum partium; quæ etenim vehementer calefaciunt, vrunt, & crustam inducunt: quare an piper, ut quod violenter calefaciat & siccet, & pyrethrum, aliæque id genus quæ adurentibus postea annumerat, rectè hic as-

cripserit, alij indicent: id tantum dicendum est, quod omnia exemplaria, meo quidem iudicio, perperam vulnera legant, quum potius vlcera legendum sit: quamuis auctor noster, Hippocratem imitatus, vulneris vocabulum cum ulcere confundat, ut ante annotauimus.

## CAPVT V.

*Quæ purgant.*

\* est san-  
daracha  
squama

\* hoc val.

\* vtique  
\* fel tauri-  
num, vit.

**P**URGANT, ærugo, auripigmentum, quod ἀρσενικόν à Græcis nominatur. Huic autè & sandaracæ in omnia, eadem vis, sed validior \* est squama aris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina & pinea, & terebinthina liquida, & nanthe, lacerti sterces, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacum potest, sed \* valentius est, abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphacium, radícula, coagulum, sed maximè leporinum, cui eadem quæ cæteris coagulis facultas, sed \* vbique validior est, \* fel, vitellus crudus, cornu ceruinum, gluten taurinum, mel crudum, misty, chal-



fy, chalcitis, crocum, vua <sup>\*</sup>taminia, abrotanum, spuma ar-  
genti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum,  
sulphur, pix, cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, len-  
ticula, eruum.

## ENARRATIO.

**P**URGANTIA medicamenta Græci <sup>καθάρτικα</sup> vocant, debent au-  
tem eadem modicè detergere & siccare; de-  
tergenda enim sordes est, quæ corruptela  
corporis concrevit; exiccanda sanies humi-  
dumque recrementum, quod flatu natura  
lege ab alimento partis reliquum sit, aut  
alimnde illabitur.

ammoniacum.

**B**DELLIVM valentius quidem est am-  
moniacum, verum an eadem purgent, alij vi-  
derint; ego ceridè molliendi discutiendique  
vi adeo prædita esse comperi, ut scirrhus to-  
phosque discutiunt.

coagulum.

**L**EPORINVM coagulum omnium est  
præstantissimum, ut quod comitiales liberet,  
sanguinem in ventre concretum dissipet ac  
dissoluat: in genere tamen omni coagulo vis  
est digerens acris ac deterforia.

seuum, adeps.

**A**N hæc purgantibus rectè annumerâ-  
rit, penes alios iudicium esto: ego, ut quod  
sentio libere proferam, à quodam assensu  
existimo.

## CAPVT VI.

*Quæ rodant.*

**R**ODVNT, alumen liquidum, sed magis rotundum, æru-  
go, chalcitis, misy, squama æris, sed magis rubri, æs com-  
bustum, sandaraca, minium Synopicum, galla, balsamum,  
myrrha, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humi-  
da, piper vtrunque, sed rotundum magis, cardamomum, au-  
ripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, nar-  
cissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nuci-  
bus, allium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri,  
fel taurinum, scammonia, vua taminia, cinnamomum,  
styrax, cicuta semen, resina, narcissi semen, <sup>\*</sup>fel, nuces ama-  
ræ, oleumque earum, atramentum sutorium, chrysocola,  
veratrum, cinis.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ rodunt, aut acria, aut amara, vellicant, alia salsugine quadam rentiginem  
aut salsa, aut acerba sunt; aliæque pronocant; sicuti alia acrimonia sua cutem  
aliàs id efficiunt: siquidem alia astringendo penetrant, atque erosionis sensum faciunt.

*Cicuta*



## cicutæ semen.

NVILLO modo Cicutæ inter erodentia numerari potest. Nam quum frigidissima sit cicutæ, ut auctor est Galenus, nulla ratione semen inter rodentia collocari poterit; si tamen alicui pro cicutæ, cicutariam secundo ordine excalfacientem herbam substitunere placuerit, poterit utrumque con-

stare sententia: quanquam nemo myrrhidis semen absolute rodens dixerit.

## oleumque carum.

NESCIO an sui per omnia bene memor Celsus breuisculo hoc capite recte oleum ex anaridis pincillus bis bene inseruerit, quando id semel dixisse sufficisset.

## CAPVT VII.

*Quæ exedant corpus.*

EXEDVNT corpus, acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chryfocolla, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicutæ, sandaraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum futorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quæ tithymallos à Græcis nominatur, alcyonium, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites, & Phrygius, & Asius, & scissilis, misy, vinum, acetum.

## ENARRATIO.

QVÆ corpus exedunt, *ἐκπικνὰ* vocant: hæc aliis paulo quam cathartica, quæ rodentia vocat Celsus, carnem subeunt; eandem tenellam adhuc tabesciunt, calore multo, nec ita crasso corpore.

cicutæ.

RVRSVM hic cicutam, nihil minus quam exedentem, asseripit; sicuti etiam tunc acetum, & alcyonium.

## CAPVT VIII.

*Quæ adurant.*

ADVRVNT, auripigmentum, atramentum futorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, fex combusta, myrrha, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Gnidium, allium, diphryges, lac vtrunque (quod proximo capite supra comprehensum



prehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaraca, vua taminia, chrysocola, ochra, alumen sciissile, ouillum stercus, cenanthe.

## ENARRATIO.

**S**UB adventibus cathartica & septica comprehendisse videtur; septa vocantur quæ sine morbo exedunt.

myrrha, thus.

SECUNDI ordinis calefacientium, & primi tantum siccamini sunt, ut restatur Galenus: quo fit ut huic capiti non recte accommodata dicamus.

corallium.

ET hoc quoque inter adurentia male

locantur; quando, ut auctor est Dioscorides, astringat & refrigeret mediocriter: unde & excrementa coarctet, & cicatricem oculorum abstergit, atque ulcerum canitantes atque cicatrices explet.

chrysocola.

GALENUS inter ea quæ carnem liquant, non tamen quæ vehementer mordicant, chrysocolam enumerat, quamquam sit facultate admodum digerente, exiccanteque.

## CAPVT IX.

*Quæ crustas ulceribus inducant.*

**E**ADEM ferè crustas ulceribus tanquam igne adustis inducunt: sed præcipuè chalcitis, utique si cocta est, flos æris, ærugo, auripigmentum, misy, & \* id, quod magis coctum. \* id quoq. m.

## ENARRATIO.

**Q**UÆ crustas inducunt, escharotica vocantur: ea ex septonum genere ferè sunt: sed ut firmior contrahatur crusta,

aliquod ex acerbis metallicis admiscendum erit, quod sit crassa simul, & astringente potentia præditum.

## CAPVT X.

*Quæ crustas ulceribus resoluant.*

**C**RUSTAS verò has resoluit farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

KK

CAPVT



## CAPVT XI.

*Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte  
corporis coierunt.*

\* sampsu-  
cus Cy-  
pius.

**A**d discutienda verò ea, quæ in corporis parte aliqua coe-  
runt, maximè possunt, abrotanum, helenium, amara-  
cus, alba viola, mel, lilium, \* sampscus, cyperus, lac, fertula  
campana, serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea,  
narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadratus, nardum,  
cinnamomum, casia, ammoniacum, cera, resina, vua tami-  
nia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini &  
narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut  
molaris, crudus vitellus, amaræ nuces, sulphur.

## ENARRATIO.

Ad discutienda.

discussorium omnino ex aquosa substantia  
moderate calida, substituo.

**H**ÆC duorum generum sunt: alia  
enim leniora sunt, quæ æxiomæ  
dicuntur: suntq; media nature vicina, quæ  
calore quem humiditas temperet; aliaque  
fortiora sunt quæ dyapocrenæ nominant;  
suntq; epispasticæ quadammodo vicina.

cedrus.

**C**EDRVS tertio ordine calefacit &  
exiccat: unde inter primi ordinis eroden-  
sium seu septicæ rectius annumeramus.

cyperus.

ficus arida.

**CYPERVS** & iuncus quadratus  
idem sunt: quare quum paulo post iuncum  
quadratum repetat, pro cypero, cyprum,

ALII glossos etiam tanquam discusso-  
rium medicamentum, caricis multo ineffica-  
ciores, ascribunt.

## CAPVT XII.

*Quæ euocent, & educant.*

**E**VOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebe-  
nus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, re-  
sina terebinthina, & pinea, propolis, ficus arida decocta, ster-  
cus columbæ, pumex, farina lolij, croci in aqua cocti, elate-  
rium, lauri baccæ, nitrum, sal.

ENAR-



## ENARRATIO.

**Q**UAE ENOCANT, calida ferè sunt & rennis substantie; Græci ἰκκίδια ἰκκίδια vocant. quare cur in hoc genere omphacini, facilitate planè contrarium (ut quod reprimat magis) posuerit; non possum satis mirari: nam quod de alumine subiungit, eum forè sefellit Dioscori-

dis auctoritas, qui alumini etsi vim astrictionis attribuerit, idem tamen excofacere dicit; unde suspicatus est mixta atque contraria simul esse facultatis, hoc est reprimentis, & enocantis, sicuti chalcitis: quæ etsi ita calefaciat ut & crinitas inducat, astrictionis tamen alicuius particeps est.

## CAPVT XIII.

*Quæ exasperata \* leuent.*

\* leuens.

**L**EVAT id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, oui album, lac tragacanthum. \* Lauat

## ENARRATIO.

NON omnino malè Pansinus τὸ leuant, in τὸ leuigant conuertendū censuit.

## CAPVT XIII.

*Quæ carnem nutriant, & vlcus implcant.*

**C**ARNEM alunt, & vlcus implent, resina pinea, \* ochra, actice, mel, asteriace, cera, butyrum.

\* ochra Attica, vel asterica, vel attice.

## ENARRATIO.

**M**EDICAMENTVM, ut auctor est Galenus tertio Methodi medendi, quod carni producenda sit aptum, primi ordinis tum seccantium, tum detergentium esse debet: nam quod super hunc fuerit, ita ut non modo humoris redundantiā consumat, sed etiam affluentem sanguinem populetur, id refici carnem seu materiem eius absumens prohibebit: at quæ vlcera implent, sordes abstergunt, & humorem seccant; atque ita impedimenta tollunt, quæ carnem à natura creari non patiebantur.

ochra, actice, mel, asteriaca.

**S**UNT qui legendum putent ochra

actica, vel asterica: ego ochra Attica, circa distinctionem, legendum existimo, quod olim inter reliquas Attica ochra primus honos ascriberetur, si Dioscoridi & Plinio habenda fides est. Verum an rectè τὸ mel in distinctionem vel commutari nonnulli, nondum assequor; præsertim quando mel ad sordida vile sit vlcera, non solum quod abstergat, sed & quod abscedentem carnem glutinet. si cui tamen distinctionem ponere libeat, ita ut per asteriacem, Lemnium sigillum intelligat (quod, licet non per omnia, saltem aliqua ex parte colore ochram exprimat) per me integrum est. Siquidem nisi pro asteriaca sphragida Lemniaca intelligamus, ingenuè fateor me nondum legisse quid asteriaca

KK 2



asteriace sit : solebant enim varia in Lem-  
nio sigillis signa imprimere; nam modò ima-  
gine capre signabant, interini stella (unde  
olim *ἀστὴρ* appellabantur) aut alterius cuius-

piam. Est autem Lemnium sigillum ad  
vulnera tam recentia, quam vetera &  
contumacia, & cicatrici inducenda utile;  
ut inter alios auctor est Galenus.

## CAPVT XV.

*Quæ molliant.*

\* erythria

\* Ribium

**M**OLLIVNT, æs combustum, terra \* cretria, nitrum, pa-  
paueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum,  
adeps, oleum, ficus arida, sesamum, fertula Campana, nar-  
cissi & radix & semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus,  
amaræ nuces, medulla omanis, \* stibi, pix, cochlea cocta, cicu-  
tæ semen, plumbi retrimmentum, *σικωρία μολύβδα* Græci vo-  
cant, panaces, cardamomum, galbanum, resina, vua taminia,  
styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, buty-  
rum, ruta.

## ENARRATIO.

**M**EDICAMENTA emollientia scir-  
rhus, ut auctor est Oribasius, multo  
calidiora esse debent quam temperata natura  
sit; non tamen tam vehementer calida; nam  
quæ à lento crassoque humore indurato, aut  
congelato induruerunt, calefacientia siccant-  
tiæque medicamenta exposcunt; non tamen  
quæ valida violentiæque sunt: sed satis est  
interim, ut secundi aut tertij sint ordinis  
excalefacientium, primi exiccantium. sa-  
cultas quoque emplastica in iis esse debet: sicuti  
& in eis quæ ad purgandum adhibentur.  
Sed quo magis ad enacuandū pertinere de-  
bent, eod etiam minus meatui illius obstruere.

## papaueris lacryma.

**S**I, ut ex Oribasio retulimus, calida  
esse debent emollientia; mirum est, quare in  
eorundem catalogo, opium inseruerit Celsus;  
nisi quispiam, ut quod gustu amarum sit (si-  
cuti etiam inferre videtur doctissimus medi-  
cus Matthiolus Seneris) temperie calidum  
esse dicat.

## rosæ folia.

**E**TSI mixta facultatis sit rosæ, astrin-  
gentis potius quam emollientis esse dixerō:  
nisi & hic quoque rosam pro rosaceo ac-  
cipias.

## CAPVT XVI.

*Quæ cutem purgent.*

**C**UTEM purgat mel; sed magis, si est cum galla, vel eruo,  
vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro,  
vel ærugine.

## ENAR-



## ENARRATIO.

QUÆCUNQUE nigra sunt & amara, ea omnia meatus expurgato possunt, quæ verò tenuium partium sunt dulcia, extergant moderatè vlcera sordes, & totius cuticula.

si est cum galla.

GALLA nihil minùs quam exterges autem extem purgat, quum tertij ordinis exiccantur, secundique frigescentius sit.

## CAPVT XVII.

De misturis simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid Malagma, & Emplastrum, & Pastillus inter se differant.

EXPOSITIS simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, \* quæ ex iis fiant. Miscetur autem variè, neque huius \* vllus modus est, cum ex \* simplicibus alia demantur, alia adiciantur, iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. \* Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt, quæ comprehendi si possent, tamen esset superuacuum. Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus iis ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quæ vel desiderari in prioribus poterunt, vel ad easurationes pertinent, quas protinus hic comprehendam, sic vt tamen quæ magis communia sunt, simul iungam. Si qua singulis, vel etiam \* paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri volo, in vncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde denarij pondus diuidi à me in sex partes, id est sex vncias, vt idem in vncia denarij habeam, quod Græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata verò, atque Emplastra, Pastilli que (quos ῥοχλονος Græci vocant) cum plurima eadem habeant, differunt eò, quod Malagmata maximè ex floribus, eorumque etiam surculis: Emplastra Pastilli que magis ex

\* quæque

\* vnus

\* similibus

\* Itaque

\* paucis

Vncia.

Denarij.

KK 3

gis ex



gis ex quibusdam metallicis fiunt: deinde malagmata contusa abunde mollescent: nam super integram cutem iniiciuntur. Laboriosè verò conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilli que fiunt, ne lædant vulnera cum imposita sunt. Inter Emplastrum autem, & Pastillum hoc interest, quòd Emplastrum utique liquati aliquid accipit, in Pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum Emplastrum hoc modo fit, arida medicamenta per se teruntur, deinde mistis iis instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est, & ea rursus ex eo teruntur. Ea verò quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur, & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt, in vnum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut vino, vel aceto coquuntur, & rursus cocta, inarescunt. Atque ubi utendum est, eiusdem generis humore diluuntur, tum Emplastrum imponitur, \* pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

## ENARRATIO.

Miscentur autem variè.

**M**ISCENDORVM medicamentorum rationem copiosissimè tradiderunt veteres; eamque animadversionem observare consueverunt, ut eis miscendis & componendis, euincens in laborantibus humores sequerentur, quo minus aliorum vico alios expellerent: cautione interim habita, ut si euacuatione opus esset, eosdem, quoad fieri posset, maxime citra molestiam euacuarant.

Vnius deinde denarij.

**LOCVS** hic, ut doctissime annotauit Ioannes Guinterius Andernacus, mendosè legitur, restituendusque in hunc modum est: Denarius à me diuiditur in sex partes, id est sextantes; ut idem in sextante habeam, quod Græci in eo quem ὀβολός appellant. Hic porro inter auctores magna controuersia est: siqui-

dem Plinius idem scribit esse Latinorum denarium, quod drachma apud Græcos: est idem faciunt Celsus & Scribonius. hi tamen auctores septem denarios in unciam mittunt, ut videlicet LXXXIIII. duodecim uncias seu libram absoluant. Galenus autem aliqui scriptores Græci, octo drachmas uncia attribunt, & xcvi libra. Iam vero Galenus quoties ex Scribonio medicamentum adducit, denarium semper drachma reddit; eisi hic Roma quoque, sicut & ille, professus fuerit. In eo conueniunt utrobique, & Latini & Græci, prout quod denarium, & drachmam continere sex oboles dicant. Hæc Guinterius.

Laboriosè verò.

**QVASI** dicat magno conatu in tenuissimum pollinem terenda, & summo labore quasi in cineres redigenda.

DE MA-



## DE MALAGMATIS.

## CAPVT XVIII.

*Malagma aduersus calidas podagras.*

**H**is cognitis, primum malagmata subiiciam, quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare \* possit, ad calidas podagras ap- \* potest, tum. Habet gallæ & immaturæ & alterius, coriandri seminis, cicutæ lacrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti quod *πρωλευν* Græci vocant, felibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahunt, *ἐκπαρασκευάζειν* vocantur, pleraquæ certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

## ENARRATIO.

**M**ALAGMATA vocant medici, ut auctor est Galenus, quæ partes supra modum induratas emolliunt; calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exiccantia, quemadmodum nec manifestè humectantia: Nam quum exactè malactica, medium quendam ordinem inter humectantia siccantiaque sortiantur, indurescentium substantia veluti fusionem quandam molliuntur. Sunt autem malagmatum tres differentie: alia enim ex quibusdam succis, radicibus, inquam, herbis & seminibus fiunt; alia ex metallicis, aut iis quæ proportionem

metallis respondent; quanquam contrarium asserere videatur Celsus: nam quæ lieni applicantur (ut auctor est Paulus ex Ægina medicus) constant calce vina, arripigmento, æruginè, cardamomo, ammoniaco, & aceto: alia ex succis, sebo, & lacrymis componuntur.

## Habet gallæ &amp; immaturæ.

IMMATVRAM gallam appellat eam, quam Dioscorides *omphacitea* nominat.

*Malagma ad materiam extrahendam.*

**S**i materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ, nitrî, ammoniaci, galbani, singulorum pondo \*, ceræ pondo \*. Aut in quo hæc sunt, æruginis rasa, thuris, singulorum p. i. i. \*. ammoniaci



niaci salis p. vi. \*. squamæ æris, ceræ, singulorum p. viii.  
 \*. resinæ aridæ p. \*. xii. \*. aceti cyathus. Idem præstat cu-  
 \* vii. mini farina cum struthio, & melle p. ii. \*.

## ENARRATIO.

Idem planè est quod ad Cleopphantem *que idcirco hoc quod auctor noster describit*  
*refert Galenus, nisi quod loco ceræ, pro-* non ignauus.  
 poliu, & cyprinum acetumque accipiat, at-

*Malagma ad iecur dolens.*

Si iecur dolet, id in quo est balsami lacrymæ p. xii. \*. co-  
 sti, cinnamomi, cassiæ, corticis myrrhæ, croci, iunci rotun-  
 di, balsami seminis, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, nar-  
 di, singulorum p. xvi. \*. Quibus adiicitur nardinum vi-  
 guentum, donec cerati crassitudo sit, & huius quidem recen-  
 tis usus est. Si verò seruandum est, resinæ terebinthinæ p. xvi.  
 \*. ceræ p. x. \* ex vino leni contunduntur, tum \* eo mis-  
 centur.  
 \* hac addi-  
 titia.

## ENARRATIO.

MALAGMA hoc non solum ad iecur *anerantibus. Refertur autè ad Damocratem*  
 dolens utile est, verum etiam & ad *auctorem. Differt tamè nonnihil ab eo quod*  
 omnes affectiones renum, colic, stomachi, & *Galenus libro octavo Loca limum medicamen-*  
 vulnè, sed neque incommodum est cache- *torum describit.*  
 cticis, atrophis & hydropicis, cibumque

*Malagma ad lienem.*

At si lienis torquet, glandis (quam *Balaenon* Græci vo-  
 cant) cortex & nitrum paribus portionibus contundun-  
 tur, respergunturque aceto quàm acerrimo. Vbi cerati crassi-  
 tudinem habet, linteo antea in aqua frigida madefacto illini-  
 tur, & sic imponitur, supraque farina ordeacea iniicitur, sed  
 \* absumat. manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem \* consu-  
 mar. Satiusque est id bis, aut ter fieri. Commune autem &  
 iocinori, & lieni, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, arti-  
 culis, calcibus quoque suppurantibus, aut aliter dolentibus,  
 etiam concoctioni ventris, Lyfias composuit ex hyssopi, pa-  
 nacis,



nacis, styracis, galbani, resinæ, singulorum p. ii. \*. ammoniaci, bdellij, ceræ, seui taurini, iridis aridæ p. \* i i i i. \*. cachryos \* i i. acetabulo, piperis granis quadraginta. Quæ contrita, irino vnguento temperantur.

## ENARRATIO.

**V**ALENTIVS multo est quod ad lie-  
nos describit Scribonius Largus. reci-  
pit autem myrobalanorum \* p. l. Aphro-  
nitri \* p. xxx. capparidis radicis \* p. xx.  
cardamomi \* p. xxv. ammoniaci gutta  
\* p. xxx. ceræ p. sēlibram, olei irini p.  
sēlibram. Cera irino dissolvitur: quibus am-

moniacum aceto dilutum admiscetur, &  
postea quæ arida sunt miscentur.

Lysias composuit.

Si opopanaxum, sænugracum, anisum  
addideris, multo efficacius reddideris.

*Malagma ad laterum dolores.*

**A**D laterum autem dolores compositio est Apollophanis,  
in qua sunt resinæ terebinthinæ, thuris, fuliginis, singu-  
lorum p. i i i i. \*. bdellij, ammoniaci, iridis, seui vitulini, aut  
caprini à renibus \* sicci, singulorum p. i i i i. \*. Hæc autem  
eadem omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocri-  
ter calefaciunt. Ad idem latus Andreæ quoque malagma  
est, quod etiam resoluit, educit humorem, pus maturat, vbi  
id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, pro-  
dest impositum minutis maioribusque abscessibus, item arti-  
culis, ideoque & coxis, & pedibus dolentibus: item si quid  
in corpore collisum est, reficit, præcordia quoque dura & in-  
flata emollit, oslā extrahit, ad omnia denique valet, quæ  
adiuuare calor potest. Id habet ceræ p. \* xi. \*. visci sycamini,  
quam aliàs sycomoron vocant, lacrymæ, singulorum p. \* i.  
\*. piperis & rotundi, & longi, \* ammoniaci, thymiamatis,  
bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xylobalsami, thu-  
ris masculi, myrrhæ, resinæ aridæ, singulorum p. x. \*. pyre-  
thri, cocci Gnidij, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ  
Creticæ, radicis ex cucumere agresti, resinæ terebinthinæ li-  
quidæ, singulorum p. x x v. \*. Quibus adiicitur vnguenti iri-  
ni, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

\*, visci,

\*, r.

\*, x i.

\*, ammo-  
niaci thy.

L L

ENAR-



## ENARRATIO.

Andreae quoque.

**D**ESCRIBIT isto operosius Andrea malagma, quod multis uile dicit Galenus libro De compositione medicamentorum extra parvum septimo: nam praeter simplicia quae hic enumerat Celsus, assypum, radicem hibisci, gladioli radicem, capparidis radicem, aloen, styracem, galbani adipemque anserinum addit: praeterea ubi Celsus rotundum piper habet, ille album accipit:

adhuc loco cucumeris agrestis, Galenus, meo quidem indicio, male sicut agrestes legere maluit. quare hic monendus lector est, ut locum hunc Galeni corrigat, ac loco rotundus cucumeris restituat: parvus enim lapsus fuit atri et circum, et omnes reddere. His accedit, quod male haecenus distincta fuerit Celsi lectio: siquidem post rotundus visci, comma apponendum; ut viscum quercinum, sicuti facit Galenus, intelligamus.

*Malagmata ad resoluenda quae adstricta sunt, & mollienda quae dura sunt, & digerenda quae coeunt.*

**P**RAECIPVVM verò est ad resoluenda quae adstricta sunt, mollienda quae dura sunt, digerenda quae coeunt, id quod ad Polyarchum auctorem refertur. Habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, cerae, resinae liquidae pares portiones.

*Aliud malagma ad eadem.*

**A**LIVD ad eadem Nilei, crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) p. iiii. \*. ammoniaci, thymiamatis, cerae, singulorum p. xx. \*. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, & tum omnia iunguntur.

## ENARRATIO.

*Aliud ad eadem.*

**G**ALENVS non solum ad praedicta, sed & ad praecordiorum dolores facere auctor est: Dissolvit, inquit, omnem duritiam, facit ad exarticulata, & luxata post declinationem inflammationum positum: facit etiam splenetici & hepatici. Variat tamen Galeni descriptio ab hac nostra: nam loco crocomagmatis, crocum habet; & in vicem rosacei, irinum substituit.

*Malagma Moschi ad molliendum.*

**P**ROPRIE etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis, P. \*. 3. cerae, ammo-



LIBER V. 451  
ammoniacy, \* thymiamatis trientes, picis aridæ p. i i. \*, aceti \* dele di-  
heminas tres. sinæ.

ENARRATIO.

MOSCHIONIS legendum puto, cuius ne medicamentorum ratio ym mentio-  
Galenus libro secundo De compositione facit.

*Malagma Medi ad digerenda quæ coeunt.*

FERTYR etiam ad digerenda quæ coeunt sub auctore  
Medo, quod habet ceræ p. 3. \*. panacis p. \*. semis, squa-  
mæ aris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum p. i.  
\*. plumbi combusti p. i. \*. & semis.

*Malagma Panthemi ad eadem.*

AD eadem Panthemus utebatur, calcis p. \*. semis, sina-  
pis contriti, item sceni Græci, aluminis, singulorum p. i.  
\*. seu bubuli p. i i. \*. & semis.

*Malagma ad strumas.*

AD strumam multa malagmata inuenio. Credo autem  
quo peius id malum est, minusque facile discutitur, co-  
plura esse tentata, quæ in personis variè responderunt. An-  
dreas auctor est, ut hæc misceantur, vrticæ seminis p. i. \*. pi-  
peris rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, re-  
sinæ aridæ, singulorum p. i i i i. \*. resinæ liquidæ, ceræ, py-  
rethri, piperis longi, lactucæ marinæ, seminis sulphuris ig-  
nem non experti (quod *ἀνθερ* vocatur) fecis \* aridæ, aceti, \* aridæ  
spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis cu- \* aceti,  
cumeris syluestris, resinæ, singulorum \* p. v i i i. \*. Quæ ex \* p. v.  
leni vino contunduntur.

*Aliud malagma ad idem valens.*

EXPEDITIVS ad idem fit, quod habet visci \* felini ster- \* aliâ: semi-  
coris, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. nis, steico-  
Et in quo est sulphuris p. i. \*. lapidis, quem pyriten vocant ris. Legen-  
p. i i i i. \*. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eius- dum fort. sse  
dem vel caprini,  
Guleno de  
strumâ.

LL 2

dem



dem pars vna, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

## ENARRATIO.

Expeditius ad idem.

POTES huc applicare Scribonij Largi <sup>enim, ut dicit, omnem futuram suppurationem dissipat, factam aperit: cuius descriptionem habes apud eundem § CLXIII.</sup>  
malagma strumarum discussorium; id

*Malagma ad strumam, & phymata.*

**A**RABIS autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ *φύματα* vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum p. i. \*. lapidis eius, quem *πυρίτης* vocant, p. i i i i. \*. quibus quidam adiciunt sulphuris p. i i. \*.

*Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.*

**E**ST etiam proficiens in struma, & in his tuberibus, quæ difficulter concoquuntur, & in iis quæ carcinodæ vocantur, quod ex his constat: Sulphuris p. i i. \*. nitri p. i i i i. \*. myrrhæ p. v i. \*. fuliginis thuris p. \*. semis, salis ammoniaci p. \*. i i i. ceræ p. i. \*.

*Malagma Protarchi ad parotidas, & fauim, & mala ulcera.*

**P**ROTARCHVS autem ad parotidas, eaque tubercula, quæ meliceriæ, id est, faui, vel phymata nominantur, item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum p. v i i i. \*. cum ceræ p. i x. \*. miscebat, hisque olei cyathum & dimidium adiebat.

*Malagma, aduersus panum & phymata.*

**A**T aduersus panum, tum primum orientem (quod *φύμα* Græci vocant) & omne tuberculum, quod phyma nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus similæ, \* hisque contunditur, subinde mel instillatur, donec \* malagmatis crassitudo sit.

\* cum tunduntur,  
\* mellis

ENARR-



## ENARRATIO.

miscetur ochra.

**A**TTICAM ochram dicit, quod Attica, ut scribit Galenus, laudatissima sit: Attica autem ochra usui Viriunij tempore

in Italia planè exolenerat. Habet autem vim astringendi, erodendi collectiones, & tubercula dissipandi: unde non inutiliter per se cum melle & similia ad orientem pannum applicari auctor noster dicit.

*Malagma aduersus phymata.*

**D**ISCVTIT etiam omne tuberculum (quod phyma vocatur) id quod habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum P. I. \*. galbani P. II. \*. salis P. IIII. \*. quæ excipiuntur cerato ex rosa facto.

*Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.*

**S**UPPRIMITQUE omne quod abscedit id, in quo est galbani, fabæ\* fresæ, singulorum P. I. \*. myrrhæ, thuris, ex radice \* fixæ capparis corticis, singulorum P. IIII. \*. Satisque omnia abscedentia digerit, murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

## ENARRATIO.

*ad suppressendum omne.*

**V**ENVSTE figuratèque dixit, ad suppressendum; pro eo quod est, ad dissipandum, discutiendum, digerendumve; quod nimirum ea qua dissi-

pantur, non secus atque ea qua oculantur, ex oculis nostris enascuntur. atque quod sic intelligendum sit, tum simplicia ipsa testimonio sunt, tum ipsemet Celsus sub finem paragraphi satis demonstrat quum dicit, satisque omnia abscedentia digerit.

*Malagma ad sanguinem suppressendum, & phymata.*

**A**T si \* satis sanguis subit, rectè imponitur quod aduersus \* plus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellij, styra-<sup>fatis</sup> cis, ammoniaci, galbani, resinæ & aridæ & liquidæ pineæ. Item ex lentisci, thuris, iridis, singulorum P. II. \*.

## ENARRATIO.

**V**ITIVM hoc apud Græcos ecchymoma, vel ecchymosis vocatur: id quidem circa initia, digerentibus nonnihil

ex astringentibus admisceri flagitat; si tamen perseveraverit malum, solis digerentibus opus habet.

LL 3

*Malagma*



*Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.*

**C**ARCINODÆ verò & phymata commodè his leniuntur: Galbani, visci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis p. i. \*. seui taurini p. \*. semis, fecis combustæ quàm maxima portione, dum id siccius non faciat, quàm esse malagma oportet.

*Malagma ad liuorem faciei contusa.*

**Q**UOD si facie contusa liuor subcruentus est, hæc compositio nocte & die imposita tollit: Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum p. ii. \*. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, resinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, ceræ, singulorum p. iiii. \*. Item faba quoque imposita proficit.

\* anastomica  
\* anastomica  
\* anastomica

*Malagmata \*stomachica ad aperiendum.*

**S**UNT etiam quædam malagmata, quæ <sup>scilicet</sup> Græci vocant, quoniam aperiendi vim habent. Quale est quod ex his constat, piperis longi, spumæ nitri, singulorum p. ii. \*. erisimi p. \*. iiii. quæ cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumæ aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusque ex his est id quod habet calcis p. iiii. \*. piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum p. x. \*. mellis p. \*. 3. olei heminam.

## ENARRATIO.

Sunt etiam.

**N**ESCIO qua ratione in hac significatione stomachica dicta malagmata usurpet: quando certum sit à parte affecta (nempe ore) cui accommodantur, stomachica dicta sunt, quod in assiduo oris usu dicta, non solum malagmata, sed & reliqua medicamenta: siquidem, cui auctor est Galenus quinto Methodi, stomachica medicamenta dicta sunt, quod in assiduo oris usu sunt.

*Miconis malagma, ad resoluendum aperiendumque ac purgandum.*

**M**ICONIS quoque est quod resoluit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, paribus portionibus, quibus tantum picis, & ceræ adiicitur, ut fiat cerati crassitudo.

ENAR-



## ENARRATIO.

IOANNES Cesarine suis in Celsum 24yconis cuiusdam medici, & aliorum statuarij mentionem, quo fit ut nihil hic immutandum censeam. *hæc frequens mentio est, facit tamen Plinius*

*Malagma ad ossa, & nervos.*

**A**D ossa autem Aristogenis, fit ex his: sulphuris p. i. \*. resinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti, singulorum p. ii. \*. thuris, fuliginis p. viii. \*. ficus aridæ quàm pinguiissimæ, seu taurini, singulorum p. viii. \*. ceræ p. xi. \*. iridis Macedonicæ p. vi. \*. fefami fricti acetabulum, maximeque nervis, & articulis malagma conuenit.

*Malagma Euticlei ad articulos, & ad omnem dolorem.*

**I**GITUR Euticlei est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos, quas ἀγνώλας Græci nominant, quod habet fuliginis thuris acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine surculis fescunciam, ammoniaci, bdellij, singulorum p. \*. 3. ceræ p. \*. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p. xiiii. \*. resinæ liquidæ p. vi. \*. ceræ p. xvi. \*.

## ENARRATIO.

## Igitur Euticlei.

**I**STHOC parum differt ab eo quod cordiorum, thoracis & stomachi dolorem ad Amatbaonem refert Galenus ad præperutile.

*Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.*

**A**D dolores articulorum Sofagoræ: Plumbi combusti, papaueris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seu resinæ, ceræ, pares portiones.

ENAR-



## ENARRATIO.

**I**STHOC, sicuti omnia etiam narco- ferendo impares videantur, in usum reci-  
tica, non nisi summa urgente necessita- piendum est.  
te, & ubi dolor ita excruciat, ut eidem suf-

*Chrysippi malagma, ad idem valens.*

**C**HYSIPPI, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperis, singulo-  
rum p. xii. \*. quibus ceræ paulum adiicitur.

\* Ctesipon-  
tis

\* Ctesiphontis malagma ad idem valens, & ad parotidas, &  
phymata, & strumam.

**C**TESIPHONTIS, ceræ Creticæ, resinæ terebinthinæ,  
nitri quàm ruberrimi, singulorum p. \*. semis, olei cya-  
thi tres. Sed id nitrum antè per triduum instillata aqua teri-  
tur, & cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor  
consumatur. Potest verò ea compositio etiam ad parotidas,  
phymata, strumam, omnemq. coitū humoris emolliendum.

## ENARRATIO.

Ctesiphontis, ceræ.

**V**IDE ne non Cleophræ legem- num mentio fit; & cuius Plinius libro Na-  
turalis Historia xxvi. capite iii. me-  
dum sit, cuius frequens apud Gale- minit.

*Malagma ad articulos.*

**A**D articulos fici quoque aridi, partem nepetæ mistam,  
vel vuam taminiam sine seminibus cum pulegio rectè  
aliquis imponit.

## ENARRATIO.

DIOSCORIDES non cum nepeta, sed ex farina sænigraci & aceto viriles dicit.

*Malagma Aristonis, aduersus podagras, & recentia  
phymata, & omnes dolores.*

\* chamæ-  
meli

**E**ADEM podagræ præsidio sunt. Sed ad eam fit Ariston-  
is quoque, quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, \* cha-  
mæleontis,



mæleontis, iunci rotundi, singulorum p. viii. \*. seu capri-  
ni ex irino liquati p. xx. \*. iridis p. i. \*. quæ in aceto quàm  
acerrimo iacere per xx. dies debet. Idem autem etiam re-  
centia phymata doloresque omnes discutit.

*\* Theoseni malagma, ad pedum dolores.*

*\* Theoni*

**A**t Theosenus ad pedum dolores, seu à renibus partem  
tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranul-  
am illitam imponebat, tum superiniiciebat ammoniacum,  
thymiana in aceto liquatum.

*Numenij malagma, ad podagram, cæterosque  
articulos induratos.*

**A**t Numenius podagram, cæterosque articulos induratos  
hoc mollebat: abrotani, rosæ aridæ, papaveris lacrymæ,  
singulorum p. iii. \*. resinæ terebinthinæ p. iiii. \*. thuris,  
spumæ niri, singulorum p. viii. \*. iridis, aristolochiæ, sin-  
gulorum p. xii. \*. ceræ p. iii. \*. quibus adicitur *\* cedri cya-*  
thus vnus, olei laurini cyathi tres, olei acerbi sextarius. *\* cedriæ*

*Dexij malagma, si quando callus in articulis increuit.*

**S**i quando autem in articulis callus increuit, Dexius do-  
cuit imponere, calcis p. iiii. \*. cerusæ p. viii. \*. resinæ  
pinæ p. xx. \*. pipetis grana p. xx. ceræ p. ii. \*. Quibus  
dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

## DE EMPLASTRIS.

### CAPVT XIX.

**E**x emplastris autem nulla maiorem vsum præstant, quàm  
quæ cruentis protinus vulneribus iniiciuntur, *ἐμπλαστρα*  
Græci vocant. Hæc enim reprimunt inflammationem (nisi  
magna viseam cogit) atque illius quoque impetum minuunt,  
tum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, cicatricem iisdem  
inducunt. Constant autem ex medicamentis non pingui-  
bus, ideoque *\* alipenæ* nominantur. *\* alipenæ*

MM

ENAR.



## ENARRATIO.

## Ex emplastris.

**E**MPLASTRORVM nonnulla sunt vulneraria, quæ traxima, quod cruentis iniiciantur; alia *ῥαγμητὰ*, quod congelant dicuntur; sicuti & *ῥαγμητὶς*, quod fracturis accommodentur, appellamus. Consilare autem ea oportet, ut auctor est Ægineta, ex siccentibus non summe, verum secundi ordinis absolute, & tertij incipien-

tis: coqui autem debent quousque amplius manus non inquinent.

## ideoque alipenz.

GVLIELMVS Pantinus recte hic admonet legendum esse *ἀλινάριον*: sic enim apud Græcos vocari ea, quæ non habent oleum, pinguedinemque, aut eorundem parum admodum admixtum.

*Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus iniicitur.*

**O**PTIMUM ex iis est, quod Barbarum vocatur. Habet æruginis rasæ p. xii. \*. spumæ argenti p. xx. \*. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum p. i. \*. quibus adiiciuntur olei & aceti singulæ heminæ.

## ENARRATIO.

**H**OC emplastrum acceptum fert Scribonius Glycioni: quod idem paulo alter describit. Galenus libro De medicamentis *ῥαγμητὶς*, aliud *ῥαγμητὶς*, ab hoc non

usque adeo discrepans, quod à plerisque nigrum vocari dicit, ad Heram Cappadocem refert: Ægineta ab his diuersum longe & operosius describit.

*Choacem emplastrum nigrum, ad idem valens.*

argando

**A**LTERVM ad idem, quod *ῥαγμητὶς* vocant, habet spumæ argenti p. c. \*. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est, qui ferè talis fit ex pice atque resina. At ex bitumine nigerrimus: ex ærugine, aut æris squama viridis: ex minio ruber, ex cerussa albus.

## ENARRATIO.

**I**OANNES Casarius, Legendum, inquit, fortassis, choacum, aut chyacum, ut apud Georgium Vallam De cura oculi: nisi malis, Coacum, quod inter Hippocratis

opera liber habeatur, qui de Prænotione Coacis inscribitur, unde & nomen dedatum videri potest.

*Basilicon*



*Basilicon emplastrum nigrum ad idem.*

**P**AUCÆ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid misturæ varietas nouat. Ergo id quoque nigrum est, quod Basilicon nominatur. Habet panacis p. i. \*. galbani p. ii. \*. picis & resinæ, singulorum p. x. \*. olei dimidium cyathum.

## ENARRATIO.

**Q**UOD ad Triphonem Basilicum refert Scribonius, parum ab hoc differt; nisi quod panacem omisit, cuius loco cyprinum oleum idem inserit.

*Smaragdinum emplastrum nigrum ad idem.*

**A**T quod peruiride est, smaragdinum appellatur, in quo sunt resinæ pineæ p. iii. \*. ceræ p. i. \*. æruginis p. \*. semis, thuris fuliginis p. ii. \*. olei tantundem, & aceti, quo fuligo & ærugo in vnum cogantur.

## ENARRATIO.

**S**MARAGDINUM hoc emplastrum ad Galium quendam libro secundo medicamentorum nota jam refert Galenus. differt tamen non nihil in ponderibus, ut cuius planum erit qui hoc nostrum smaragdinum, cum viridi Galli conferet.

*Emplastrum rufum ad idem.*

**E**ST etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris p. i. \*. resinæ p. ii. \*. squamæ æris p. iii. \*. spumæ argenti p. xx. \*. ceræ p. c. \*. olei heminam.

## ENARRATIO.

**S**I galbanum adieceris, commodum & perutile emplastrum reddideris, ut auferat est Largus, ad canis morsum & omnium quadrupedum, item ad offensionem in stirpe, & cetera vulnera mediocria.

*Παεκολλητικὸν emplastrum ad idem.*

**P**RÆTEREA est, quod παεκολλητικὸν à glutinando vocant. Constat ex his: Bituminis, aluminis scissilis p. iii. \*. spumæ argenti p. iii. \*. & olei veteris hemina. p. ii.

MM 2

Cepha-



*Cephalicum emplastrum Philota capiti conveniens.*\* Ery-  
thrae\* ros. i. ro.  
sacii

PRÆTEREA sunt quædam generis eiusdem, quæ quia cap-  
pitibus fractis maximè conveniunt, Cephalica à Græcis  
nominantur. Philota compositio habet: Terræ \* cretræ,  
chalcitidis, singulorum p. iiii. \*. myrrhæ, æris combusti,  
singulorum p. x. \*. ichthyocollæ p. vi. \*. æruginis rasæ, alu-  
minis rotundi, misyos crudi, aristolochiæ, singulorū p. viii. \*.  
squamæ æris p. x x. \*. thuris masculi p. ii. \*. ceræ p. i. \*.  
\* rosæ, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est,  
dum arida ex eo conteruntur.

## ENARRATIO.

Præterea sunt.

CAPITIS fracturatum quæ ad la-  
minam usque pervenerunt emplastra,  
cephalica dici consueverunt. Eorum virtus  
est, ut ossium squamas regenerent, nutri-  
menta in calvaria, & aliis corporis ossibus  
reducant: suntq; catagmaticis magna ex

parte aciora. Galenus ea magis probat quæ  
arida sunt: quale est id quod sexto Methodi  
Therapentica descripsit; ex iri illyrica, erui  
farina, manna, aristolochia rotunda, & pa-  
nacis radice. Vfus eorum est quoties ossa  
denudata fuerunt; denudatis enim ossibus  
pinguia malè conveniunt.

*Emplastrum viride ad idem valens.*

ALIVD ad idem viride, æris combusti, squamæ æris,  
myrrhæ, ichthyocollæ, singulorum p. vi. \*. misyos  
crudi, æruginis rasæ, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulo-  
rum p. viii. \*. ceræ p. vii. \*. olei hemina, aceti quod satis sit.

## ENARRATIO.

GALENVS libro secundo De cōpositione medicamentorum hæc de xviij. ad Epigo-  
num ab hoc non prorsus dissimile, relatum  
emplastrum viride describit.

*Tetrapharmacum emplastrum, ad pus movendum.*

PURI autem movendo non aliud melius, quàm quod ex-  
peditissimum est, Tetrapharmacum à Græcis nominatur.  
Habet pares portiones ceræ, picis, resinæ, seu taurini, si id non  
est, vitulini.

ENAR-



## ENARRATIO.

**P**ER nesum hic colophoniam intelligi: nam eam accipiendam docet Paulus in tetrapharmaco hoc emplastro, quod & Basilicon vocari dicit. Scythionis resinam fructam esse vult, asseribitq; Aristo chirurgo. seui taurini.

TAVRINYM adipem dicit accipien-

*Enneapharmacum emplastrum ad pus moriendum, & ad purgandum valens.*

**A**LTERVM ad idem Enneapharmacum nominatur, quod magis purgat. Constat ex nouem rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha, \*rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina, vel bubula, \*hyssopo, butyro. Quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur. Sunt autem quedam emplastra, quibus vtriusque rei facultas est, \*quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia reiicienda sunt, his potius adhibitis, quæ propriè id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

## ENARRATIO.

**N**ON dissimile huic enneapharmacum emplastrum describit Galenus libro De compositione medicamentorum secundum locos: constat autem ex mollis, cera alba, medulla ceruina, myrrha, butyri, adipis an-

serini, adipis vitulini, terebinthina, olei paribus portionibus. Ex quo constat hic pro resina, terebinthina esse accipiendam: pro hyssopo autem hic æsypum substitui conuenit.

ros. i. ro-  
faceo  
æsyro

\*cui, si c.  
addenda  
sunt, dete-  
riora sunt,  
nec nisi  
cum vtra-  
que opus  
est, aut in  
singulis  
singulorū  
inopia,  
vtendum  
venit. Sed

*Attalum emplastrum ad vulnera.*

**E**ST igitur ad vulnera Attalum, quod habet squamæ aris \*p. xvi. \*. fuliginis p. xv. \*. ammoniaci tantundem, resinae terebinthinæ liquidæ p. xxv. \*. seui taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

\* p. vi.  
\* thuris  
ful.

*Iudæi emplastrum, fracto capiti accommodatum.*

**A**T inter ea quæ fracto capiti accommodantur, habent quidam id quod ad auctorem Iudæum refertur. Constat ex iis, salis p. \*. iiii. squamæ aris rubri, aris combusti,

MM 3

singulo-



singulorum p. xii. \*. ammoniaci, thymiamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singulorum p. vi. \*. resinæ Colophoniacæ, ceræ, seu vitulini curati, singulorum p. xx. \*. aceti sesquicyathum, olei minus cyathum, *τελεαρδύνη* Græci appellant, quæ curata \* vocant, cum ex seuo, puta omnes membranulæ diligenter exemptæ sunt aut ex alio medicamento.

*Curata*  
\* vocamus, vel vocatur,

*Diadaphnidon emplastrum, ad extrahendum.*

**S**UNT etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum. Quæ ipsa quoque *ἐμαρυσινὰ* nominantur. Quale est, quod, quia lauri baccas habet, diadaphnidon appellatur. In eo est, resinæ terebinthinæ p. x. \*. nitri, ceræ, picis aridæ, baccarum lauri, singulorum p. xx. \*. olei paulum. Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

#### ENARRATIO.

Sunt etiam.

**S**IC Galenus *malagmata diadaphnidon*, quod baccas lauri recipiant, libro De

*compositione medicamentorum* *κατὰ γένος* describit: quæ facultate ab hoc Celsi diadaphnidon emplastro parum discrepant.

*Aliud diadaphnidon ad extrahendum,  
& pus mouendum.*

**A**LID eo nomine, quod puri quoque mouendo est: Seui vitulini, ammoniaci, thymiamatis, picis, ceræ, nitri, baccarum lauri, resinæ aridæ, aristolochiæ, pyrethri pares portiones.

*Philocratis emplastrum ad extrahendum,  
& pus mouendum.*

**P**RÆTER has, est Philocratis, quod habet salis ammoniaci p. vii. \*. aristolochiæ p. viii. \*. ceræ, resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum p. xv. \*. spumæ argenti \* p. lii. \*. Quibus ut pus quoque moueant, iridis p. iiii. \*. & galbani p. vi. \*. adiciuntur.

*Rhypodes*



*Rhypodes emplastrum, ad extrahendum.*

**O**PTIMUM tamen ad extrahendum est id quod à similitudine sordium *ῥυπώδες* Græci appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdellii, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum p. iiii. \*. aristolochiæ p. viii. \*. squamæ æris p. xvi. \*. resinæ terebinthinæ p. lxxv. \*. ceræ, & seui vel taurini, vel hircini p. c. \*.

## ENARRATIO.

Optimum tamen.

**N**ON omnino male cytnos intelligi <sup>autem cytni, ut ait Aetius, flores mali punici qui floribus anemones similes sunt.</sup>  
auctor est ex Galeno Pantinus. Sunt

*Emplastrum Hecatæi ad extrahendum.*

**H**ECATÆO quoque auctore emplastrum generis eiusdem sit ex iis, galbani p. ii. \*. fuliginis thuris p. iiii. \*. picis p. vi. \*. ceræ, & resinæ terebinthinæ, singulorum p. viii. \*. quibus paulum irini vnguenti miscetur.

*Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.*

**V**ALENSQVE ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis p. viii. salis ammoniaci p. \*. viii. 3. squamæ æris p. xvi. \*. myrrhæ, thuris sing. p. xviii. \*. ceræ p. cl. \*. resinæ Colophoniacæ, aut pineæ p. cxc. \*. p. ec. \*. olei heminam, aceti sextarium.

## ENARRATIO.

Valensque ad idem.

**E**x Andromacho ad Pasionem relatum <sup>genera: quod ab hoc non discrepat: nisi quod Celsus myrrham addiderit; Pasion autem arginens & as combustum loco eius posuerit, quod Galenus non solum extrahere, sed & digerere auctor est.</sup>  
emplastrum viride describit Galenus libro secundo De compos. medicis secundum

De ens-



*De emplastris exedentibus.*

**Q**UÆDAM autem sunt emplastra exedentia, quæ *omnina* Græci vocant, quale est id quod habet resina terebinthina, \* fuliginis thuris, singulorum p. \*. 3. squamæ aris p. i. \*. ladani p. ii. \*. aluminis tantundem, spumæ argenti p. iii. \*.  
*\* hic & supra sape fuliginem pro polline posuit.*  
*Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit, & supercrescentem carnem coercet.*

**E**XEST etiam vehementer corpus, atque ossa quoque resoluit, & supercrescentem carnem coercet, id quod habet spumæ argenti, squamæ aris, vncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asij, aristolochiæ p. sextantes, ceræ, resinæ terebinthinæ, thuris, olei veteris, atramenti futorij, salis ammoniaci p. semis, aruginis rasæ p. bessem, aceti \* stillitici heminam, vini aminei tantundem.  
*\* stillitici, al. scilicet*

*Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora vulnera.*

**S**UNT etiam aduersus morsus quædam accommodata, quale est Diogenis nigrum, quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ aridæ, singulorum p. xx. \*. spumæ argenti p. c. \*. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris p. iii. \*. cerussæ, & aruginis \* rasæ, singulorum p. viii. \*. ammoniaci p. xii. ceræ, resinæ pineæ, singulorum p. xxv. \*. spumæ argenti p. c. \*. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris p. xiiii. \*. galbani p. vi. \*. cerussæ, & aruginis rasæ, singulorum p. viii. \*. ammoniaci p. xii. ceræ, resinæ pineæ, singulorum. \* p. lv. \*. ex quibus spuma argenti concoquitur.  
*\* passæ,*  
*\* p. xlv. al. p. xxxv.*

*Ephesium emplastrum rubrum, ad idem valens.*

**R**UBRUM quoque emplastrum, quod Ephesium vocatur, huc aptum est. Habet resinæ terebinthinæ p. ii. \*. galbani p. \*. iii. minij sinopici p. vi. thuris fuliginis p. vi. \*. ceræ



cerae p. viii. \*. spumae argenti \* p. lvi. \*. olei veteris he-  
minam. \*xlvi.  
al. xxxvi.

## ENARRATIO.

Rubrum quoque.

**V**ARIANT hic exemplaria: siquidem  
alia Ephesium, ab Epheso civitate  
legunt: ego Ethesiū dicere malim: de quo  
Hermolaus Barbarus in suis Corollaris ca-

pue lxxxvii. Galenus Halieno cuiusdam  
emplastri huius descriptionem assignare vi-  
detur: discrepat tamen ab hoc Celsi Ephesio,  
quod mannā prater alia ingredientia re-  
cipiat.

*Aliud emplastrum ad idem valens.*

**I**TEM id quod ex iis constat, squamæ aris, thuris fuliginis,  
singulorum p. iiii. \*. galbani p. vi. \*. salis ammoniaci  
p. \*. xii. 3. cerae p. xxv. \*. olei tribus heminis. Hæc autem  
aliis quoque recentioribus vulneribus rectè imponuntur.

*Alia emplastra non grauibz vulneribus accommo-  
data, & maxime senilibz.*

**S**UNT enim alba lenia, *Alia* Græci vocant, ferè non gra-  
uibz vulneribus accommodata, præcipueque senilibz.  
Quale est quod habet cerussæ \* p. lii. \*. seu vitulini curati, \*p. xxxii.  
& cerae, singulorum p. \* lviii. \*. olei heminas tres, ex qui-  
bus ea cerussa concoquitur. \*xlvi.

## ENARRATIO.

Sunt enim alba.

**H**oc non ignotum, nec omnino dissi-  
mule, describit Scribonius, quod album  
vocat, ad contusa & periones utile: Re-  
cipit autem cerussæ p° lib. olei myrtini p° lib.

spuma argentea \* p° xxiiii. cere pon-  
tica p° lib. Cerussa, inquit, & spuma ar-  
gentea decoquantur donec coeant; postea ad-  
ditur cera.

*Elephantinum emplastrum.*

**A**LIVD quod habet cerussæ p. xx. \*. cerae \* p. lv. \*. olei \*p. xxxv.  
hemina, aquæ sextarium. Quæ quoties adiciuntur  
cerussæ, vel spumæ argenti, scire licet illa ex his coquenda  
esse. Est autem ea percandida compositio, quæ supra posita  
est, ideoque elephantina nominatur.

NN

ENAR-



## ENARRATIO.

**E**MPLASTRUM hoc tactu blandissimum est, & adhaerendo pertinax, refrigeratorem vim mediocrem obtinet; cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat impedit, & iam influxum denno ad partes externas retrudit.

*Lenia emplastra.*

**L**ENIA quoque quaedam emplastra sunt, quas λιπαρὰς ferè Græci nominant, ut id quod habet minij p. iiii. \*. spumæ argenti p. xxv. \*. ceræ, & adipis suillæ, singulorum p. xxvii. vitellos quatuor.

## ENARRATIO.

Λιπαρὰς Græca dictio est, idem significans quod pinguis; deducta à λίπος, quæ oleum, adipem, unguenque omne Græci significant; unde λιπαρὰ lenia dicuntur emplastra, quod cera, adips, oleum, resina, aut plura ex his simul miscantur.

*Emplastrum lenie.*

\* P. VIII. **A**LIA compositio generis eiusdem, ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum p. vi. \*. cerussæ \* p. vi. \*. spumæ argenti, plumbi recrementi, scorian molybdi Græci vocant, singulorum p. xx. cicini olei, & myrti singulorum heminæ.

*Archagathi emplastrum lenie.*

**T**ERTIA, quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysos cocti, æris combusti, singulorum p. iiii. \*. cerussæ coctæ p. viii. \*. resinæ terebinth. p. x. \*. spumæ argenti p. vi. \*.

## ENARRATIO.

Tertia quæ ad.

**Q**UAM hic ad Archagathum liparam refert, imperfecta quodammodo est, ut ex Scribonio Largo constat: siquidem is liparam ruffam describit, ad ani fissuras diuitinas quas ἐλκυσσας nominant, & ad eiusdem partis exulcerationes, & ad vitia diuitina non inutilem, quæ ab Archagathi emplastro hoc nihil differt, nisi quod aquam,

oleum myrticum, & ceram auctor noster omiserit. sic autem habet Largi descriptio: Spuma argentea \* p° xxxvi. cerussa \* p° vi. mysos \* p° vi. chalcitidos vitæ \* p° vi. resina terebinthina \* p° xii. cera \* p° vi. olei myrtici sextarios S. ii. aque pon. sextans: cum aqua teruntur quæ primò posita sunt, & olei pondo dimidio, cum reliquo oleo, cera & terebinthina liquefacta mortario superfunduntur.

*Emplastra*



*Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.*

**E**TIAMNUM generis eiusdem, spumæ argenti, ceræ, adipis suillæ, singulorum p. xxvii. \*. vitelli cocti quatuor, \* rosæ hemina. Aut cerati ex oleo myrteo facti partes tres, \* ros. i. ro-  
adipis suillæ pars quarta, paulum ex plumbi recremento. Aut <sup>sacci</sup> spumæ argenti selibra, ex olei hemina, & aquæ marinæ altera, cocta donec bullire desierit, cui paulum ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seui, stibi, spumæ argenti, cerussæ.

#### ENARRATIO.

**E**MPLASTRUM hoc ambustis mirifice <sup>propterea</sup> propterea enim impositum mitigat, postea tollerit dolorem, statimque infinita celeritate per multis usus fuerit, nullum magis probavit, sanat.

#### CAPUT XX.

*De pastillis, & primò de his qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti sunt.*

**P**ASTILLI quoque facultates diuersas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti. Qualis est qui habet \* chalcitis, misyos, spumæ nitri, floris æris, gal-  
læ, aluminis scissilis modice cocti, sing. p. i. \*. æris combusti, <sup>\* chalciteos,</sup> capitulorum mali punici, singulorum p. iiii. \*. Hunc oportet diluere aceto, \* sic ubi vulnus glutinandum est, illinere. \* ac ubi  
At si nervosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, sic ut illius octo partes, nona huius sit.

#### ENARRATIO.

**P**ASTILLORVM tria sunt genera: quorum unum potius datur, alterum in aluum iniicitur, tertiumque illitionibus seruit: Cel-  
<sup>his</sup> <sup>hoc loco tantum de his qua illuminantur</sup> <sup>meminis.</sup>

*Alius pastillus ad glutinanda vulnera.*

**A**LIVS ad idem constat ex his, bituminis, aluminis scissilis, singul. p. i. \*. æris combusti p. iiii. \*. spumæ argenti p. xi. \*. olei sextario.

NN 2

*De sphra-*



\* Polydas

*De sphragide pastillo, quem Polybus confecit ad glutinandum vulnus.*

\* Polyda

**S**ED longe \* Polybi celeberrimus est, Sphragis autem nominatur, qui habet aluminis scissilis p. \*. i. 3. atramenti sutorij p. ii. \*. myrrhae p. v. \*. aloës tantundem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum p. vi. \*. Quæ contrita vino austero excipiuntur.

## ENARRATIO.

*Sed longe Polybi.*

**I**OANNES - Celsus hic verè lectiorem approbat; idg. auctoritate tum Avicennæ, tum Galeni, qui inter veteres medicos Polybium recensuerunt. Mihi tamen (sicut & ante nos Pantino quoque) Polyda sphragis potius legendum videtur; idg. auctoritate Galeni, & Pauli Aeginetæ: siquidem Polyda sphragidem sic describit:

Aluminis scissi \* p. iii. myrrha \* p. vii. atramenti sutorij \* p. i. floris salis punice \* p. xii. fellis taurini \* p. vi. aliq. xvi. aloës uncia, vino excipiuntur austero Galenus addit thuris \* p. iiii. duasque huius pastilli descriptiones habet: quarum priorè qua hinc nostra magis consona est, vino dulci excipit, posteriorem austero, sicut & Celsus.

*Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscenis partibus, inflammationesq. eorum.*

**A**D ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscenis partibus, inflammationesque eorum: Chrysocolle p. i. \*. atramenti sutorij, aluminis scissilis, sing. p. ii. \*. halicacabi corticis p. iiii. \*. minij p. vi. \*. spumæ argenti p. xii. \*. cerussæ p. xvi. \*. Quæ ex aceto & coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

## ENARRATIO.

**H**VIC omnino consonum pastillum quem dihalicacabon vocat, Paulus de-

scribit; nisi quod sarcocollam omittat.

*Pastillus Andronis ad uiam inflammatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.*

**A**NDRONIS verò est ad uiam inflammatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia: Gallo, atramenti sutorij,



futorij, myrrhæ, singulorum \* p. i. \*. aristolochiæ, aluminis \* p. ii. scissilis, singulorum p. ii. \*. capitulorum punici mali p. xxv. \*. ex passo coactorum, & (cùm vñsexigit) aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius vitium est, cui mendendum est.

## ENARRATIO.

**A**LIVS pastillus eadem auctori ascriptus excipiuntur. Paulus Aegineta ab hoc recipit cythron \* p. x. gallæ \* p. vii. etiam diversum habet. Scribonius Largus loco capitulorum punici mali; granati cortices accipit, atque aloë & aris florem addit.

*Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum fundentia sanguinem vel cancrum.*

**P**ROPRIE autem ad ani fissa, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancrum: Aeruginis p. ii. \*. myrrhæ p. xii. \*. stibis, lacrymæ papaveris, acaciæ sing. p. xvi. \*. Quæ \* sibi, ex vino & teruntur, & in ipso vñ \* deliquantur. \* liquantur.

*Pastillus ad expellendum calculum cum urina.*

**E**XPELLERE autem ex vesica cum urina calculum videtur hæc compositio: Casiæ, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur, deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant p. \*. 3. hiq̃ue singuli quotidie manẽ ieiuno dantur.

## CAPVT XXI.

## De pessis.

**H**ÆC tria compositionum genera, id est, quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq̃ue sunt, maximum præcipueq̃ue varium vñsum præstant. Sed alia quoque vñlia sunt, vt ea quæ foeminis subiciuntur (πείρας Græci vocant.) Eorum hæc proprietas est: Medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaq̃ue lana naturalibus conditur.

NN 3

ENAR-



## ENARRATIO.

## Hæc tria compositionum.

**P**ESSI utero soli adhibentur: sunt autem eorundem tres differentie; alij namque molliunt, alij astringunt, terij deinceps ordine aperiunt. Mollientibus ad uteri inflammationem, exulcerationes, perfrictiones, strangulatus, auersiones, & inflationes utimur. Aperientes utiles sunt, quoties purgationem suppressam provocare volumus, aut convenienti compressione vulvam emen-

dare. Astringentium usus contrarius est aperientibus: nam fluorem muliebrem cohibent, & uterum suspensum contrahunt, & prolapsum reprimunt. Ceterum convenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulo crassiore facere, deinde lanam linamento toruli similem duplicatam in medicamentum tinctam ori vulvae condere, sic ut stupam praelongam habeat alligatam; quo pessus facile eximi possit, quando visum fuerit. Auctor est Aegineta.

## Ad sanguinem euocandum.

\* cannis  
al. cuneis  
\* P. 11.

**A**D sanguinem autem euocandum, \* cauneis duabus addicitur nitri \* P. I. \*. aut alij semen conteritur, addicitur myrrha paululum, & vnguento fusino miscetur, aut cucumeris sylvestris pars interior, ex lacte muliebri diluitur.

## ENARRATIO.

## cauneis duabus.

**F**ICI genus est à loco sic denominatum. Hoc Marco Crasso in Parthos naviganti quum navem consenderet, omen fecit; nam quum quidam canneas sicus venales haberet,

Crasso visus est dicere, Cave ne eas. Porro quod eadem per se, etiamsi non additum sit nitrum, aut alij semen, naturam stimulent mensisque euocent, clarum admodum est ei qui earundem temperiem probe exploratam habuerit.

## Ad vulvam molliendam.

\* ros. i. rosaceum, &  
sic innu-  
maris lo-  
cu.

**A**D vulvam molliendam, oui vitellus, & foenum Græcum, & \* rosa & crocum temperantur. Aut elaterij P. \*. 3. salis tantundem, vuæ taminæ P. VI. \*. melle excipiuntur.

## ENARRATIO.

## Aut elaterij.

**P**ESSVS hic nihil minus quam vulvam emolliet, nisi ex retentis mensibus duri-

ties aut inflammatio collecta sit: nam ad menses ciendos, atque adeo partum moriuntur euocandum optime faciet.

Alia



*Alia pesti compositio ad idem valens.*

**A**UT Boëtho auctore, croci, resinæ terebinthinæ, sing.  
P. \*. IIII. myrrhæ P. \*. III. rosæ 8. I. \*. seui vitulini  
P. \*. 3. ceræ P. II. \*. miscentur.

*Ad inflammationes vulvæ Numenij pessus.*

**O**PTIMA autem aduersus inflammationes vulvæ, Nu-  
menij compositio est, quæ habet croci P. \*. 3. ceræ  
P. I. \*. butyri P. VIII. \*. adipis anserini P. XII. \*. vitellos co-  
ctos duos, rosæ minus cyatho.

## ENARRATIO.

**O**ptima autem.  
**C**OMMODVS, latque utilis admodum  
ad vulvæ inflammationes est iste pes-  
sus, atque citra omnem mali suspicionem  
exhiberi potest: nam qui ab Ægineta libro

tertio capite LXIII. sub finem describitur,  
quantumvis parum ab hoc differat, tamen  
propter papaveris lachrymam aut decoctum  
papaveris caput, quod immiscendum di-  
cit, non ita tutum existimo.

*Ad euaciendum è vulva infantem mortuum.*

**S**I verò infans intus decessit, quo facilius euacietur, mali-  
corium ex aqua terendum, eoque vtendum est.

## ENARRATIO.

malicorium ex aqua.

**E**GO certe nusquam eo elogio decantatum  
malicorium legi: nam quum ascriptoria  
admodum facultatis sit, imminenti potius  
partum repellet, quam adiunabit, nisi id ex

occulta quadam proprietate fieri dicamus.  
Quod de malicorio dico, idem de cochleis cum  
resis suis combustis pronuntiandum censeo:  
nam quantumvis menses ciant, nusquam  
tamen legisse memini prodesse iis qua vitio  
locorum concidunt.

*Si mulier vitio locorum concidit, qua cura-  
tione vtendum sit.*

**S**I concidere vitio locorum mulier solet, cochlex cum te-  
stis suis comburendæ, conterendæque, deinde iis mel adii-  
ciendum est. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa  
mollienda est.

DE MEDI-



## DE MEDICAMENTIS QVIBVS

ARTIDPS. VTIMVRUS

## CAPVT XXII.

*Ad carnem supercrescentem exedendam.*

**Q**UÆDAM autem misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur, sic ut inspergamus, aut cum aliquo liquido mista illinamus, quale est ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamæ, fuliginis thuris, singulorum p. i. \* æruginis p. ii. \*. Hæc autem eadem cum melle purgant ulcera, cum cera implent. Misy quoque & galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt, eaque vel arida inspergere licet, vel excepta cadmia, illinire.

## ENARRATIO.

Quædam autem.

**G**ALENVS intra ulceris per arida medicamenta curationem, quotiescunque solueris, animaduertendum dicit, qualemnam in particula effectum ediderint, sciendumque, ac in memoria tenendum esse, nonnulla desiccare, non autem detergere: cuiusmodi sunt illa quæ astringendi qualitatem obtrinent, eaq; quæ vlcus purum non efficiunt. At quæ præterquam quod siccant, adhuc etiam detergunt, ea non solum siccant, sed & putram quoque totam partem exulceratam efficiunt.

Præterea notandum venit, pura ulcera ab iis medicamentis, unde prius quam essent sordida, nihil rosionis percipiebant, nunc erodi mordetique, quæ causa est, ut a valentioribus abstergentibus medicamentis, ad mitiora lenioraque digrediamur; ubi vlcus ad amissum purum inuenimus: quemadmodum si sordidum sit, ad magis abstergentia transimus; nisi ex rosione sordida apparuerint. Celsus hoc capite, eorum quæ corpus consumunt atque exedunt, huiusmodi ponit.

*Ad putrem carnem continendam, ne ultra serpat, eamque leniter exedendam, plures compositiones.*

**P**UTREM verò carnem continet, neque ultra serpere patitur, & leniter exest, mel, vel cum lenticula, vel cum marubio, vel cum oleæ foliis, antè ex vino decoctis. Item sertula campana in mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut amara nuces cum allio, sic ut huius pars tertia sit, paulumque iis croci adiiciatur. Aut quod habet spinam, er-  
genti



genti p.vi. \*. cornu bubuli combusti p.xii. \*. olei myrtei, & vini cyathos ternos. Aut quod ex his constat: Floris punici mali, atramenti futorij, aloës, singulorum p.ii. \*. aluminis scissilis, thuris, singul. p.iiii. \*. gallæ p.viii. \*. aristolochiæ p.x. \*. Vehementius idem facit etiam adurendo auripigmentum cum chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta combusti. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali, aloës, singulorum p.ii. \*. aluminis scissilis, thuris, singulorum p.iiii. \*. gallæ p.viii. \*. aristolochiæ p.x. \*. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel cantharides p.i. \*. p. sulphuris. i. \*. loliij p.iii. \*. Quibus adiicitur picis liquidæ quantum satis est: adiungendum mel, chalcitis quoque cum resina & ruta mista, aut cum eadem resina diphryges, aut vva taminia, cum picæ liquida. Idem verò possunt feces vini combusti, & calcis, & nitri pares portiones, vel aluminis scissilis p. \*. 33. thuris, sandaracæ, nitri, singulorum p. \*. i. gallæ p.viii. \*. aristolochiæ p.x. \*. mellis quantum satis est.

*Hieræ compositio.*

**E**st etiam Hieræ compositio quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum p.ii. \*. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p.iiii. \*. aristolochiæ, gallæ immaturæ, singul. p.viii. \*. malicorij contriti \* p.xx. \*.

\* p. x.

*ENARRATIO*

Est etiam Hieræ. **I**oannes Cæsarius, Legendum fortasse est, inquit, Hyrrhæ; ut sit medici non medicina nomen; cuius & Galenus alicubi meminit. Ego tamen Heræ legere malim, cuius frequens apud Galenū libris De compositione medicamentorum, & alibi, sit

mentio; quinquam si quis legere scribere maluit, per me stat: quando Galenus libro v. De compositione medicamentorum paræ æræ emplastri cuiusdam meminerit, quod & ex Vulcani templo ad Memphim vocatum dicit.

*Iudæi compositio.*

**E**st & Iudæi, in qua sunt calcis partes duæ, nitri quàm ruberrimi pars tertia, quæ vrina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

OO

*Tolle*



*Tolle compositio.*

**A**r Iollas chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum  
p. i. \*. calcis p. ii. \*. auripigmenti tantundem miscebat.

## ENARRATIO.

**Q**UOD <sup>diacæru</sup> Apellis inscribitur, <sup>que easdem incipientes prohibens.</sup>  
<sup>paulo operosius est, nomas sileus, at-</sup>

*Ad sanguinis profluvia vel ex membrana cerebri, vel aliis  
locis, & ad cancerum, & ad inducendam cicatri-  
cem, & ad coërcendam carnem crescentem.*

**S**i verò ex membrana, quæ super cerebrum est, profluit  
sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet, si  
alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ  
\* vti æris, singulorum p. i. \*. sandaracæ p. ii. \*. marmoris \* cocti  
p. iii. \*. inspergi debet. Eadem cancro quoque obsistunt.  
Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis,  
singul. p. ii. \*. calcis p. iii. \*. Eadem incrementem quoque  
carnem coërcent.

*Timei compositio ad ignem sacrum vel cancerum.*

**T**IMÆVS autem ad ignem sacrum, vel ad cancerum, his  
utebatur, myrrhæ p. ii. \*. thuris, atramenti sutorij, sin-  
gulorum p. iii. \*. sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris,  
singul. p. iii. \*. gallæ p. vi. \*. cerussæ combustæ p. viii. \*.  
Eadem vel arida insperfa, vel melle excepta idem præstant.

*Ad sternutamenta excitanda.*

**S**TERNVTAMENTA verò vel albo veratro, vel struthio  
coniecto in nares excitantur, vel his mistis, piperis, vera-  
tri albi, singulorum p. \*. 3. castorei pondo i. \*. spumæ nitri  
p. ii. \*. struthij p. iii. \*.

ENAR-



## ENARRATIO.

Sternutamenta verò.

**S**TERNUTAMENTA excitantibus mo-  
nentur, ut secundo libro diximus; vel  
ut eos qui nimia propensione in somnum de-

ninentur, excitare festinemus; vel ut scetus  
vel secundas expellamus, ut achleos qui in  
pectore latent, in aspectum adducamus; vel  
ut verriginem sedemus; vel ut aliquid ex-  
pellamus.

*Gargarizationes quibus fieri debeant.*

**G**ARGARIZATIONES autem aut \* leuandi causa fiunt, aut  
reprimendi, aut euocandi. \* Leuant lac, cremor, vel ptif-  
fana, vel furfurum. Reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel  
rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmula decocta  
sunt. Euocant, sinapi, piper.

\* lauandi

\* Lauant

## CAPVT XXIII.

*De antidotis, & quibus malis opitulentur.*

**A**NTIDOTA raro, sed præcipue interdum necessaria  
sunt, quia grauissimis casibus opitulantur. Ea rectè qui-  
dem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto  
deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorum-  
que partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt  
aduersus venena, vel per morsus, vel per cibos, aut potiones  
nostris corporibus inserta.

## ENARRATIO.

Antidota raro.

**A**NTIDOTA dicuntur (ut auctor est  
Galenus) medicina, quæ non extrin-  
secus corpori inposita, sed intra ipsum as-  
sumpta affectibus medentur. Tres autem  
ipsorum in uniuersum differentia habentur:

nonnulla enim lethalium medicamentorum  
gratia assumuntur; quædam ad virulentas  
feras proficiunt; quædam affectibus ex prano  
victu oborientibus opitulantur. sunt etiam  
quæ triplicem promittunt usum; quemad-  
modum theriace nuncupata, quæ ab Andro-  
macho medico composita est.

*Compositio antidoti.*

**V**NUM est quod habet lacrymæ papaueris p. \*. 3. acori  
malobatri p. v. \*. iridis illyricæ, gummi, singul. p. ii. \*.

OO 2.

anisi



\* feseleos,  
\* papaue-  
ris  
\* syriaci,

anisi p. iii. \*. nardi gallici, foliorum rosæ aridorum, cardamomi, singul. p. iiii. \*. petroselini p. \*. iiii. 3. trifolij p. v. \*. casia nigra, \* filis, bdellij, balsami, seminis \* piperis albi, singulorum p. \*. 3. styracis p. \*. v. 3. myrrha, opopanacis, nardi \* syri, thuris masculi, hypocistidis succi, singul. p. vi. \*. castorei p. vi. \*. costi, piperis albi, galbani, resinæ terebinthinæ, croci, floris iunci rotundi, singulorum p. \*. vi. 3. dulcis radice p. viii. \*. 3. Quæ vel melle vel passo excipiuntur.

## ENARRATIO.

filis.

HOC est feseleos, atque sic quidem passim in antidotis accipiendum est.

*Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.*

\* hic ubique,  
et pa. preced.  
et inf. usque  
ad pag. 484.  
in vet. cod. de-  
letu \* poss  
et legitur p.

**A**LTERVM quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat: Costi, thuris masculi, singulorum p. v. \*. piperis albi p. \*. 3. floris iunci rotundi p. ii. \*. cinnamomi p. iii. \*. casia nigra p. iiii. \*. croci Cilicij p. \*. iiii. 3. myrrha, quam staeten nominat, p. v. \*. nardi indici p. \*. v. 3. Quæ singula contrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendum est, id quod Ægyptiæ fabæ magnitudinē impleat in portione vini diluitur.

## ENARRATIO.

**S**IMILEM planè descriptionem habet Paulus libro septimo. Scribonij tamē antidoti Zopyri multum ab hac differt.

*Antidotum Mithridatis.*

**N**OBILISSIMVM autem est Mithridatis, quod quotidie sumendo rex ille dicitur aduersus venenorum periculatum corpus suum reddidisse. In quo hæc sunt: costi p. \*. s. 3. acori p. v. \*. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi, iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum p. ii. \*. anisi p. iiii. \*. nardi gallici, gentianæ, radice, aridorum rosæ foliorum, singulorum



gulorum p. iiii. \*. papaueris lacrymæ, petroselin, singulo-  
rum p. \*. iiii. 3. calix, filis, lolij, piperis longi, singulorum \*. polij.  
p. vi. \*. styracis p. \*. v. 3. castorei, thuris, hypocistidis succi,  
myrrhæ, opopanacis, singulorum p. vi. \*. malobathri folij  
p. vi. \*. floris iunci rotundi, resinæ terebinthinæ, galbani,  
dauci cretici seminis, singulorum \*. \*. v. 3. nardi, opobal-  
sami, singulorum p. \*. vi. 3. thlaspi p. \*. v. 33. radicis pon-  
ticæ p. vii. \*. croci, zingiberis, cinnamomi, singul. p. \*. vii. 3.  
Hæc contrita melle excipiuntur, & aduersus venenum, quod  
magnitudinem nucis Græcæ impleat, ex vino datur. In cæ-  
teris autem affectibus corporis pro modo eorum, vel quod  
Ægyptiæ fabæ, vel quod erui magnitudinē impleat, satis est.

## ENARRATIO.

**M**VLTVM differt hæc Methridatij anti-  
dotum, ab ea quam descripsit Galenus  
libro De antidotis: cuius descriptionem si-  
quis desideret, aut Galenum iam citato loco,  
aut Scribonium Largum §. centesimo se-  
ptuagesimo consulat.

lolij, piperis longi.

**P**OLII restituendum est ex Scribo-  
nio Largo, atque pro longo pipere, scri-  
bendum est album.

## DE ACOPIS.

## CAPVT XXIII.

*Acopum nervis utile.*

**A**COPA quoque vtilia nervis sunt. Quale est quod ha-  
bet floris iunci rotundi p. \*. ii. 33. costi, iunci quadrati,  
lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singul. p. \*. iiii. 3.  
myrrhæ, æris combusti, singulorum p. \*. vii. iridis illyricæ,  
ceræ, singulorum p. iiii. \*. alexandrini calami, iunci rotun-  
di, aspalathi, xylobalsami, singulorum p. xviii. \*. seui p. i. \*.  
vnguenti irini cyathum.

## ENARRATIO.

**A**COPA dicta sunt, quod præcipue ad  
lassitudinis, quæ Græcis *σβροσ* dicitur,  
puta tensine, ulcerosa, & eius quæ ossa de-  
fatigat, sensum, conueniant, quanquam &  
talibus compluribus morbis sint vtilia. Eorum  
porro usus commodus est, in iis qui perma-  
nente, & indigente impinguatione opus ha-  
bent, ut docet Orribastus, quibus in adfectio-  
nes pro-



nes propter arum defluxum, nihil magno-  
pere possint: vel in iis quibus, propterea  
quod morbi inueterauerint, madefactiones  
minime sunt idoneae. in quo genere sic post  
madefactiones acopa adhibent; sicuti etiam  
malazmata post cerata. Sunt autem tres

acoporum differentia: calefaciunt enim, mol-  
liunt, cutimque scarificant. Calefacientibus  
in acutis morbis utimur, ubi nervum laesum  
iri suspicia est: mollientibus vero in morbis  
diutinis: scarificantium usus in diuturnis  
morbis est, qui difficulter amouentur.

*Acopum Enodes nervis utile.*

*viduades*

**ALTERVM** quod \* *ἑνὸς* vocant, hoc modo fit. cerae  
p. \*. 3. olei tantundem, resinae terebinthinae ad nucis iu-  
glandis magnitudinem simul incoquantur, deinde infusa in  
mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mel-  
lis acetabulum, tum irini vnguenti, & rosae terni cyathi.

**ENARRATIO.**

**S**i in vicem olei, glaucinum, & cypri-  
num recipias, *ἑνὸς* δὲ τοῦ μελέως  
Galeni, quod *τὸ τρέμα* dicitur, effeceris,

commodum est ad nervorum contractiones:  
benefacit ad lassitudinum molestias.

*Enchrasta ad ulcera purganda & implenda.*

*\* cilini*

**ΕΓΧΡΙΣΤΑ** autem Graeci vocant liquida quae illinuntur. Qua-  
le est quod fit, ad ulcera purganda, & implenda maxime  
inter nervos, paribus portionibus inter se mistis, butyri, me-  
dullae vitulinae, seu vitulini, adipis anserinae, cerae, mellis, re-  
sinae terebinthinae, rosae, olei \* cicini. Quae separatim omnia  
liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur.  
Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosa  
cyprus infunditur.

**ENARRATIO.**

olei cicini.

**I**OANNES Caesarius, Cicini, inquit,  
legendum fortassis: sed & Cilicini po-  
test, vel Cilicij: propterea quod Galenus

in quodam operum suorum mentionem facit  
olei quod ab ipso Capnoleum vocatur: quod  
quidem in Cilicia fit: unde & dictum vi-  
deri potest a Celsopoleum Cilicinum.

*Ad sacrum ignem.*

**A**d sacrum ignem spumae argenti p. vi. \*. cornu bubuli  
combusti p. ii. \*. conteruntur, adiciturque inuicem vi-  
num, & id quod specialiter sil vocatur, & myrteum, donec  
utriusque terni cyathi conficiantur.

**DE CA-**



## DE CATAPOTIIS.

## CAPVT XXV.

*Catapodium ad somnum accersendum, & lenationem doloris, & simul ad concoquendum.*

**C**ATAPOTIA quoque multa sunt, variisque de causis fiunt. Anodyna vocant, quæ somno dolorem leuant. Quibus uti, nisi nimia necessitas vrget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaueris lactymæ, galbani, singulorum p. i. \* myrrhæ, castorei, piperis, sing. p. ii. \*. Ex quibus quod erui magnitudinem habet, satis est deuorasse.

## ENARRATIO.

**C**atapodia quoque. *verò Catapodium, citra noxam exhiberi possit, si lachryma papaueris pondus non nimium imminuatur; quum reliqua ingredientia, ad refrendam eius vim satis esse queant.*  
**CATAPOTIVM** id est medicamentum quod non diluitur, sed ita ut est deuoratur. auctor est scribovim. *in hoc*

*Catapodium valentius ad somnum.*

**A**LTERVM stomacho peius, ad somnum valentius ex his fit, mandragoræ p. \*. 3, apij seminis, item hyoscyami seminis, singulorum p. iiii. \*. Quæ ex vino teruntur. Vnum autem eiusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumpsisse.

## ENARRATIO.

**H**oc, *aut reuerentius & omnino narcoticum non concessero.*  
*Catapodium ad plurimos dolores per somnum leniendos.*

**S**IUE autem capitis dolores, siue vlcera, siue lippitudo, siue dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta, siue inflammatio vuluæ est, siue coxa, siue iocur, aut lienis, aut



aut latus torquet, siue vitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietem eiusmodi catapotium: Silis, acori, rutæ syluestris seminis, singulorum p. i. \*. castorei, cinnamomi, singulorum p. ii. \*. papaueris lacrymæ, panacis, radicis mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum p. ii. \*. piperis grana lvi. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

## ENARRATIO.

Hoc certe, si quod aliud, merè benedictum censendum est: ut quod nec nimis profundum somnum conciliet, nec neruis inimicum sit, sed quod & sensus simul excitet, & sopiat.

panacis, radicis mandragoræ, malorum arid.

Legendum. panacis radicis, mandragoræ malorum aridorum.

*Catapotium aliud ad multa valens.*

**Q**VINETIAM syluestris papaueris cum iam ad excipendam lacrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat, atque ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proicitur, & cum eo humore, passi pari mensura miscetur, inferuetque donec crassitudinem sordium habeat. Cum <sup>\*refrixit,</sup> infixit, catapotia ex eo fiunt, ad nostræ fabæ magnitudinem, habentque vsum multiplicem. Nam & somnum faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succo, ac passi. Et tormina supprimunt ex vino liquata, & inflammationem vuluæ coërcent, mista cerato ex rosa facto, cum paulum his croci quoque accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

## ENARRATIO.

CATAPOTII huius descriptio non eandem loca, nisi quod hoc formam elementum differt a Diacodio Galeni, libro De medicamentorum compositione secundum loca, nisi quod hoc formam elementum recipiat: imò regitur & extra omnem noxam Catapotium hoc exhibetur.

*Catapotium*



*Catapodium ad inducendum somnum, quod vulua  
dolens prohibuit.*

**I**TEM si vulua dolens somnum prohibuit, croci p.ii.\*. anisi, myrrhæ, singul. p. i. \*. papaueris lacrymæ p.iiii.\*. cicutæ feminis p. viii. \*. miscentur, excipiunturque vino veteri, & quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

*Ad iecur sanandum.*

**A**D sanandum iecur nitri p. \*. 3. croci, myrrhæ, nardi Gallici, singulorum p. i. \*. melle excipiuntur, daturque quod Aegyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

**E**NARRATIO.

*Ad sanandum.*

**I**D sanè quomodo iecur sanare possit, non video: nam quantumvis nardus Celica, imbecilliori iecinori profit, non ta-

men sequitur statim eandem iecur persanaturam: & neque etiam si frigidis iecinoris morbis convenire dicamus, omnibus ob id ex aquo utilis erit. Idem si quis de duobus proximis paragraphis dicat, non aberraverit.

*Ad finiendos dolores lateris.*

**A**D lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

*Ad thoracis dolores finiendos.*

**A**D thoracis, nardi p. i. \*. thuris, castiæ, singulorum p. iii. \*. myrrhæ, cinnamomi, singulorum p. vi. \*. croci p. viii. \*. resina terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

*Catapodium Athenionis ad tussim.*

**A**D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum p. i. \*. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum p. i. \*. Quæ separatim contusa, postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapodia mane, bina noctu dormituro dantur.

PP

ENAR-



## ENARRATIO.

Ad tussim.

**S**i galbanum & styracem, sicut facit Scribonius, admiscueris, longè excellen-

tius feceris, ut quod & ad siccas seu aridas tusses profuturum sit. neque hoc ignavius est quod proximo paragrapho ad Heraclidem refert.

*Catapotium Heraclidis Tarentini, ad tussim, & somnum.*

**S**i tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini, croci p. i. \*. cinnamomi, castorei, papaveris lacrymæ, singulorum p. i. \*. myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum p. \*. 3.

*Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.*

**Q**UOD si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panacis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorū p. v. \*. galbani p. \*. 3. hyssopi p. \*. 3. conterenda sunt, hisq. hemina mellis adiicienda, & quod digito excipi potest, deuorandum est.

*Colicæ Cassij medici.*

**C**OLICÆ verò Cassij ex his constat, croci, anisi, castorei, singulorum p. iiii. \*. petrosclini p. iiii. \*. piperis & longi, & rotundi, singulorum p. v. \*. papaveris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum p. vi. \*. Quæ melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

## ENARRATIO.

Colicæ verò.

**H**ANC Cassij medici colicem describit Scribonius Largus paragrapho cxx.

adiicit tamen semen apij: Datur, inquit, quantum nux abellana media patet, & in ipsis etiam doloribus statim prodest. De hac libro precedente fusius dictum est.

*Ad infantem mortuum aut secundas impellendas.*

**I**NFANTEM verò mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci p. i. \*. aut cui dictami Cre- tici p. i. \*. adiectum est.

ENAR-



## ENARRATIO.

**S**i pro sale ammoniaco, subtraheris des, ammoniacum partus extrahit: quod guttam ammoniacam, constabit sali ammoniaco à nullo attributum comminino sententia; quando, ut ait Dioscori- perio.

*Laborantibus ex partu quid dari debeat.*

**E**x partu laborantibus erisimum, ex vino tepido \*iciunæ \*iciunis dari debet.

## ENARRATIO.

**A**PRVD nullum hac facultate pradi- tum lego erisimum: nam etiam si Galenus plantis que acrimonia pradita sunt comparatis, & Dioscorides extenuare atque

excalfacere dicat, contraque venena in delictu cum melle dari; non tamen sequetur ob id ex partu laborantibus cum vino datum profuturum.

*Ad adiuvandum vocem.*

**V**OCEM adiuuat thuris p. i. \*. in duobus cyathis vini datum.

*Aduersus difficultatem urine.*

**A**DVERSUS urinæ difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi vnciæ singulæ, styracis, resinæ terebinthinæ pondo sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ Ægyptiæ, & manè, & \*cœnato dari debet.

\*incarnato

## ENARRATIO.

*Aduersus urinæ.*

**E**TSI opium recipiat confectio, calida admodum est, neque cuius difficultati urinæ conueniens; verum ei tantum, que frigiditatem originis suæ causam habuerit, atque hac quidem ratione, non solum urinæ

cienda, sed & indurato pleni, atque hepatis conueniens erit: nam que ingrediuntur, sufficientia sunt, & ad viscositatem humorum induratis partibus infarctorum extergendam, & ad secandam crassitudinem, & ad discutiendos extenuatos humores.

*Arteriace compositio quomodo fiat.*

**A**RTERIACE verò hoc modo fit, casia, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum p. i. \*. croci p. i. \*. piperis grana xxx. ex passis tribus sextariis decoquuntur, donec

PP 2

nec



nec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum p. i. \*. coniiciuntur in passu eundem modum, eodemque modo decoquantur. Aut eiusdem passu heminae tres usque eò coquantur, donec extracta inde gutta indurescat, \* & adiicitur trita cassiæ p. i. \*.

\* & ci  
adiic.

## CAPUT XXVI.

*De quinque generibus noxarum corporis, & primò de vulneribus, quæ maximè per tela inferuntur.*

Cum facultates medicamentorum proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena, quæ intumescens, in varicem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quæ præcipuè scalpellum & manum postulant, nunc de his dicam, quæ maximè medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et antè dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt. Tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiam à vulneribus. In his autem antè omnia scire medicus debet quæ insanabilia sint, quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primùm eum qui seruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius, ut occisi, quem fors ipsius \* peremit. Deinde ubi grauis metus, sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis in difficili \* rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conueniunt, sic rursus histrionis est, paruum rem attollere, quò plus præstitisse videatur. Obligarique æquum est, confessione promptæ rei, quò curiosius etiam circumspiciat, ne quod per se exiguum est malum, maioris curantis negligentia fiat.

\* spem  
al. aspici-  
cionem  
\* intere-  
mit.  
\* spem

ENAR-



## ENARRATIO.

Cum facultates.

**H**IPPOCRATES libro secundo Prædictionum docet, quæ vulnera prognosticis relinquenda sint: siquidem, Quacunque, inquit, vulnera tempus nascuntur, aut ita gliscientem sanguinem, aut corpus

doloris impatiens adeo, ut præ dolore & febricitet & deliret homo; aut si magnitudine tanta fuerint, ut homo ad curationem adduci ab eius contemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualiacunque tantum fuerint; diuini animi deliquis exceptis.

*Quæ vulnera insanabilia sint.*

**S**ERVARI NÔ potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocinoris portæ, cui in spina medulla percussa est, cuiq. aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt, cuive circa fauces\* glandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.

\* glandes, vena vel arteria, &c.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES sexto Aphorismorum, Vesica, inquit, discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut aliquo ex interioribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est. Et libro Prædictionum: Vulnera magis lethalia sunt quæ in venas crassas in collo ac inguinibus insiguntur; deinde quæ in cerebrum, & hepar; postea quæ in intestinum & vesicam. Sunt tamen hæc omnia perniciose valde; non tamen ita, ut nemo ex his euadat, velut putatur. siquidem Galenus cerebrum vulneratum sæpius curatum vidit. Sunt tamen ex capitis vulneribus lethalissima quæ ad cerebrum pertingunt, graviora sunt & huiusmodi omnia, si os nudum, magnum os infractum, diffractumque: quin

etiam si osculum ulceris paruum fuerit, fissura vero ossis aliquamdiu permanferit, periculosus est: sunt autem hæc eo graviora quo sunt propinquiora. Vesica porro collium vulneratum, ut in lithiasi frequenter visum venit, discissum, indies curari videmus: ipsa tamen vesica concanitas, quam propriè vesicam aut xōm appellamus, discissa, quum nervosa sit, incurabilis omnino est, tum quod vesica ipsa tenuis, exanguis & nervosa sit; tum quod profundum sit; tum quod in interiora progreditur vulnus, atque ob id coalescere non possit. Eadem planè ratio de intestinis est. At ventriculo vulnerato multos restitutos ait Galenus, nisi omnino magnum vulnus fuerit.

*Quæ vulnera difficilem curationem habeant.*

**V**ix autem ad sanitatem perueniunt, quibus vlla parte pulmo, aut iocinoris crassum, aut membrana quæ continet cerebrum, aut lienis, aut vulua, aut vesica, aut vllum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoq. in præcipiti sunt, in quibus usque ad grandes, intusque conditas ve-

PP 3

nas,



\* descendit. nas, in alis vel poplitibus mucro \* descendit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunque venæ maiores sunt, quoniam exhaurire hominem, profusione sanguinis possunt. Idque evenit non in alio tantum, atque poplitibus, sed etiam in his venis, quæ ad anum, testiculosque perveniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in atticulis, vel inter digitos est. Item quodcunque musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

## ENARRATIO.

aut iocinoris crassum.

ITA tamen ut venas notata dignas non vulneret: nam aliqui propter sanguinis profusionem lethale omnino vulnus esset, sicuti ante de iocinoris porta sauciata pronuntiatur reliquit. Huc referri possunt quæ de venis subiungis.

aut vulva aut vesica aut  
vllum intestinum.

IVM propter substantiam nerveam,

tum propter situm: necessum est enim iis vulnerari profunda esse vulnera.

Præter hæc.

SYMPTVS est hic locus ex secundo Prædictionum Hippocratis: ubi sic scribit. Caterum ex locis subalares difficiliore curati sunt, & laterum mollitudines (inanes locos reddidit Celsus) & femora. nam & mora in ipsis sunt, & recidiva. Ex articulis maxime obnoxii sunt magni digiti, & præsertim pedum.

*Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.*

TVTISSIMUM omnium, quod in carne est, & hæc quidem loco, vel peiora, vel meliora sunt. Modò verò periculum facit, quodcunque magnum est.

## ENARRATIO.

quodcunque magnum est.

HIPPOCRATES triplex genus magni vulneris ponit: primum quidem, quod

in corporis parte præstantiore accidit; alterum, quod malignum; ac tertium, quod amplum est: in quo significato magnum vulnus videretur Celsus.

*Observationes quedam, & ætatis, & corporis &  
vite, & temporis in vulneribus.*

ALIQUID etiam in vulneris genere, figuraque est. Nam peius est, quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est, aded ut acuto quoque quam retuso telo vulnerari



vulnerari commodius sit. Peius etiam vulnus est, ex quo aliquid<sup>\*abscissum</sup> excisum est, ex quo ve caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessima quæque plaga in orbem est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illive figuræ vulnus est, eo vel deterius, vel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus: quia facilius sanescit puer, vel adolescens, quàm senior; valens, quàm infirmus: neque nimis tenuis, neque nimis plenus, quàm si alterum ex his est: integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, & temperans, quàm vino, venerique deditus. Opportunissimumque curationi tempus vernum est, aut certè neque feruens, neque frigidum. Siquidem vulnera & nimius calor, & nimium frigus infestant: maximè tamen horum varietas, ideoque perniciosissimus autumnus est. Sed pleraque ex vulneribus oculis subiecta sunt, quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstraui, cum positus interiorum partium ostendimus. Verunt tamen quia quædam vicina sunt, interest quoque vulnus in summa parte sit, an<sup>\*penitus</sup> penetraverit: necessarium est notas subiicere, per quas quid intus actum sit, scire possimus, & ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

## ENARRATIO.

**Q**UOD simplicia vulnera compositæ, hoc est iis quæ simul contusa & distrupta sunt, faciliora sunt; clarum est quàm ut dici debeat: at quod rotundum vulnus aut vlcus difficillimè curetur, ex Herophiliorum sententia, Problematum libro rationem hanc reddidit Cassius: φανερὸν ὅτι τὰ τετραγώνια καὶ ὁμαλὰ τῶν ἰληῶν μικρὰ μὲν φαίνονται τῇ περὶ τοῦ σώματος ἐν τοιαύτῃ δ' ἐστὶν, ἀλλὰ ἔχουσι τῇ δοξῇ, μολύβδα τὰ ἰσχυρὰ δ' ὑπὲρ φαίνονται, τὸ μέγεθος δὲ πλείονος ἡρώου δύνανται πρὸς τὴν ἐπούλωσιν.

## Quin etiam confert.

**S**YMPTVS est locus hic ex secundo Prædictionum Hippocratis: Multum etiam differt, inquit, corporis ipsius hominis stru-

ctura. aliquando enim non febricitat, neque inflammatur sauciatus; aliquando etiam citra causam febricitat, & aliqua corporis parte omnino inflammatur.

## Siquidem vulnera.

**H**IPPOCRATES: Frigidum ulceribus mordax est, cutem obdurat, dolorem insupportabilem facit. Nam quod de frigide perfusione dicit Hippocrates, id etiam de tempestate calida accipi potest. Calidum tempus vires dissolvit, atque profluvia sanguinis excitat; unde & vulneratis inimicum est: Autumnus vero inequalitas, sicuti omnibus morbis aliena est, ita vulneribus adversissima existit.

Signa



*Signa percussæ cordis.*

**I**GITUR corde percusso, sanguis multus effertur, venæ languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, malique odoris, tanquam \* in rotato corpore oriuntur, extremisque partibus frigidis, matura mors sequitur.

\* in ægroto  
al. irritato  
al. irrotato

## ENARRATIO.

**Æ**GINETA subnigrum sanguinem posse docet variis exemplis Nicolaus Massa, & Matthias Cornax. Alex. Pedemontanus scribit in eiusdem capsula etiam vermes re-  
perios esse, ipsum cor innadentes, qui lunaticam passionem generent, atque pueros interficiant.

*Signa pulmonis icti.*

**P**ULMONE verò icto, spirandi difficultas est, sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulque etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari iuvat, quidam sine ratione confurgunt. Multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

## ENARRATIO.

sanguis ex ore. ex ore magis per vomitum redditur, lingua alium colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri frigidi appetentes.

**Æ**GINETA, Sanguis, inquit, ex plaga spumans enacnatur, quum non

*Signa iocinoris vulnerati.*

**I**OCINORIS autem vulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis, ad spinam redacta præcordia, in ventrem cubandi dulcedo, punctiones, doloresque usque ad iugulum, iunctumque ei latus scapularum, os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

*Signa percussorum renum.*

**R**ENIBUS verò percussis, dolor ad inguina, testiculosque descendit, difficulter urina redditur, eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

ENAR-



## ENARRATIO.

eaque aut est cruenta.

**Q**UICUNQUE, inquit Hippocrates, sanguinem mingunt, his in renibusruptionem vena significat: nam quantumvis varia sint ac multa mitionis sanguinis

causa, non tamen purus sanguis conseritur & celeriter efferitur per urinam, nisi ubi vena renum propter sanguinis multitudine rupta sunt, aut renes ipsi aliqui vulnerati.

*Signa vulnerati lienis.*

**A**T liene icto, sanguis niger à sinistra parte prorumpit, præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurefcunt, fitis ingens oritur, dolor ad iugulum, sicut iocinore vulnerato, venit.

*Signa percussa vulue.*

**A**T cum vulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit, vomitus bilis insequitur. Quædam obtumescunt, quædam mente labuntur, quædam sui compotes, neruorum, oculorumque dolore vrgeri se consentunt, morientesque tandem, eadem quæ corde vulnerato patiuntur.

## ENARRATIO.

**S**YMP TOMATA hac subsequuntur, tum sensum quem cum cerebro, ventriculo, & propter colligantiam, tum propter con- superioribus partibus habes.

*Signa percussi cerebri, vel membrana eius.*

**S**\* I N cerebrum, membranave eius vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit, fereque bilis vomitus insequitur. Quorundam sensus obrunduntur, appellati que ignorant. Quorundam trux vultus est, quorundam oculi quasi resoluti, huc atque illuc mouentur. Fereque tertio vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam nerui distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori obiciunt.

\* Enimvero si

\* huc illuc commouentur.

QQ

ENAR-



## ENARRATIO.

PAVLVS distinguit ita, ut si cerebri membrana vulnus acceperit, dolor capitis validus subsequatur, oculi ferueant, rubeantque, lingua agitetur, mens desipiat. Et si cerebrum percussum est, inquit, agri concidunt, vox nihil sonat, facies pervertitur, bilis vomitus sequitur, sanguis per na-

res erumpit, per aures humor albus pulicula similis emanat, sanies per vulnus exit. Hippocrates sectione sexta Aphorismorum, Quibus cerebrum vulneratur, ait, iis febris & bilis vomitus superuenire necesse est. Celsus febris non meminit, forte quod illam sub delirio comprehenderit.

*Signa percussi stomachi.*

**V**BI stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur. Si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito. Venarum motus elanguescent, sudores tenues oriuntur, per quos extremæ partes frigescent.

## ENARRATIO.

**H**VC referre potes quæ de abdomine vulnerato scribit Paulus, quod nimis

rum succus aut chylus ex ventriculo emanatur, ex intestinis stercus.

*Signa ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.*

**C**OMMVNES verò ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus, & potio per vulnus exeunt, præcordia \* intumescunt, nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta vel stercus, vel odorem eius exhibent.

## ENARRATIO.

nonnunquam bilis  
per os.

intestinum hoc bilem sinceram universam ex cholagogis poris recipiat, & quod cysti fellis maxime vicinum sit. Cæterum ex hoc § satis constat pro gula in præcedente § stomachi nomen usurpatum.

**P**RÆSERTIM si ieiunum vocatum intestinum affectum sit: quod videlicet

*Signa percusse medulle, quæ in spina est.*

\* percussa, al. discussa,

**M**EDVLLA verò quæ in spina est, \* discussa, nervi resolvuntur, aut distenduntur, sensus intercedit: interposito tempore



tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel  
vrinam, vel etiam sterus excernunt.

## ENARRATIO.

SI quis originem convulsiois nervorum, principium, per quos velut internuncios cor-  
distentionisve probe exploratam habeat, pus uniuersum transmittit motum & sen-  
qua hic de medulla spina discissa dicuntur, sum, consequens est dorsali medulla percus-  
facile assequetur: nam quum spinalis me- sa, sensum & motum si non prorsus inter-  
dulla cerebri quodammodo germen sit, & cipi, saltem vitari; atque ea qua ordine  
explantatio, & durorum corporis nervorum subiungit Celsus, subsequi.

*Signa septi transuersi percuss.*

AT si septum transuersum percussum est, præcordia  
sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, san-  
guis spumans fertur.

## ENARRATIO.

SEPTO transuerso vulnerato, inquit gemitu & dolore per totam humeri partium  
Paulus, inspiratio magna oritur, cum compagem.

*Signa vesicae vulnerate.*

VESICA verò vulnerata, dolent inguina. Quod super pu-  
bem est, intenditur, pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere  
vrina descendit, stomachus afficitur. Itaque aut bilem vo-  
munt, aut singultiunt, frigus, & ex eo mors sequitur.

## ENARRATIO.

pro vrina sanguis.

EXVLCERATA vesica, æquè ac reni-  
bus, mingitur sanguis: non respondet  
tamen proportionem ei qui ex renibus fertur,  
quando in his vena & ampliores & plu-  
res sint. Sed quòd vesica affecta sanguis

per urinariam fistulam effluit, docet Hippo-  
crates sectione quarta Aphorismorum, di-  
cens: Si sanguinem mingant aut grumos,  
vel stillidium vrina habeant, & dolor in  
inum ventrem incidat, & pectinem, &  
semen, circa vesicam labor est.

*De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus,  
quando meliora, deterioraue sint.*

HIS cognitis, etiam nunc quædam alia noscenda sunt, ad  
omnia vulnera vlceraque, de quibus dicturi sumus, per-  
tinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis om-  
nibus.

QQ 2



\*varis, nibus notus est. Sanies est tenuior hoc, \*variè crassa, & glu-  
 \*albidissi. tinosa, & colorata. Pus crassissimum, \*albissimumque, glu-  
 tinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere  
 recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter vtrunque tem-  
 pus: Pus ex vulnere iam ad sanitatem spectante. Rursus &  
 sanies, & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas  
 \*μελικερα habent. Est enim quædam sanies, quæ vel *ιχωρ*, vel \*melice-  
 ria nominatur. Est pus, quod *ελαιωδες* appellatur. *ιχωρ* tenuis,  
 subalbidus ex malo ulcere exit, maximeque ubi nervo læso  
 \*glutino- inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & \*glutiniosior,  
 sa & c. subalbida, melli que albo sub similis fertur. Hæc quoque ex  
 malis ulceribus, ubi nervi circa articulos læsi sunt, & inter  
 hæc loca, maxime ex genibus. *Ελαιωδες* tenuis, subalbidus, qua-  
 \*vngui- si vinctum colore atque pinguitudine, oleo albo non dissimi-  
 nolam le, adparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus autem  
 est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore vel liui-  
 \*rubec, dus, vel niger, aut pituita mistus, aut varius. Optimus cali-  
 dus, \*rubens, modicè crassus, non glutinosus. Itaque protin-  
 us eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis  
 bonus fluxit. Itemque postea spes in his maior est, ex quibus  
 \*quoque melioris generis quæque proveniunt. Sanies \*igitur mala est,  
 multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutino-  
 sa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctam ei  
 cutem erodit. Melior non multa, modicè crassa, subrubicun-  
 da, aut subalbida. *Ιχωρ* autem peior est multus, crassus, sub-  
 liuidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odo-  
 ris. Tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria  
 prioribus habet. Meliceria autem mala est multa, & per-  
 crassa, melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter  
 hæc optimum est. Sed id quoque peius est multum, tenue,  
 dilutum, magisque si ab initio tale est. Itemque si colore se-  
 ro simile, si pallidum, si liuidum, si seculentum est. Præter  
 hæc, si malè olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat.  
 Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Item-  
 que si leve est, si nihil olet, si æquale est, modò tamen con-  
 venire, & magnitudini vulneris & tempori debet. Nam  
 plus



plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. Elæodes quoque peius est multum, & parum pingue, quo minus \* etiam, quoque id ipsum pinguius, eo + citius melius est.

## ENARRATIO.

INTER eos qui hodie extant, nullus exactius parvis & saniei differentiam descripsit, quam noster Cornelius hoc paragrafo. Pus igitur, ut docet Hippocrates libro De ulceribus, fit ex sanguine putri, & à natura plurimum abhorrente, ixeuq; san sanies; Guidoni ac recentioribus virulentia appellatur: estq; superfluitas subtilis, ex

abundantia humorum aquosorum generata, unde ulcera humida redduntur. Sordem Galenus crassiores quandam sanies vocat; quæ si multa sit, ulcera sordida reddat, quam eandem cum Celsi meliceria esse existimo. Damocrates ixeuq; τρυφάδιον λέγειτο appellat.

*Curatio aduersus profusionem sanguinis in ulceribus.*

QUIBUS exploratis, ubi aliquis ictus est, qui seruari potest, protinus prospicienda duo sunt, ne sanguinis sit profusio, néve inflammatio interimat. Si profusionem timeamus, quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia, ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sæpius linamenta mutanda sunt. Et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendum est. Ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest, ne nimis valenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. Quæ res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum, quamuis pleraque ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, \* potius quæ mitius \* his pot. idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venæ quæ sanguinem fundunt apprehendendæ, \* circaque id \* intraque quod ictum est, duobus locis deligandæ, intercidendæque sunt, \* ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Vbi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo

\* ut in se  
iunctæ  
coeant,

neque

223



neque nervus, neque musculus est, vtruta in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum tamen est cucurbitulam admovere \* à diuersa parte, vt illuc sanguinis cursus reuocetur.

\* ab aduersa, vel auersa,

## ENARRATIO.

& ex impetu ruentis sanguinis.

**I**D ad dignotionem loci affecti dictum est: nam qui cum impetu feritur sanguis, magna ex parte, aut arteria, vulnerata, aut eadem præcisa, accidere solet. Linamenta autem aceto madefacienda dicit, quod repellentis admodum astrictioraque sit facultatis, alij emplastica admovere malunt, quemadmodum & Paulus ipse faciendum suadet.

decidunt, nudam magis partem, quam naturaliter esse debet, relinquunt, multisq; iam ex iis quibus crusta decedit, sanguinis profluvium quod ægè sisti queat, superuenit: quanquam & his vitandum est, quoties magna urget necessitas. Auctor est Ægineia.

ferro candenti aduri.

OPORTET tamen ignita ferramenta antea ex aceto, vel vino restringere.

Sed etiam fatis.

Quæ res efficit.

DE remissione per cucurbitulam secundo libro abundè dictum est.

NAM quæ crustas generant, quoties

*Curationes aduersus vulnerum inflammationem.*

**E**T aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu, \* ea timeri possunt, vbi læsum est, vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus: aut vbi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit, adeo vt si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat, vti que si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multo que magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

\* ea que

## ENARRATIO.

Quod si musculus.

**L**ÆSUM musculum præcidendum dicit auctor noster: quod etsi quàm maximè eo præciso actionem aliquam vitari certum sit; ab inflammatione tamen & conuulsione

vindicet, quam proximo capite ex Hippocrate lethalem esse dicit. atque hæc quidem musculos vulneratos magna ex parte subsequi solet; præsertim si in capitibus aut finibus musculorum vulnera infligantur: nam in capitibus musculorum, musculi nervi adnascuntur;



nascentur; ex finibus autem chordæ oriun-  
tur. Si tamen in longum, aut in rectum  
vulnerari contingat musculus, nihil minus  
quàm præcidendus erit; quando si probè cu-

retur, non minus quàm præcisus curationem  
recipiat, idq; circa vitium alicuius actionis,  
quàm in præciso musculo necessariò vitari  
diximus.

*De glutinatione vulnerum.*

SANGVINE autem vel suppresso, si nimius erumpit: vel <sup>\*venæ se-</sup> ex-  
hausto, si per se parum fluxit, longè optimum est vulnus <sup>ctione,</sup>  
glutinari. Potest autem id vel quod in cute vel etiam in carne  
est, si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro alia parte  
dependens, alia inhærens, si tamen etiamnum integra est, &  
coniunctione corporis fouetur. In his verò quæ glutinantur,  
duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet,  
maximeque si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons,  
vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis vel  
venter. Si verò in carne vulnus est, hiatque, neque in vnum  
oræ faciliè attrahuntur, futura quidem aliena est. Imponendæ  
verò fibulæ sunt (*ἀγκυρῆς* Græci nominant) quæ oras pau-  
lum tamen contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit.  
Ex his autem colligi potest, id quoque quod alia parte depen-  
dens, alia <sup>\*inhæret,</sup> inhærebit, si alienatum adhuc non est, futuram, an  
fibulam postulet. Ex quibus neutra antè debet imponi, quàm  
intus vulnus purgatum est, ne quid ibi concreti sanguinis  
relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationem  
mouet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum qui-  
dem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, inibi  
relinquendum est. Nam id quoque inflamat. Compre-  
hendi verò futura vel fibula non cutem tantum, sed aliquid  
etiam ex carne, vbi suberit hæc, oportebit, quò valentius  
hæreat, neque cutem abrumpat. Vtraque optima est ex <sup>\*acu</sup> acia  
molli non nimis torta, quò mitius corpori incidat. Vtraque  
neque nimis rara, neque nimis crebra iniicienda est. Si nimis  
rara est, non continet. Si nimis crebra est, vehementer affi-  
cit, quia quò sæpius acus corpus <sup>\*transiit,</sup> transiit, quoque plura loca  
iniectum vinculum mordet, eo maiores inflammationes  
oriuntur, magisque æstare. Neutra etiam vim <sup>\*vllam</sup> illam defi-  
derat: sed eatenus utilis est, <sup>\*quatenus</sup> quæ cutis ducentem, quasi sua  
sponte



\*coiunct,

\*madet,

\*imposito,  
quo adiu-  
uetur,

sponte subsequitur. Ferè tamen fibulæ latius vulnus esse pa-  
tiuntur. Sutura orasiungit, quæ ne ipsæ quidem inter se con-  
tingere ex toto debent, vt si quid intus humoris \*concreuerit,  
sit quæ emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id  
tamen purgari debet, deinde omni vulnere primò imponenda  
est spongia ex aceto expressa: si sustinere aliquis aceti vim non  
potest, vino vtendum est. Leuis plaga iuuatur etiam, si ex  
aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea quocumque  
modo imposita est, dum \*manet, prodest. Itaque vt inare-  
scat, non est committendum. Licetque sine peregrinis, &  
conquisitis, & compositis medicamentis vulnus curare. Sed  
si quis huic parum confidit, imponere medicamentum de-  
bet, quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruentis vul-  
neribus apta esse proposui. Maximeque si caro est, barba-  
rum: si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, qua-  
les aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum  
quoque viride neruis idoneum est, eminentibusque partibus  
ea, quam Græci πάτρουσαν vocant. Solet etiam colliso cor-  
pore exigua parte findi cutis. Quod vbi incidit, non alienum  
est scalpello latius aperire, nisi muscoli, nervique iuxta sint,  
quos incidi non expedit. Vbi satis diductum est, medica-  
mentū imponendum est. At si id, quod collisum est, quam-  
uis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos,  
aut musculos non licet, adhibenda sunt ea, quæ humorem  
leniter extrahant, præcipueque ex his, id quod rhyodes vo-  
cari proposui. Non alienum est, etiam vbicunque vulnus  
graue est, \*impositum, quo id iuuetur, insuper circumdare  
lanam succidam ex aceto, & oleo. Vel cataplasma, si mollis  
is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus aut musculo-  
sus, quod emolliat.

## ENARRATIO.

Nam si plaga.

**T**RIPlicem. suturarum in vulneribus  
differentiâ consuevit chirurgi: vnam  
scilicet agglutinatoriâ seu incarnatiuam;

alteram suppressoriam sanguinis; & tertiam  
labiorum in vnum adductorum ad tempus  
conservatricem appellantes: ac conglutina-  
toria sutura quinque diversos modos statunt,  
quos breuitatis causa omisso. Hæc omnes

Theophrastus



Theophrastus Paracelsus in maximis etiam vulneribus tanquam superfusas reuocat, & veluti inflammationum genitrices suspectas habet. Dicit enim singulis particulis insitum humidum quoddam radicale quod balsamum vocat, quod solitum continuitatem per se viuere & consolidare possit: ac proinde quum natura per se vulnera sigillare potius sit, in hoc tantum chirurgus incumbendum, ut natura subministret, atque ea arceat quæ symptoma aliquod loco affecto afferre possent; in quo albo, ut diximus, suturam censet, quod eidem magna ex parte committes esse soleant dolor, congeries excrementorum, & inflammatio. Quæ quidem etsi ita se habeant, est tamen quandoque ubi citra noxam usus suturarum esse possit, adhibitis cautelis quas hic auctor noster recenset.

#### Vtraque optima est ex acia.

BENE monuit Paninus hic subesse mendum, legendumque ex acu. quamquam id non animadvertens Taganlius, antiquam lectionem in suum De institutionibus chirurgicis librum transtulit. Caterum acus ipsa longa esto, ut idem scribit, ac lenis, cuspide triangulari, canda excavata, ut in ea filum recondatur, & transitum acis non remoretur.

#### Neutra etiam vim illam.

QUAMVIS verus lectio aliquo modo constare possit, ego tamen cum Pantino vim vllam legere malim.

#### Spongia ex aceto.

SI nervosus locus sit affectus, aut alioqui

tendines, acetum, ut libro Methodi docet Galenus, etiam si quam maxime inflammationes arceat, suspectum est. vinum cerid, austrium inprimis, (hoc enim Celsum intelligere verisimile est) admodum vile censetur: nam præterquam quod inflammationes arceat, ut docet Hippocrates, etiam glutinandi vi præditum est, quam usque ad penitiores vulneris partes transmittit.

#### Levis plaga.

SI natura corporis totius atque adeo partis affecta calida sit, ipsaque anni tempestas frigidis vi permittat, frigida conueniet, ut quæ repellendi vi prædita est, & calore naturali aucto sanitatem restituet. si tamen profundum vulnus sit, & nec tempestas, nec corporis constitutio frigida usum admittant, nihil æquè aduersum vulneribus existit, atque frigida, ut quæ extincto calido innato, curationem prohibeat, si nervosus locus affectus est, aqua frigiditas nervos sensiles admodum, & natura frigidos afficiet, & principi partium primari, ut restatur Galenus, affectionem suam impertiet.

#### Polybi sphragidem.

Polyidæ legendum esse iam ante dictum est.

#### lanam succidam ex aceto.

SVCCIDAM lanam *δυσμνην* vocant: leniendi, digerendi, & repellendi vim habet: acetum siccat, astringit mediocriter, ac repellit; oleum autem dolorem lenandi & discutiendi facultate præditum est.

#### Quomodo vulnus ligari conueniat.

**F**ASCIA verò ad vulnus deligandum, \*linca  
eaquæ lata esse debet, ut semel iniecta non vulnus tantum, sed paulum vtrinque etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si æquè ab vtraque, transversè comprehendere oras debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media primùm iniicienda  
RR est, ut



est, ut tum in vtranque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut & contineat, neque adstringat. Quod non continetur, elabitur: Quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hyeme sæpius fascia circuire debet, æstate quoties necesse est, tum extrema pars eius \* inferioribus acu assuenda est. Nam nodus \* vulnus lædit, nisi tamen longè est. \* Illo neminem decipi decet, ut propriam viscerum curationem requirat, \* de quibus suprà posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel futura, vel alio medicinæ genere est. In visceribus nihil mouendum est, nisi aut si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, præcidatur. Alioquin vulnus interius, ea victus ratio, eaque medicamenta sanabunt, quæ cuique visceri conuenire superiore libro proposui.

\* inferior

\* vlcus

\* Porro

\* ab iis, de

q.

## ENARRATIO.

ad vulnus deligandum,  
lindea aptissima.

EXPVNGENDA distinctio est, legendaque linea. Hippocrates libro De offi-

cina medici, Quod ad longitudinem, inquit, ac latitudinem pertinet, impleantur trium, quatuor, quinque aut sex digitorum quidam latitudinem, cubitorum vero longitudinem.

*De ratione victus, & notis vulnorum, curationibusque eorum.*

**H**is ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est, isque, si graue vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem à cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquam calidam: vel si æstas est, neque febris neque dolor est, etiam frigidam. Aded tamen nihil perpetuum est. Sed semper pro viribus corporis æstimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit, tenuem scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multi que etiam ex profluvio sanguinis intermorientes, ante ullam curationem in vino reficiendi sunt, quod alioqui inimicissimum vulnere est. Nimis verò intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimum est. Illud indicium est magnæ inflammationis, hoc emortui corporis. Protinusque si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, maturè.



turè vulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum \*inflatio est, permanet. Illa pernicioſa est, quæ vel leui vulneri superuenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si neruorum \*rigor, aut distentio, quæ ex vulnere orta est, eam non finit. Vomitus quoque biliosus non voluntarius, vel protinus vt percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nerui, vel etiam neruosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere non alienum est, præcipuè his, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque iam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est. Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus iniicienda sunt. Quinto \*iam die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto vulnere considerandus color est. Quod si liuidus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malum vulnus esse: idque quodcumque animaduersum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundum esse vlcus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, vbi hæc sine dolore tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leuiter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ primò fuerunt. Si grauis inflammatio est, neque glutinandi spes est, eaque pus moueat, aquæ quoque calidæ necessarius vsus est, vt & materiam digerat, & duritiam emolliat, & pus citet. Ea sic temperanda est, vt & manu contingenti iocunda sit, vsque eò adhibenda donec aliquid ex tumore minuisse, \*coloremque vlceri magis naturalem reddidisse videatur: maximeque si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilagineis, rhyodes. Post id fomentum, si \*lata plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, \* & si latius hiat, illud emplastrum liquari ex irino vnguento oportet: eoque illitalinamenta disponi per plagam, deinde emplastrum suprà dari, & super id succidam lanam, minusque etiam, quàm primo, fasciæ astringendæ sunt.

RR 2

ENAR-

\* inflam-  
matio\* rigorem,  
aut disten-  
sionem q.  
e. v. o. est,  
ca. m.

\* cancr

\* calorem

\* latè

\* maxime-

que si grã-

de vulnus

est, tetra-

pharmacu:

si in articu-

lis, digitis,

locis carti-

laginosis,

rhyodes;

at si latius



## ENARRATIO.

abstinere.

**H**IPPOCRATES libro De affectionibus, & de ulceribus, Vulneratos, inquit, fame affligito, & ex alio quæ insunt subducito, aut clystere, aut pharmaco infra purgante exhibitio, & in potu dato aquam vel acetum; inflammata cataplasmati frigefacito. Celsus hic pro virium ac temporis ratione limitationem quandam addit.

nihil intumescere.

**H**IPPOCRATES sectione v. Aphorismo LXVI. In vulneribus fortibus & præuri, si tumor non appareat, ingens malum est: certum etenim est materiam ad interiora, atque adeo nobiliores partes rapi, atque inibi maiori noxa originem dare. Celsus signum emortui corporis esse dicit.

vel si neruorum rigor.

**H**IPPOCRATES segmento v. Aphorismo II. Convulsio ex vulnere lethalis est, inquit: atque id quidem duabus de causis; partim videlicet quod ex inanitione fiat. atque sic idem eodem libro dicit, ubi sanguis plurimus fluxit, singultus, aut convulsio superveniens, malum; partim quod necessum sit magnum esse vulnus idque in nervoso genere, quod lege consortij cerebrum quoque afficiat. hinc & vomitum non spontaneum

tanquam convulsorinum suspectum etiam habet.

Quinto iam die.

**T**ERTIO etenim & quarto die ferè revivescunt vulnera, ut docet Hippocrates: unde si qua in metu sit inflammatio, quinto die sese exeret.

Si gravis inflammatio.

**Q**UOTQVOT hæcenus videre contigit exemplaria, locum hunc depravatè legunt: siquidem Pinzanum, quod secutus est Ioannes Oporinus, si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, eaque pus moveant: Ioannes Casarius, si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, neque moveretur, legere maluit: ego (nisi quid me fallat opinio) legendum existimo: ea quæ pus moveant. & quod sic legendum sit, me movit ipse Celsus, qui aquam calidam idè utilem esse dixit, quod pus ciet. Porro quod ad calidæ usum attinet, sic scriptum reliquit Hippocrates: Quæ ad aquæ calorem pertinet & copiam, calor vehementior non sit, quam ut infusa ferri possit à manu. copiam, ubi relaxandum tenuandūque est, esse conveni: maximam; ubi caro producenda est aut molliendum, modicam.

Curationes propriæ articulorum.

\* dicenda

\* &amp; ea

\* Magisq.  
quò maio-  
res, & quò  
in mai.

**P**ROPRIE quædam in articulis \* visenda sunt, in quibus si præcisi nervi sunt, qui continebant, debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, \* ea transversa commodior est. Si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est. At visendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque & crassum dufertur, nervum præcisum esse credibile est. \* Magis quoque, maiores dolores inflammationesque quo maturius excitatæ sunt. Quamvis autem non abscissus nervus est, tamen si

circa



circà tumor durus diu permanet, necesse est & diuturnum  
 vlcus esse, & sano quoque eo tumorem permanere, futurum-  
 que est, vt tardè membrum id extendatur vel contrahatur.  
 Maior tamen in extendendo mora est, vbi recuruato articulo  
 curatio adhibita est, quàm in recuruando eo, quod rectum  
 continuerimus. Collocari quoque membrum quod ictum  
 est ratione certa debet. Si glutinandum est, vt superius sit, si  
 in \* inflammatione est, vt in neutram partem inclinatum sit. \* eo inflā-  
 Si iam pus profluit, vt deuexum sit. Optimum etiam me-  
 dicamentum quies est: moueri & ambulare, nisi sanis, alic-  
 num est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite vel  
 in brachiis, quàm qui in inferioribus partibus vulnerati sunt.  
 Minimeque ambulatio conuenit, femine, aut crure, aut pede  
 laborante. Locus in quo cubabit tepidus esse debet. Bal-  
 neum quoque dum parum vulnus purum est, inter res infe-  
 stissimas est. Nam id & humidum, & sordidum reddit, ex  
 quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Leuis frictio  
 rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vul-  
 nere.

## ENARRATIO.

**A**RTICVLORVM vulnera omnia Ga-  
 lenus Cacoëthe vocat. Methodi meden-  
 di libro, tum quod nervorum distensionem  
 inferre soleant, tum quod ex dolore vigilia-  
 rum & delirij periculum instet.

ea transuersa.

GALENVS tamen libro Methodi sexto  
 nervum per transuersum vulneratum con-  
 uulsiōi opportuniorem dicit, quàm per di-  
 rectum.

*Vulnus quomodo purgandum est.*

**I**NFLAMMATIONE finita, vulnus purgandum est. Id optimè  
 faciunt tincta in melle linamenta, supraque id, emplastrum,  
 \* vel enneapharmacum dandum est. Tum demum verò pu-  
 rum vlcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neque  
 humidum est. Ac quodcunque sensu caret, quod non natu-  
 raliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est:  
 quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum  
 est, id purum non est.

\* tetra-  
 pharmac-  
 cum, veli

R.R. 3.

ENARR.



## ENARRATIO.

**D**ETERGET mel, & humores euocat: dida ulcera finisq; commodissime infun-  
qua ratione, inquit Dioscorides, infor-  
dicur.

*Quomodo vulnus implendum est.*

**P**VRGATO, sequitur vt impleatur, iam q; calida aqua cate-  
nus necessaria est, vt sanies remoueatur. Lanæ succidæ  
superuacuu vsus est. Lota melius circumdatur. Ad imple-  
dum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta  
aliqua. Itaque ea adhiberi non alienum est, vt butyrum cum  
rosa, exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum ea-  
dem rosa tetrapharmacum, aut ex rosa linamenta. Plus ta-  
men proficit balneum rarum. Cibi boni succi, vitatis omni-  
bus acribus, sed \* iam plenioribus. Nam & auis, & venatio,  
& suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum  
inflammatio est, alienum est. Item q; vsque ad cicatricem,  
si nerui, musculiue vulnerati sunt, etiam si altè caro \*, aut si  
plaga in summa cute generis tutioris est, potest non peruetus,  
modicè tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si  
quid molliendum est, quod in nervosis locis, musculosisq;  
necessarium est, cerato quoque super vulnus vtendum est.  
At si caro supercreuit, modicè reprimat siccum linamentum,  
vehementius squama aris. Si \* plus est, quod tolli opus est,  
adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quæ corpus ex-  
dant. Cicatricem post omnia hæc commodè inducit, lycium  
ex passo, aut lacte dilutum, vel etiam per se impositum sic-  
cum linamentum.

\* etiam  
pleniora.

\* At si

\* carnis  
pl.

## ENARRATIO.

vt butyrum cum rosa.

**P**vs magis moueris, sordidumque vlens  
reddideris quam vulnus impleris, aut  
carnem produxeris.

modicè reprimat siccum.

VALENTIUS effeceris, si prius ex acri-  
minia imbutum resiccaris.

*De vlceri-*



*De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera incidunt,  
curationibusque eorum.*

**H**ic ordo felicitis curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere consuerunt. Interdum enim vetustas vlcus occupat, induciturque ei callus, & circum oræ crassæ liuent, post quæ quicquid medicamentorum ingeritur, parum proficit, quod fere negligenter curato vlceri superuenit. Interdum vel ex nimia inflammatione, vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora, vel quia nimis vulnus adstrictum est, vel quia corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus à Græcis diductum in species est, nostris vocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupauit, sed etiam serpit, deinde aliis aliisque signis decernitur. Nam modò super inflammationem rubor vlcus ambit, isque cum dolore procedit, ἐρυσσέλας Græci nominant. Modò vlcus nigrum est, quia caro eius corrupta est. Idque vehementius etiam putrescendo intenditur. Vbi vulnus humidum est, & ex nigro vlcere humor pallidus fertur, malique odoris est, carunculæ corruptæ. Interdum etiam nerui ac membranæ resoluuntur, specillumque demissum descendit aut in latus, aut deorsum, eoque vitio nonnunquam os quoque afficitur. Modò oritur ea, quam Græci γάληναζον appellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hæc in prominentibus membris, id est inter ungues, & alas, vel inguina, fereque in senibus, vel his quorum corpus mali habitus est. Caro in vlcere vel nigra, vel liuida est, sed sicca & arida, proximaque cutis plerumque subnigris pustulis impletur, deinde ei proxima vel pallida, vel liuida, fereque rugosa sine sensu est. Vltior in inflammatione est, omniaque ea simul serpunt: Vlcus in locum pustulosum: Pustulæ, in eum qui pallet aut fiuet: Pallor aut liuor, in id quod inflammatum est: Inflammatio, in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensque sitis, quibusdam etiam delirium accedit, alij quamuis mentis suæ compotes sunt, balbutiendo tamen vix sensus suos ore explicant. Incipit affici

\* discernitur.

\* extenditur.

\* pustulis.



pit affici stomachus. Fit foedi spiritus ipse odoris. Atque initium eius quidem mali recipit curationem. Vbi verò penitus insedit, insanabile est, plurimique sub frigido sudore moriuntur.

## ENARRATIO.

QUANQVAM indifferenter vulnus & ulcus apud probatores auctores, praefertimque Hippocratem, pro eodem accipi contendant nonnulli: videmus tamen hic à Celso alterum ab altero esse distinctum.

Omnis autem cancer.

QUANDOQVIDEM Gulielmus Pantinus brevissimè caput hoc enarravit, non pigebit hic eiusdem verba ascribere, ne (quod semper mihi religio fuit) alios suo

defraudem honore: Tres, inquit, canceri species facit Celsus, erysipelam, gangranam, & ulcus nigrum. Vltimum autem istud cancer dici ceptum est, vel quia vena qua in eius ambitu circumiacent, sic tument & implentur, ut cancerorum pedes sua forma imitari atque exprimere videantur; vel quòd renacissimè hoc malum, ubi semel apprehenderit, inheret: quo modo & canceri diffisillimè ab eo quod suis chelis amplectuntur, anelli possunt.

## Curatio ulceris.

\* concidendum  
al. excid.  
\* carnicula  
\* has, vel  
hoc

\* nolit,

Ac pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem vlcus scalpello \* incidendum est, excidendæque eius oræ, & quicquid super eas liuet, æquè incidendum. Si \* varicula intus est, quæ \* his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis emissus, novatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti \* non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit, & cum vlcus sub eo exesum est, id quociatrix inducitur.

## ENARRATIO.

emplastrum quod ex ladano.

QUONIAM ea quæ præcedunt clariora sunt quàm ut ampliore enarratione egeant, volentes præterimus. Ceterum quando hic emplastri quod Ἀλγιδύρον vocari dicit, mentionem facit; diximus non omnino inutile fore, quæ ingre-

diuntur simplicia enumerare, posteaquam id à Celso nostro omissum est. Recipit igitur argenti spuma \* p<sup>o</sup> XL. ladani \* p<sup>o</sup> XXXII. chalcanti \* p<sup>o</sup> VIIII. aluminis scissilis \* p<sup>o</sup> XII. cere \* p<sup>o</sup> C. squamma \* p<sup>o</sup> VIIII. bituminis \* p<sup>o</sup> XXXII. myrti quartam hemina partem, vinum Falernum succis adicitur.

## Curatio Erysipelatium.

Id autem quod Erysipelas vocari dixi, non solum vulneri superuenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit, atque interdum



terdum periculum maius affert, utique si circa \*cervicem aut \*cervicem caput constitit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere, deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq. cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua \*pluviali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam \*lenticula. cupresso adiecta, aut si tenerius corpus est, \*lenticulam. Quicquid impositum est, betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo, sulphuris p. i. \*. cerussæ & croci, singulorum \*p. xx. \*. ea- \*p. xii. que cum vino conterenda sunt, & id his illinendum: aut si al. xxi. durior locus est, solani folia contrita, suillæ adipi miscenda al. xxxii. sunt, & illita linteolo superiniicienda. At si nigrities est, neque dum serpit, imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedant, repurgatumque vlcus sic ut cætera nutriendum est. Si magis putre est, iamque procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est, siccum est cum aduritur, post vltionem putris vlceris superponenda sunt quæ crustas à vino resoluunt, eas *ῥοχλεας* Græci vocant. Vbi exciderunt, purgandum vlcus maxime melle & \*resina est, sed aliis quoque purgari potest, \*resina vsta quibus purulenta curantur, \*eodemque modo ad sanitatem \*eoque perducendum est.

## ENARRATIO.

QVOD si ulceratus locus incalascit aut doleat, aut colorem ex sano rubicundum, aut aliam notam quamcunque exiguan præ se ferat, verendum est ne erysipelas subsequatur. quam suspicionem augere, natura patientis biliosa, tempus anni calidum, & regio, reliquaque eius generis. Porro Galenus tumorem ex seriente & tenui sanguine constat, primatim quidem & propriè erysipelas vocavit: quum verò nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio existat, sed ex ambabus mixta, utique ab eo quod in mixtura superat, nomen vitio indidit; ac

modò erysipelas phlegmonodes, nunc inflammationem erysipelatoden nominavit. Ceterum quæ cervicem aut caput excipit erysipela, merito periculosa dicitur Celsò; ut quæ, nisi subito succurratur, suffocet ac strangulet.

## Oportet, si vires patiuntur.

HIPPOCRATES libro De ulceribus, rationem materia peccantis habens, Cuiusque, inquit, ulceri supervenerit erysipela, purgare corpus convenit seu deiectione, seu vomitu, prout ulceri præstabit. Celsus ma-

SS

iores.



iozem respectum habens ad inflammationem, quæ eadem comes magna ex parte esse solet, sanguinem mittendum esse dicit: quanquam præstiterit ex Hippocratis præscripto, nisi quid obset, medicamento purgante aluum sollicitare, atque bilem ducere.

### Sulphuris.

SI spumam argenti & opium addideris, Oribasij pastillum ad erysipelam reddideris.

### Si magis putre est.

MALVM id esse dicit Hippocrates: se-

ctione septima Aphorismorum: quod videlicet partes in superficie existentes, non solum exulceret, sed & interiores & profundiores depascatur.

### cas ἐχάρας Græci.

IOANNES CASARIUS ex Suida: ἐχάρας, φησὶ, καλεῖται τὸ λυγρὸν καὶ ἀμύμονον τὴν μὴ ἔχουσαν ὕψος, ἀλλ' ἐπὶ γῆς ἰδρυμένην, ἢ κλίην, παρ' ὃ καὶ τοὺς ἰατροὺς τὰ ὀστέα καὶ τὰ ἐλκεῖα ἐχάρας καλεῖται.

### Curatio Gangræne.

**G**ANGRÆENAM verò, si nondum planè tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est, utique in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt, si nervi vel laxi non sunt, vel leuiter affecti sunt, neque vllus magnus articulus nudatus est, aut carnis in eo loco paulum est, ideoque non multum, quod putresceret, fuit, consistitque coloco vitium: quod maximè fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est, & \* intentione quadam proximum quoque locum malè habet, \* vsque ad sanum corpus \* concidere. Medicamenta verò dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus mouere consuerunt, ideoque ne aqua quidem calida. Grauius quoque, quamuis reprimentia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est, superque ea quæ inflammata sunt, vtendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, vri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet. Præcipueque in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à victus ratione præsidium est. Neque enim id malum nisi corrupti vitiosi que corporis est. Ergo, primò, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia vtendum. Deinde danda quæ per cibum potionemque aluum, ideoque etiam corpus, adstringant, sed ea leuia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri vlcere præscripta sunt. At tum quoque pleniori-

\* extensio-  
ne  
\* vsque co  
sa.  
\* excidere



plenioribus cibis vti licebit ex media materia, \*sic tamen non \*sed  
 nisi aluum, corpusque siccantibus: aqua verò pluuiali frigida  
 balneum (nisi iam certa fiducia redditæ sanitatis est) alie-  
 num est, siquidem emollitum in eo \*vulnus, cito rursus eo- \*vltus,  
 dem malo afficitur. Solent verò nonnunquam nihil omnia  
 auxilia proficere, ac nihilominus serpere \*his cancer. Inter \*is  
 quæ miserum, sed vnicum, auxilium est, vt cætera pars cor-  
 poris tuta sit, membrum, quod paulatim emoritur, abscin-  
 dere. Hæ grauissimorum \*vulnerum curationes sunt. Sed \*vulcerum  
 ne illa quidem negligenda, vbi integra cute interior pars col-  
 lisa est, aut vbi derafum, attritumve aliquid est, aut vbi fur-  
 culus corporis infixus est, aut vbi tenue, sed altum vulnus in-  
 fedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex  
 vino coquere, interioremque eius partem conterere, & cera-  
 to miscere ex rosa facto, idque \*supponere: deinde vbi cutis \*superpo-  
 ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, quale λι- nere:  
 παρ᾽ est. Derafo verò detricto que imponendum est empla-  
 strum tetrapharmacum, minuendusque cibus, & vinum sub-  
 trahendum. Neque id quia non habebit altiores ictus, con-  
 temnendum erit. Siquidem ex eiusmodi casibus sæpe cancri  
 fiunt. Quod si leuius id erit, & in parte exigua, contenti esse  
 poterimus eodem leni medicamento. Surculum verò (si fieri  
 potest) oportet vel manu, vel etiam ferramento eiicere. Si  
 vel præfractus est, vel altius descendit, quàm vt ita \*fieri pos- \*velli  
 sit, medicamento euocandus est. Optimè autem educit, su-  
 perimposita arundinis radix, si tenera est protinus contrita:  
 si iam durior, antè in mulso decocta. Cui semper mel adii-  
 ciendum est, aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex  
 furculis arundo est, quia aspera est. Eademque offensa, etiam  
 in \*filice est. Sed vsu cognitum est, vtranque aduersus alte-  
 ram medicamentum esse, si contrita superimposita est. Facit  
 autem idem in omnibus furculis, quodcunque medicamen-  
 tum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusque vulne-  
 ribus aptissimum est. Priori rei Philocratis, huic Hecataei  
 emplastrum maximè conuenit.



## ENARRATIO.

**G**ANGRÆNAS appellant quoties membrum aliquod ob inflammationis quæ conflatur magnitudinem, emoritur. neque iam confirmatas tantum sic dicunt, sed etiam tum quæ sunt: hæc si ita intendantur, ut ipsa particula corrumpatur, in sphacelum degenerant. Porro Hippocrates id malum nasci auctor est tum libro De fracturis, tum libro De vulneribus capitis, quoties ulcus male curatur, quod sit quoties egrotus improba vitæ ratione utitur, aut quoties medicamenta non satis congrua applicantur.

superque ea quæ inflammata sunt.

**G**ALENVS ante omnia priusquam affectus in sphacelum degeneret, atque prius quam pars mortificetur, sanguinem in loco affecto impactum, quantum eius fieri potest, euacuat: ex vena quidem si vena amplior in ipso membro appareat, vel aliquæ cute ipsa altis plagis diuisa; sanguine siquidem ablato facile est malo mederi. si tamen membra ita vitata sint, ut in totum sensu sint destituta, praevidenda aut aduenda sunt, ne vicinis partibus malum communicent.

*Quomodo cicatrix vulnere inducenda, purgandaque sit.*

**V**BI verò in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem est, quod perpurgatis iam repletis ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur: deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maximè sano corpori similem accipit. Idem radix sylvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet claterij p. i. \*. spumæ argenti p. ii. \*. vnguenti pondo ii. ii. \*. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portionibus mista, ærugo, plumbi elotum, eademque rosa cocta, siue vngitur cicatrix, quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est. At si vel excreuit cicatrix, vel concaua est, stultum est decoris causa rursus, & dolorem & medicinam sustinere. Alioqui res utrique succurri patitur. Si quidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæc, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt: super concauam



cauam impleantia, donec vtrumque vlcus sanæ cuti æquetur,  
& tum cicatrix inducatur.

## ENARRATIO.

**Q**UOD cicatrix à cute aliud sit, docet  
Galenus libris tercio, & XIII.  
Methodi therap. Inducunt autem cicatri-  
cem quæcunque astringunt & siccant: nam,  
sicuti Paulus ait, summa vlceris caro cuti  
similis efficitur, induciturque ei cicatrix si  
illam desicemus astringamusque, adeo ut  
non solum id quod præter naturam redundat

discutiat, verum etiam id quod secundum  
naturam est attingamus.

Ac nigras quoque  
cicatrices.

LENE admodum hoc est quod prescri-  
bit Celsus, efficaciusque effecerit si loco olei  
vini accipias, aut nitri paucillum addideris.

## CAPVT XXVII.

*De vulneribus quæ per morsus inferuntur,  
eorumque curationibus.*

**D**IXIT de his vulneribus, quæ maximè per tela inferun-  
tur. Sequitur, ut de his dicam, quæ morfu fiunt, inter-  
dum hominis, interdum simiæ, sæpe canis, nonnunquam  
ferorum animalium aut serpentium. Omnis autem feræ  
morsus habet quoddam virus. Itaque si vehemens vulnus  
est, cucurbitula admoenda est. Si leuius, protinus empla-  
strum iniiciendum, præcipueque \*Diogesi. Si id non est,  
quodlibet ex his, quæ aduersus morsus proposui. Si ea non  
sunt, viride Alexandrinum. Si ne id quidem est, quodlibet  
non pingue ex his quæ recentibus vulneribus accommodan-  
tur. Sal quoque his, præcipueque ei, quod canis fecit, medi-  
camentum est, si manus vulnere imponitur, superque id duo-  
bus digitis verberatur: Exsaniat enim: ac fassamentum quo-  
que rectè super id vulnus deligatur.

\*Diogēnis

## ENARRATIO.

Omnis autem feræ  
morsus.

PLINIVS Naturalis historia libro  
XXVIII. capite IIII. inter asperri-

mos vel hominis morsum numerari conten-  
dit, idque salinæ morfo vulnere illata causa:  
nam hæc, ut idem testatur, non modò homi-  
ni noxia est, sed & contra serpentes veneni  
vim obtinet. Anicennas, quod & paulo  
post

SS 3



post etiam infert Celsus, ieiuni sine hominis  
sive bestia morsum nocentiorum esse dicit.

præcipueque Diogeni.

cucurbitula admoenda.

VIRVS siquidem una cum sanguine,  
& spiritu extrahitur, visq; veneni enervatur,  
ac dissolvitur.

NON omnino male legendum hic arbitramur Ioannes Celsus, Diogenis: cuius supra à Celso facta mentio est in emplastris, adversus morsus, & alia recentiora vulnera.

*Curatio adversus rabiosi canis morsum.*

*Timor aquæ.  
ὕδρφοβία.*

*præuisam*

**V**TIQUE autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula virus eius extrahendum est. Deinde si locus neque nervosus neque musculosus est, vulnus id adurendum est. Si vri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. Tum vsto quidem vulnere superimponenda, quæ cæteris vstis, sunt. Ei verò quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Postque nullo novo magisterio, sed iam supraposito vlcus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt, ibique patiuntur desudare, dum vires corporis finunt, vlcere adaperto, quo magis ex eo quoque virus destillet, deinde multo, meracoque vino excipiunt: quod omnibus venenis contrarium est. Idque cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo videtur. Solet autem ex eo vulnere, ubi parum occursum est, aquæ timor nasci, ὕδρφοβία Græci appellant. Miserrimum genus morbi, in quo simul æger & siti, & aquæ metu cruciatur. Quo oppressis in angusto spes est. Sed vnicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non antè ei præuisam proicere. Et si natandi scientiam non habet, modò mersum bibere pati, modò attollere. Si habet, interdum deprimere, ut inuitus quoque aqua satietur. Sic enim simul & sitis & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem, præcipue id, quod primò loco posui: ubi id non est, aliud, si nondum æger aquam horret, potui ex aqua dandum est, & si amaritudine offenditur, mel adii-



adiiciendum est. \* Et si iam is morbus occupauit, per catapota sumi potest. \* At si

## ENARRATIO.

Deinde si locus.

PRIMUM & ante omnia vulnus maius facere conuenit, osculo ipsius per scalpellum diuiso, & dilatato: Deinde etiam fissuris circumcirca locum vellicare eo studio, ut effluxum sanguinis multum per locum eliciamus, vulcus verò canteris ignitis amplioribus inuendendum. Auctor est Aëtius.

protinus in balneum mittunt.

SI QUIDEM una cum sudore exdat virus: quocirca ante, & post cibum mouendi sunt sudores.

aquæ timor.

AETIVS hoc malo potissimum affici testatur, qui vitiosis humoribus repleti sunt: at alij ex immodica siccitate metum aquæ fieri dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in contrarium penitus habitum mutata. Ruffus autem insania ex atra bile speciem esse dixit, veneno humorem illum imitatio: nam sicuti alij atra bile insaniantes,

alia timent, ita hydrophobi imaginem canis qui momordedit, in aqua se videre suspicantur. sic philosophus quidam, ut memoria prodidit Aëtius, à rabioso cane morsus, & generoso animo affectioni resistens, & in consequens ratus canem in balneo apparere (apparere enim illi sicuti aliis omnibus hoc modo affectis) ratiocinatus secum atque locutus, Quid cani & balneo commune est? superauit affectionem, & sanatus est ab affectione, ubi citra timorem bibisset. Ceterum vitium hoc haudquaquam prescriptum statimque diem habet quo inuadit, ut auctor est Actuarius: siquidem vitulurimum quidem, post quadragesimum diem negligentiores adoriri solet: attamen interdum & post sex menses, & anno elapso enadere contingit. sunt qui narrent aquæ panorem post septimum demum annum corripuisse.

Antidotum autem.

NON solum in potu theriaca danda est, sed & cum rosaceo dissoluta vulnere inposita admodum prodest.

*Curationes communes, aduersus omnes morsus serpentium.*

SERPENTIVM quoque morsus nonnimum distantem curationem desiderant, quamuis in ea multum antiqui variarunt, ut in singula genera anguium singula medendi genera præciperent, atque aliis alia. Sed in omnibus eadem maximè proficiunt. Igitur in primis \* super vulnus id membrum deligandum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optimè facit. Neque alienum est, antè scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitiati iam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhiben-

\* supra



adhibendus est, qui vulnusexugat. Neque hercules scientiam  
 psylli. præcipuam habent hi qui Psylli nominantur, sed audaciam  
 vsu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, vt quædam  
 etiam venatoria venena, quibus Galli præcipuè vtuntur, non  
 gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tutò estur,  
 ictus eius occidit, & si stupente ea (quod per quædam medi-  
 camenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, ne-  
 que percussus est, nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis  
 exemplum Psylli secutus, id vulnus exuxerit, & ipse tutus erit,  
 ille & tutum hominem præstabit. \* Illud, ne intereat, antè de-  
 bebant attendere, ne quod in gingiuis, palatove, aliave parte  
 oris vlcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus  
 est, sic vt id, quod percussus erit, in inferiorem partem incli-  
 netur. Si neq. qui exugat, neq. cucurbitula est, sorbere oportet  
 ius anserinum, vel ouillum, vel vitulinum & vomere. Vium  
 autem gallinaceum pullum per medium diuidere, & protinus  
 calidum super vulnus imponere, sic vt pars interior corpo-  
 ri iungatur. Facit id etiam hædus, agnúsve discissus, & cali-  
 da eius caro statim super vulnus imposita. Emplastra quoque,  
 quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephe-  
 sium, vel id quod ei subiectum est. Præfensque in aliquo an-  
 tidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium est exsor-  
 bere potionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud,  
 quo calor mouendus est, ne humorem intus coire patiatur.  
 Nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia  
 etiam vrinam mouentia, quia materiam extenuant, vtilia  
 sunt.

## E N A R R A T I O.

hi qui Psylli nominantur.

PSYLLORVM meminit Plinius Natu-  
 ralis historia libro XXI. capite xv. &  
 libro VII. capite II. in hunc modum: Cra-  
 tes Pergamenus in Helleffonto circa Parum  
 genus hominum fuisse tradit, quos Ophio-  
 genes vocant, serpentum ictus contactu le-  
 nare solitos, & manu imposita venena ex-  
 trahere corpori. Varro etiam nunc paucos

esse ita, quorum salua contra ictus serpen-  
 tum medeantur. Similis & in Africa  
 gens Psyllorum fuit, vt Agatarchides scri-  
 bit, à Psyllo rege dicta, cuius sepulchrum in  
 parte Syriam maiorem est. Eorum corpori  
 ingentum fuit virus exitiale serpentibus, vt  
 cuius odore sopirent eas. Mos verò liberos  
 genitos, protinus obiciendi sanctissimis earum,  
 eorumque genere pudicitia coniugum experiendi,  
 non profusis ientibus adulterino sanguine na-  
 tos. ser-



eos serpentibus. Hæc gens ipsa quidem propè internecione sublata est à Nasamonibus, qui nunc tenent hæc sedes. Genus tamen hominum ex his qui profugerant, aut quum pugnatum fuerat, absuerant, hodièque remanet in paucis. Simile & in Italia de Marforum gente durat, quos à Circes filio ortos ferunt, & ideo inesse iis vim naturalem cam. Hæc Plinius.

### Ergo quisquis exemplum Psylli.

QUISQUIS ad exugendum vulnus sese accingere vult, cibum antè sumpsisse debet, ac vino os colluisse, oleique momentum dum fugit in ore continere.

### Vium autem gallinaceum.

LONGE tamen præsentius erit reme-

dium, si unctionem adhibeamus: nam quum ignis facultas, inquit Aëtianus, quavis alia sit validior, simul veneno potitur, impeditque quo minus penitus serpat, adde quòd eius denicta portio locum dei curationi, quum videlicet, durante exulceratione, facilis sit venenieductio.

### Sin id non est necessarium.

NIHIL enim aequè calorem innatum auget, & cõseruat, ac meri portio, præterquàm quòd humores nocuos à partibus nobilioribus ad ignobiliores & extimas propellat; quo præsentius nihil in moribus venenatis est: nam & ob hoc summe commendantur balnea, ut materia foras euocetur.

### Speciales curationes aduersus ictus serpentium, & primò aduersus ictum aspidis.

HÆC aduersus omnes ictus communia sunt. Vfus tamen ipse docuit, eum quem aspis percussit, acutum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acutum quod forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo quoniam id quamuis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quo fit, ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo vi verisimile est, spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aceti vis & natura.

### ENARRATIO.

TRIA aspidis genera prodit Galenus, cherseam, chelidoniam, & pyadam, quam propriè sub aspidis nomine Celsus, Serenus, Dioscorides, atque alij auctores intellexerunt: hæc enim omnium perniciosissimum virus eiacularitur, erecto in priorem partem collo, ex intervallo quod satis esse coniciat, venenum in hominem fundit.

Huius generis fuisse traditur quam Cleopatra denicta ab Augusto vberibus affixit. Morsus autem aspidis acus punctura similis est, atque omnino exiguus sine tumore apparet; sanguis non copiosus, sed exiguus & niger distillat: subita oculorum hebetudo innadit, dolor corporis multiplex admodum, sed miris, nec sine voluptate comitatur; adeo

TI

ut sine:



ut sine dolore quodammodo pereant; color  
mutatur, & virefcit, stomachi erosio exi-  
gua infestat, frons continuo contrahitur,  
palpebra sine sensu velut in somno commo-  
nentur, atque inter hac morsprehendit, ne  
tertia quidem diei parte prolata. Hinc Pli-  
nius libro XXIX. capite IIII. Aspidēs, in-  
quit, percussos torpere & somno necant,  
omnium serpentum minimè sensibiles.

Vfus tamen ipse docuit.

ID quo acrimia, eò melius & convenien-

tius erit. dandum autem est, quousque aceti  
qualitatem circa dextram præcordiorum par-  
tem percipiant: lepar etenim morsus ab aspi-  
de primum privari sensu aiunt. Cæterum  
ad præmotionem victurus sit, nec se percus-  
sus, centauream cum vino tritam præbe bi-  
bendam: siquidem si enormat pharmacum,  
moriatur; sin minus, vivet. Auctor est  
Aëtius.

*Aduersus ictum scorpionis.*

*Heliotro-  
pium herba  
solaris.*

IN quibusdam etiam aliis serpentibus, certa quædam aux-  
ilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum  
medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt,  
quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt,  
quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, vn-  
dique veste circumdata, ne is fumus dilabatur, tum carbonem  
eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbæ so-  
laris, quam ἡλιότροπον Græci vocant, semen, vel certè folia ex  
vino. Super vulnus verò etiam furfures ex aceto, vel ruta  
syluatica rectè imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognoui  
tamen medicos, qui ab scorpione ictis, nihil aliud quàm ex  
brachio sanguinem miserunt.

ENARRATIO.

ASCORPIONE ictis locus quamprimum inflammatur, ac durescit, &  
plaga vehementissimus dolor consequitur,  
frigiditasque & stupor, circaque plagam &  
totum corpus frigidus sudor, & his qui iux-  
ta infernas partes percussi sunt, inguina ex-  
citantur atque intumescent: qui verò circa  
supernas, locus sub alis, & hac quidem leni-  
ter percussus adsunt. Validius autem ictis  
ardor circa plagam adest, quemadmodum in  
ambustis, & rubore suffunduntur, & ver-  
rucarum instar formicarum eruptio, circa la-  
bra & totum corpus, ut grandino se impeti-  
puit, facies dislorquetur, sordèque circa  
oculos adsunt glutinose, & lachrymæ vis-

cosæ. Plinius, Scorpium, inquit, vermicu-  
lus est venenosus, eo importunior cæteris,  
quod grauiore supplicio lenta per triduum  
morte conficit. Virginitus lethale semper  
ictu, & seminis ferè in totum; viris autem  
in matutino, exenuescunt canis, priusquam ali-  
quo fortuito ictu ieiunium egerant vene-  
num.

Nam scorpio.

SCORPIVS, ut auctor noster dicit, in  
puluerem redactus locoque vulnerato im-  
positus, tanquam vulneris sui medicus opitula-  
tur, ita iubente rerum nature dissidio quam  
ceteris nominant, quod testatur Plinius  
libro



libro xi. item Aegineta ac Aëlius, & præter eos Sereus hoc carmine :

At cui vulnus atrox incussit scorpius  
ardens,

Continuò capitur: tunc digna cedere  
tulit

Vulneribusque actus fertur reuocare  
dolorem.

ruta syluatica.

EFFICACIOR erit si eidem Galbanum  
splendidiore extraximus locoque inducimus, &

in vino dissolutum addatur, aut cum ipsius  
ruta decocto, aut cum ruta.

### Cognoui tamen medicos.

SANGVINIS mistio, etsi omnibus à  
virulento animali morbis conveniat, atque  
eis præsertim qui plethorici sunt, si venenum  
per corpus fuerit dispersum, nescio tamen an  
à scorpione ictos per sanare possit.

*Aduersus aranei, & scorpionis ictum.*

ET ad scorpionis autem, & ad aranei ictum, allium cum  
ruta rectè miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

### ENARRATIO.

PLINIVS inter araneas solum phalan-  
gium noxium esse existimat: Aegineta  
etiam aliud aranearum genus esse dicit, quod  
percuttis validos dolores circa media præ-  
cordia excitat, & ruborem, & urina diffi-  
cultatem: nonnunquam etiam & strangula-  
tum. Id murem catum, vel murem ara-

neum vocat Scribonius: Græci *μαράνη* ap-  
pellant. huius meminit in Theriacis suis  
Nicander.

allium cum ruta.

NON modo impositum allium remedio  
est, sed & si sumatur, vinumque meracius  
superbibatur, iuuabit.

*Aduersus cerastis, & dipsadis, & hæmorrhoidis ictum.*

AT si cerastes, aut diplas, aut hæmorrhoids, percussit,  
asphodeli, quod Aegyptiæ fabæ magnitudinem æquet, \* carapo-  
arefactum, in duas \* portiones diuidendum est, sic ut ei rutæ <sup>tium</sup>  
paulum adiiciatur. Trifolium quoque, & menthastrum, & <sup>portio-</sup>  
cum aceto panaces æquè proficiunt. Costumque & casia, & <sup>nes</sup>  
cinnamomum rectè per potionem assumuntur.

### ENARRATIO.

A Ceraste percussis elenatio & tumor  
plage insurgit, capitis clavi similitu-  
dine, ac totum corpus variculis modo astol-  
litur: emanat autem ex vulnere sanies,  
modò nigra, modò suppalida, & porraceo  
colore: genitale attingitur, mente alienatur,

oculi obscurascunt; postremò, convulsione  
rigentium instar pereunt. At qui à dipsade  
morsi sunt (est autem dipsas vipera species,  
à nonnullis prester, & causos appellata)  
siti intolerabili urgentur; ita ut etiam si  
quammaximè bibant, lenamen sitis nullum  
perferant

TT 2



persentiscant: manus omnes ita obstruantur, ut nec vomant, sudent, meiant, aut alius excrementis exonerentur; quo fit ut si ad lenandam suam multam bibant, distendantur venter, adeo ut inferre circa inguina, vel circa imum ventrem distumpantur. Ab hamorrhoidibus vel hamorrhoidibus percussos consequitur color isti loci cruentus, mali coloris & nigricans; granibus atque huiusmodi crebris excruciantur doloribus: in principio quidem ex plaga nihil essent, praeter paucum quippiam aquosum: ac macilentia, atque strigo a prorsus ob cruciatum constrictum redduntur corpora; progressu vero temporis, non solum e plaga promanat sanguis sed & reliqua si quae ante in corpore fuerint vulnera, iam diu cicatrice obducta, disruptis cicatricibus sanguinem fundunt. Quin & idem ex naribus fluit; idque potissimum si masculus fuerit qui momordit. alii quoque excrementa sanguinea sunt, cruor quoque is qui

amamat, serè in grumos concrevit. Quod si foemina fuerit, ex toto corpore sanguinem efflari continget, ita ut ex venarum radicibus, angulis oculorum, dentium gingivis sanguis efflatur atque distillet. In genere omnes dolore stomachi, & spirandi difficultate detinentur.

### asphodeli.

TANTVM antiquitas asphodelo tribuebat, ut ante portas villarum satum, remedio esse crederent contra veneficorum mortuum. Pyrazani exemplar loco asphodeli, perpetam spoli legi. Trifolium autem praesentissimum adversus omnium serpentium ictus remedium esse dicebant; adeo ut XXV. grana eius adversus omnia venena sufficere pro antidoto dicerent, neque aliter eo viendum quam contra venena censuerunt: efficacius autem reliquis bituminosum est.

### *Adversus chersydri ictum, & cerastis.*

**A**DVERSUS chersydri verò ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum \* p. ii. \*. vel porri succus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem ordeacea farina, aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerastes fecit, aequè valet.

### ENARRATIO.

**S**ERPENS hic, ut auctor est Aëlius, chersydri appellationem inde habet, quod in principio quidem in aquis degit locis, & hydrys, id est natix (sic enim vocat Plinius) ab ipsis aquis appellatur: postea verò siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, hoc est natricis terrestris nomen invenit. In terraigitur degens chersydros appellatur; & tunc sæpe seipso senior redditur, quod in humidis locis humido victu exsatiatur, nec purum venenum habeat:

siquidem, quemadmodum auctor est Aristoteles libro De natura animalium, serpentes non parum inter se differunt, pro loci, & regionis in qua sunt diversitate. Nam loca montosa, aspera & calida venenata magis producent animalia; omitto quod morum etiam diversitatem conciliant; montosa siquidem aspera & inaccessa loca, animalia omnis generis effratiora aspectu, & robustiora, producent, locis planis declinibus, & mollibus. Quare non debeat alicui mirum videri,



videri, si chersydri morsus, natricis periculosiores dixerimus. Natricis porro morsu vulnus factum, dilatur, & linefcens augetur, saniesque ex eo nigra, & copiosa, & fædi odoris, qualis ex depascense ulcere excernitur. Morsos consequitur vertigo oculorum, exolutio, vomitus biliosus, fætidus, ac motus quidam corporis totius inordinatus, ita

ut per ventrem quedam inordinata serantur.

### Imponendum autem.

CAPRINVM ftercus Græci propriè *εργαδ* nominant; id ex aceto ad viperarum morsus non inutile esse docet Galenus, adeo ut complures eo serenos dicat.

### Aduersus phalangii ictum.

**V**BI verò phalangium nocuit, præter eam curationem quæ manu redditur, sæpe homo demittendus in folium est, dandusque ei myrrhæ, & vuæ taminix par modus ex passi hemina, vel radicula semen, aut lolij radix ex vino, & super vulnus furfures ex aceto coctæ, imperandumque ut is conquiescat.

### ENARRATIO.

**PHALANGIUM** Italia ignotum est, teste Plinio, & est plurimum generum: Aëtiū sex ut plurimum numero esse dicit; ac primum quidem rhagium, id est acineum, vocari, figura rotundum, colore nigrum acino vuæ simile, & os quidem iuxta medium ventrem habet, pedibus brevisimis tamquam imperfectis, dolor à morsu eius, qualis à scorpione: lotium simile araneis textis. Alterum lupus appellatur, corpus latum ac volubile habens, partes verò circa collum ipsius incisa sunt, amplius autem & os eius eminentias tres habet. Tertium myrmecium, hoc est formicarum dictum est, formica maximè assimilatur capite; alio nigra guttis albis velut astris quibusdam distinguentibus, vesparum dolore torquer. Quartum crauocolaptes, sublongum est & viride stimulumque iuxta collum habet, atque si in quem irruat, locos circa caput petit. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet saxum & obduratum, linamenta verò per omne corpus similia animalibus illis quæ noctu lucernas circumvolitant. Sextum deinceps scolium sine vermicularum appellatum, sublongum est & macu-

losum, maximè circa caput. Et hac quidem de phalangiorum generibus ex Aëtio. Ceterum à morsu phalangiorum locus rubescit, & veluti aculeo punctus apparet, non tamen tumet, neque incalcescit, sed leniter rubidus frigore, & pruritu vexatur. Morsos autem molestat dolor assiduus, tremor, pallor, vigilia; quosdam etiam pudendi intentio, continua urinae excernende excitatio, nonnullis urinae difficultas: intumescit autem vniuersum corpus, faciesque, & maximè circa linguam partes, ut impediri habeat sermone. Sunt nonnulli, præsertim qui ab aculeo morfi sunt, qui si mingant, aquosa omnino reddant, in quibus quedam araneorum telis similia continentur; sed & iisdem vomitus similis excernitur; nonnullis etiam talia excrementa reiciuntur; magna tamen ex parte difficulter eadem subsequuntur.

### sæpe homo.

**NIHIL** æquè prodest morsis à phalangio, quam assidua balnea; aut fomenta spongiarum in calido aceto tinctarum, & sæpe ad plagam adhibitarum: nam nisi continuus vus sit, aut sæpe balneum reiteretur. parum admodum



admodum profuerit : quando cerum sit  
moxos quidem si quando in aquam calidam  
demittantur, dolore liberari, atque rursus  
posteaquam exempti fuerint, validius in-  
dolere.

& super vulnus furfures.

IDEM fecerit ficulneum cinis cum sale  
ex vino subactum : proderit etiam ulcera  
aqua marina fomentasse.

*Aduersus ictus Italarum anguium, qui minus ter-  
ribiles peregrinis sunt.*

\*bryonia  
\*argem.  
\*person-  
ta,

**V**ERVM hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto  
magis pestifera sunt, maximeque æstuosis locis gignun-  
tur. Italia, frigidioresque regiones hac quoque parte salubrita-  
tem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus  
quos satis proficit herba \*betonica, vel cantabrica, vel centau-  
rion, vel \*agrimonia, vel trixago, vel \*personina, vel marinæ  
pastinacæ, singulæ binæve tritæ, & cum vino potui datæ, &  
super vulnus impositæ. Illud ignorari non oportet, omnis  
serpentis ictum & ieiuni, & ieiuno magis nocere. Ideoque  
perniciosissimi sunt cum incubant. Vtilissimumque est, ubi  
ex anguibus metus est, non antè progredi, quàm quis aliquid  
assumpfuit.

#### ENARRATIO.

**A**NGVIS, ut auctor est Plinius, vene-  
natus non est, nisi per mensem infla-  
tus luna.

Illud ignorari non oportet.

CIBATIONE enim virulentia quodam-  
modo mitigatur, & ieiunis venenositas per  
corpus facilius distribuitur.

*Remedium generale aduersus omnia venena, vel in  
cibo, vel in potione assumpta.*

**N**ON tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in  
cibo, vel in potione sumpserunt. Primum, quia non  
protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem  
statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab  
interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen,  
ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere.  
Deinde ubi præcordia exhausta, bibere antidotum. Si id  
non est, vel merum vinum.

ENAR-



## ENARRATIO.

## Primum quia.

**S**I quis tamen in cibo aut potu suspectum habeat venenum, certis notis quale id sit deprehendet: ex odore enim & amaritudine cibi, & potus, ut auctor est Aërius, opinum dignoscitur; ex colore, cerussa, calx, gypsum; ex his vero quæ in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens mactati tauri sanguis; ex fetore autem & qualitate ac odore, rana rubra, lepus marinus; & reliqua omnia certis aliquibus signis discernuntur. Nam & præter hæc, post sum-

ptum venenum statim ac de repente à sumpto cibo varia accessiones irruunt: de quibus sigillatim hic enarrabimus.

## Commodissimum est.

**V**BI videlicet datum venenum adhuc dum in ventre est, inibi que per se nauseam facit: nam alioqui, si ad intestina usque penetrarit, & tormina circa umbilicum induxerit, magis fuerit necessarius clyster; quemadmodum etiam si ad vesicam devenierit, infusus in aqua & oleo laudantur.

*Specialia remedia aduersus quædam venena, & primò aduersus cantharidas.*

**S**VNT tamen quædam remedia propria aduersus quædam venena, maximeque leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbano, vino adiecto dari, vel lac per se debet.

## ENARRATIO.

**M**ALEFICORVM, inquit sexto Epidemion Hippocrates, lac, allium, vinum feruidum, acutum & sal remedia existunt; per malefica, venenata animalia intelligens: nam quod potissimum aduersentur, lac, vinum, allium, auctor est Dioscorides xxxix. capite libri sexti.

## Nam si cantharidas.

**C**ANTHARIDES gustum & odorem similem pici è cedro facta habent: potæ sto-

machi dolorem morsusque excitant, præcipueque vesica: quamobrem qui biberunt eas, difficulter urinam, & cum sanguine reddunt, exulcerata scilicet vesica: præterea animo sæpè deficiunt, dextræque præcordiorum parte inflammationem patiuntur: per alium ipsis excernuntur qualia in torminibus intestinorum egeri solent, & in tenebriosis, inquit Aëtianus, verrigines incidunt; denique mente alionantur.

## Aduersus cicutam.

**S**I cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est, deinde is vomere cogendus. Posteaque laser ex vino dandum. Isque si febre vacat, in calidum balneum mittendus. Si non vacat, vngendus ex calefacientibus est. Post quæ quies ei necessaria est.

## ENAR-



## ENARRATIO.

**C**ICVTAM potam caligo vertiginēque, ut nec minimum ē longinquo videre liceat, itēque mentis alienatio, & ar-  
tuum gelatio consequitur; ultimōque con-  
mulli praefocantur qui eam sumperunt, ni-  
bilq; sentiunt.

est: studendum tamen est ut ante vini sum-  
ptionem vomitu eandem, quoad fieri potest,  
educamus, quantumcunque alium ab hoc di-  
uersum ordinem describat auctor noster; &  
si quid eius ad intestina prolapsum sit, pur-  
gante medicamento enacnemus.

vinum merum.

Id non semel sed subinde faciendum

*Aduersus hyoscyamum.*

**S**i hyoscyamum, feruens mulsum bibendum est, aut  
quodlibet lac, maximè tamen asininum.

## ENARRATIO.

**H**YOSCYAMON qui biberint, caput  
grane venisque discentu habent: mente  
abalienantur ebrij, modò cum quadam  
verborum altercatione; unde & nomen al-  
terci trahit herba: postea sopiuntur, & omni

sensu carent, linescentibus membris eorum.  
Auctor est Scribonius.

aut quodlibet lac.

PRIVS tamen aqua mulsā saepius pota  
cogendi sunt per pinnam reicere.

*Aduersus cerussam.*

<sup>\*iuglandis</sup> **S**i cerussam, ius maluae, vel \* ius glandis ex vino contrita,  
maximè profunt.

## ENARRATIO.

**C**ERVSSAM qui biberunt, facillè depre-  
henduntur; linguam enim albam habent,  
commissurisque dentium albicantes: pra-  
eterea nausaeant; reiciunt potò medicamento,  
caligant magis magisque, vertigine quadam

urgentur; postea spiritus vine intercluditur,  
cum extremorum perfictione, & mentis  
alienatione ac pigro corporis motu, ac pra-  
focantur.

*Aduersus sanguisugam si epota est, & lac  
quod intus coit.*

**S**i sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est.  
Si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum  
aceto laser.

ENAR-



## ENARRATIO.

**S**ANGVISUGAM potam quinis per se facile deprehenderit: nam præterquam quod in faucibus molestiam titillationemque sentiat, sanguis purus etiam nonnunquam reicitur; quibus accedit, quod ventriculi os vellicatur.

aut coagulum.

POTISSIMUM agninum, leporinum aut porcinum, victoriati pondere bis terve datum.

*Aduersus fungos inutiles.*

**S**I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut \*epota, \*potanda aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi verò hi, & specie quidem discerni possunt ab vtilibus, & cocturæ genere idonei \*sunt. Nam siue ex oleo inferbuerunt, siue piri furculus \*fieri cum his inferbuit, omni noxa vacant.

## ENARRATIO.

**F**UNGORVM alij genere, alij copia offendunt: ac propterea auctor noster viles ab inutilibus quodammodo distinxisse videtur. integri sumpti strangulatis laqueis similes inducunt. Venenatos autem, aut inutiles fungos quoties quis deuorauerit, primum nauseat, nec quicquam magno opere reicit; postea stomachi, ventrisque & præcordiorum infinitos habet dolores: manant

sudores frigidi per artus, qui & ipsi gelantur celerrimè, nisi citò succurratur.

radícula aut epota.

PER radiculam raphanum intelligit; hæc enim his qui fungis strangulantur, iam cibo, quam potu salutaris est: sensum enim aciem, ut ait Dioscorides, excitat, ac vomitionem conciliat, qua presentini nullum est remedium.

*De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.*

**A**DUSTIS quoque locis extrinsecus vis infertur, itaque sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optimè curantur foliis, aut lilij, aut linguæ caninæ, aut betæ in vetere vino oleoque decoctis. Quorum quidlibet protinus impostum, ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiaque primò & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle, farina, vel \*myrrha, vel vino, creta ei-  
molia cum thuriscortice contrita, & aqua coacta, atque vbi

\*myrrhæ  
cum vino,

YV

vsus



vsus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus quælibet lipara. Sed idonea maximè est, quæ vel plumbi recementum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crusta cadant. Tum cruum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec vlus purum sit. Nouissimè siccum linamentum.

\* ordeï fa.

### ENARRATIO.

**A**DYSTOS appellat eos quos Græci *παραβύσιος*: quo vocabulo Galenus eos quoque notari auctor est, qui aqua calida vruntur; ita ut quacunque de causa, & quantis re quis aduratur, adustus vel *παραβύσιος* dicatur. Quando igitur in his qui vruntur, solutio continui fiat, ac crusta quedam superinducatur, statim in initio opus est calorem restringere, & ne pustula, aut inflammatio superueniat, repellentibus præcanere: quo facto, ad ea quæ siccant ac de-

tergent veniendum est, abstinendūque omnino ab his est quæ morsum aliquem inferunt. Nam Hippocrates ulcerata & fracta lenibus medicamentis nutrienda sunt, inquit, non secus atque adusta. quare an rectè, ac propriè exasperandam hîc dixerit cutim summam, indident alij: nam neque creta cimolia quantumcunque aceto diluta sit, cutem exasperabit; verum mitigabit potius inflammationem, compeſcēque ac repellet.

*De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum parte corrupta nascuntur.*

### CAPVT XXVIII.

*De carbunculo, & eius curatione.*

**A**B his quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est quæ interius corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. Eius hæ notæ sunt: Rubor est, superque cum non nimium pustulæ eminent, maximè nigra, interdum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius quàm naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est, eaque inflammatione cingitur, neque in eo loco leuari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus vrget, nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrumque. Idque



Idque vitium subtrahitis quasi quibusdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum tardius, supra quoque procedens inalbescit, dein liuidum fit, circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id graue est. Nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde \*vulnus, sicut caetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta vndique a viua carne diducta, quae trahit secum quicquid corruptum erat, purusque iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcunque vero medicamentum positum est, si satis proficiet, protinus a viua corruptam partem \*resoluit. Certeque esse fiducia potest, fere ut vndique vitiosa caro \*excedat, quae huiusce medicamen exest. Si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad vitionem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinendum a cibo, a \*vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

\*vulcus,

\*albugo.

\*resoluet.

\*excidat,

\*vinoque

## ENARRATIO.

**C**ARBUNCULUS, qui & ἀράχνη Græce dicitur, ut XI. II. Methodi medendi Galenus, est vitium quod ex humore crasso feruenteque nascitur, plerumque a pustulis incipiens; aliquando vero & sine his. Inter initia autem quibus vitium hoc inflat, scabunt particulam: mox oritur pustula quadam; qua rupta vulcus cum crusta gignitur. Sæpe vero non una oritur scabentis pustula; sed multe exiles velut milij sentina, crebra in particula residentes: quibus perruptis similiter crustosum vulcus superuenit. Febricitant omnes qui a carbunculo apprehenduntur; non minus quam qui erysipelate laborant; quare & iis iun loco citato, tum libro De arte curatiua ad Glanconem statim ad animi deliquium mitten-

dum sanguinem docet, quod videlicet sanguinis missio totum corporis habitum respuget & febrem extinguat.

## Et si circa stomachum.

Id mirum non est; praesertim quando carbunculus ipse ex causis popularum grafsantibus oriri soleat, & materia ipsa ad interiora, atque adeo partem aliquam principem regurgitare, quo fit ut putido hoc & venefico spiritu homo supprimatur atque suffocetur.

## Nihil melius est, quam.

SATIUS tamen est, nisi rebelis omnino fuerit materia, alia ratione propellere, neque (nisi ubi ad extrema iam fore ventum est)

vitionem



uisionem aggredi: Galenus enim, scarificandura locum docet; alij sanguisugas adhibendas existimant, quod nonnullis suspectum est, quod pro ratione attractæ materia non euacuent, purioresque tantum sanguinem exugant, crassiore relicto. Cataplasmata quæ quum reprimant modico, etiam digerant, & dissipent, adhibent: quale est quod ex plantagino conficitur, aut quod ex bis cocta laute

constat. Verum si eoque malum progressum sit, ut omnibus fere remediis rebelle sit, tum aut arsenicum, quod huic malo peculiariter aduersatur, aut simile quid quod ignis vim habeat, apponendum erit: & quum exirentis exquisitè morbis, extrema ad summum remedia optima sint, carbunculum ipsum protinus adurentur, & candente ferro extirpabimus.

*De Carcinomate, & eius curatione.*

\* exagitatum, i. irritatum  
\* è iec.

\* æqualis

Tactuque

\* aufertur.

\* profecit.  
al. profuit

**N**ON idem periculum καρκίνωμα affert, nisi imprudentia curantis agitata est. Id vitium fit maximè in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et \* in iecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, illæque immobilis, \* inæqualis tumet, interdum etiam torpet. Circa eum inflatæ venæ quasi recurvantur, hæque pallent, aut liuent, nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. \* Tactuque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quàm esse naturaliter debet; nonnunquam iisdem omnibus vlcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quæ vocant Græci κοινάματα, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque eius ruber est, aut lenticulæ similis, neque tunc \* fertur. Nam protinus aut resolutio nervorum aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quæ circa sunt, intenduntur, & intumescit. Nantque pessimum id genus est, fereque primum id fit, quod κακόνθησ; à Græcis nominatur. Deinde ex eo id καρκίνωμα, quod sine ulcere est. Deinde vlcus, ex eo thymium. Tolli nihil nisi κακόνθησ; potest, reliqua curationibus irritantur. Et quo maior vis adhibita est, eo magis quidam vsi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt. Quidam scalpello exciderunt. Neque vlli vnquam medicina \* profecit. Sed adusta protinus concitata sunt, & increuerunt, donec occiderent. Excisa etiam post inductam cicatricem, tamen reuerterunt, & caus-



& causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quominus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. Discernere autem \*cacoëthes, quod curationem recipit, à \*carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore & experimento. Ergo ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si leuatur malum, minuunturque eius indicia, procedere curatio potest, & ad scalpellum, & ad vitionem. Si protinus irritatum est, scire licet iam \*carcinoma esse, remouendaque sunt omnia acria, \*cacoëthes omnia vehementia. Sed si sine vlcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguiissimam, aut rhypodes emplastrum satis est. Si vlcus æquale est, ceratum ex rosâ iniiciendum est, adiiciendusque ei puluis ex contrita testa, \*ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Sed si id nimium supercreuit, tentanda squama æris est, quæ lenissima ex adurentibus est, eatenus ne quid eminere patriatur, sed ita, si nihil exacerbauit. Si minus, eodem cerato contenti esse \*debemus.

## ENARRATIO.

**R**ECTE monet Ioannes Tagalium libro primo Institutionum Chirurgicarum, Celsum nostrum contra Græcos carcinoma à cancro distinguere. Ita ut cancerum oriri & serpere dicat ab his quæ extrinsecus incidunt; carcinoma autem corrupta interius parte aliqua innasci.

## Id vitium fit.

**F**REQUENTIVS tamen in feminarum mamma, quam vlla alia corporis parte nascitur; quæ quod natura fungosa sit & inanes, crassissimam atræ bilis (unde hoc vitium nascitur) materiam possunt concipere.

## Circa locum aliqua.

**C**ANCROSVS tumor duritiem habet, & inequalitatem quæ tactu facile depre-

henditur. colorem præ se fert lividum, quæ videlicet inter rubrum & nigrum medius sit: circa locum affectum aliqua quasi puncta sentiuntur.

## Et nonnumquam.

**V**BI mitior fuerit humor melancholicus, latentem seu occultum, ut vocat Hippocrates, cancerum sine ulcere progignit; sin acrior maligniorque contingat, eum erodit, & cancerum facit ulceratum.

## Interdumque nullam.

**S**IC Galenus, Alias, inquit, confusa exiguæque, & quæ vulgum fortassis latere possint, affert symptomata; alias ita vehementia & magna, & cunctis evidentiâ, ut ne puerum quidem clam sint.



Nam protinus aut  
resolutio.

ISTHVC neque experientia comperisse  
contigit, neque apud quenquam probatum,  
quod sciam, auctorem legisse memini.

Namque pessimum  
id genus.

OBSERVVS admodum hic Celsus est,  
neque satis assequor quid velit: nam quod  
modo pessimum dicit, paulo post idem cura-  
tionem tantum recipere asserit; reliqua vero  
medicamentis irritari, atque quodammodo  
efferrari: *αὐχὼν* autem à Græcis vocari,

auctor est veterum more; ut qui cancre-  
tum vlcus malignum ac fœvum appellabant.

Neque vlli vniquam.

ALLVDIT ad XXXVII I. Aphorif-  
mum sectionis sexta: Cancros occultos me-  
lius est non curare: qui enim curantur, ci-  
tius pereunt; qui vero non curantur, longiore  
tempore durant.

Excisa etiam.

GALENVS excisa vlcera vix recipere  
cicatricem contendit, unde contingat ho-  
mines macie & doloribus consumptos, ocys  
quam si curationem non admisissent, ani-  
mam agere.

De Therioma, & eius curatione.

EST etiam vlcus, quod *ἑρπητις* Græci vocant. Id & per  
se nascitur, & interdum vlceri ex alia causa facto super-  
uenit. Color est vel liuidus, vel niger, odor fœdus, multus,  
& mucco similis humor. Idipsum vlcus neque tactum, neque  
medicamentum sentit, prurigne tantum mouetur. At circà  
dolor est, & inflammatio. Interdum etià febris oritur. Non-  
nunquam ex vlcere sanguis erumpit. Ad id quoque malum  
serpit. Quæ omnia sæpe intenduntur. Fitque ex his vlcus,  
quod *ἐρπητις* & *ἑρπιδιον* Græci vocant, quia celeriter serpendo,  
penetrandoque vsque ossa corpus vorat. Id vlcus inæquale  
est, cœno simile, inestque multus humor glutinosus, odor  
intolerabilis, maiorque quam pro modo vlceris inflammatio.  
Vtrunque sicut omnis cancer, fit maximè in senibus, vel his,  
quorum corpora mali habitus sunt. Curatio vtriusque eadem  
est, sed in maiore malo magis necessaria: ac primùm à victus  
ratione ordinandus est, ut quiescat in lectulo, ut primis diebus  
à cibo abstineat, aquam quamplurimā assumat. Alius quo-  
que ei ducatur. Dein post inflammationem cibum boni  
succici capiat, vitatis omnibus acribus, potionis quantum volet,  
sic ut interdum quidem aqua contentus sit. In cœna etiam  
vini austeri aliquid bibat. Non æquè tamen fame in his quos  
herpes vrgebit, atque in his qui therioma adhuc habebunt,  
utendum

\* At

\* cauo  
al. ouo

\* ordina-  
dum

\* sedatam  
infl.

\* verò



utendum erit. Et victus quidem talis necessarius est. Super  
 vlcus verò inspergenda est arida aloë, cenanthe, & si parum  
 proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est,  
 contegendus antè linteolo est, ne sub eo medicamento adu-  
 ratur. Si validioribus etiam remediis opus est, ad eas compo-  
 sitiones veniendum est, quæ vehementius adurunt. Quic-  
 quid autem inspergitur, auerso specillo infundi debet. Super-  
 danda cum melle sunt vel linamenta, vel olea folia ex vino  
 decocta, vel marrubium, eaque linteolo contegenda in aqua  
 frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque quæ tumor  
 ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplas-  
 mata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet, di-  
 ligenter nervis, si qui apparent, antè contactis. Adustum vel  
 medicamentis, vel ferro corpus, primum purgandum, deinde  
 implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

## ENARRATIO.

**N**OMEN ipsum per se malignum  
 admodum ac ferum vlcus indicat. cæ-  
 terum ad quem affectum referendum sit,  
 admodum dubito; præsertim quando nihil  
 commune habere video cum ferino Hippo-  
 cratis ulcere, libro De locis in homine.  
 Quando tamen eiusdem signa penitus paulo  
 mecum perpendo, idem ferè esse videtur,  
 quod Auicenna libro IIII. fen III. ca-  
 pite IX, ignis Persicus, atque ita quidem  
 eiusdem prunam, carbunculum, ignem au-  
 tem Persicum theyrioma esse dicimus; quan-  
 quam certi nihil hinc ausim pronunciare.

quod ἐρπητις.

**S**I flaua bilis acris sit ac compage cras-  
 sa, omnem cutem ad subiectam carnem  
 usque exulcerat, atque herpetem exeden-  
 tem aut æsthiomen dictum generat.

fit maximè in senibus.

**H**IPPOCRATES in viris fieri dixit  
 donec LX. annos transierint.

Aluus quoque ei.

**NON**VNQVAM etiam suffecerit diu-  
 reticis materiâ peccantem expurgasse: quan-  
 quam si leniter ducente aluum ac bilem tra-  
 hente medicamento purgetur aluus, admo-  
 dum proderit.

Super vlcus verò in-  
 spergenda.

**I**DEM præscribit Galenus libro De arte  
 curatua ad Glanconem: Exedentes, inquit,  
 refrigerari volunt; quemadmodum & alij  
 herpes, & erysipelata: non tamen medi-  
 camenta ferunt, quæ præterquam quod re-  
 frigerent, etiam humectare idonea sunt, sed  
 solum refrigerantia admittunt; præsertim  
 quæ exiccare possunt. Quare an per se uti-  
 lis sit chalcitis, alij viderint: mihi certe  
 nondum placere potuit; uti neque ea quæ  
 vehementius adurunt; nam quæ cum frigi-  
 ditate quadam reprimunt, commendari cer-  
 tum est.

De sacro



*De sacro igne, & eius curatione.*

**S**ACER quoque ignis, malis vlceribus annumerari debet. Eius duæ species sunt: Alterum est subrubicundum, aut mistum rubore atque pallore, exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper ferè pus, & sæpe rubor cum calore est, serpitque id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis vlcus continuatur, humorque exit, qui esse inter saniem, & pus videri potest. Fit maximè in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidum, inæqualiter tamen, mediumque sanescit, extremis procedentibus, ac sæpe id, quod iam sanum videbitur, iterum exulceratur. At circà proxima cutis quæ vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo ferè corpora seniora tentantur, aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maximè. Omnis autem sacer ignis, vt minimum periculum habet ex his quæ serpunt, sic propè difficillimè tollitur. Medicamentum eius \*fortissimum est, vno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius \*quo crassius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os vlcerum \*lædi, quo plus puris exeat, & id quod ibi corruptum corpus est, extrahat: sed tamen si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alui ductione opus est. In omni verò sacro igni neque lenibus, & glutinosis cibis, neque falsis & acribus vtendum est, sed his quæ inter vtrunque sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aues, exceptoque apro omnis ferè venatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerum, & balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quàm cibus debet. Ipsa autem vlcera si mediocriter serpunt, aqua calida: si vehementius, vino calido fouenda sunt. Deinde acu pustulæ quæcunque sunt aperiendæ. Tum imponenda ea, quæ putrem carnem exedant.

\* fortissimum

\* pus, quo

\* lædi,



dant. Vbi inflammatio sublata, vlcusque purgatum est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in vino cocta, atque contrita. Potest emplastrum vel Hieræ, vel tetrapharmacu, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hederæ ex vino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato vlcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

## ENARRATIO.

**N**ESCIO me hercules, qua ratione ducti, hodie quotquot serè sunt interpretes, Græcorum cryspellam, Sacrum ignem reddiderint: quando certum sit priscos illos Latinos medicos herpetem pro sacro igne usurpasse, quod vel ex hoc Celsi capite cuius manifestum enatur, qui singula quæ igni sacro ascribit, cum herpete conferet. Huic adde quod Plinius libro Naturalis Historia xxvi. capite xi. plura ignis sacri genera esse dicit, inter quæ medium hominem ambiens appellatur zoster, & homineæ encæ si cinxerit. Cui subscribere videtur Scribonius Largus, qui quum antè ignis sacri meminisset, statim zonæ, quam zosteræ Plinius vocari dixit, remedia describit, atque hanc quidem simpliciter herpetem vocari auctor est.

## Eius duæ species.

**G**ALENUS libro De tumoribus præter naturam, tres eius species enumerat; vti post eum annotauit Aetius: Nam si flava bilis, inquit, citra alterius humoris mixturam secreta iuxta partem aliquam consisterit, herpes appellatur affectio. Si quidè igitur crassa fuerit compage, & magis acris, omnem cutem ad subiectam carnem exulcerat. atque hæc species generis appellationem tulit, simpliciterque, ac citra appositionem herpes vocatur. Est etiam adhuc tertia herpetis species quæ miliaris appellatur, eod quod pustulas paruas, & multas in superficie cutis excitat milio similes. Oritur autem etiam ipse à bile, vtrum minis acris & calida quam

priores. Celsus, quod præcedente De theriomate paragrafo herpetis exedentis mentionem fecerit, sufficit hinc dixisse, duas tantum eius species esse. Dicitur est autem ἱερὴ, eod quod videatur ἱερὴ, hoc est serpere per cistem summam, modo hanc eius partem, modo proximam occupans, vt auctor est Aëtius; quod semper priore laborante persanata, propinqua eius vitium excipiat, non secus quàm ignis qui proxima quæq; depascitur, vbi ea quæ prius accensa erant, deficiente iam idonea materia, prius quoque extinguuntur.

## Omnis autem sacer ignis.

**H**IPPOCRATES secundo Prædictionum, Herpetos, inquit, minimè omnium vlcerum, quæ depascendo prosperunt, periculosi sunt: verum maximè difficulter submoueri possunt; quemadmodum cancri oculi.

## vno die febris.

**Q**UOD si ex sincera bile ortus sit herpes, nescio quàm conueniat febris: at si eadem permixta sit pituita, non omnino inuulsi eris, vt quæ calore febrili dissipari possit.

## Si non est febricula.

**Q**UAM conueniant hæc quæ enumerat Celsus, alij indicent: Hippocrates abstinentiam & aquam, tum in diutinis vlceribus, tum maximè recensibus conuenire dicit; atque à vino abstinendum: quia quanto liberalius corpus nutritur, & quo meracius vi-



num bibitur, eo plus sanguinis & aliorum succorum ad ulceratū locum fertur. Præterea idem in ulceribus omnibus quietem & otium plurimum convenire dicit. Si quis tamen ideo balneum, & ambulationem admittere velit, ut humores euocentur; per me integrum est: malim tamen ex Hippocratis præscripto quietem & abstinentiam.

### *Ipse autem ulcera.*

IN herpete Galenus nihil alienius quam humiditatem dixit, ac proinde frustra localia dicta medicamenta applicari, ante totius corporis purgationem: nam quantumcunque localibus exulceratam particulam curaveris, serpet tamen semper ulterius malum, ac cutim exulcerabit, nisi purgata sit bilis.

### *De Chironio ulcere, & eius curatione.*

\*duras,  
\*tenuis, o.  
malus.  
Neque i.  
v. n. i. e. t.  
vlla est in-  
flāmatio.  
Dolor  
\*humore

CHIRONIUM autem vlcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras \*duas, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed \*tenuis. Odor malus neque in ulcere, neque in eius \*tumore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit, ideoque nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusque renouatur. Fit maximè in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & vehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa fit ex his, Squamæ æris, plumbi eloti combusti, singulorum p. iiii. \*. cadmiæ, ceræ, singulorum p. viii. \*. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

### ENARRATIO.

INVETERATA, & quæ vix cicatricem recipiunt, alij chironia appellāunt, ut ait Paulus, seu Chirone medico peritissimo indigentia: alij Telephia, quod in tali ulcere Telephus consenuerit. Galenus libro 1111. De compositione medicamento-

rum secundum genera, Chironia ulcera vocata dicit, non mediocriter, sed maximè maligna contumaciāque. Nos, quemadmodum Commentariolo nostro De magnis lenibus ostendimus, sceleratica dicta ulcera esse putamus.

### *De ulceribus quæ ex frigore in pedibus, & manibus oriuntur, & eorum curationibus.*

χίρωνος  
hoc genus vl-  
ceru dicitur à  
Græcis, à La-  
tini Pernio.

FIVNT etiam ex frigore hyberno ulcera, maximè in pueris, & præcipuè pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulæ oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est, nonnunquam humor exit, sed



sed nō multus, qui referre vel pus, vel saniē videtur. In primis multa calida aqua fouendum est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliqua verbenæ ex reprimentibus. Si nondum ad apertum vlcus, æs, quàm maximè calidum quis pati potest, admouendum est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen, æqua portione cum thure \* contritū, cum vino adiecto, \* contritum, vino aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hīc quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

## ENARRATIO.

VLCERA hæc Latinis Perniones, Græcis χιμετλα dicuntur. Hesiychius χιμετλον, inquit, τὸ ἐν χειμῶνι γινόμενον ἢ ἀπὸ ψύχρους.

In primis multa calida.

HIPPOCRATES: Perniones, inquit, perimudere & calefacere oportet; ita ut quàm maximè calefacias igne & aqua. Paulus marinam aquam præfert.

## De struma, &amp; eius curatione.

STRUMA quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine, quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipuè fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec vnquam faciliè maturescunt, & siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque pōst medicamento est opus. Quibus id quoque accedit, quòd longo spatio detinent. Nascuntur maximè in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque fœminarum se reperisse, Chirurgicus Meges auctor est. Propter hæc & album veratrum rectè datur, atque etiam sæpius, donec \* ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent, quorum suprà mentio facta est. Adurentibus quoque quidam vtuntur, quæ exedunt, crustaque eum locum astringunt: tunc verò vt vlcus \* conterant. Quæcunque autem ratio curandi est, corpus puro vlcere exercendum, atque alendum est, donec ad cicatricem perueniat. Quæ cūm medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma malè habet, eum, si anguem \* edit, liberari. \* cedat.



## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES libro Prædictionum secundo, strumosa tubercula pueros plurimum infestare auctor est, & facillimè ex ipsis liberari. Senioribus verò pueris, inquit, & adolescentibus minus quidem orinuntur; verum difficilius ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valde sunt. Vocant autem strumas, quas Græci *χοιρίδες*, à porcis in quorum gutture adnatos quidam tiores reperiuntur strumis similes: vel quod prolifica videantur, ut auctor est Aëtius: ab unico etenim tumore, alij etiam quandoque enascuntur. Solent autem eas ita distinguere, sicuti docet Aëtius, ut inter se differant magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, vasorum complicatione: Magnitudine, quia alia parva, alia magne, alie media, aliæq; ingentes: Multitudine, quia plures, aut una

tantum generantur: Natura, quia aliqua maligna sunt, ut que attactu indolent, & medicamentis appositis deteriores redduntur, quas etiam, ut auctor est Ægineta, carcinodes aliqui dixerunt; notumque est omnibus, curationi que manu fit, ipsas non cedere: aliqua contra morigera sunt tum tactu, tum medicamentorum usus. In genere, quales quales sunt, per chirurgiam optimè curantur: ea observatione adhibita, ut si in collo struma sit, recta aut obliqua sectio fiat; sin circa alas, aut inguina, transversa, ob cutis reduplicationem.

## Plerumque iterum.

Id de malignis tantum, & que nondum extirpata planè sunt, intelligendum est; mites & parva facillè ex toto curantur.

## De Furunculo, &amp; eius curatione.

\* inflammatio,  
ne,

**F**URUNCULVS verò est tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore, maximeque ubi iam in pus vertitur. Qui ubi ad apertus est, & exit, super apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est. Sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt, imponi debet primum nō pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum. Expresso pure, nulla vltra curatio necessaria est.

## ENARRATIO.

**G**RÆCORVM Dithienos furunculos appellat, atque omnino periculi exortes dicit: Paulus tamen duplicem furunculi speciem facit, mitem, quoties sub sola cure coit; & perniciosam seu malignam, ubi

subteractis radicibus in superficiem erumpit. Dignosces id, ut auctor est Aëtius, tum visu tum tactu, locum circumquaque furunculi contrectans.

De phy-



## De phymate, &amp; eius curatione.

**P**HYMA verò nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius & planius, sæpe etiam maius. Nam furunculus oui dimidij magnitudinem raro explet, nunquam excedit: phyma etiam latius patere consuevit, sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Vbi \*euulsum est pus, eodem modo apparet ventriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascitur quidem. Quibus verò medicamentis discuteretur, supra propositum est.

\* diuisum  
al. diuul.  
est, pus  
cod. m. ap-  
paret: vêt.  
qui i. fu-  
runculo,  
n. i.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES generatim omnia tubercula *phymata* appellare solet: sic in Aphorismo, Vbi sanæ egrotant, inquit, tubercula aut phymata in corpore nascuntur; aphorismo XV. sectionis secunda. & sectione quarta, aphorismo penultimo: Quibus phymata urinarum meatum exercent, hi abscessu in vomicam erumpente liberantur. Specialim tamen phymata dicimus glandularum inflammationem, quæ & celeriter augetur, & ad suppurationem festinet.

Galenus Commento primo sectionis XIII. libri sexti Hippocratis De morbis vulgaribus: Ab iis, inquit, quæ ex terra progerminant, Græci homines *phymata* (hoc est tubercula) vocauerunt, eos præter naturam tumores, qui prorsus sine causa extrinseca proveniunt, sed potissimum eos hoc nomine vocant, quæ extra corporis superficiem extuberant: verum ob nominis alterius inopiam interdum & latus, pauloque naturalibus partibus aliores, hoc eodem nomine appellans.

## De Phygethlo, &amp; eius curatione.

**P**HYGETHLON autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distentioque vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricula, idque tardè maturefcit, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maximè aut in vertice, aut in alis, aut in inguinibus. \*Panem, ad similitudinem figuræ nostri vocant. Atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstraui. Sed cum omnes nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit: latius vitium ad suppurationem spectans. Idque ferè fit aut post febres, aut post dolores partis

Panum,  
Panis.

XX 3

alicuius,



\* nocenter  
adol.  
\* impri-  
mit.

\* quod-  
quamuis  
rub.

\* aqua co-  
cta, cui &  
olerum a-  
liquid re-  
ctè  
\* tantum  
modo  
\* maior  
\* durities,  
&  
\* quas  
\* istæ  
\* iamq. is  
locus pru-  
rit,

ima

alicius, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque innocenter indolescit, & sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest, maximeque, ubi altius pus mouetur. Sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquæ punctiones, & quod de subito durius non est, melius est: & quamuis non rubet, coloris tamen aliter mutati est. Quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor ruborque multo antè incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant, qualia & aliàs & paulò antè in Erysipelate proposui. Si iam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resoluant: qualis est ficus arida, contusa: aut fex mista cum cerato: quod ex adipe suilla coactum sit, aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, antè ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adiacere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex qua cocta rectè miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra reddidi, rectè sunt. Eadèque omnium curatio, tantummodo distat. Crudum est autem in quo magis quasi venarum motus est & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities. Et si maior abscessus est, horror aut etiam febricula permanet, penitusque condita suppuratio. Si pro his quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamque cutis prurit, & aut subliuidus, aut subalbidus est, matura suppuratio est, eaque ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitte. Tum si quæ in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoque partibus, si vna plaga exigua est, si medio-



mediocris suppuratio fuit, si non altè penetrauit, si febris non est, si valet corpus, æquè linamenta superuacua sunt. In reliquis, parcè tamen, nec nisi \*plaga est, imponi debent. <sup>\* magna</sup> Commodè verò \*vel super linamenta, vel sine his imponitur <sup>pl.</sup> lenticula ex melle, aut malicorium ex vino coctum. Quæ & <sup>\* mel</sup> per se, & mista idonea sunt. Siqua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malua contrita, vel fœni græci, linivæ semen ex passio coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non abstringit, sed modicè deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum vlcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, \*conveniuntque in vulneribus, expo- <sup>\* cõn. vul.</sup> sita sunt.

## ENARRATIO.

**PHYGETHLON** Latinis **Pannus** dicitur, estq; inflammatio erysipelatodes, aut eryspelas cum inflammatione: ac proinde quoniam mixtus affectus est, alterutrinus, inflammationis dico aut eryspelatis, remedia aut augenda, aut minuenda erunt pro superantis in mixtura ratione.

aut cucumeris radix.

**SYLVATICI** videlicet, quem & anguinum vocat Plinius.

Tum si qua in alis.

**GALENVS** bubones vocare solet, sunt tamen, ut libro De tumoribus ait, qui in alis & inguinibus phygethla tantum oriri dicant, utpote glandularum inflammationes.

*De Fistulis, & earum generibus, & curationibus.*

**N**ON NVNQVAM autem ex eiusmodi abscëssibus, & ex aliis vlcërum generibus Fistulæ oriuntur. Id nomen est vlcëri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis, habetque quædam in singulis locis propria. prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem aliæ breues sunt, aliæ altius penetrant, aliæ \*rectè intus ferun- <sup>\* recta</sup> tur, aliæ multoque plures transversæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplicesve ab vno \*ore intus orsæ, quæ tres sunt, aut <sup>\* ore orsæ, quæ intus</sup> etiam in plures sinus diuiduntur, aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad interiora



\* simplici,  
recta, int.

\* thoracēq.  
pen. malū.  
Ad

\* Si iā in  
esse vitii  
est, nec ne,  
id quoque  
d. p. & si  
iā eō sist. p.  
\* ultimo  
\* labitur  
sede qua  
inn.  
\* subsit,  
\* sciri po-  
test.

\* laue,  
\* osse

\* alterum  
inc. al. ite-  
rum

teriora perueniunt. Aliæ deinde facilē, aliæ cum difficultate curantur. Atque etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula \* simplici recenti intra carnem, adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt. Itemque si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vuluam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad inania, vt guttur, stomachum, \* thoracem penetrauit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, vt quò tendat, & quàm altè perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extracto specillo pater. \* Si verò os in vicino est, id quod disci potest, si iam nec ne, eò fistula penetrauit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod \* ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si elabitur specillum, nondum caries est: si non \* labitur, sed æquali innititur, caries quidem, verum adhuc leuis est. Si inæquale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago vbi \* subhæsit, ipsa sedes docet, peruenitque esse ad eam ex renixu \* pater. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples verò hæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris, cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus esse manifestum est. Cumque ferè iuxta sint caro, & neruus, & aliqua neruosa, quales ferè tunica, membranaque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera pertransierint. Si quidem ex carne: pus \* leue, album copiosius fertur. At ex neruoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex \* neruo pingue, & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulæ penetrarint, quia sæpe cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocauit, pus ferri, quod iam defierat, \* incipit, testaturque non solum alium sinum



sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem cum tendere. Sed si & in carne, & \* recens, & simplex \* recta, est, ac neque rugosa, neque caua sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore mouetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur; dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aris, vel æruginem, \* ex metallicis aliquid. Ex \* vel ex quo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idque ea parte qua tenuius est, \* altera antecedente \* alteram demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus ostendat. Quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo super imponendum, supraque iniicienda spongia, in acetum ante demissa, soluique quinto die satis est. Genusque victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius à præcordiis fistula est, ex interuallo ieiunum radículas edisse, deinde vomere, necessarium est. Verustate callosa fit fistula. Callus autem neminem fallit, *Callus.* quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaueris lacrymæ p. i. \*. gummi p. iii. \*. cadmiæ p. iiii. \*. atramenti futorij p. viii. \*. Ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallæ \* p. \*. æruginis sandaracæ, aluminis \* p. i. \*. Egyptij, singulorum p. i. \*. atramenti futorij combusti p. ii. \*. Aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis, quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adicitur, eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rasæ p. ii. \*. conterere, deinde ammoniaci, thymiamatis p. ii. \*. aceto liquare, \* eoque \* ex eoque infuso æruginem colligere. Idque ex primis medicamentis est. Sed ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis \* prodere, aut quibus \* hæc maximè in effectu sunt erodere. Satiusque est, vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrij astrictum \* eò illinere. Scilla quoque cocta & mista cum calce, callum exest. Si quando verò longior & transversa fistula est, demisso specillo contra

YY

princi-



\*vtrinque  
al vtrique.

\*foramen  
\*tot med.

principium huius incidi, commodissimum est, & collyrium vtrunque demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus (sic tamen ut brevis, intraq. carnem sit) collyrio vti non debemus, quod vnam partem curret, reliquas omittat: sed eadem medicamenta arida in calamum scriptorium coniicienda sunt, isque ori fistulae aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda: vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt, atque intus infundendum quicquid inditum est. Superponenda sunt quae refrigerent & reprimant. Nam ferè quae circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est vbi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta coniiciat, per auricularium clysterem fistulam eluere. Si plus puris fertur, vino: si callus durior est, aceto: si iam purgatur, mulso, vel aqua, in qua cruum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paulum adiciatur. Ferè verò fit, ut ea tunica quae inter \*ferramentum & integram carnem est, victa \*medicamentis tota exeat, infraque vlcus purum sit. Quod vbi contingit, imponenda glutinamenta sunt, praecipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, linamentum in modum collyrij compositum, tinctum melle demitti. Sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat, adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus, cum saepe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in vnum os iungat.

#### ENARRATIO.

**FISTULA** finis est callo obductum, aliquatenus indolens, in pluribus nascentis periculis: magna verò ex parte ex abscessibus oritur parum dextrè curatis. est autem translatum nomen, ut ait Galenus, à fistulis quibus mnsici vtiuntur.

Nonnunquam autem.

Sic Hippocrates sectionis sexta Aphorismorum, aphor. XLV, Vlcera, inquit, quae-

cumque annua sunt, aut diuturniora, os abscedere necessarium est, & cicatrices canas fieri.

Aliæ deinde faciliè.

HIPPOCRATES in Coacis Praenotionibus, Fistulae, inquit, difficillimae sunt, quae in cartilaginosis, & excarnibus locis sunt, & canae sunt, ac procedunt, ac sanie madent semper, & caruncula in ostio ipsius inest. Cu-



est. Chyram autem faciliores sunt, quæ in mollibus & carnosiss, & non nervosis existunt.

nendum dicit, atque ablendas fordes, ac deinde æruginem immittendam, atque ad septem usque dies faciendum.

### Ex nervo pingue.

NON solum ex puris qualitate fistulam ad nervum usque pervenisse indicabimus; verum etiam ex doloris sensu: punctione enim sensum, aut stuporis exhibebit. adhuc motus ille qui à nervo hoc proficisci solebat, seipso deterior apparebit, sed & in specilli tactu molestus sensus perceptus indicationem faciet. Humor autem inde latus tenuior est, similis ei qui ab ossibus defluit, non quidem oleosus aut pinguis (sicuti hic infert Celsus) sed glutinosus ac saniosus, ut ait Aëlius.

solutique quinto die  
satis est.

HIPPOCRATES tamen quotidie sol-

### Expediitissimum autem.

IOANNES Tagaulius ex Ægineta locum hunc in hunc modum restituendum arbitrat: æruginis rasæ \* p<sup>o</sup> xii. conterere, deinde ammoniaci thymiamatis \* p<sup>o</sup> ii. &c.

Ferè verò fit.

VARIANT hic exemplaria: alia etenim ferramentum, habent: Ioannes Casarius, Pinzanam lectionem reproband, quæ ferrumen habet, foramen legere maluit: mihi certè Pinzana magis aridet.

Neque ignoro.

IDEM quoque suadet Aëlius.

### De Meliceria.

EST etiam vlceris genus, quod & à faui similitudine *μελικερία* à Græcis nominatur; idque duas species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiore. Quod ubi maturefcit, habet foramina per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus, nec tamen ad iustam maturitatem pervenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti quàm in furunculo apparet, altiusque descendit. Rarè fit, nisi in \* scapulis. Alterum est minus super corpus \* capillis. eminens, durum, latum, subviride, \* subpallidum, magis ex \* super caput ulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus subpallidus, crassus \* subalbidum, stitudinem mellis aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intrà caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeò ut acutam quoque febrem mouere confuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponitur & ficus arida, & lini semen \* in multo coctum, & emplastra ac malagmata materiam educentia, \* quod in vino coctum aut quæ propriè huc pertinentia, suprà posui. Super alterum,

YY 2

&c.



& ea medicamenta, & farina\* ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & vuæ taminia pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum vlcus vsque ad sanam carnem excidi oportet, & vlcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ pus citent, deinde quæ purgent, tum quæ impleant.

## ENARRATIO.

**I**ANVS Cornarius, ut annotauit Pantinus, pro meliceria, melicerin legendum contendit: est autem affectio quam alij Cerion, Latini Fannum nominant; quæ quia foramina habeat maiora humorem similem mellis continentia, meliceris, hoc est fannum mellis nominatur. Celsus duas species meliceris ponit; per priorem quidem, quam maiorem esse dicit, propriè dictam melicerim intelligens; per posteriorem verò, affectionem quæ achor appellatur: est etenim hæc vlcusculum in capitis cute consistens; vel, ut ait Aëtius, tenuia foramina habens, per quæ tenuis sanies effluit, mediocriter viscosa. Galenus unicam tantum melicerim definiuit: quemadmodum Aëtius quoque & Ægi-

nera: neque fannum hunc cum meliceride confundunt, sed inter se distinguunt, ac diuersis capitibus de singulis tractant, de achoribus tamen, & fannis tanquam congeneribus morbis, eodem capite remedia causasque ac signa describunt.

Rarò fit, nisi in scapulis.

Ex Aëtio restitendum monet Pantinus capillis, quando in capite atque locis capillis obductis frequentius oritur malum. Quanquam si de propriè dicta meliceride, non de ceruo seu fanno intelligamus, rectè auctor noster intulerit scapulis maximè molestas esse melicerides.

*De Acrochordone, & Thymio, & Myrmecis, & Clauo, curationibusque eorum.*

**S**VNT quædam verò verrucis similia, quorum diuersa nomina, ut vitia sunt. Acrochordona Græci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius, idque modicum est, quia rarò fabæ magnitudinem excedit. Vix vnum tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plura maximeque in pueris, eaque nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. Ac \*Thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdu-

\* acrothymion.



rum, & in summo perasperum. Idque summum colorem  
 floris thymi repræsentat, unde ei nomen est, ibique facile fin-  
 ditur, & cruentatur, nonnunquam aliquantū sanguinis fun-  
 dit, fereque \*circa magnitudinem fabæ Ægyptiæ est, raro \*citra.  
 maius, interdum perexiguum, modò vnum, modò autem  
 plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum  
 partibus. Pessima tamen in obscœnis sunt, maximeque ibi  
 sanguinem fundunt. Myrmecia autem vocantur, humiliora  
 thymio, durioraque, quæ radices altius \*exigunt, maiorem. \*adigunt,  
 quæ dolorem mouent, infra lata, super autem tenuia, minus  
 sanguinis mittunt, magnitudine vix vnquam lupini modum  
 excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis, aut in infe-  
 rioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam qui-  
 dem etiam alibi, sed in pedibus tamen maximè nascitur, præ-  
 cipuè tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, dolorem-  
 que etiam, si non aliàs, tamen ingredienti mouet. Ex his  
 Acrochordon, \*siue Thymium sæpe etiam per se finiuntur: \*sic &  
 & quo \*minora sunt, eò magis. Myrmecia & clauus sine cu- \*maiora.  
 ratione vix vnquam desinunt. Acrochordon si excisa est, ἀκροχόρ-  
 nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. δόν.  
 Thymio clauoque excisis subter rotunda radícula nascitur, ὀύμιον.  
 quæ penitus descendit ad carnem, eaque relicta idem rursus  
 \*exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhaerent, ideoque ne \*exit.  
 excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum μύρμηκας.  
 subinde deradere commodissimum est. Nam sine vlla vi sic  
 emollescit, ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe  
 emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde  
 imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum, quem ex la-  
 pide molari contrito fecit. Cætera verò genera medicamen-  
 tis adurenda sunt. Aliisquæ id quod ex fece vini: myrmeciis  
 id, quod ex alumine & sandaraca fit, aptissimum. Sed ea,  
 quæ circa sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exulce-  
 rentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thy-  
 mium etiam ficus in aqua cocta.

YY 3

ENAR-



## ENARRATIO.

IOANNES Cesarinus annotavit hic à Celsi myrmecium in neutro genere usurpatum, contra aliorum tam Græcorum quam Latinorum auctorum consuetudinem, ut à quibus feminino genere myrmecia fertur. Paulus tamen Ægineta (sicuti Celsus libro IIII. capite XV.) neutro genere usurpat.

## Acrochordona Græci.

VERRUCA, inquit Ægineta, que acrochordon dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte habet basin angustam, & suspensa esse videtur: myrmecia autem, seu formicaria verruca sic dicta est, quod ad contactum dolorem eiusmodi exhibeat qualis à morsu formicæ animalis contingit. Ad frigora, inquit, Ægineta formicarum moribus similem sensum excitat. hæc non solum in palmis, aut inferioribus partibus pedum,

ut arbitratur Celsus, sed & in uniuerso corpore nascitur, frequentius tamen in iam dictis locis.

## Ac Thymion.

ABUNDANT certe hæc potissimum circa sedem, pudenda, ac media femora; rarius tamen in aliis partibus, atque ibidem (ut etiam infert noster auctor) pessima sunt. Solent autem ea ita distinguere, ut alia mansueta, alia maligna appellent: atque hæc quidem incurabilia dicunt; illa vero curata facilia.

## Clausus autem nonnumquam.

CLAVVS, inquit Ægineta, circinctus in orbem callus coloris candidi, clauorum capitibus similis, toto corpore, sed pedum solo digitisq; præcipue, enascitur; dolor sequitur, & incessus impedimentum.

## De pustularum generibus, &amp; earum curationibus.

**A**T pustulæ maximè vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. nam modò circa totum corpus par-  
 \*aspritudo tèmeve \*aspreudo quædam fit, similis his pustulis, quæ ex vrtica, vel ex sudore nascuntur, *ἐξανθήματα* Græci vocant, eaque  
 \*excedūt. modò rubent, modò colore cutis non \*exedunt. Nonnunquam plures similes varis oriuntur, nonnunquã maiores pustulæ luidæ, aut pallidæ, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato, subestq; his humor. Vbi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet, *ἐλκώδες* Græcè \*nominatur. Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel ex medicamentis. \*Ptydracion autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex pustulis verò nonnunquam etiam vlcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora: & modò tantum cum prurigine, modò etiam cum inflammatione aut dolore. Exitque aut pus, aut sanies, aut vtrunque. Maximeque id euenit in ætate puerili, rarò in medio corpore,



pore, sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quæ *ἰμμορδὲς* vocatur. Ea colore vel subliuida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est, & cum adaperita est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est, neque enim ea faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & ferè noctu. Vnde nomen quoque à Græcis ei Epinyctis impositum est. In omni verò pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere, abstinere ab omnibus acerbis & extenuantibus, eademq. nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc is qui iam robustus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet, simulque super eas nitrum inspergere, oleoque vinum miscere, & sic vngi. Tum descendere in solum. Si nihil sic proficitur, aut si *ἰμα-\** ius pustularum genus occupauit, imponenda lenticula est, detractaque summa pellicula ad medicamenta lenia transeundum. Epinyctis post lenticulam rectè herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœnigræci mista, sic, ut his inuicem rosa, atq. intubi succus adiciatur, donec mellis crassitudo fiat. Propriè ad eas pustulas, quæ infantes malè habent, lapidis, quem pyriten vocant p. viii. \*, cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adiciunturq. olei cyathitres. Sed prius vngi ex cerussa pustulæ debent, tum hoc illini.

\* malum  
maius.

## ENARRATIO.

**E**XANTHEMATA cutis sunt exulcerationes subrubicunda, & aspera; Hippocrates libro tertio Epidemion *ἐξάνθημα*, quoddam spontè è cute erumpant, in eaq. floreat, vocat. Plinius papulas, atque interdum pituita eruptiones appellat. At quæ prinatim *ἐξ ἀνθήματε* nominantur, inquit Aëtianus, à crassis humoribus cuti impactis, ut plurimum ubi densa est summa cuticula, conflantur.

*ἐλκώδες.*

**VARIANT** hic exemplaria: siquidem nonnulla *φλύκταινας* legunt: Pantinus helcydria rectius legendum arbitrat, quæ Galenus ulcerosas pustulas nominare solet.

## Pfydracion.

**PYNZANVM** exemplar phylacium non omnino malè habet: malim tamen Pfydrachiam scribere, sicuti Ioannes Ma-

maximus:



nardus omnino legendum suspicatur: est autem psyrachium pustula dolorem inferens circa sanici collectionem, eamq; ab ebulliente fervore, ut auctor est Aëlius, Græci ἐκζυμα vulgò appellant. Alexander Trallianus exigua capitis tubercula esse dicit, pustulæ similia, quæ summam cutem excidunt.

### Pessima pustula est.

EPINYCTIDES, ut auctor est Galenus, nomen sortite sunt, quod nocte nascantur: sunt autem ulcuscula sua sponiæ erumpentia pustularum specie, & subrubra; quibus apertis cruenta sanies defluit. Per diem non magnopere excruciant; per noctem autem gravis & magis quàm pro ratione ulceris dolor torquet. vide Pauli lib. II. cap. IX.

### De Scabie, & eius curatione.

\* aliàs,  
humor cutis rubicundus,  
al. humor durior c.  
r. al. durities cutis.

SCABIES verò est, \* durior cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit in quibusdam sanies, fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam citò. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis verò certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eò difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis est, ἀγέτω (id est feram) Græci appellant. In hanc quoque victus ratio eadem quæ suprà necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est, quod fit ex spodij, croci, æruginis, singulorum p. i. \*. piperis albi, omphacij, singulorum p. i. \*. cadmiæ p. viii. \*. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris p. i. \*. ceræ p. iiii. \*. picis liquidæ hemina, olei sextariis duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum auctorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ scilibræ, aceti cyathos tres. Crocum quoque, lycium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus rectè miscentur, & ex passo coquantur. Idque omnem pituitam ubique \* sustinet. At si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pice liquida mistum, sicut in pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulatur.

### ENARRATIO.

SCABIES à Græcis ὀΐα vocatur: runt tamen, quod lepra cum manifestis affinis admodum affectio cum Græcorum squamis cutem profundius per circulum lepra, ut rectè annotavit Manardus: Dissedepascatur; scabies autem, seu psora, superficiem



ficiem tantum variis figuris ladit, & furfuracea quaedam corpora remittit. Lepram melancholicus succus committit, ut auctor est Aetnarius: scabiē varij humores, eorumq; varia miscella, constituunt. communis viri- que est cutis asperitas & pruritus: si vero tenues acresque & serosae humiditates succi permiscantur, impetigines suboriuntur, quae facillime in scabiem ac lepram degenerant.

*ayelav.*

PER *ayelav*, scabiem intelligere videtur eam, quae crassiores succum, puta melancholicum, originis suae causam habuerit: haec enim non raro (sicuti secundo ab hac scriptum reliquit Celsus) in lepram Graecorum degenerat.

*De Impetiginis speciebus, & curationibus.*

**I**MPE<sup>T</sup>IGINIS, verò species sunt quatuor. Minimè mala est, quae similitudine scabiem repraesentat. Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ab ea, quia magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet, videnturque esse in ea quasi bullulae quaedam, ex quibus interposito tempore squamulae resoluuntur, certioribusque hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papulae ferè, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens: squamulae ex summa cute \* descendunt, rosio maior est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam nonnunquam \* prior temporibus & fit, & desinit, Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nam & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit, & late, & tarde \* eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit, neque ex toto tollitur, Nigra cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulaeque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulae similes, quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura atque fissa est, proceditque latius. Haec verò omnia maximè genera oriuntur in pedibus & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion autem nitri p. ii. \*. sulphuris p. iiii. \*. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur.

\* erodit.

\* descendunt,

\* nigra

\* & minus serpit, neque in certis temp.

ZZ.

ENAR-



## E NARRATIO.

**Q**UANTUM Scribonius Largus, & Celsus Aurelius lichena Græcis dictam, Latinorum impetiginem esse contendunt; Celsus tamen hic per impetiginem, Græcorum leprā intellexisse videtur, quemadmodum annotarunt Ioannes Mainardus & Fuchsius. Aliis tamen opinio hæc non satis placuit, quod videlicet apud Græcos nusquam quatuor lepræ species, ut hic à Celso impetiginis, describantur. Ego certè rem quodammodo in dubium vocarim; nisi potior eorum opinio videretur, qui per impetiginem, lepram Græcorum intellexerunt: nam, ut sequente paragrafo dicemus, papularum nomine lichenes seu impetiginem vulgo dictam à Celso intelligi certum est, quam interdum in impetiginem transire dicit: quod & de lichene Græci scribunt, quam in lepram non raro degenerare contendunt. Tertium porro atque quartum impetiginis genus Mainardus libro epistolarum medicinalium ad Ionthosin refert; cuius

Plinius meminit, principiumque elephantiasis esse dicit: Galenus tumorem parvum & durum in faciei cute esse ait, & qui à succo crasso congregetur; Latini Varum nominant. Verum, ut cum bona venia tanti viri quod sentio eloquar, nihil minus quam Ionthosin comprehendisse videtur; præsertim quando sequente libro capite V. speciatim de variis scribat. Nam quantumvis tertium genus quod nigrum vocari dicit, in tempore aut oriri, aut desinere dicit; subiungit tamen paulo post: hæc omnia genera maxime oriuntur in pedibus, & manibus, atque ungues quoque infestant, & c: vari autem faciei cutim tantum debonestant. Quo fit, ut quum obscurus admodum hic locus sit, ingenue nostram ignorantiam fateri potius duxerimus, quam alius erroris fenestram patefacere. Secundum verò genus, quod rubricam vocari dicit, ad quem affectum referam, nondum legisse memini.

## De Papulis, &amp; earum curatione.

**P**APULARVM verò duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leuiterque roditur: medium habet \*pauillo leuius, tardè serpit: idque vitium maximè rotundum incipit, eademque ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam *ἀγέλας*, id est, feram Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet, interdum etiam pilos remittit. Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur: sed levis papula, etiam si ieiuna saliuā quotidie defricatur, sanescit. Maior commodissimè murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Ut verò ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his \*vitij est: alterum ad idem Myronis, nitrī \*rubri, thuris, singulorum p. i. \*. cantharidum purgatarum p. ii. \*. sulphuris

\* paulo læ-  
uius,

\* vitium  
\* ruffi,



fulphuris ignem non experti tantundem, resinæ terebinthinæ  
liquida p. xx. \*. farina \* lolij semis, gith cyathos tres, picis  
cruda \* vnum.

\* lolij  
sext. iij.  
\* sext.

## ENARRATIO.

**Q**UANDOQVAM doctissimus, ac mihi  
quondam summa necessitudine in-  
tus, Hadrianus Iunius in suo Nomencla-  
tore dicat papulas, quæ & Boæ Plinio di-  
cuntur, esse puerilem morbum qui rubore  
corpore obsidet, nimirum exiles maculas, ru-  
bras aut purpureas, interdum etiam nigri-  
cantes, ἐξανθήματα Græcis dicta, quæ Gale-  
nus 6. Epidemion ἐξανθήματα καὶ ἡρόδω  
à milij similitudine vocat: & Leonartus  
Fuchsius eadem etiam duplicia esse conten-  
dat, sublimia videlicet & lata seu humilia,  
atque illa ab iis qui barbaram sequuntur me-  
dicinam morbillos vocari, lata verò vario-  
las: Mihi tamen, saluo illorum iudicio, au-  
ctor noster papulis suis idem asseruisse vi-  
detur, quod Græci lichenibus: siquidem, ut  
habet auctor Introductorij (sive is Galenus  
sive alius fuerit) lichen cutis affectus est;  
eiusque species duæ existunt, una tolerabilis  
mitiorque est, altera fera (ἀγέλη à Græcis  
vocari dicit Celsus) difficiliorque: squam-  
ula in his ex summa cute descendunt; sub  
quibus locus rubicundior ferèque exulcera-

tus apparet. Hanc Ægineta non raro in le-  
pram degenerare auctor est: Galenus De  
compositione medicamentorum localium, ex  
lichenē pforam & lepram ordiri contendit.  
Quæ si cum Celsi nostri papulis quis conse-  
rat, non poterit non fateri, easdem cum li-  
chenibus esse papulas: nam & papularum  
duo depingit genera, & ex his id quod fe-  
rum vocari dicit, in impetiginem interdum  
transire dicit. Huc si remedia conseras,  
atque eadem expendas, videbis papulis eadem  
adscribi remedia quæ & lichenibus, & vul-  
gò dictæ impetigini utilia esse censentur.  
Siquidem, ut vnum multorum loco in me-  
dium asseramus, Scribonius Largus, Galenus,  
Ægineta, ieiuni hominis salina mitiorem  
lichenem sanari contendunt: & Serenus  
Sammonicus capite XI. inquit:  
Si verò vitium est quod ducit ab im-  
pete nomen,  
Hoc matutina poteris cohibere salina.  
Celsus noster, Sed levis papula, inquit,  
etiam si ieiuni salina quotidie defri-  
catur, sanescit.

*De Vitiliginis speciebus, id est, de Alphi, & Melane,  
& Leuce, & earum curatione.*

**V**ITILIGO quoque, quamuis per se nullum periculum  
adfert, tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit.  
Eius tres species sunt. Αλφός vocatur, vbi color albus est, ferè  
subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ  
esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam  
intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia ni-  
ger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Λευκή habet  
quiddam simile alphi, sed magis albida est: altius descendit,  
in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc ser-  
punt, sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alphos & Melas in

ZZ 2 quibus



quibusdam variis temporibus & oriuntur, & desinunt. Leuce quem occupavit, non facile dimittit. Priora curationem non difficilissimam recipiunt, ultimum vix unquam sanescit: ac si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acuungi. Si sanguis exit, quod ferè sit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest: itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id verò, quod curationem recipit, imponenda lenticula mista cum sulphure & thure, sic ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Hirenaum auctorem refertur, Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adiecto aceto. His in sole vitiligo perungitur, deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Propriè quidem Myrone auctore eos, quos Alphos vocari dixi, hoc medicamento perungunt, sulphuris \* p. ii. \*. nitri p. iii. \*. myrrhæ aridæ contritæ acetabulum miscent, deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum hæc inducunt. Hi vetò quos Melanas vocari dixi, curantur, cum simul \* contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorem insperguntur, \* tum genus id vitiliginis defricatur.

\* quidam

\* p. 3. a-  
luminis scif-  
filiis p. \*. 3.  
nitri p. \*.  
iiii. myr-  
ri radice co-  
erita acetab.

\* contrita  
alcyoniū.

\* actum

## ENARRATIO.

VITILIGINVM, inquit Aëtius, quæ Alphi Græcis dicuntur, generatio eiusdem est speciei cum leuce & lepra; non tamen omnino in profundo caro in eis affecta est, sed summa tantum cutis, & velut squamula quadam vitilignes ipsa affixæ inhaerent; albæ quidem ex pituita, nigra verò ex atra bilis humore oloris. Ioannes Marinardus albam & morpheam Aniceum sub vitiliginis nomine comprehendit vult. & quoniam plurima quæ ad loci huius & aliorum intelligentiam de minoribus tumoribus & pustulis facere possunt, idem libro septimo

capite secundo in medium adducit, lectorem eò relegatum volumus.

## Leuce quem occupavit.

ÆGINETA tamen non omnem leucem incurabilem dicit: esse enim nonnunquam quando incisa summa cute sanguis effluat; & interdum rubicundiores cutem evadere, si panniculo laneo asperiore perficata fuerit: quod quories contigerit, spem sanitatis adhuc esse; sin lactea humiditas aut humor albus exeat, desperatam esse; quod nimirum caro, quam iam occupat, aliam formam inducit.

AVRE



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A


L I B E R S E X T V S ,

A B A L D V I N O R O N S S E O *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

C A P V T I .

*De vitii singularum corporis partium.*

*De capillis fluentibus.*



**D**IXI de his vitiis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant. Nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maximè quidem sæpe radendo succurritur. Adicit \* enim vim quandam ad \* etiam continendum ladanum cum oleo mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè fluunt. Nam quo minus caput quibusdam ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

E N A R R A T I O .

**C**ALVITIUM fit quoties ex defectu humorum, non ex malignitate eorumdem capilli desinunt; Græcis φαδάρεωσιs dicitur. videmus interim interdum ætate aliquibus pilis nudari caput: nonnullis etiam non ætatis vitio, sed ex morbo capilli defluunt; quod ex raritate cutis & penuria essentia generantis pilos fit: atque ob id auctor noster ea quæ vim quandam ad continendum habent, prodesse dicit; hoc est, ea quæ moderatè cutem densant, sic tamen ut ne refrigerent: quapropter moderatè astringentia admiscere oportet humectantibus pharmacis, quale inter alia est ladanum.

ZZ 3

C A P V T



## CAPVT II.

## De Porrigine, &amp; eius curatione.

**P**ORRIGO autem est, vbi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, ex quæ <sup>\* à cute</sup> acutæ resoluuntur, & interdum madent, multo sæpius siccæ sunt. Id quæ euenit modò sine vlcere, modò exulcerato loco: huic quoq. modò malo odore, modò nullo accidente, fere quæ id in capillo fit, rariùs in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neque ex toto inutile est. Nam bene integro capite, non exit. Vbi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quàm id, quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare, quàm id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magis quæ si <sup>\* is</sup> id etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein <sup>\* in super</sup> id super <sup>\* ad linea-</sup> ad lineam <sup>- dum</sup> iuuandum aliquibus ex leuiter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per hæc proficitur, vehementioribus vti licet, cum eo, vt sciamus, vtique in recenti vitio id inutile esse.

## ENARRATIO.

**P**ORRIGINEM Auicenna furfures vocat, Græci πυρρῆσι nominant: contingit autem hæc affectio à serosis humoribus; decidunt tenues & furfuraceæ squamulæ ex capitis cute citra exulcerationem, vt docet Paulus Aegineta: Celsus modò madere tanquam consortia exulcerationis (quæ

sies videlicet humor acrior cutim exulcerat) sæpius tamen sicca esse dicit, quæ à cute resoluuntur: atque ea quidem quæ vlcerato loco contingunt, mali esse odoris, neque omnino inutilia; quando capitis, hoc est, cerebri vitia ita commodissimè expurgantur.

## CAPVT III.

## De Sycofi, &amp; eius curatione.

**E**ST etiam vlcus, quod à fici similitudine σύκοσις à Græcis nominatur. Caro excrescit, & id quidem generale est.



est. Sub eo verò duæ species sunt. Alterum vlcus durum, & rotundum est, alterum humidum, & inæquale. Ex duro exiguum quiddam, & glutinosum exit: ex humido plus: & mali odoris. Fit verò vtrunque in his partibus, quæ pilis continguntur. Sed id quidem quod callosum, & rotundum est, maximè in barba. Id verò quod humidum, præcipuè est in capillo. Super vtrunque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum, & aqua\* coactum, aut ficum in aqua decoctum, aut emplastrum terrapharmacum ex aceto subactum, terra quoque eretria ex aceto liquata rectè illinitur.

## ENARRATIO.

**A**ETIVS Amidonius quando thymos excrecentes in ficos aut σίκωνας degenerare dicit, aliam ab hac fycosi intellexisse videtur: siquidem is circa pudenda femoræque frequentissimè, raroque in facie viri dicit: Oribasius plerumque in capite nasci auctor est: Celsus in barba & capillo mo-

lestam esse contendit; est tamen quando in reliquo corpore, quauquam rarius, contingat. Appellat autem ficos, ut auctor est Oribasius, germina quedam ad modum vlcærum rotunda, subdura, rubentia, quæ dolor etiam concomitatur.

## CAPVT IIII.

*De Areis, & earum curationibus.*

**A**REARVM quoque duo genera sunt. Commune vtrique est, quòd emortua summa pellicula pili primùm extenuantur, deinde excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris, increscitque vtrunque in aliis celeriter, in aliis tardè. Peius est, quod densam cutem, & subpinguem, & ex toto glabram fecit: sed ea quæ ἀλωπεκία nominatur, sub qualibet figura dilatatur, fit & in capillo, & in barba. Id verò quod à serpentis similitudine ὀφίαισις appellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum latitudinem non excedit, ad aures duobus capitibus serpit, quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est, hoc fere infantibus. Illud vix vnquam sine curatione, hoc per se sæpe finitur. Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. Quidam illinunt



illinunt adurentia ex oleo, maximeque chartam combustam. Quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam nouacula quotidie radere, qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radicular. Neque ante oportet desistere quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorio satis est.

## ENARRATIO.

**A**REARVM causam Galenus esse dicit humorum vitiorum redundantiam: atque ij quales quales tandem sunt, ex colore cutis capitis cognoscere licet; quando color, ut idem restatur, similis efflorescat humoribus. Aliquitus enim mutata cutis albidior apparet, piuita redundantis testis; aliquitus nigrior, melancholici humoris indicium; alius etiam pallidior, biliosi humoris exuberantis certissimum testimonium. Curare autem singulos affectus pro humoris varietate oportet, ac prapurgato corpore discoloris medicamentis vitendum est, quando nihil alienius sit quam repellentia adhibere. Alopecias autem dictas volunt, quod vulpitus peculiare sit vitium.

## CAPVT V.

## De Varis, &amp; Lenticulis, &amp; Ephelide, &amp; eorum curationibus.

**P**ENE ineptiae sunt, curare Varos, & Lenticulas, & Ephelidas. Sed cripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas supra posui, Vari, Lenticulaque vulgo nota sunt, quamvis rarior ea species est, quam Graeci vocant, cum sit ea Lenticula rubicundior, & inaequalior. Ephelide vero a plerisque ignoratur, quae nihil est, nisi asperitas quaedam, & durities mali coloris. Caetera non nisi in facie, Lenticulae etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. De qua per se scribere alio loco, visum operae pretium non est. Sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, & interpositis pluitibus horis manere eluendum est, oleoque leuiter vngendum.



dum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia verò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani\* magmatis, cretæ cimoliæ subcærulæ, nucum amararum, farinæ ordei, atque erui, struthij albi, sertulæ campanæ seminis. Quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquuntur, illitumque à vespere vsque manè eluitur.

\* croco-  
magma-  
tis,

## ENARRATIO.

VARI, ut diximus, exigui & duri in facie tumores sunt, qui ubi suppurrati fuerint, evanescent; idèus Greci nominant. ut plurimum verò eos infestant, qui barbam unguere assolent, & quibus sanguis è naribus profluere solet. Ephelis est tuberculum & affredo cutis in facie, ex inflammatione aut ardore solis prognata. Ζάκτιος, vel Ζάκτιος, seu φακός, ut alia habent exemplaria, pustula aut tumor quidam est,

sugillatis non omnino dissimilis, deducto vocabuli etymo ἀπό τῆς ζάκτιος, quod percussere significat.

## myrobalani magmatis.

MAGMA myrobalani vocas retinenda ab expressa myrobalano reliqua: ea enim lenticulis, psoriæ, varis commodissimè adhiberi auctor est Dioscorides.

## CAPUT VI.

*De oculorum morbis, curationibusque eorum, & primò de his morbis, qui lenibus medicamentis curantur.*

SED hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus verò, & variis casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & usum, & dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt. Protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt, ex quibus quid euenturum sit, colligere possimus. Nam si simul ac lacryma, & tumor, & crassa pituita coeperint, si ea pituita lacrymæ mista est, & ea lacryma calida est, pituita verò alba, & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lacryma multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idque in vno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est. Idque lippitudinis genus minimè cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnunquam per duos menses durat, sed quandoque finitur. Si pi-

\* si simul

aa

tuita



pituita alba & mollis esse incipit, lacrymaeque miscentur, aut si  
 ea simul<sup>\*</sup> haec utrumque oculum inuaserunt, potest esse breuior,  
 sed periculum vicerum est. Pituita autem sicca & arida do-  
 lorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulce-  
 rauit. Tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine vlllo  
 periculo est. Si siccus quidem, sed cum dolore est, ferè ex-  
 ulcerat, & nonnunquā ex eo casu fit, vt palpebra cum oculo  
 glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pu-  
 pillisve est, vbi super magnum dolorem lacrymae salsae, cali-  
 daeque cunt, aut etiam si tumore<sup>\*</sup> infinito diu lacryma cum

<sup>\*</sup> finito

<sup>\*</sup> candida,

<sup>\*</sup> ex

pituita profluit. Perius etiamnum est, vbi pituita<sup>\*</sup> calida, aut  
 liuida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à tem-  
 poribus ad oculos dolor peruenit, nocturna vigilia vrget. Si-  
 quidem sub his oculis plerunque rumpitur, votumque est,  
 vt tantū exulceretur. Intus ruptum oculum febricula iuuat.  
 Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est. Si<sup>\*</sup> de nigro  
 aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum cras-  
 sum est, etiam post curationem vestigium aliquod relin-  
 quit. Curari verò oculos sanguinis detractione, medica-  
 mento, balneo, vino, vetustissimus auctor Hippocrates  
 memoriae prodidit. Sed eorum tempora, & causas pa-  
 rum explicuit, in quibus Medicinae summa est. Neque mi-  
 nus in abstinentia, & alui ductione saepe auxilij est. Hos  
 igitur interdum inflammatio occupat, vbi cum tumore in  
 his dolor est, sequiturque pituitae cursus nonnunquam co-  
 piofior vel acrior, nonnunquam vtraque parte modera-  
 tior. In eiusmodi casu prima omnium sunt, quies & ab-  
 stinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet, sic  
 vt à sermone quoque abstineat. Nullum cibum assume-  
 re, si fieri potest, ne aquam quidem: sin minus, certè quàm  
 minimum eius. Quòd si graues dolores sunt, commo-  
 dius secundo die; si tamen res vrget, etiam primo sanguis  
 mittendus est, vtique si in fronte venae tument, si firmo cor-  
 pori materia superest. Si verò minor impetus, minus acrem  
 curationem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertiove  
 die, duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his  
 auxilium



auxilium desiderat. Satisque est uti quiete, & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita tenuior atque acrior fiat. Sed secundo die dari debet id, quod leuissimum videri potest ex his, quæ pituitam faciunt crassiorem, qualia sunt oua sorbilia. Si minor vis urget, pultrula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibus diebus, quantum inflammationi detrahatur, tantum adici cibi poterit. Sed generis eiusdem, utique ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his quæ extenuant, sumatur, nihil potui præter aquam. Et victus quidem ratio talis maximè necessaria est. Protinus autem primo die croci p. i. \*. & farinæ candidæ quàm tenuissimæ p. ii. \*. excipere oportet oui albo, donec mellis crassitudinem habeat, idque in linteolum illinere, & fronti agglutinare, ut compressis venis pituitæ impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiat, nihil interest. Super inungi verò oculi debent, sic ut croci quantum tribus digitis comprehendendi potest, sumatur: myrrhæ ad fabæ, papaueris lacrymæ ad lenticulæ magnitudinem, eaque cum passo conterantur, & specillo super oculum inducantur. Aliud ad idem: Myrrhæ p. i. \*. mandragoræ succi p. ii. \*. papaueris lacrymæ p. ii. \*. foliorum rosæ, cicutæ seminis, singulorum p. iiii. \*. acaciæ p. iiii. \*. gummi p. viii. \*. Et hæc quidem interdiu. Noctu verò, quò commodior quies veniat, non alienum est superimponere candidi panis interiorè partem ex vino subactam. Nam & pituitam reprimat, & si quid lacrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id, & durum propter magnum oculorum dolorem videtur, oui & album, & vitellus in vas defundendum est, adiiciendumq. eo mulsi paulum, idque digito permiscendum. Vbi facta vnitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superque oculos imponi. Ea res & leuis est, & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque ordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mista, commodè imponitur. Neque ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus



\* *agro* est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant, & hoc superimponi satis est, quia & reponi ab \* ipso commodè potest: & cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ \* *ἀνέσδωρα* Græci vocant. Satisque est puero, quod erui, viro quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum verò oculum primo die, nisi \* *modica* inflammatio est, nihil rectè coniicitur. Sæpe enim potius concitatur eo pituita, quàm minuitur. A secundo die graui quoque lippitudini per indita medicamenta rectè succurritur, ubi vel iam sanguis missus, vel aluus ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse, manifestum est.

## ENARRATIO.

**M**ORBI oculos infestantes, ut varij atque multiplices sunt; sic variis sedibus vagantur: alij siquidem oculi propria agnitiones sunt, ut sunt ophthalmia, chymosus, pterygia, œdemata; alij communes sunt oculis atque ciliis; in quo albo comprehenduntur xerophthalmia & sclerophthalmia: alij verò circa cutem ciliorum sunt, ut sunt steatomata & melicerides: alij intus circa cilia consistunt; cuius generis sunt sycofis, & grando: rheades canthorum seu hircorum morbus est, caligo ceratoecidis tunica. Circa rhagoiden tunicam oriuntur staphylomata, mydriasis, phthisis, hypoplasmi pupille: suffusio in ipso rhagoidis foramine consistit: glaucosis vitium est crystallini humoris.

## Qui cum magnam partem.

SIC Aniceus, Cruciatu, inquit, lumen omnium maximè excruciant, est enim oculus acerrimi sensus.

## Protinus autem orta.

LIPPITUDO seu ophthalmia est oculorum phlegmone; ex accidenti tamen oculorum morbus esse videtur, quando, ut passim testatur Galenus, aliud nihil sit quàm in-

flammati tunica os capitis & calvariam ambientis.

## Nam simul ac lachryma &amp; tumor, &amp;c.

TOTA hæc periculis ex Hippocratis secundo de Prædictionibus desumpta est: ac proinde quoniam locis aliquot hic restitutus est Celsus, Hippocratis verba subiungemus. Dicit autem sic: Oculi porro lippientes optimè permittantur, si & lachryma & sordes, & tumor simul inceperint: si verò lachryma sordi fuerit permixta, & non valde calida, sordes autem alba fuerit & mollis, & tumor lenis, solutus; si ita hæc se habuerint, oculus conglutinabitur ad noctes, ut doloris exorsus sit: atque hoc modo res minimè periculosa fuerit, ac minimè diuturna; si verò lachryma procedit multa, & calida cum paucissima sorde, ac paruo tumore, atque hoc ex altero oculo tantum, tunc diuturnum valde sit malum, verum non periculosum; & doloris exorsus est hic modus: & indicationem in his maximè expectare oportet, primam quidem ad vigesimam diem; si verò hoc tempus transmittat, ad quadagesimum expectanda est; si verò neque in his diebus sedetur, in sexaginta indicatur. Per totum autem tempus hoc sordem considerare oportet,



oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maxime sub indicationis tempore; si enim desinet, hac faciet. At si utrique oculi hac perpetuantur, in maiori periculo sunt ne ulcerentur: verum indicatio brevioris temporis erit. Sordes autem sicca valde dolorosa sunt, sed cito indicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si vero tumor magnus fuerit, dolorisque exorsus & siccus, periculo vacat; si vero cum dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculum est ne ulceretur oculus & concreseat. Sed & gravis est tumor si lachrymam continuam habeat, itemque dolorem: si enim lachryma procedit calida ac salsa, periculum est, & pupillam exulcerari & palpebras. Si vero tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, viris quidem palpebrarum eversionem praedicere oportet, mulieribus autem ac pueris exulcerationem ac subversionem palpebrarum. At si sordes pallida ac limida fuerint & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum incubuerint, & vigilia his accesserint, necesse est ulcus in oculo factum esse, & tumor est quoque ut talis impatitur. Prodest autem succedens febris, aut dolor ad lumbos innixus. Haecenus Hippocrates. Celsus passim punitam crassam pro sordibus reddidit.

### Nam simul ac.

LEGITO ex iam citato loco, Nam si simul.

### sed quandoque finitur.

LEGE quandoque ante finitur, ut quadragesimum diem intelligamus, quo nonnunquam solui morbum dixit Hippocrates.

### in palpebris pupillisve.

LEGE pupillisque.

### Peius etiamnum est.

OMNIA ferè exemplaria sic habent, idq; mendose admodum; solum Oportini reliquis rectius, atque adeo Hippocrati & Celsiq; mentem exprimens, etiamnum legitur.

### Curari verò oculos.

HIPPOCRATES sectionis sextae Aphorismo XXXI. Dolores, inquit, oculorum meri potio, aut balneum, aut vena sectio, aut medicamentum epotum soluit. Meri quidem potio eos oculorum dolores sanat, qui ex copia sanguinis crassioris in venulis oculorum circa plenitudinem totius corporis contenti, procreantur: potest enim, ut auctor est Aegineta, vinum calefacere, vacuare & obstructions tollere; ac tale quidem potissimum est, ut auctor est Aetius, fulvum tenue, antiquum. Balneum autem, ut docet Galenus, eis prodest qui ab acerbis humoribus ad oculos fluentibus circa corporis plenitudinem oriuntur. Per balneum autem intelligit, balneum aquae dulcis, ut docet Paulus; hoc etenim dolores mitigat, acres humores evocat atque contemperat. Fomentum autem, auctore Galeno, confert, ubi nihil in oculos confluit, dissolvit enim eam quae in ipsis est superfluitatem. Sanguinis verò missione si universum corpus plenitudine laboraverit, nihil utilius est; ut quae sola à gravissimis ophthalmiis liberare possit, quemadmodum docet libro De sanguinis missione Galenus. At purgatio, si malis humoribus redundet homo, non minus quam phlebotomia ex usu est: quod confirmat Hippocrates libro De visu, Ad lippitudinem annuam, dicens, ac populareum conducit capitis purgatio & ventris inferni.

### Neque minus.

IDEM suadet Hippocrates libro De visu.

### Neque tamen in lippientibus.

QVOD hic oculis lippientibus panem ex lacte exhibet Celsus, contra Hippocratis mentem, atque adeo ipsam rationem esse videtur: nam Hippocrates lac dare caput dolentibus & febricitantibus malum esse auctor est, quod lac suis vaporibus caput perat atque afficiat: Verum quoniam variae sunt lippitudinis causae, aliisque alia siccior sit, non cuius prodesse dicemus panem lacti infusum,



sum, sed citantur quæ siccior sit, & quæ ab acerbis succis originem trahit; obviandis enim lac, hebetatque humorum acrimoniam, ut paragrapho de oculorum carbunculis annotauimus.

**Myrrhæ p. i. \*. mandragoræ.**

ISTHVC tanquam narcoticum non nisi maxima urgente necessitate admiserit Galenus.

& cum malo cotoneo.

SEMINA cotonei, quam malum ipsum, præulerim; ut quæ venenositati inflammationum strenuissime resistent: quamquam & ipsum cotoneum summe commendetur. nisi immodica inflammatio est. Pynxanum exemplar male habet nisi modica inflammatio est: legendumque est nisi immodica, sicut reliqua omnia habent.

*De diuersis oculorum collyriis.*

**M**ULTA autem multorumque auctorum collyria ad id apta sunt, nouisquæ etiam nunc misturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modicè reprimentia, facillè & variè misceantur. \* Ergo nobilissima exequar.

\* Ego nobilium ex-  
scilicet au-  
storum.

**ENARRATIO.**

**V**ARIA admodum medicamentorum ocularium materies existit; alia enim acrimoniam leniunt, alia contrariam his temperiem obtinent, recludendis vacuandisque iis quæ diu impacta fuerunt, accommodata: nonnulla sordines abstergunt; alia

his vicina sunt, smectica dicta ab exterendis sordibus; alia concoquunt, ac discutiunt; nonnulla etiam astringunt. At ex compositis oculorum remediis alia delinuntur, simplici enimque denominationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria vocantur.

*Philonis collyrium.*

**E**ST igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodij, gummi, singulorum p. i. \*. papaueris lacrymæ combustæ p. i. \*. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primùm per se teri, deinde mista, iterum adiecta paulatim vel aqua vel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

Gummi

\* præstat,

*Dionysij collyrium.*

**D**IONYSII verò collyrium est, papaueris lacrymæ combustæ, donec tenerescat, p. i. \*. thuris combusti, gummi singulorum p. ii. \*. spodij p. iiii. \*.

inarefcac,

Cleonis



*Cleonis collyrium.*

**C**LEONIS nobile admodum, papaueris lacrymæ frictæ  
 P. I. \*. croci P. I. \*. gummi P. I. \*. quibus cum terun-  
 tur, adicitur rosæ succus. Aliud eiusdem valentius: Squamæ  
 \* aris quod *σφουγγα* appellant, P. I. \*. croci P. II. \*. spodij  
 P. III. \*. plumbi & eloti, & combusti P. VI. \*. gummi tan-  
 tundem. Eius aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa  
 pituita profluit. Castorei P. 3. aloës P. L. \*. croci \* P. L. \*.  
 myrrhæ P. II. \*. lycij P. III. \*. cadmiæ curatæ P. VIII. \*. stibis  
 tantundem, acaciæ succi P. XII. \*. quod cum gummi miscuit,  
 liquidum in \* pyxidula seruatur. Theodotus verò huic  
 compositioni adiecit papaueris lacrymæ combustæ P. I. \*. aris  
 combusti & eloti P. II. \*. nucleorum palmarum combusto-  
 rum P. X. \*. gummi P. XII. \*.

\* ferri aut  
 chalybis

\* pyxidula

\* aliàs: nu-  
 cleos pal-  
 marum co-  
 bustos nu-  
 mero x.

## ENARRATIO.

## Cleonis nobile.

**E**ST & aliud Cleonis collyrium, quod  
 Galenus & Aegineta describunt: re-  
 cipit autem, pompholygos, plumbi, singulo-  
 rum uncias v. croci 3 ss. squammæ aris  
 quod stomoma dicitur 3 i. gummi 3 ii.  
 adicitur aqua pluvialis. Atque hic Ianus  
 Cornarius commentariis suis in librum pri-  
 mum De compositione medicamentorum lo-  
 calium squammæ ferri legendum existi-  
 mat: quanquam Celsus noster, atque eundem  
 sequitur Plinius pro stomomate aris squam-  
 mam reddiderint: Est enim stomoma, in-  
 quit, ferri perpurgamentum, & ad acies  
 confirmatum. Ponitur tamen a Dioscoride  
 inter medicamenta: verum ab aris squamma  
 distinguit, ut patet legenti Dioscoridem capi-  
 tibus XLIX. & L. libri quinti. Andreas  
 Matthiolus nec aris, nec ferri squammam  
 esse contendit, commentariis suis in Dioseo-  
 ridem, sed chalybis tantum purissimi, &

ad acies confirmati: auctoritate Galeni du-  
 ctus, qui scribat aris squammam principem  
 locum in desiccando inter ceteras obtinere,  
 ferri verò maiore astringendi vi, quam hæc  
 pollere, & hac etiam maiore stomomati:  
 ad hæc quod Galenus dicat, aliq̃ esse squam-  
 mam aris, aliam ferri, aliam stomomati.  
 Docet porro stomomati conficiendi rationem  
 Aristoteles libro quarto Meteororum in hunc  
 modum: Τὴν αἰσθητὴν δὲ καὶ ὁ ἀεζαομένης  
 οὐδὲν ἔστιν, ἀλλ' ὁ ὑγρὸς γίνεσθαι, καὶ πάλιν  
 πύρρον εἶναι. καὶ τὰ στομάματα ποιοῦσι δυνά-  
 τως ὑφίστασθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθαι κατὰ  
 τὴν φύσιν, ὅταν δὲ ποικίλῃς πάθος, καὶ κο-  
 ρυφῇ γένεσθαι, τὸ τοῦ στομάματος γίνεσθαι.  
 quod sic Latine reddas: Sed & ferrum ela-  
 boratum liquefit, ita ut fluxum reddatur,  
 & rursum concrestat: atque in hunc mo-  
 dum faciunt stomomata; siquidem scoria in  
 fundum subsidet, & defecatur ferrum: quum  
 verò id sæpe factum est & purum enasit,  
 stomoma efficitur.

Theodoti



*Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.*

**A**T ipsius Theodoti, quod à quibusdam ἀχαρίστον nominatur, cuiusmodi est. Castorei, nardi indici, singulorum <sup>\* P. II.</sup> p. i. \*. lycij \* p. \*. papaueris lacrymæ tantundem, myrrhæ <sup>\* P. II.</sup> p. ii. \*. croci, cerussæ elotæ, aloës, singulorum <sup>\* P. III.</sup> p. iii. \*. cadmiæ botryodis elotæ, æris combusti, singulorum <sup>\* P. VIII.</sup> p. viii. \*. gummi \* <sup>\* P. VIII.</sup> p. viii. \*. acaciæ succi <sup>\* P. XX.</sup> p. xx. \*. \* stibis tantundem, quibus aqua pluuialis adiicitur.

## ENARRATIO.

**A**ETIVS libro quarto sermone primo capite cix. ἀχαρίστον dictum putat, quod digna illi gratia referri nequeat: ipsum tamen vocabuli etymon in gratitudinē quamdam præ se ferre videtur. Ceterum describuntur à Galeno diversa collyria acharista: quæ etsi cum hac Theodoti descriptione parum conveniant, tamen quod ad facultatem attinet, hoc non multo inferiora censenda sunt.

*Cythion vel Tephron collyrium.*

**P**RÆTER hæc ex frequentissimis collyriis est id, quod quidam Cythion, quidam à cinereo colore Tephron appellant, amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum <sup>\* P. I.</sup> p. i. \*. papaueris lacrymæ <sup>\* P. II.</sup> p. ii. \*. cerussæ elotæ <sup>\* P. III.</sup> p. iii. \*. spumæ elotæ <sup>\* P. VIII.</sup> p. viii. \*. Quæ æquæ ex aqua pluuiali continentur.

*Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.*

**E**VELPIDES autem, qui ætate nostra maximus fuit ocellarius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat, Trygodes nominabat: Castorei <sup>\* P. II.</sup> p. ii. \*. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum <sup>\* P. I.</sup> p. i. \*. croci, myrrhæ, aloës, singulorum <sup>\* P. III.</sup> p. iii. \*. æris combusti <sup>\* P. VIII.</sup> p. viii. \*. cadmiæ, & stibis, singulorum <sup>\* P. XII.</sup> p. xii. \*. acaciæ succi <sup>\* P. XXVI.</sup> p. xxvi. \*. gummi tantundem. Quo granior verò quæque inflammatio est, eo magis leniri \* medicamentum debet, adiecto vel albo oui, vel muliebri lacte. At si neque medicus, neque medicamentum præsto est, sæpius utrumlibet horum in oculis penicillo ad ipsum



ipsum facto infusum, id malum lenit. Vbi verò aliquis releuatus est, iamque cursus pituitæ constitit, reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum & vinum. Igitur lauari debet leuiter, antè ex oleo perficatus, diutiusque in cruribus & feminibus, multaue calida aqua fouere oculos, deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi, à balneo cauere, ne quo frigore afflatuue lædatur: posthæc cibo paulo pleniore, quam ex eorum dierum consuetudine, vti: vitatis tamen omnibus pituitam extenuantibus. Vinum bibere lenè, subausterum, modicè vetus, neque effusè neque timidè, vt neque cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturque intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturbationem quam attulerat, quod incidere his solet, qui manente adhuc pituitæ cursu festinarunt, quamprimum discedere debet, nihil eo die vini assumere, cibi minus etiam quam pridie. Deinde cum primum satis pituita substitit, iterum ad vsum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam, siue tempestatum vitio, siue corporis, vt pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, & minimè pituitæ cursus finiatur. Quod vbi incidit, iamque ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim vt in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus, quæ nullis aliis auxiliis cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt: videlicet hic quoque vt alibi, cum secunda vana fuerint, contrariis adiuantibus. Sed antè ronderi ad cutem conuenit. Deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos fouere, tum vtrumque penicillo detergere, & vngere caput irino vnguento: continereque in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est, finiatur, desinatque sudor, qui \*necessarius in capite collectus est. Tum ad idem cibi viniue genus <sup>\*necessarius</sup> veniendum est sic, vti poriones meracæ sint, obregendumque caput, & quiescendum. Sæpe enim post hæc raui somnus, sæpe sudor, sæpealui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquando sapius fit, per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas rekituatur. Si diebus eis-

bb

dem



dem alius nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes leuentur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat. *πρότερον* id, quoniam oculi procedunt, Graeci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mittere: si id fieri non potest, aluum duci, longioremque mediam indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque Cleonis collyrio, quidam *\*quod du.* quod ex duobus antè positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei. Neque de villo magis inter omnes auctores convenit.

## ENARRATIO.

Euelpides autem iamque cursus pituitae.

**S**I pondera nonnihil iuntes, collyrium Scribonii, quod à colore *ομιον*, hoc est, fuscum seu subnigrum vocari dicit, effeceris: quod idem, & post eum Galenus, ac Egineta ad epiphoras cum perseverantia tumoris rectè applicari dicit. Trygodes autem vocari dicit, hoc est, faculentum, ab acacia, quae ingreditur: solent enim ea primum faculentia, aut *αγορδα* nominare, quae multam in se acaciam recipiant.

**E**IUS videlicet, ut ex Scribonio locum iam citato liquet, quae ipso calore oculorum glutinosior visa fuerit, quod serè sexio septimoque die accidere solet.

multaque calida aqua.

**E**TSI per se calida conveniat, vitium tamen reddideris si sanguinem, aut meliorum eadem incoxeris.

*Nilei collyrium omnium optimum.*

**I**tem habet nardi Indici, papaveris lacrymae, singulorum *p. i. \** gummi *p. i. \** croci *p. ii. \** foliorum rosae recentium *p. iiii. \** Quae vel aqua pluviatili, vel vino leni sabauifero coguntur. Neque alienum est malicorium, vel scutellariam campanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrrham nigram cum rosa foliis miscere, aut hyoscyami folia, cum oui cocti vitello, aut farinam cum acaciae succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoque papaveris adiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo preparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso: in qua autem mel myrti vel rosae folia decocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Præter hæc ab occipitis incisa cute, cucurbitula ad-mouenda est. Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam



fuam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum. Deinde futurum, ut <sup>indure-</sup> inarescat <sup>icat</sup> is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est, incidere oculus debet: ut, effuso pure, & inflammatio, ac dolor finiatur, & intus tunica residant, quo minus foeda postea facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyriis est ex lacte, aut ovo, vel croco, cui album oui miscatur. Ac si induruit & sic emortuus est, ne in pus verteretur, quatenus foede prominebit, excidendum erit, sic ut hamo summa tunica apprehendatur: infra id deinde scalpellus incidat tantundem: medicamenta erunt coniicienda, donec <sup>randem</sup> omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca <sup>fissus</sup> fissus est.

## ENARRATIO.

**G**ALENVS; & Aegineta non Nilum, sed Nilum vocant. vtile esse dicunt ad doloris angustiam, fluxum vberem, ac tenuem, pustulas, ac prolapsus; descri-

buntq; praeter hoc, & aliud Nili collyrium quo usus est Galio ophthalmicus; parum tamen ab hac descriptione discrepat.

## De carbunculis oculorum, &amp; eorum curatione.

**S**OLENT etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris; & in ipsis oculis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est, cibus minuendus, lac potui dandum, ut acria quae laeserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet, his utendum, quae aduersus inflammationes proposita sunt. Atque hic quoque Nilei collyrium optimum est: si tamen carbunculus in exteriori palpebrae parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum: aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

## ENARRATIO.

**C**ARBUNCULI, ut auctor est Aetius, oculorum ruborem ab initio habent, adeo ut oculum sibi perire putent, immo etiam

vero aut eminentiam non statim inducunt: nam ob immodicam caliditatem velut rupturam quandam carbunculus sustinet, &

bb 2

quod



quod effluit ab ipso quum sit acce ac mordax, superficiem quidem carbunculi ressecat, & crustam inducit, vicinis vero locis morbum infert; & qui in palpebris carbunculi oriuntur, facilius certe quam qui in oculis consistunt, curantur; siquidem hos curationem vix admittere auctor est Aegineta; & Aetius perfecte sanari posse negat.

& alioqui boni succi, & omni acrimonia vacuis: cavendum tamen est ne aut febricit egrotus, aut imbecillo ventriculo praeditus sit: nam hic nihil alienius esset quam lactis usus, ut quod biliscentis facillime aut acefcens morbo novam materiam suppeditaret: nam hac de causa Hippocrates, lac dare capite dolenti & febricitanti venit.

### In hoc casu aluus.

Si corpus plethoricum sit, etiam vena tunc danda est.

### lac potui dandum.

Si C. Paulus, Dolor, inquit, leniri debet lactis potione, item cibis frumentaceis.

### Quod ad cataplasmata.

CAVENDUM est ne frigefactientia cataplasmata applicemus, quod hac carbunculis adnota, in oculum propellunt quod a carbunculo defluit; unde non raro non minus periculi immineret quam ab ipso carbunculo.

### De pustulis oculorum & curatione earum.

**P**USTULAE quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam servanda sunt, quae de sanguine, & quiete supra posui. Sin serius quam ut sanguis mitti possit, aluus tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

### ENARRATIO.

**P**USTULAE, ut inquit Paulus, excrecentiae quaedam sunt corniformis membrana, orta ex humore quopiam subexcoriante ipsius compagem; Graeci φλύκταινες, Arabes vesicas nominant; Aetius & in albo & in palpebris, & plerumque circa corniformem membranam fieri dicit, atque eas superficiem tantum aliquando occupare, quae curari faciles sunt; nonnunquam etiam in profundo quodammodo delitescere, quae curari

difficilius curantur, ita non raro (ut paulo post etiam infert Celsus) exulcerantur, & inducta tandem cicatrice visum si non plane abolent, certe admodum debilitant.

### alius tamen ducenda.

VEHEMENTES tamen purgationes, atque ea potissimum quae stomachum subvertunt, evitanda sunt: quare commodissimum erit aut picra, aut aliquo simili amittere aluum.

### \* Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.

**I**D quoque, quod Philetis vocatur, huic aptum est, Myrrhae, papaveris lacrymae, singulorum p. i. \* plumbi elotii, terrae samiae, quae ashp vocatur, tragacanthae, singulorum

P. IIII.

\* φιλαιτης  
\* Philethos



P. IIII. \*stibis cocti, amyli, singulorum P. XVI. \*. spodij eloti, \*stibij cerussæ elotæ, singulorum P. VIII. \*. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vfus collyrij, vel ex ouo, vel ex lacte est.

## ENARRATIO.

terræ samiæ.

SCRIBONIUS Largus etiam samiam dicere maluit.

*De vlcerebus oculorum, & eorum curatione,  
& de diæ\* βαλάνη collyrio.*

\*βαλάνη

**E**x pustulis vlcera interdum fiunt, eaque recentia æquè lenibus medicamentis nutrienda sunt, & iisdem fere quæ suprà in pustulis posui. Fit quoque propriè ad hæc quod \*diabalanu vocatur. <sup>\*διὰ λιβάνου</sup> Habet æris combusti & eloti, papaueris lacrymæ frictæ, singulorum P. I. \*. spodij eloti, turis, \*stibis combusti, & eloti, myrrhæ, gummi, singulorum P. II. <sup>\*stibij</sup>

## ENARRATIO.

eaque recentia.

<sup>fundum dehiscat, non ita facile, etiam in ipso principio, curari potest; periculum enim est, ne acrimonia sua humores, atque adeo oculum ipsum corrodat atque exulceret.</sup>  
**I**d quidem verum est, si in superficie oculi exulceratio consistat: verum si in pro-

*Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.*

**E**VENIT etiam, vt oculi vel ambo, vel singuli, minores fiant, quàm esse naturaliter debeant. Id quæ & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte vtendum est. Cibis verò his qui maxime corpus alere, & implere consueverunt. Vitandaque omni modo caussa, quæ lacrymas excitet, curaque domesticorum, quorum etiam, si quid tale incidit, eius notitiæ subtrahendum: atque acria quoque medicamenta, & acres cibi non alio magis nomine his nocent, quàm quòd lacrymas mouent.

bb 3

ENAR-



## ENARRATIO.

**P**HTHYSIN, & atrophiam oculi sic distinguunt Græci, ut phthisis oculi affe-  
ctus sit, quo pupilla angustior, obscurior, ru-  
gosiorque reddatur, res visui obiectæ maiores  
appareant: Imminutus autem, aut macer  
oculus (Græci ἀτρεφίας, Anicennas pro-  
funditatem oculi nominat) vel omnino ali-  
mentum sentire non dicitur, quum ex ve-  
hementi capitis dolore aut in febribus acutis  
paulatim humiliatur, vel canatur, aut in

retum minor sit, & aliquando obscurior, &  
visum impedit: differt tamen à tabe vel  
phthisi, quod tabes solam pupillam, atrophia  
totum oculum occupet.

Idque & acer pituitæ  
cursus.

SOLET etiam cephalalgias, & reli-  
quas capitis inbecillitates subire, ut iam  
dictum est.

## De pediculis palpebrarum.

\* quo  
al. cum

\* alias  
ne acio-  
res pitui-  
tæ concit-  
tentur.  
al. ne quid  
acrioris pi-  
tuitæ cōc.

**G**ENVIS quoque vitij est, \* qui inter pilos palpebrarum  
pediculi nascuntur. Id *ὀφθαλμίας* Græci nominant.  
Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra pro-  
cedit. Sed fere tempore interposito, pituitæ cursus acerrimus  
sequitur, exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque  
ipsam corrumpit. His alius ducenda, caput ad cutem ton-  
dendum, diuque quotidie ieiunis perfricandum. His, ambu-  
lationibus, aliisque exercitationibus diligenter utendum, gar-  
garizandumque ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus de-  
cocta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fouendum caput.  
Vitandi acres cibi, lacte vinoque pingui utendum, bibendum-  
que liberalius quam edendum est. Medicamenta verò intus  
quidem lenia danda sunt, \* ne acriorem pituitam concitent.  
Super ipsos verò pediculos alia, quæ necare eos & prohibere  
ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum spumæ nitri p. i. \*.  
sandaracæ p. i. \*. vuae taminix p. \*. i. simul teruntur, adici-  
turque vetus oleum pari portione, atque acetum, donec ei  
mellis crassitudo sit.

\* diu nō  
cōc.

\* curantur

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriun-  
tur, & validioribus medicamentis curantur, & de  
*Andree collyrio*, & de \* diacerato.

**H**ACTENVS oculorum morbi lenibus medicamentis  
nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quæ diuersam  
curatio-



corationem desiderant, foreque ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoque his manentia. Atque in primis in quibusdam perseverat tenuis pituitæ cursus, quibus alius ab inferiore parte euocanda est, demendum aliquid ex cibo. Neque alienum est illi frontem compositione Andrea, quæ habet gummi p. i. \*. cerussæ, stibis, singulorum p. ii. \*. spumæ argenti & coctæ, & elotæ p. iiii. \*. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte cataplasma quoque super iniiciendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoque, inciso vertice, rectè accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi verò eo debet quod habet squamæ aris, papaueris lacrymæ, singulorum p. \*. ceruini cornu combusti & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. iiii. \*. thuris p. xii. \*. Hoc collyrium quia cornu habet, *ὀξέγατο*, nominatur. Quotiescunque non adiicio quod genus humoris adiciendum sit, aquam intelligi volo.

## ENARRATIO.

## Atque imprimis.

**EPIPHORAM** intelligit, quamquam latius quodammodo epiphora nomen patere videatur, ut quod omnem humiditatem delationem ad oculos, siue per angulos siue per totum oculum fiat, denotet. Est autem epiphoris non raro comes inflammatio, interdum etiam citra eandem oriuntur, & desinunt: est & quando longas oculorum inflammationes subsequantur: de quibus hic mentionem facere videtur Celsus.

## Cucurbitula quoque.

UT videlicet impetū humoris reuellamus.

## Hoc collyrium.

**ALIUD** ab hoc diaceros collyrium describit Galenus quod recipit plumbi combusti, cornu ceruini cremati, singulorum ꝑ ii. cerussæ, squamæ aris, amyli, thuris, sepiæ, resæ combustæ, eruginis, myrrhæ, gummi, singulorum uncia; aqua pluuiatili excipiuntur. Aërius (sicuti etiam Galenus) varia ex cornu ceruino collyria describit.

*Memigmenon, Euclidis collyrium.*

**AD** idem Euclidis, quod *μυμυγμένον* nominabat. In eo papaueris lacrymæ, & albi piperis, singulæ uncia sunt, gummi libra, aris combusti p. i. \*. Inter has autem curationes, post intermissione aliquam prosunt balneum & vinum.

Cumque:



Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sunt, qui extenuant, tum præcipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiores reddunt, sicut in hoc genere materiæ maximè promptum est, confugiendum est ad ea, quæ quia ventrem, corpus quoque astringunt.

*De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, veteribus, & curationibus singulorum.*

**A**T vlcera si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certè vetera esse confuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod Memigmenon vocatur, optimè reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo quod Smilion nominatur.

#### ENARRATIO.

At vlcera si cum.

**I**N ulceribus quæ cicatrice indigent, cauendum est ne supercrescentia aliqua sit, aut caro ipsa abundet, quod videlicet superuenientes cicatrices visum impediunt, & dum ex palpebris punguntur, fluxionem afferant. Porro interdum afficiuntur typica agnata, interim corniformis, aut angulorum

aliquis seu palpebra ea affectione laborat. Nosse autem oportet quod vlcus vel vulnus corniformis tunica periculosius sit, quam reliquarum partium oculi, & si ea pars ipsius quæ pupilla obiecta est, fuerit ulcerata, si vulnus ad interiora descendit, magna ex parte taliter affecti obiacantur, teste Galeno.

*Smilion collyrium.*

**H**ABET æruginis p. iiii. \*. gummi tantundem, ammoniaci, minij tinopici, singulorum p. xvi. \*. Quæ quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sunt, ex aceto terunt.

*Phynon collyrium Euelpidis.*

\* Alias  
Pyrrhon,  
vel Pyrrhona.

\* fingendū

**I**D quoque Euelpidis, quod \* Phynona appellabat, huic vtile est: Croci p. i. \*. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum p. ii. \*. æris combusti & eloti, myrrhæ, singulorum p. iiii. \*. piperis albi p. vi. \*. Sed antelinitum hoc \* vngendum est.

*Spherion*



*Sphæron collyrium Euelpidis.*

**I**D quoque eiusdem, quod Sphæron nominabat, \* eodem \* in cod.  
valet. Lapidis hamatidis eloti p.ii. \*. piperis grana sex,  
cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ, singulorum  
p.iii. \*. croci p.iiii. \*. gummi p.viii. \*. Quæ cum vino  
aminceo conteruntur.

## ENARRATIO.

**I**D quoque eiusdem. collyrium describit, ab hoc nonnihil diver-  
**G**ALENVS aliud orbiculare, sphæ- sum.  
rion dictum, ad Triphonem relatum

*Liquidum Euelpidis collyrium.*

**L**IQUIDVM quoque medicamentum ad idem compo-  
nebat, in quo erant hæc, æruginis p. \*. \* minij combusti, \* misy  
atramenti futorij, cinnamomi, singulorum p.iii. \*. croci,  
nardi, papaueris lacrymæ, singulorum p.i. \*. myrrhæ p.ii. \*.  
æris combusti p.iii. \*. cineris ex \* odoribus p.iiii. \*. piperis \* oleribus,  
grana \* xv. Hæc ex vino austero teruntur: deinde cum passi id est, bras-  
tribus heminis decoquuntur, donec corpus vnum sit. Idque sica.  
medicamentum vetustate efficacius fit. \* v.

## ENARRATIO.

minij combusti.

**M**INIVM intelligi potest de cinna-  
bary, quæ catachresticis atque abu-  
sive, minium etiam appellatur: potest ni-  
hilominus sinopicum minium intelligi, cuius  
in Smilio collyrio superius facta est mentio.

Nam minium Hispanicum hic nequaquam  
oportunum est; quippe venenum, vti sunt  
Plinius & Dioscorides abunde testes idonei:  
quaquam Strabo Hispanicum sinopicâ terrâ  
non esse deterius existimat. Hæc Pantinus.  
Quid verò per cineres ex odoribus intelligat,  
me ignorare ingenuè confiteor.

*De causis oculorum ulceribus, & curationibus.*

**C**AUVA verò ulcera commodissimè implent ex his quæ su-  
prà posita sunt, Sphæron, & id quod \* Philetis vocatur. \* aliàs,  
Idem Sphæron vetustis ulceribus, & vix ad cicatricem ve- Philale-  
nientibus optimè succurrit. this, φιλαι-

CC

Hermo-



*Hermionis collyrium.*

**E**st etiam collyrium, quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his vlceribus videtur. Refertur ad Hermonem auctorem: habet piperis longi p. i. 3. \*. albi \* p. \*. cinnamomi, costi, singulorum p. i. \*. atramenti sutorij, nardi, casia, castorei, singulorum p. ii. \*. gallae p. v. \*. myrrhae, croci, thuris, lycij, cerussae, singulorum p. viii. \*. papaueris lacrymae p. xii. \*. aloes, æris combusti, cadmia, singulorum p. xvi. \*. acaciae, stibis, gummi, sing. p. xxv. \*.

## ENARRATIO.

*Est etiam collyrium.*

**C**OLLYRIUM hoc ad multa utile est, & unum multorum loco esse potest; siquidem caua vlcera explanat, cicatrices quodammodo inconspicuas reddit, pustulas sanat, oculum perturbatum conseruat, &

ut uno verbo omnia dicam, ad omnes desperatas affectiones conueniens est. Describitur tamen aliud ab Aëtio ad Hadrianum Imperatorem relatum collyrium, huic non omnino dissimile: verum hoc nonnihil oporosis est, & non minoris efficacia censendum est.

*De cicatricibus oculorum, quae ex vlceribus factae sunt, & quomodo curari debeant, & de Asclepias, & Canopite & Pyxino, collyriis.*

**F**ACTAE verò ex vlceribus cicatrices, duobus vitiis periclitantur, ne aut cauae, aut crassae sint. Si cauae sunt, potest eas implere, id quod spharion vocari dixi, vel id quod Asclepias nominatur. Habet papaueris lacrymae p. ii. \*. sagapeni, opopanax, singulorum p. iii. \*. æruginis p. iiii. \*. \* cumini p. viii. \*. piperis p. xii. \*. cadmia elotae, cerussae, singulorum p. xvi. \*. At si crassae cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite collyrium, quod habet cinnamomi, acaciae, singulorum p. i. \*. cadmia elotae, croci, myrrhae, papaueris lacrymae, gummi, singulorum p. ii. \*. piperis albi, thuris, singulorum p. iii. \*. æris combusti p. ix. \*. cum aqua pluuiatili. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his constat: Salis fossilis p. iiii. \*. ammoniaci, thymiamatis p. viii. \*. papaueris lacrymae p. xii. \*. cerussae p. xv. \*. piperis albi, croci, ficuli,



ficuli, \*singulorum P.LII.\*. gummi P.XIII.\*. cadmiæ clotæ \*alijs  
P.IX.\*. Maximè tollere cicatricem videtur, id quod habet  
gummi P.III.\*. æruginis P.I.\*. crocomagmatis P.IIII.\*. \*alijs  
singulorū  
xxxi.

## ENARRATIO.

**C**AVÆ ex ulceribus cicatrices accu-  
ratè admodum diligenterque tratan-  
de sunt, quòd videlicet periculum sit, ne  
dum easdè implere studeamus, crassam quan-  
dam pelliculam procreemus, quæ visum im-  
pediat. Et rursus crassas cicatrices atque  
callosas, quæ diuturnæ fuerunt, velle cu-  
rare, est operam perdere, quòd maius pericu-  
lum sit ex acrimonia collyriorum quibus ci-  
catrices exterere nitimur, quàm emolumenti  
ex cicatricis imminutione expectandum sit:

exulcerantur enim faciliè vicinæ oculi par-  
tes. Videndum etiam est num una cum  
leucomate, vel cicatrice coniuncta sit, aut  
glaucofis aut suffusio: siquidem si harum  
alterutra affuerit, frustra cicatrices abster-  
serimus. Ceterum abstergentia talia esse oportet,  
quæ morsus aut erosionis ferè expertia  
in totum sint, ex etenim oculis maximè con-  
uenient: inter quæ primas faciliè obinet lac  
equæ cum modico melle assidue illitum.

*De alio genere inflammationis oculorum.*

**E**ST etiam genus inflammationis, in qua si cui tument ac  
distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte  
emitti necessarium, multaquæ aqua calida caput atque oculos  
fouere, \*gargarizari ex lenticula, vel ex fici cremore, inungi  
acribus medicamentis, quæ suprà comprehensa sunt, maxi-  
mequæ eo quod Sphæriorum nominatur, quod lapidem hæma-  
riten habet. Atque alia quoque vtilia sunt, quæ ad extenuan-  
dam aspritudinem fiunt, de qua protinus dicam. Hanc au-  
tem \*inflammatio oculorum fere sequitur, interdum maior, \*inflatio  
interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitu-  
do fit, deinde aspritudinem ipsam auget, fitquæ ea in alijs bre-  
uis, in alijs longa, & quæ vix vnquam finiatur. In hoc genere  
valetudinis quidam crassas durasquæ palpebras, & ficulneo  
folio & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt, ver-  
sasquæ quotidie medicamentis suffricant. Quæ neque nisi  
in magna vetustaquæ aspritudine, neque sæpe faciendæ sunt.  
Nam melius eodè ratione victus & idoneis medicamentis  
peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo fre-  
quentiore, multaquæ oculorum palpebras aqua calida foue-  
bimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.



## ENARRATIO.

**A**N hac sit genuina Celsi lectio, vehementer ambigo; præsertim quando verisimile sit Cornelium nostrum non fuisse adeo vecordem aut sui immemorem, ut nonnum hoc genus inflammationis, inflammationem oculorum ferè subsequi dixerit: quo fit ut nisi quid obster, loco inflammationis, et inflationis restituendū censē, idq; tam in titulo quā in principio paragraphi legendumq; Est etiam aliud genus inflationis. Inflari autē oculum dicūt, quoties absque manifesta causa iurgens oculus, pituita redundantior est, & admodum cum influxu privis.

inungi acribus medicamentis.

VEL hinc conicere licet, non esse ei sermonem de inflammationibus, quin acria omnia inflammationem non solum non compescerent, sed eidem fomitem quandam subministrarent, conceptamque iam auferent; inflationi cōtrā, ut quæ ex pituita originem habeat, optimè medeantur. Oportet tamen non immodicè acria, neque calida quæ adhibentur, esse, sed leniter tantum calida, habereque astringentem quandam admixtam.

*Cæsarianum collyrium.*

**A**T medicamentum id quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti sutorij p. i. \*. misyos p. \*. piperis albi p. v. \*. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum p. ii. \*. cadmiæ elotæ p. iii. \*. stibis p. vi. \*. Satisque constat, hoc collyrium aduersus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse, exceptis his quæ lenibus\* nutriuntur.

\* Alias  
curantur.

## ENARRATIO.

SI opobalsamum, æruginem rasam, & crocum addas, stacticum Prosechij reddideris.

*Hieracis collyrium.*

**I**D quoque quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest: Habet myrrhæ p. i. \*. ammoniaci thymiamatis p. ii. \*. æruginis rasæ p. iii. \*. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum est etiam id quod\* Canopite est, & id quod Smilion vocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphæron. Si composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quàm optimo melle satis commodè aspritudo curatur.

\* Canopite

## ENARRATIO.

**E**XTAT apud Galenum quoddam collyrium ad obusum visum, & scabram affectiones quod hieracinum appellat, nihil cum hoc commune habens.

De Xe-



*De Xerophthalmia, genere aride lippitudinis.*

**E**ST etiam genus aride lippitudinis, *Ξεροφθαλμία* Græci appellant: neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam \* grauescunt, & noctu prægravi pituita inalescunt: quantoque \* minor generis huius impetus, tanto finis minus expeditus est. In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lauare sæpe, ibique desudare, multaque frictione vti necessarium est. Cibi neque qui impleant, neque nimium acres apti sunt, sed inter hos medij. Manè vbi concoxisse manifestum est, non alienum est ex sinapi gargarizare, tum deinde caput atque os diutius \* perfricare.

\* fere leui,  
& pruriginæ grauescunt & palpebræ citra duriciem vlam noctu prægravi pituita inhaerescunt.  
\* maior  
\* alias defricare.

## ENARRATIO.

**L**IPPITUDO sicca est, quoties subaridus factus fuerit oculus, & pruriginosus, & leuiter dolens citra duriciem palpebrarum, Græci *Ξεροφθαλμία* vocant. Cuius rationem huius non negligere oportet, quod, si inueterauerit, suffusionis, ulcerationis ac staphylomatum causa sit.

*Rhinion collyrium.*

**C**OLLYRIUM verò aptissimum est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ p. i. \*. papaueris lacrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum p. i. \*. lapidis hæmatitis, lapidis phrygiæ, lycij, lapidis scissilis, singulorum p. ii. \*. æris combusti p. iiii. \*. Ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

## ENARRATIO.

**E**ST apud Galenum Phædro ascriptum aliud collyrium quod rhinema inscribitur; Rhinion collyrium; est & apud eundem neutrum tamen cum hoc convenit.

*Ad oculos scabros, collyria.*

**S**I verò scabri oculi sunt, quod maximè in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id quod suprà positum est: potest similiter prodesse id quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaueris lacrymæ, singulorum p. \*. ii. piperis albi, gummi, singulorum p. \*. iiii. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulo-

cc 3

singulo-



\* Afij,

*laseris  
descriptis, quæ  
eadem fere &  
à Dioscoride  
traditur.  
\* inditum*

\* leuibus

\* leuant

\* exasperet,

singulorum p. vi. \*. Nullum tamen melius est quàm Euelpidis, quod Basilicon nominabat. Habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis \* Afij, singulorum p. ii. \*. gummi p. xiii. \*. piperis albi p. iiii. \*. croci p. vi. \*. pserici p. xiii. \*. Nulla autem per se materia est, quæ Psoricon nominetur, sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul contendantur, idque in vas fictile \* additum, & contactum ficulneis foliis sub terra reponitur, sublaturumque post dies viginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoque collyrio conuenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non \* lenibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos \* leuant & mel & vinum. Succurritque & his, & aridæ lippitudini, si quis panem ex vino subactum super oculum imponit. Nam cum fere sit humor aliquis, qui modò ipsum oculum, modò angulos, aut palpebras \* exasperat, sic, & si quid prodit humoris, extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

## ENARRATIO.

**A**ETIVS lippitudinē scabrā appellat: ortum habet ex humorum acrimonia quæ angulos oculorum erodat atque exulceret, ac lachrymam salfam, & nitrosam stillat. His duobus affectibus congener fere is morbus est quem sclerophthalmiam vocant: est autem oculorum duricies, quoties dura fieri cilia contigerit, aut ipsum oculum duriores & difficulter mobilem, intus rubentem, & humorem nullum fundentem; eius curatio fere eadem est quæ xerophthalmia: nam quæ humiditate quodammodò eliciunt atque secernunt, eidem optimè medentur.

Nullum tamen melius.

S i asium lapidem dempseris, collyrium

*Ad Caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem  
oritur, remedia & collyria.*

**C**ALIGARE verò oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecilli-

psoricum Scribonij ad xerophthalmiam effeceris; commiscetur autem aqua pluviali.

Nulla autem per se.

**DIOSCORIDES** chalcitidos partes duas accipit, cadmiæ unam tantummodo; & ex aceto conterit: Galenus autem de psorico sic scribit. Conficitur hoc medicamentum dupla chalcitide admixta lithargyro, arte tamen utrisque ex aceto acerrimo solutis, sicq; in nonam ollam coniectis: nam sumo æstate mediâ diebus quadraginta obrutum sepelies.



cilitatēve aliam consuerunt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium est, adiuuat collyrium quod Asclepias nominatur. Adiuuat \*id quod ex crocomagmate fit.

\* &amp; id

## ENARRATIO.

**C**ALIGO interim confestim inuade-  
re, modo etiam sensim se insinuare so-  
let, quæ paulatim visum impedit atque la-  
befactat: varias subsequitur causas; at quæ  
confestim irruit, originem suam tribuere so-  
let nervo optico; crassæ & glutinosæ humo-

ribus infarctis, aut eodem resolutionem pa-  
tiente.

Si ex reliquiis.

**NAM** aliqui ante localia dicta reme-  
dia, opus esset venæ sectione, cucurbitularum  
medicari applicatione, aut alui purgatione.

Διά νεφους collyrium.

**P**ROPRIE etiam ad id componitur, quod *διά νεφους* vocant:  
habet piperis p. i. \*. croci \* cilicis, papaueris lacrymæ, \* cilicij,  
cerussæ, singulorum p. ii. \*. pforici, gummi, singulorum <sup>al. ficuli,</sup>  
p. iii. \*.

## ENARRATIO.

**D**IVERSVM planè ab isto *διά νεφ-*  
*ους* collyriū describit Alexander Tral-  
lianus libro primo: ulceribus vetustis & ma-

lignis accommodum, & quod ingentes ci-  
carices exterat. Egineta ab utroque di-  
uersum habet.

*Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem,  
aut aliam imbecillitatem fit.*

**A**T si ex senectute, aliave imbecillitate id est, rectè inungi  
potest, & melle quàm optimo, & cyprino, & oleo ve-  
tere. Commodissimum tamen est, balsami partem vnā,  
& olei veteris, aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi  
partes tres miscere. Vtilia quoque huic medicamenta sunt,  
quæ ad caliginem proximè, quæque ad extenuandas cicatri-  
ces supra comprehensa sunt. Cuicumque verò oculi caliga-  
bunt, huic opus erit multa ambulatione atque exercitatione,  
frequenti balneo, vbi totum quidem corpus perfricandum  
est, præcipuè tamen caput, & quidem irino, donec insudet,  
velandumque postea, nec detegendum antequam sudor &  
calor domi conquierint. Tum cibus vtendum acribus, & ex-  
tenuantibus, interpositisquæ aliquibus diebus, ex sinapi garga-  
rizandum.

ENAR-



## ENARRATIO.

huic opus erit. *lationes utiles sunt: quin & infernarum  
IN umbrasis potissimum locis deambu- partium exercitio utendum docet Aëlius.*

*De suffusione oculorum.*

*\*pituitæ,* **S**UFFUSIO quoque (quam Græci *ὑπόχρωσις* nominant) interdum oculi *\*potentiæ*, qua cernit, se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere, in temporibus venas adurere, gargarizando pituitam euocare, suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

## ENARRATIO.

**H**YPOCHYMA seu hypochysis, *quam suffusionem dicunt Latini, est, ut ait Aëlius, humorum præterfusio, circa pupillam congelatorum, ut ubi perfecta fuerit, visum impedit. Paulus glaucoma & hypochyma pro uno eodemque morbi genere apud veteres usurpatum fuisse auctor est: differunt tamen quod glaucoma sit mutatio crystallini humoris in glaucum colorem; hypochyma verò, ut iam dictum est, humorum sit suffusio, inter vneam ac crystallum, den tumescam conuoluentium. Ac glaucomata qui-* dem omnia curationem non recipiunt: suffusiones verò recipiunt, sed non omnes.

*Sanguinem ex fronte.*

CELSVS per omnia sibi similis in ocularibus morbis semper ex vena frontis sanguinem mittit. Galenus tamen, & quotquot sunt Græci primum cubiti venam tunc dunt, ac deinde cucurbitulas occipitio eius scarificatione offigunt; deinde aut frontis venam aperiunt, aut vnam earum quæ in canthis oculorum delitecent.

*De resolutione oculorum, quæ Paralysis dicitur.*

**A**c ne resolutio quidem oculorū, quam *παράλυσις* Græci nominant, alio victus modo, vel aliis medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitij satis est. Igitur interdum euenit, modò in altero oculo, modò in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer oculus ipse concussus est, ut his neque quoquam intendi possit, nec omnino consistat: sed huc illucve sine ratione moueatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præstet.

ENAR-



## ENARRATIO.

**T**OTIVS oculi paralyfis difficilem  
admodum curationem admittit; atque  
ea potissimum que nam grandioribus acci-  
dit: quod si una cum oculi nostri principis  
innadat, prognosticis relinquenda est. Est  
tamen ubi circa solam palpebram fiat reso-  
lutio, ac tunc quidem oculus semper conclu-

sus est, & palpebra non sentit; sed oculus  
paralyticus sit, motus ad dextram & sini-  
stram efficere non potest, quemadmodum nec  
sursum, nec deorsum, frequentissime apople-  
xin, ac distensionem corporis comitatur,  
quoniam & prius sepe innadat.

## De Mydriasi oculorum.

**N**ON multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci  
vocant. Pupilla effunditur & dilatatur, aciesque eius he-  
bescit: ac penè difficillimè genus id imbecillitatis eliditur.  
In utraque verò, id est, & paralyfi, & mydriati, pugnandum  
est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta  
sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino inter-  
dum acetum, interdum nitrum adiciendum est\*, melle in-  
ungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis vti  
releuarique. Quidam sine vlla manifesta causa subito obce-  
cati sunt. Ex quibus nonnulli cum aliquandiu nihil vidissent,  
repentina profusione alui lumen receperunt. Quo minus  
alienum videtur, ex recenti re & interposito tempore medi-  
camentis quoque moliri deiectiones, quæ omnem noxiam  
materiam in inferiora depellant.

\* ac p. om-  
ligatur.  
Diffic.

\*: oculos  
verò mel-  
le

\* &

## ENARRATIO.

**M**YDRIASIM vel pupilla dila-  
tationem Aëtius valde agere curabi-  
lem dicit; quam enim membranosa sit uni-  
formis tunica; ubi semel distensa fuerit, in-  
duratur, neque facile amplius contrahi po-  
test: sed let autem morbus hic puerilem potis-  
simam ætatem ob tunicarum imbecillitatem  
affigere.

## Ex quibus nonnulli.

Sed si enim est si materia ad infernas  
partes decumbat, atque propellatur, huius-  
modi illapsus qui acernatur ad oculos fiebat,  
aliud derivandum; ac sic tandem pulsa morbi  
causa, morbum ipsum & minorem & le-  
uiorem futurum.

## De imbecillitate oculorum.

**P**RÆTER hæc imbecillitas oculorum est, ex qua quidem  
interdum satis, noctu nihil cernunt, quod in foeminam  
d d bene



\* alijs,  
humore  
iocin al.  
saute

bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet \* sanguine iocinoris, maxime hircini, si minus, caprini, ubi id assum coquitur, excepto: atque edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adiciunt, eatenus ne id ex specillo distillet, eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, frictionibus, garganzationibus iisdem, his quoque utendum est.

## ENARRATIO.

**I**MBECILLES oculi dicuntur, qui neque album, neque lucidum, neque rufum spectare possunt, sed tali causa oborta illachrymare coguntur. Celsus sub imbecillis oculis nyctalopes, quos lusciosos aut misticiosos vocant Latini, comprehendit: idque, quoniam distincte sint affectiones, an sanæ recte fecerit, indicent alij: Est autem, ut ait Paulus, nyctalops vitium quo per diem homo cernit, sole deinde occiduo obscurius, nocte omnino nihil: alijs tamen contingit, ut nocte melius cernant, interdum deterius, ac nocte lucens luna, omnino nihil.

sanguine iocinoris.

**I**DEM tradit Trallianus, qui re. mor. ac felli hircino plurimum in hoc casu attribuit. Iunius, inquit, fel hircinum; præterea succurrit nyctalops iecur hircinum, si ex eodem assatur ichora colligas, & inde lumina perungas; facit idem hepar ipsum commundatum. Quin & vapor decocti iecinis apertis oculis hantus nyctalops sanat. Idem tradunt Dioscorides & Plinius Naturalis historia libro XXVII. capite XI.

*Ad oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum sanguine suffusi sunt.*

\* harum  
\* celerissimeque

**E**T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus vero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est, quam sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit, cum \* horum acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, \* celeberrimeque hirundinis. Unde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonia restitui, quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tueretur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minimè efficax columbæ & illi ipsi, & nobis. Supra percussum vero oculum ad inflammationem leniendam, non est alie.



est alienum imponere etiam cataplasmata. Sed ammoniacus, vel quilibet alius quam optimus teri debet, sic ut ei paulatim oleum adiiciatur, donec crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum est cum ordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem recognitis omnibus, quæ medici quoque prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix vllum ex his, quæ supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, & promptis remediis submoueri possit.

\* Armeniacus legendus, ut subaudiatur lapis.  
al. Sal ammoniacus,

\* subito remoueri

## ENARRATIO.

**G**ALENVS *ἀπὸ τοῦ οὗτος ὁρκεῖ, hoc est, sanguineas suffusiones, nominare solet.*

ut sit hirundinis optimus.

**E**TSI hirundines in cibo sumptas ad aciem oculorum commendat Dioscorides, & post eundem Galenus; earundem tamen combustarum, aut exiccatarum puluerem cum melle, obscuris caliginosisq; oculis utilissimè illini dicat; nondum tamen, quod sciam, hoc elogio decantari earundem sanguinem comperi. Verum, vixit est, sine fabula sine res gesta sit, quod de chelidonia herba scribit Plinius, si apud omnes in con-

fesso est, palumbinum, columbinum, eun-  
rumque sanguinem ad sigillatos oculos plu-  
rimum prodesse; cur non idem, sicuti hic fa-  
cit Cornelius nosler, sanguini hirundinum  
attribuere audeamus? quando Aëtius idem  
asinino sanguini adscribat, & quando rosa  
hirundinum substantia (excepto stercore)  
visum acuat?

Sed ammoniacus.

**V**ARIANT hic exemplaria; Pynza-  
num malè Ammoniacus: reliqua re-  
ctius habent, Armeniacus: quod & an-  
notavit Ioannes Casarius.

## CAPVT VII.

*De aurium morbis, & curationibus.*

**H**ACTENVS in oculis ea reperiuntur, in quibus medica-  
menta plurimum possint. Ideoque ad aures transcu-  
dum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis  
dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia  
oculorum intra ipsos nocent. Aurium inflammationes do-  
loresque, interdum etiam ad dementiā mortemque præcipi-  
tant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne  
maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis  
sensit, abstinere & continere se debet. Postero die, si vehe-  
mentius malum est, caput tondere, idque irino vnguento ca-

\* ipsis tan-  
tummodo  
noc.



\*catapla-  
smati  
\*cortices

\*decoquā-  
tur:

\*argenti  
(al. nitri)  
spumæ,  
lycij

lido perungere & operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliqua causæ prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue fœni Græci, siue lini, siue alia farina ex mulsò decocta est. Rectè etiam subinde admouentur spongiæ, ex aqua calida expressæ. Tum leuato dolore, ceratum circundari debet ex irino aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosâ factum est, proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adiaci cataplasinata debent, papaueris, \*corticis fricti atque contriti, sic ut ex his pars dimidia sit, eaque tum simul ex passo misto decoquatur. In aurem verò infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper antè reperiendi conuenit, commodissimeque per strigilem instillatur. Vbi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt. Medicamentum verò est & rosæ, & radicum arundinum succus, & oleum in quo lumbrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali perfici expressus. Composita verò ad inflammationem doloremque leniendum hæc fere sunt: Castorei, papaueris lacrymæ pares portiones conteruntur, deinde adiacitur his passum. Vel papaueris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus, sic teritur, ut inuicem modò rosâ, modò passum instilletur. Vel id quod amarum in ægyptia faba est, conteritur, rosâ adiecta. Quibus myrrhæ quoque paulum à quibusdam miscetur, vel papaueris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosæ succo. Vel castorei, myrrhæ, papaueris lacrymæ pares portiones cum passo. Vel croci p. i. \*. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. \*. 3. quibus cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Idque ex primis medicamentis est. Vel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis, quæ habet castorei, opopanacis, papaueris lacrymæ ex aceto, singulorum p. ii. \*. spumæ lycij p. iii. \*. Quæ contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant, atque ita reponuntur. Vbi usus requiritur, rursus idem medica-



medicamentum adiecto passo, \* specillo teritur. Illud per-  
petuum est, quotiescunque crassius medicamentū est, quā  
ut in aurem instillari possit, adiiciendum cum esse humorem,  
ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit. Si verō  
pus quoque aures habent, rectē lycium per se infunditur, aut  
irinum vnguentum, aut porri succus cum melle, aut cen-  
tauræ succus cū passo, aut dulcis punici mali succus in ipsius  
cortice tepesfactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Rectē etiam  
miscentur myrrhæ (quā *saxtlw* \* cognominat) p. i. \*. croci  
tantundem, nuces amaræ \* xv. mellis sesquicyathus. Quæ  
contrita, cū vtendum est, in cortice punici mali tepesfiant.  
Ea quoque medicamenta quæ oris exulcerati causa compo-  
nuntur, æquē vlcera aurium sanant. Quæ si verustiora sunt,  
& multa sanies fluit, apta compositio est, quæ ad auctorem  
Erasistratum refertur, piperis p. ii. \*. croci p. i. 3. \*. myrrhæ,  
misyos cocti, singulorum p. ii. \*. æris combusti p. ii. \*. Hæc  
ex vino teruntur. Deinde vbi inaruerunt, adiiciuntur passi-  
heminae tres, & simul coquuntur. Cū vtendum est, adii-  
citur his mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medi-  
camentum, quod habet lentisci p. i. \*. gallæ p. i. \*. ompha-  
cis p. i. \*. succum punici mali. Est Menophili validum ad-  
modum, quod ex his constat, piperis longi p. i. \*. castorei  
p. ii. \*. myrrhæ, croci, papaveris lacrymæ, nardi syriaci, thu-  
ris, malicorij, ex Ægyptia faba partis interioris, nucum ama-  
rarum, mellis quā optimi, singulorum p. iiii. \*. Quibus,  
cū teruntur, adiicitur acetum quā acerrimum, donec  
crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, casia,  
singulorum p. i. \*. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum p. i. \*.  
aloes p. ii. \*. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus  
vinum cum lycio decoquitur, deinde his alia miscentur. Ac  
si multum puris, malusque odor est, æruginis rasa, thuris, sin-  
gulorum p. ii. \*. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul in-  
coquuntur. Vbi vtendum est, dulce vinum miscetur. Aut  
aluminis scissilis, papaveris lacrymæ, acaciæ succi par pondus  
miscetur, hisque adiicitur hyoscyami succi dimidio minor  
quā vnus ex superioribus portio, eaque trita, ex vino di-  
dd. 3. luuntur.

\* pistillo

\* cogno-  
minant).  
\* xxv.



\* albi pi-  
peris &  
longi,

\* faniem  
\* tandem  
al. tum

luuntur. Per se quoque hyoscyami succus satis proficit. Com-  
mune verò auxilium aduersus omnes aurium casus, iamque  
vfu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cin-  
namomi, casie, singulorum p. i. \*. floris iunci rotundi, ca-  
storei \* albi, piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum  
scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis,  
croci, spumæ nitri, singulorum p. ii. \*. Quæ separatim con-  
trita, rursus mista ex aceto conteruntur, atque ita condita, vbi  
vtendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune au-  
xilium auribus laborantibus est, Polybii sphragis ex dulci  
vino liquata. Quæ compositio priore libello continetur.  
Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est,  
misto vino per oricularium clysterem eluere, & tum infun-  
dere vinum austerum cum rosa mistum, cui spodij paulum  
sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbæ sanguinalis  
succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua parte  
myrrhæ. Si sordida quoque vlcera sunt, melius mulso eluun-  
tur, & tum aliquod ex his, quæ suprâ scripta sunt, quod mel  
habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput vtiq; ten-  
dendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargari-  
zandum, & vsque ad lassitudinem ambulandum, & cibo mo-  
dico vtendum est. Si cruor quoque ex vlceribus apparuit, ly-  
cium cum lacte debet infundi, vel aqua, in qua rosa decocta  
sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adiecto. Quod si  
super vlcera caro increuit, eaq; mali odoris \* sanguinem fun-  
dit, aqua tepida elui debet: \* tamen infundi id, quod ex thure  
& ærugine, & aceto, & melle fit, aut mel cum ærugine in-  
coctum. Squama quoque æris cum sandaraca contrita per  
fistulam rectè instillatur.

#### ENARRATIO.

Q VONIAM, vt quarto De locis affectis docet Galenus, secundum lo-  
cum obtinet sensorium auditus in tennitate  
à visu; velut gustus sensorium in crassitu-  
dine secundum locum obtinet à tactu: pro-  
pterea ab oculis ad aures recto tramite pro-  
greditur Celsus. Est autem functionis au-  
ditus noxa triplex: aut enim debilitatur, aut  
depranatur, aut aboletur; quare pro noxa  
differentia, interim surdastros, modo ob-  
audientes, aliàs etiam surdas appellare so-  
lemus.

Aurium



**Aurium inflammationes.**

**AVRUM** dolorem solent vocare, ut auctor est Galenus, quoties in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat; unde in Praenotionibus Hippocrates: Auris dolor acutus cum febre continua, ac forti, horrendum est; periculum enim est deliraturum esse hominem, ac periturum. Proinde quum hic modus minimè tutus sit, citò mentem advertere oportet etiam aliis signis, ac primo etiam die. Pervenit autem iuniores homines septimo die, & adhuc citius ex hoc morbo; senes verò longè tardius: nam febres, & deliria minùs ipsis accidunt; & hac de causa aures ipsis suppurantur. Verum his quidem atantius recidina morbi contingentes plurimos occidunt, ac verò iuniores priusquam suppuratur, aures, perunt. Huic non absimile est quod Trallianus dicit, Sine meatus, inquit, sine alia ipsius interna partícula quæpiam frequenter inflammatione laboret, acutissima pericula vicinia regionis, & genere substantiæ indicat: nam nervus qui internam auris superficiem sublinet, quum sit sensibilis, validos dolores, acutòque excitat, ut etiam cerebrum in consensum perducatur, ita ut febres & deliria sic affectis oriuntur.

**ex amaris nucibus.**

**AMYGDALAS** amaras intelligis.

**Composita verò.**

**S**i quidem maximus, ac vehementissimus dolor ex inflammatione urgeat, necesse est sensum stupefacientibus uti, quoties videlicet per dolorem ad mortis discrimen tendat ager; utendumque iis tantum monet Paulus, quæ sensum leviter stupefaciunt, quòd non mediocriter periculum sit ne cerebrum nervo per quem facultas audiendi erogatur, vicinum, consortij lege afficiatur. Sed neque sapius, sicuti docet Trallianus, eadem in usum recipienda erunt; verum

ubi coactus fueris; idq; semel tantum iterum tentandum tradit. Galenus tertio De compositione medicamentorum localium libro, longo ante usum tempore (sive pari pondere, sive duplo castoreo admisceatur opium) preparatum id esse debere scribit, & misceri in vehementissimis quidem doloribus pari, in minoribus verò duplo castorei; liquorem verò quo diluuntur ex mulso sapam esse vult, quòd multo magis quam dulcia vina dolorem fedit.

**Specillo teritur.**

**ET** Si Galenus, & Aëtius, sicuti Celsus quoque, specillum adiciant, Iam tamen Cornarius id specillo supernacaneum esse putat.

**myrrhæ (quam *σκητὴν* &c:**

**H**oc est, pinguedinis recentis myrrhæ cuius aqua exigua tusa, & origano expressa; sic enim statim describit Dioscorides: Celsus paulo post myrrham pinguem appellat.

**Est Menophili validum.**

**GALENUS** compositionem hanc partim ab obturatione liberantem, partim resiccantem, partim discutientem, ac nonnihil concoctoriam esse dicit; adicit tamen alumen fixibile, & loco longi piperis albi substituit.

**Polybij sphragis.**

**H**ic iam tertio monitum velim lectorem, passim pro Polybij pastillo Polydæ restitutum esse.

**cui spodij paulum.**

**S**i in pulverem redigatur spodium, ac auritus infletur, per se prodesse dicit Trallianus.

**id, quod ex thure.**

**I**dem planè habet Alexander Trallianus.

*Adversus*



*Aduersus aurium vermes.*\*prola-  
buntur,

**V**BI verò vermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius, medicamentis enecandi, cauendumque ne postea nascantur. Ad vtrunque proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sic emortui vermes in primam auris partem \*prouocabuntur, vnde facillimè educi possunt.

## ENARRATIO.

**V**ERMES in auribus aut generatos, aut extrinsecus illapsos amara & acris occidunt, & ex imo in summā auris, unde facillimè enelli possint, euocant.

Elui quoque aurem.

IDEM effecerit apsitibum, si in vino decoquatur, atq. ex eo ablutio aut suffitus fiat.

*Ad compressa aurium foramina.*

**S**IN foramen auris compressum est, & intus crassa sanies subest, mel quàm optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho & dimidio, æruginis rasæ p. ii. \*. addiciendum est, incoquendumque, & eo vtendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis & rosæ scrupuli duo. Item galbani p. ii. \*. myrrhæ cum melle, & fellis taurini, singulorum p. ii. \*. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

## ENARRATIO.

**E**ST interdum ubi impediēte crassa sorde aurium foramina compressiora sint, Græci θλάσις vocant: in qua quidem affectione nihil adhibendum præcipit Hippocrates; verum si humor crassus sit, omnib. modis eliciendus est: cui negotio opportunis-

sima sunt, quæcunque citra mordacitatem sensuum sunt partium: cuius generis censentur quæ lapides in ranibus conterunt. in quem usum Galenus libro. x. & c. r. radices cucumeris sylvestris, æri, dracunculi, briania ac similia plurimum commendat.

*Ad grauem auditum.*

**V**BI verò grauius aliquis audire cœpit, (quod maximè post longos capitis dolores euenire consuevit,) in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis



qualis super vlcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cū melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atque vbi crusta à corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahatur. Si sordes æque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At si duræ sunt, acetum & cum eo nitri paululum coniciendum est. Cumque emollitæ sunt, eodem modo elui aurem purgarique oportet. Quod si capitis grauitas manet, attondendum idem, & leniter, sed diu perfricandum est: adiecto vel irino vel \*laureo oleo, sic vt vtrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterque post vnctionem aqua calida caput fouendum. Cibisque vtendum ex imbecillissima, & media materia, magisque assumendæ dilutæ potiones, nonnunquam gargarizandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto, & laureo oleo, & succo radiculae corticis: aut cucumeris agrestis succus, adiectis \*contritis rosæ foliis. Inmaturæ quoque vix succus cum rosâ instillatus, aduersus \*surditatem satis proficit.

\* laurino

\* contrita

\* sordiditatem

## ENARRATIO.

Quod si capitis grauitas.

**T**RALLIANVS humerorum exercitationes admittit, easque ex usu esse dicit: verum equitationes & gestationes quæ in curru obeniuntur, suspectas habet, quod videlicet vertiginosum quodammodo

hominem reddant. subinde caput condendum dicit, atque id perfricandum, quod grauari & crassius succis quodammodo infarci senserimus. Calida etiam lanaxa laudat: verum si marina ad manum sit, eandem præfert.

*Ad sonitum aurium intra seipsas.*

**A**LIVD vitij genus est, vbi aures intra seipsas sonant. Atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Leuissimum est, vbi id ex grauedine est. Peius, vbi ex \*morbis, capitisve longis doloribus incidit. Pessimum, vbi magnis morbis venientibus, maximeque comitali, prouenit. Si ex grauedine est, purgare aurem oportet, & spiritum continere, donec inde humor aliquis expumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem,

\* morbo

cc

garga-



gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt. Cibis non utendum nisi extenuantibus. In aurem dandus radicula succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto, & \* laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, & inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his coepit, ideoque nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, vel \* laureo oleo, aut huic mistum castoreum cum succo nucum amarantharum, aut myrrha\* & nitrum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio. Eademque facienda sunt, quae supra comprehendimus, cum maiore quoque diligentia: & praeterea donec his sonus finitur, à vino abstinendum. Quod si simul & sonus & inflammatio est, \* laurinum oleum coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur, quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

## ENARRATIO.

**A**VRIVM sonitus accidere solet, interim ex multa sensus acrimonia, & subtilitate; magna autem ex parte statuosum spiritum subsequi consuevit: quin & ex febrium decretoriis (quod omnium lenissimum est, & manu auxiliari non eget, ut quod per se curetur breui) malum hoc oritur; & interdum ex partium imbecillitate

conualescentibus ex morbis, eoque peius censendum, quo maioribus morbis succedat: nam, ut in Protheticki auctor est Hippocrates, in febre ardente, sonitus aurium accedentibus cum visus hebetudine, & gravitate in naribus accedente, melancholico modo mente mouentur.

*Ad ea quae in aurem inciderunt extrahenda.*

**S**OLET etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, compellendum eo lanæ paulum est, \* quo ipse is subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lana inuolutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem iniiciendum, ibique vertendum est. Vtique enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paulum recuruato. Si ista nihil profi-



proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commodè elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media inhærens capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur: atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

## ENARRATIO.

Sternutamenta quoque.

**S**TERNUTAMENTIS enim, ut docet Trallianus, admotis, meatus auris, spiritum concussione moventur, & referantur; atque ita commodè id quod incidit eliditur.

aut oriculario clystere.

Si pravi humores in auribus creuerint, plurimum proderit eosdem aqua mulsæ elue-

re, ac deinde clysteri oriculario (μυδαρίδιον aut ἀπορρύτης vocant) in aures immisso, sicut quod nocet euellitur.

Tabula quoque.

EANDEM curandi rationem tradit ex Archigene Galenus, & post illum Aëtius: Aegineta autem super circulum quendam imponit, caputque vehementius concutit.

## CAPVT VIII.

*De Narium morbis, & curationibus.*

**N**ARES verò intus exulceratas fouere oportet vapore aquæ calidæ, id est spongia expressa atque admota. Fit & subiecto vase oris angustî, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda vlcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa. Aut argenti spumam cum quolibet horum aliquis conterit, ei que dum teritur, inuicem vinum & oleum myrteum adiicit, donec mellis crassitudinem \*fecerit. Sin autem \*faciat. ea vlcera \*circa nares sunt, pluresque crustas & odorem foedum \*intra habent, quod genus Græci ὀζαννῶν appellant, sciri quidem debet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen hæc tentari possunt, ut caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur, multa calida aqua perfundatur, multa ei ambulatio sit, cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in nares ipsam mel cum exiguo modo resinæ te-

cc 2

rebin-



rebinthinæ coniiciatur, quod specillo quoque inuoluto lana fit, attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiat. Sub his enim crustæ resoluuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent. Puris vlceribus vapor aquæ calidæ subiiciendus est. Deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menthæ, aut marrubij succus, aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit: aut interior scillæ pars contrita, sic ut horum cuilibet mel adiciatur. Cuius in cæteris admodum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, <sup>\* sit,</sup> ut ea misturaliquida <sup>\* fiat,</sup> cum scilla utique pars maior, inuoluendumque lana specillum est, & in eo medicamento intingendum, eoque vlcera implenda sunt. Rursusque linamentum inuolutum & oblongum eodem medicamento illinendum, <sup>\* demitt.</sup> demittendumque in nares, est, & ab inferiore parte <sup>in nares,</sup> leniter deligandum. Idque per hyemem, & ver, bis die: per æstatem, & autumnum ter die fieri debet. Interdum verò etiam in naribus carunculæ quædam similes muliebribus mammis nascuntur, hæque <sup>\* in im. p.</sup> imis partibus, quæ carnosissimæ <sup>q. cartila</sup> sunt, inhaerent. Has curare oportet, medicamentis adurentibus, sub quibus ex toto consumuntur. Polypus verò est caruncula, modò alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modò ad labra pendens, nares implet, modò retrò per id foramen, quò spiritus à naribus ad fauces descendit, adò increfcit, uti post vnam conspici possit, strangulatque hominem maxime, austro aut euro flante, fereque mollis est, raro dura: eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat, <sup>\* fereque</sup> quæ fere ~~ex parte~~ est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit, si addita in nares per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitidis, calcis, sandaracæ, singulorum p. l. \*. atramenti sutorij p. ii. \*.

## E N A R R A T I O.

**O** Z A N A, ut inquit Galenus, ex incurabilia vlcera facere solent, non tamen acrim & putredinorum humorum graneolentia: Scritonius grauem narium, sunt influxu: nam si solum acres fuerint, odorem vertit ozanas; estq; curatu admodum.



dum difficile aut incurabile omnino vitium.  
Oportet autem, si curationem aggrediamur, affectam partem per pharmaca mixtam vim habentia resiccare, hoc est per repellentia simul & dyschoria.

### Puris ulceribus.

Hic simplicia ulcera ab ozanis distinguuntur.

Interdum verò etiam.

Σαρκώματα vocat Paulus Ægineta.

### Polypus verò est.

POLYPVS est tumor præter naturam in naribus, ex crassis & viscosis humoribus generatus: Hippocrates ex pituita nasci auctor est. Species autem eius vocantur ab eodem, libro De morbis; quas Celsus hic singulatim enarrasse videtur.

## CAPVT IX.

### De Dentium dolore, & curationibus.

IN Dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circuncidendum est. Cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico molliq̃ vtendum, ne mandentis dentes irriter, tum extrinsecus admouendus per spongiam vapor aquæ calidæ, imponendumq̃ ceratum ex cyprino aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputq̃ velandum est. Quod si grauior is dolor est, vtiliter & alius ducitur, & calida cataplasinata super \*maxillas iniiciuntur, & ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpiusq̃ mutatur. Cuius rei causa & quinquefolij radix in vino mixto coquitur, & hyoscyami radix, vel in posca, vel in vino mixto coquitur, sic vt paulum his salis adiciatur, & papaueris non \*nimium: aridi cortices, & mandragoræ radix, eodem modo. Sed in his tribus vtique vitandum est, ne quod haustum erit deuoretur. Ex populo quoque alba, cortex radice in hunc usum in vino mixto recte coquitur, & in aceto \*cornu ceruinum rasum, & nepeta cum teda pingui: ac \*ficus item pinguis vel in mulso, vel in aceto & melle, ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. Specillum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoq̃ \*ipso dens fouetur. Quinetiam quædam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur. \*in quem usum ex malo punico acido atque arido, malicorij pars interior cum pari portione, & gallæ, &

cc 3.

pinci.



pinci corticis conteritur, miscerurque his minium: eaque contrita aqua pluuiatili coquuntur. Aut panacis, papaueris lacrymae, peucedani, vuae taminiae sine seminibus, pares portiones conteruntur. Aut galbani partes tres, papaueris lacrymae pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilominus supra maxillam, ceratum, quale supra posui, esse debet lana obtectum. Quidam etiam myrrhae, cardamomi, singulorum

\* ficorum  
pinguium,  
fortasse le-  
gendū, aut  
paruarū. al.  
caprifico-  
rum pul-  
ueris, id est  
cineris, al.  
fermenti  
putris,  
\* qualis  
fere est,  
quæ ha-  
bet pap.

\* parua-  
rum, vel  
pinguiū:  
ut supra.  
al., piperis

\* pertestas  
exc.  
Pasinaca.  
\* coniectū:  
sed id tū  
canna in-  
uolutum  
demitti  
comin al.  
coniectum  
dentem  
citāt. sed  
id tamen  
inuolutum  
in lanula  
demitti

p. i. \*. croci, pyrethri, \* ficorum partes, singulorum p. iiii. \*. sinapis p. viii. \*. contrita linteolo illinunt, imponuntque in humero partis eius qua dens dolet. Si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore. Idque dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submouendum est. Si verò exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coëgit, non est necesse. Sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adiiciendæ quædam valentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant, \* quales hæc sunt. Habet autem papaueris lacrymae p. i. \*. piperis p. ii. \*. \* pforeos p. x. \*. quæ contrita galbano excipiuntur: idque circumdatur. Aut Menemachi maximè ad maxillares dentes, in qua sunt croci p. i. \*. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum \* partes, pyrethri, singulorum p. iiii. \*. sinapi p. viii. \*. Quidam autem immiscent pyrethri, piperis, elaterij, singulorum p. i. \*. aluminis scissilis, papaueris lacrymae, vuae taminiae, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis, singulorum p. ii. \*. Quod si dolor eximi eum cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo bacca hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isque \* forte stans excidet. Et plani piscis, quam paslinacam nostri, *ῥυῖα* Græci vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resinaque excipitur, quæ denti circumdata hunc soluit. Et alumen scissile in id foramen \* coniectum demitti commodius est, quia sic dente seruato, dolorem leuat. Hæc à medicis excepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum, cum dens dolet herbam menthastrum cum suis radicibus velli debere, & in peluem coniici, supraque aquam infundi, collocarique iuxta sedentem hominem vndique veste coniectum, tum in peluem candentes silices de-  
mitti,

\* forcos



mitti, sic ut aqua regantur, hominemque eum hiante ore vaporem excipere, ut supra dictum est, undique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idque sæpe longiorem, sæpe annuam valetudinem bonam præstat.

## ENARRATIO.

**E**TSI nonnulli contendunt, dentem sicut os est, doloris esse expertum; Galenus tamen in libro De usu partium sex-  
to, tum libro De ossibus, asserit eos enidentem vim sentiendi habere: idque se experientia in seipso, libro De compositione medicamentorum localium, comperisse aperte confirmat: percepit etenim, in semetipso, non dolentem, modo, sed etiam pulsam dentem, quemadmodum carnosæ partes inflammatione vexata consueverant. unde non immerito Celsus dentium dolorem maximis tormentis annumerari posse dicit. Consistit ergo dentium dolor, vel in dentium, ut iam dixi, substantia aut in nervo ad radicem sub-  
tracto, vel in gingivarum inflammatione. In genere tamen omnes quotquot sunt den-  
tium dolores, Galenus duabus contrariis cau-  
sis acceptas ferri, inopia videlicet & redun-  
dantia alimenti quod ipsis suppeditatur: in-  
opia quidem aridiores, tabidiores & tenuiores  
eos reddit; redundantia vero consimilem in-  
ais excitare affectionem potest, qualis est circa  
carnosæ partes phlegmone. Celsus singulas  
doloris dentium causas parim perpendens,  
confusa admodum remedia in medium pro-  
ferri: ac quantumvis experientia comprobata  
pleraque sint, & ratio ipsa dicat eadem  
utilia admodum esse; in hoc tamen non satis  
obseruasse methodum videtur, quod frigidis  
calida, calidisque frigida statim subiunxerit.

## &amp; quinq;folij radix.

**Q**UINQUEFOLII radici non modò  
facultas attribuitur, ut dentium dolori  
mederi possit, verum etiam eosdem illa-  
s feruare creditur, si quotidie comanducetur.

## Ex populo albâ.

**I**STHVC an. vernum sit, ambigo.

## Specillum quoque.

**C**LARIVS nonnihil Scribonius Largus  
hanc curandi rationem describit: Vbi dolor,  
inquit, fuerit, auriscalpium lana molli inno-  
luitur; deinde tingitur fermentissimo oleo;  
atque ita denti primum, deinde proximis  
gingivis superponitur bis terve, donec hebe-  
rescat aliqua ex parte dolor: post hoc medi-  
camento dens operitur. Si repetierit, aut  
permanferit nihilominus aliquis dolor, super  
medicamentum auriscalpium cum lana ex  
oleo candenti eodem modo imponere sæpius  
oportebit, hoc est donec dolor tollatur.

## vux timineæ.

**I**AM antè dictum est tamineæ le-  
gendum esse.

## pyrethri, ficorum partes.

**H**IC, ut in Menemachi statim subse-  
quente compositione, ficorum pinguium  
substitues; quod & annotavit Ioannes Ca-  
sarius.

## Et plani piscis, quam.

**P**LINIVS libro XXXII. capite VII.  
Pastinaca, inquit, radio scarificare gingivas,  
& in dolore est utilissimum, coneriturque  
is, & cum helleboro albo illitus dentem sine  
vexatione extrahit.

## Et alumen scissile.

**I**DEM testatur Scribonius Largus: Nec  
minus, inquit, alumen fissum lineoleo fissò  
circundatum, & ita dolenti pressum duntius  
continere prodest.

## herbam menthastrum.

**M**ENTHASTRUM commanducatum  
dentibus dolentibus summè prodesse auctor  
est Scribonius.

De Tes-



## CAPVT X.

*De Tonsillis, & earum cura.*

Radix dul-  
cis.  
\* cont. in p.  
\* Lenibul-  
que

\* P.V.

\* ex fico  
paul.

\* leniter-  
que

**S**I verò tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput velandum est extrinsecus, is locus vapore calido fouendus, multa ambulatione vtendum, caput in lecto sublimè habendum, gargarizandumque est ex reprimentibus. Radix quoque ea, quam dulcem appellant, \* contusa & in passo, mulsove decocta idem præstat. \* Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est, quæ hoc modo sunt: Ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit, tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. ii. \*. per se conteruntur, paulatimque his adiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis vnus, deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. Aut eiusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita ei adiciuntur hæc: Nardi \* p. \*. omphacij p. i. \*. cinnamomi, myrrhæ, casia, singulorum p. i. \*. Eadem autem hæc & auribus, & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoque in hac valetudine lenis esse debet, ne exasperet. Quòd si tanta inflammatio est vt spiritum impediat, in lecto conquiescendum, à cibo abstinendum, neque assumendum quicquam præter aquam calidam est. Alius quoque ducenda est. Gargarizandum ex fico & mulso. Illinendum mel, cum omphacio. Intrinsecus admouendus, sed aliquanto diutius, vapor aquæ calidæ, donec ea suppurent, & per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur, hi tumores incidendi sunt, deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico. At si modicus quidem tumor & exulceratio est, fursurum cremori ad gargarizandum \* paulum mellis adiciendum est, illinendaque vlcera hoc medicamento. Passi quamdulcissimi tres heminae ad vnam coquantur, tum adicitur thuris p. i. \*. croci, myrrhæ, singulorum p. i. \*. \* leniterque omnia rursus feruescunt. Vbi plura vlcera sunt, eodem



eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizandum est. Atque hîc quoque cibis lenibus opus est, quibus adiici dulce vinum potest.

## ENARRATIO.

QVE MADMODYM glandula indurata, inquit Paulus, struma appellatur; ita etiam tonsilla inflammationem experit, aut supra modum naturalem aucta, & veluti desiccata, cibi potisque & spiritus iter impediens, è regione sibi innicem utrimque opposita, eodem parvis vocabulo tonsilla, Græcis *αἰνιδες* nominantur, alij

παλιδες dicere malunt, hodie columellam appellant. Inflammatio ex dolore & colore dignoscitur: siquidem ubi solummodò tument, aperto ore maiores quidem, ceterum sibi ipsis concolores apparent; verum ubi inflammatio easdem exerceat, seipsis rubicundiores, & dolorificæ redduntur.

## CAPVT XI.

*De Oris ulceribus, & curationibus, & quæ Anthera sunt.*

VLCEA autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt, optimè his medicamentis curantur, quæ supra posita ex malis punicis fiunt. Continendusque saepe ore reprimens cremor est, cui paulum mellis sit adiectum. Utendum ambulationibus, & non acri cibo. Simulatque verò pura vlcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quàm optima aqua ore continenda est. Prodestque assumptum purum vinum, pleniorque cibus, dum acribus vacet. Inspergi que vlcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. Si iam crustas habent, quales in adultis esse consuerunt, adhibendæ sunt hæ compositiones quas Græci *αὐθνές* nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sandaracæ, singulorum p. iiii. \*. aluminis pares portiones. Aut croci, myrrhæ, singulorum p. ii. \*. iridis, aluminis scissilis, sandaracæ, singulorum p. iiii. \*. iunci quadrati p. vii. \*. Aut gallæ, myrrhæ, singulorum p. ii. \*. aluminis scissilis p. ii. \*. rosæ foliorum p. iiii. \*. Quidam autem croci p. \*. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorū p. i. \*. sandaracæ p. ii. \*. iunci quadrati p. iiii. \*. miscent. Priora arida insperguntur. Hoc cum melle illinitur, neque vlceribus

ff

bus



bustantum, sed etiam tonsillis. Verum ea longè periculosissima vlcera sunt, quas *ἀφθὰς* Græci appellant, sed in pueris: hos enim sæpe consumunt, in viris & mulieribus idem periculum non est. Hæc vlcera à gingiuis incipiunt, deinde palatum, totumque os occupant, tum ad vuam faucesque descendunt. Quibus obsessis, non facile fit, vt puer conualescat. Ac miserius etiam est, si lactens adhuc infans est, quominus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisque operibus, quæ superiores partes mouent. Mittenda in balneum, iubendaque ibi calida aqua mammas perfundere, tum alenda cibis lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Portiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. Ac si alius nutrici substitit, ducenda est. Si pituita eius in os coit, vomere debet. Tum ipsa vlcera perungenda sunt melle, cui <sup>\* ros,</sup> rhus, quem syriacum vocant, aut amaræ nuces adiectæ sunt. Vel mistis inter se rosæ foliis aridis, pineis nucleis, menthæ coliculo, melle. Vel eo medicamento, quod ex moris fit, quorum succus eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinem coquitur, eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel, miscetur. Neque quicquam dandum, <sup>\* à quo</sup> ad quod humor euocari possit. Si verò iam firmior puer est, gargarizare debet his fere, quæ suprà comprehensa sunt. At <sup>\* leniora</sup> si <sup>\* lenia</sup> medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda ea, quæ adurendo crustas vlceribus inducant. Quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest <sup>\* maxima</sup> etiam fames, & abstinencia quanta <sup>\* maximè</sup> imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen vlcera interdum caseus ex melle rectè datur.

## ENARRATIO.

quas Græci *ἀφθὰς*.

**A**NTHERAS, inquit Ioannes Marnardus libro octauo, vocant medici, compositiones quasdam agriuinibus oris accommodatas, quibus rosa miscetur: quo

fit vi non floridas antidotos, reddendum puer, uti fecit Marcellus Virgilius, sed eadem voce utendum, ubi & hunc Celsi locum citat. Videtur tamen paulo latius apud medicos anthera nomen usurpatum: nam Celsus ipse capite xviii. huius libri, medica-

mento.



mento anthera dicto, non solum ad oris, sed & ad pndendum partium ulcera vitur: & Galenus libro De compositione medicamentorum localium quarto, illitionem ad oculos antheram dictam describit. Præterea Paulus Ægineta ad fissuras calcaneorum aliam compositionem antheram nominatam recenset; quarum neutra, contra quam Manardus refert, rosas recipit; sicuti nec hæc quas hic in medium producit auctor noster, præter eam qua ordine tertia est, que rose foliorum \* p<sup>o</sup> IIII. recipit. Habet tamen

Scribonius compositum quoddam medicamentum, quod anthera vocari dicit, ad omnia ulcera accommodum rosas recipiens.

sed in pueris.

SECUNDO libro pueritia maximè familiares esse aphthas dictum est, atque easdem Galenus in pueris contra quam auctor noster facillimè curari auctor est; qua verò accidunt iis qui ad perfectam ætatem perueniunt, non ita facillè, præsertim ubi ob vitiosorum humorum defluxum excitantur.

## CAPVT XII.

De \*linguæ ulceribus.

\*linguarum

Linguæ quoque ulcera non aliis medicamentis egent, \*Gingiuæ quàm quæ prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quæ in latere eius nascuntur, diutissimè durant. Videndumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere saepe vlcus eo loco non sinit, ideoque limandus est.

## CAPVT XIII.

De parodontidibus, gingiuarum tuberculis, deque aliis ulceribus gingiuarum.

SOLENT etiam interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quædam oriri dolentia, \*παροδοντίδας Græci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perficere oportet, aut inter se mixtis sale fossili, com busto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare, donec pituitæ satis profluat. In maiore verò inflammatione iisdem medicamentis vtendum est, quæ ad ulcera oris supraposita sunt: & mollis linamenti paulum inuolucendum aliqua compositione ex his, quas antheras vocari dixi, demittendumque id inter dentem & gingiuam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admouendus erit spongiæ vapor calidus, imponendumque ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo

Aldus coniungit hoc caput cum præcedente, neque titulum addit. \*παροδοντίδας

ff 2

vapore



\* tubercu-  
lum

\* eius  
\* *παρὰ δὲ ὀ-  
ντὸς* vel *πα-  
ρὰ δὲ ὀντὸς* fuit,  
siue non  
fuit, d. p.  
feratur,  
aut d. c. a.  
fr. v. a. v.  
o. m. id p.  
f. v. cōfue-  
uit. Quod  
ubi.

vapore vtendum erit, & continendum ore calidum mulsu-  
m, in quo ficus decocta sit. Itemque \* subcrudum incidendum,  
ne si diutius ibi pus permanferit, os lædat. Quod si maior is  
tumor est, commodius totus exciditur, sic vt ex vtraque parte  
dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore  
calidam aquam continere, & extrinsecus fouere eodem va-  
pore. Si maior est, lenticulæ cremore: vt iisdem medica-  
mentis, quibus cætera vlcera oris curantur. Alia quoque  
vlcera in gingiuis plerunque oriuntur, quibus eadem quæ in  
reliquo ore succurrunt. Maximè tamen mandere ligustrum  
oportet, succumque \* eum ore continere. Fit etiam inter-  
dum, vt ex gingiuæ vlcere, siue \* parodontides sint, siue non  
sint, diutius pus feratur. Quod aut dente corrupto, aut fra-  
cto, vel aliter vitiato osse, maximeque id per fistulam venire  
consuevit. vbi incidit, locus aperiendus, dens eximendus: testa  
ossis, si qua \* excessit, recidenda est: si quid vitiosi est, raden-  
dum. Post quæ, quid fieri debeat, supra in aliorum vlcerum  
curatione comprehensum est. Si verò à dentibus gingiuæ  
recedunt, eadem antheræ succurrunt. Vtile est etiam pyra,  
aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem  
continere. Idemque præstare non acre acetum in ore re-  
tentum potest.

\* abscessit,

#### ENARRATIO.

Solent etiam.

**S**YSPICATUR hic mendum esse post  
Manardum Gulielmum Pantinum, legen-  
dumque *παρὰ δὲ ὀντὸς*, idque quod Galenus,  
Ægineta, & Aëtius, & ante eos Scribo-  
nii Largus, ita nominarunt. est autem, vt  
scribunt, Parulis exiguis abscessus gingiuas  
infectans, Epulis autem tuberculum carnis  
est in iuxta dentium aliquem in gingiuis oriens.

Mihi verò, vt aliquid post tantos viros li-  
ceat, non omnino malè *παρὰ δὲ ὀντὸς* legi  
videtur, quando vocabuli ipsius etymon abs-  
cessum circa dentes exprimere videatur:  
nam quod Pynzanum perperam parodontibus  
impresserit, clarior est quàm vt dici debeat,  
praesertim quando dictio ipsa abscessum au-  
rium denotet, tum quod Celsus paulo post  
de parodontibus scribat.

#### CAPVT XIII

De Vuae morbo, & curatione.

**V**UAE vehemens inflammatio terrere quoque debet.  
Itaque in hac abstinentia necessaria est, & sanguis rectè  
mitti-



mittitur: & si id aliqua res prohibet, alius vtiliter ducitur, caputque super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa vua vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorum mel adiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. Constat ex his, alumine scissili, squama æris rubri, atramento futorio, galla, myrrha, misy. Quæ per se contrita mistaque rursus paulatim adiecto vino austero teruntur, donec his mellis crassitudo sit: vbi horum aliquo illita vua est, chelidonix quoque succo per cochlear illita vua maxime prodest. Fere multa pituita decurrit, cumque ea quieuit, ex vino calido gargarizandum. Quod si minor in ea inflammatio, lascerere, ei que adiacere frigidam aquam satis est, eamque aquam

Androniū.

\* sit. Chel.  
q. succus  
p. c. i. v.  
m. prodest.  
Vbi horū  
aliquo il-  
lita vua est  
fere m.

\* cochleari. \* cochleario exceptam ipsi vuæ subicere: Ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida, eodem modo subiecta, reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, vel cum lasere, vel sine eo hac curatione vuæ subiecta est.

\* eo. Acde-  
cur. vuæ  
productæ  
per manū  
ratio sub-  
iecta est.

## ENARRATIO.

**G**URGVLIO, columella, & vua, tam particula, quam affectus nomen est: est autem caruncula, quam gutturi natura protegumento dedit, qua voci ad magnitudinem, & pulchritudinem confert. quare Paulus ex Ægina medicus, gurgulionem tanquam aliquod vocis plestrum esse dicit: per eam enim aer ingreditur, scinditur, ac vehementia impetus eiusdem rumpitur. subiacet autem caruncula hæc distillationibus à capite, quæ eandem frequentissime corripunt; ac pro similitudine rei cui assimilatur denominationem accipere solet: siquidem quoties acino vua simile summum gurgulionis apparet, vua appellatur; at si eadem caruncula in longum per deflexionem deducatur, columella dicitur; quemadmodum si gracilescat omnino, & loro similis propendeat, lorum vocatur affectio.

cat, columella dicitur; quemadmodum si gracilescat omnino, & loro similis propendeat, lorum vocatur affectio.

## quod Andronium.

DESCRIBIT § LXIII. aliud medicamentum Andronium Largus: quod habet, mali granati corticis \* p<sup>o</sup> x. mali terra \* p<sup>o</sup> ix. aloës \* p<sup>o</sup> iiii. myrrha \* p<sup>o</sup> ii. galla \* p<sup>o</sup> viii. aluminis scissi \* p<sup>o</sup> iii. æris floris \* p<sup>o</sup> ii. teruntur, inquit, & cribrantur sicca, & curiose deinde admisceruntur passum creticum, dum habeat mellis spissitudinem: quod ut operosius ad herpetem, sacrum ignem, cancrumque oris utilissimum dicit.



## CAPVT XV.

*De Cancro oris.*

Si quando autem vlcera oris cancer inuasit, primò considerandum est, num malus corporis habitus sit, eiùque occurrendum, deinde ipsa vlcera curanda. Quòd si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera humido vlceri arida inspersa: sicciori cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, chartæ combustæ partes duæ, auripigmenti pars vna. Si penitus malum descendit, chartæ combustæ partes tres, auripigmenti pars quarta. Aut pares portiones salis fricti, & iridis frictæ. Aut item pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in \*rosa tingere, & super adurentia medicamenta imponere, ne vicinum & sanum locum lædant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniiciunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquunt, donec exsiccet, eumque salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum iniicitur, & antè & post os diluendum est, vel cremore lenticulæ, vel aqua in qua aut eruum, aut \*oleæ, aut verbenæ decoctæ sint, sic vt cuilibet eorum paulum mellis misceatur. Acetum quoque ex scilla retentum ore, satis aduersus hæc vlcera proficit \*. Ex aceto cocto sali, sicuti suprà demonstratum est, rursus mixtum acetum. Sed & diu continere vtrumlibet, & id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quòd si puer est, cui id incidit, specillum lana inuolutum in medicamentū demittendum est, & super vlcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturque aliqui dentes, \*refici eos oportet: nam curationes vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficient, vlcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem æquè adustum atque excisum, sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingiuarum verò ossa, quæ hebetia sunt, in perpetuum

\* fractæ.

\* rosaceo

\* oleæ folia,

\*: &amp; ex

\* refigi



petuum visione nudantur. Neque enim postea caro incre-  
scit. Imponenda tamen adustus lenticula est, donec sanita-  
tem, qualis esse potest, recipiant.

## ENARRATIO.

**M**OLESTVM admodum vitium quam latius serpat, eidem obuiam ire, atque  
est, ut ait Largus, quoties cancer os ut possimus optime mederi. in quem usum  
corripit, quod in iniuriis neglectum breui summe commendat precedente capite a nobis  
temporis spacio moris causa est. oportet igitur quamprimum visum fuerit, & ante ascriptum medicamentum Andronium.

## CAPVT XVI.

*De Parotidibus, quæ sub auribus oriuntur.*

**H**ÆC in capite fere medicamentis egent. Sub ipsis verò  
auribus oriri παρὼν δὲ solent, modò in secunda valetu-  
dine ibi inflammatione orta, modò post longas febres, illuc  
impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est. Itaque nul-  
lam nouam curationem desiderat. Animaduersionem tan-  
tummodo hanc habet necessariam, quia si sine morbo id in-  
tumuit, primum \*reprimendum experimentum est. Si ex  
aduersa valetudine, illud inimicum est, maturarique, & quàm  
primum aperiri, commodius est.

\* reprimen-  
dum ex-  
perimentum  
est.

## ENARRATIO.

**P**AROTIDES sunt & genere inflam-  
mationum: sunt autem glandulis circa  
aures affectis. Vsu autem venire videntur,  
ut interdum in secunda valetudine emer-  
gant; quemadmodum hic quoque, insert  
Celsus: nonnunquam etiam post morbos,  
maximèque febres, illuc impetu morbi per  
decretorium conuerso, & facta digestionem  
evidenti accidunt: quæ sanè tanquam mi-  
nimè exitiales promptissimè curantur, ac se-  
curitatem promittunt, plurimòque à gra-  
uissimis etià accidentibus vendicant. Quin-  
etiam contingit nonnunquam ex humorum  
redundantia, proficisci cum grauedine natu-  
ram irritante parotides: ferunturque in pe-  
ricula non leuia, nisi maturè suppurentur,  
ac digerantur. Galenus omnibus parotidi-  
bus pharmaca attractoria adhibet; at quo-  
se hac nihil efficiant, etiam cucurbitulas ap-  
plicat: Admittitur enim, inquit, ut humor  
peccans ex profundo ad cutem attrahatur;  
idq; potissimum, si in capite affectio sit fir-  
mata, humoribus videlicet in ipso obscura-  
tis. Celsus nescio quàm rectè in dextera  
valetudine oris parotidibus reprimenda ap-  
plicat.

## CAPVT



## CAPVT XVII.

*De Umbilici prominentis curatione.*

**A**D Umbilicos verò prominentes, ne manu ferroque utendum sit, antè tentandum est, vt abstineant, alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicutæ & fuliginis, singulorum p. i. \*. cerussæ elotæ p. iiii. \*. plumbi eloti p. viii. \*. ovis duobus, quibus etiam solani succus adiicitur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conquiescere hominem, cibo modico vti, sic vt vitentur omnia infantia.

## ENARRATIO.

**P**LINIUS prociduum Umbilicem nominat; Græci, vt docet Paulus libro sexto, ἰσχυράδης vocant, alij pueros quibus prociduum est umbilicus, Exumbilicæres dicere solent: Anicennas umbilici augmentum appellat. Efficitur autem variis de causis: contingit enim interdum peritoneo illic dirupto ac procideme, aut omento, aut

intestino: interdum colluvie ociosi humoris sub umbilico contractâ; interdum verò carne subnatâ; aliquando sanguine irruente propter venæ aut arteriæ rupturam, vt in aneurismatis: interdum non sanguine, verum spiritui solui irruente. Curantur iisdem quibus ramex inguinum: quauquans non vsque adeo uehementia requiritur.

## CAPVT XVIII.

*De obscenarum partium vitiiis,  
& curationibus.*

**P**ROXIMA sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent, quarum apud Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam vsu sunt, cum omni ferè medicorum volumine atque sermone iactentur: apud nos fœdiora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecundiùs loquentium \* commendata sunt: vt difficilis hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta seruantibus. Neque tamen ea res à scribendo detertere me debuit. Primum vt omnia quæ salutaria accepi, comprehenderem: dein quia in vulgus eorum curatio etiam præcipuè cognoscenda est, quæ inuitissimus quisque alteri ostendit.

\* accom-  
modata

*De Colis*



*De Colis morbis, & curationibus.*

**I**GITUR si ex inflammatione Coles intumuit, reduci que  
 summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida  
 aqua fouendus locus est. Vbi verò glans contacta est, oricu-  
 lario quoque clystere inter eam, cutemque aqua calida infe-  
 renda est. Si mollita sic & extenuata cutis, \*ducenti paruit, \*reducenti  
 expeditior reliqua curatio est. Si tumor vicit, imponenda est  
 vel lenticula, vel marrubium, vel oleæ folia ex vino cocta, sic  
 ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adiiciatur. Sur-  
 sumque coles ad ventrem deligandus est. Quod in omni  
 curatione eius necessarium est. Ilque homo continere se de-  
 bet, & abstinere à cibo, & potione aquæ tantum à siti vindi-  
 cari. Postero die rursus adhibendum iisdem rationibus aquæ  
 fomentum est, & cum vi quoque experiundum, an cutis se-  
 quatur. Ea que si non parebit, leuiter \*summo scalpello con- \*summa  
 cidenda erit. Nam cum sanies profluxerit, extenuabitur is  
 locus, & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo victa  
 erit, siue nunquam repugnauerit, vlceri vel in cutis \*ulteriore \*interiore  
 parte, vel in glande vtrave eam in cole reperientur: quæ ne-  
 cesse est, aut pura siccave sint, aut humida, & purulenta. Si  
 sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt: deinde impo-  
 nendum lycium ex vino est, aut amurca cocta cum eodem,  
 aut cum rosa butyrum. Si levis his humor inest, vino eluenda  
 sunt, tum butyri, & rosæ \*mollis paulum, & resinæ terebin- \* & mel-  
 thinæ pars quarta adiicienda est, eoque vtendū. \*Aut si pus ex lis  
 his profluit, ante omnia elui mulso calido debent. Tum im- \*At  
 poni piperis p. i. \*. myrrhæ p. ii. \*. croci, misyos cocti, singu-  
 lorum p. ii. \*. Quæ ex vino austero coquuntur, donec mel-  
 lis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsil-  
 lis, vix \*madentiori, nariumque vlceribus accommodata \*manden-  
 est. Aliud ad eam, piperis p. i. \*. myrrhæ p. i. \*. croci p. ii. \*. ti, oris,  
 misyos cocti p. i. \*. aris combusti p. ii. \*. quæ primum ex nar.  
 vino austero conteruntur, deinde vbi inaruerunt, iterum te-  
 runtur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur, donec visci cras-  
 situdinem habeant. Ærugo quoque cum cocto melle, & ea

§§

quæ



\* *Ac* quæ ad oris vlcera supra comprehensa sunt, curant. \* *Aut* Eratostheni compositio, aut Cratonis rectè super purulenta naturaliter imponitur. Folia quoque oleæ ex nouem cyathis vini coquantur. His adiicitur aluminis scissilis p. iiii. \* lycij p. vii. \*.

\* *At* mellis sesquicyathus. \* *Ac* si plus puris est, id medicamentum ex melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est, post curationem dum inflammatio manet, quale suprapositum est, cataplasma super dare, & quotidie vlcera eadem ratione curare. Quod si pus & multum, & cum malo odore cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, vt ei mellis paulum adiciatur: aut oleæ, aut lentisci folia, vel marrubium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum melle vtendum, imponendaque eadem, aut etiam omphacium cum melle, aut id quod ex arugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut anthera, sic, vt ei paulum mellis adiciatur. Quidam vlcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex vino curant. Si verò vlcus latius atque altius serpit, eodem modo clui debet. Imponi verò, aut arugo, aut omphacium cum melle, aut Andronis compositio, aut

\* *myrrhæ,* marrubij, \* *myrrhæ,* aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ  
croci, foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. \*. minij sinopici p. ii. \*. Quæ per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinem

\* *habeant,* \* *habeant:* tum in æneo vase leniter coquantur, ne super-  
in æneo fluant. Cum iam guttæ indurescunt, vas ab igne remouetur, idque medicamentum, prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas vtile est. Solet etiam interdum ad nervos vlcus descendere, profluitque pituita multa, sanies tenuis malique odoris, \* non cocta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est. Doloresque is locus & punctiones habet. Id genus quamuis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est, quale est emplastrum *ῥοσάδερμανον* ex rosâ liquatum, sicut thuris quoque paulum ei misceatur. Aut id quod ex butyro, rosâ, resina, melle fit, supra verò à me positum est. Præcipueque id vlcus multa calida aqua fouendum est, velandumque, ne-  
que



que frigori committendum. Interdum autem per ipsa vlcera, coles sub cute exesus, sic vt glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. Perpetuumq. est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse seruandam, ne concidat, vlcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque vrinae includat. Tubercula etiam, quæ *φύματα* Græci vocant, circa glandem oriuntur, quæ vel medicamentis vel ferro aduruntur: & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

## ENARRATIO.

Igitur si ex.

**C**ELSVS vitium hoc sequente libro *φύματος*, alij *περὶ φύματος* dicere maluerunt.

vel lenticula.

**SCRIBONIVS** Laryus lentem coctam & ex aqua tritam, & rosaceo oleo admixtam, mirificè prodesse auctor est; & si maior tumor sit, mali granati corinm ex aqua coctum & tritum lenticula pari pondere miscere docet.

Ac si plus puris est.

**OMNE** etenim vlcus, in quavis etiam parte corporis, sordidum, purgat, mel per se, aut cum iride, terra malo aut simili aliquo mixtum.

lycio ex vino curant.

**EST** enim lycium, vt auctor est Galenus, *επ' εγγυρίαις*, hoc est ex diuersi generis substantiis coalitum: unde quum & digeratur & desiccat non parum, & astrictionis cuiusdam particeps sit, ad vlcera continuacia, & purredines vtilissimum dicit.

*De Cancro, qui in cole nascitur, curatione.*

**H**ÆC citra cancrum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque vel præcipuè vlcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupauit, protinus specillum subiiciendum, eaque incidenda est, deinde ora vulsellaprehendendæ: rum quicquid corruptum est, excidendum, sic vt ex integro quoque paulum \* demat, idq. adurendum. Quoties \* demas, quid vltimum est, id quoque sequitur, vt imponenda lenticula sit, deinde vbi crustæ exciderunt, vlcera sic, vt alia, curentur. At si cancer ipsum colem occupauit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq. id quod ex calce, chalcitide, auri-pigmento componitur. Si medicamenta vincuntur, hinc quoque scalpello quicquid corruptum est, sic vt aliquid etiam integri \* trahat, præcidi debet. Illud quoque æquè perpetuum \* detrahat, est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed siue ex me-

gg 2

dicamen-



dicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerunt, magnum periculum est, ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ puræ leniter resoluantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immaturè crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timidè debet, neque villo postea motu dandus eidem periculo locus est.

## ENARRATIO.

**C**ANCER omnibus locis nascitur, maximè tamen fungosis.

protinus specillum.

**S**OLI cancri, ut auctor est Galenus, curationem huiusmodi admittunt, qui in summa parte corporis hærent, quique exulcerati sunt, atque adeò laborantes fatigant, ut ipsi vltro chirurgi operam efflagitent, & simul in talibus partibus existant,

quas rescare aut exurere vni cum radicibus possit: ac tum quidem pramonendi sunt tam astantes, quam æger ipse de periculo quod ex sanguinis profusione oriri possit: nam nisi summa cautio adhibeatur, moriendum est ne propter vasorum multitudinem, profusio sanguinis sequatur, quæ ægri sustineri possit. Phagedænas autem, & alia maligna ulcera, eodem quo cancris modo curare docet Galenus.

*De Phagedæna in cole nascentis curatione.*

\* genus  
cancris  
\* ibi oriri

**N**ONVNQVAM etiam id \* genus ibi cancri, quod *φάγας* *δαίμων* à Græcis nominatur, \* oriri solet, in quo minimè differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est, & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac si sustinui-  
mus, usque ad vesicam tendit, neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam urinæ est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum. Si verò altè penetrauit, quicquid occupatum est, præcidendum est. Cæterum eadem, quæ in aliis cancris, facienda sunt.

*De Carbunculo, qui in cole nascitur.*

**O**CCALLESCIT etiam in cole interdum aliquid, id quæ omni penè sensu caret, quod ipsum quoque excidi debet.

Carbun-



Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est. Deinde ipse quoque medicamentis vrendus, maximeque chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle. \* Vbi is excidit, liquidis medicamentis vten-

\* aut ouil-  
lo stercore  
& contrito  
cum eodē  
melle.  
Vbi is

*De Testicularum morbis, & eorum curatione.*

**I**N testiculis verò, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est, à cibo abstinendum, imponendum \* ex faba farina ex mulso cocta, cum cumino contrito ex melle cocto. Aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto. Aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso, aut lilij radix contrita. \* Aut si iidem induruerunt, imponi debet lini vel fœnigræci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum: aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adiectum. Si vetustior iam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est, magisque si etiam liuent. Imponendum verò vtrumlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque proposita sunt. Aut ea compositio quæ habet nitri cocti p. i. \*. resinæ pineæ, gummi, singulorum p. ii. \*. vuæ tamihæ sine seminibus p. iiii. \*. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid \* desit, fere quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quàm si inciso scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

\* catapla-  
sina ex fa-  
bæ far. c.  
m. c. c. c.  
contrito &  
ex m. coa-  
cto.

\* At si

\* hæsit, f.  
pus quoq.

**ENARRATIO.**

In testibus verò.

**S**ERENVS Sammonicus ex vino decoquit, dicens:  
Vel bulbi ex mulso, vel cera immixta cupresso,  
Aut faba cum tepidis Bacchi decocta fluentis.

cocta cum cupresso.

Idem tradit Plinius libro XXI.

capite v. & Serenus, ut iam dixi, nisi quod ceram ex mulso, cupresso, admiscet. Hippocrates cupressi ramenta, & amaracum in passo aqua temperato decoquit, atque collinit ulceratas partes.

Si vetustior iam.

ORIBASIVS & Æginesa lolij farinam eidem addunt.



*De Rhagadiis, & Condylomate, & Hamorrhoidibus,  
aliisque ani morbis, & curationibus eorum:*

*& primò de Rhagadiis.*

**A**NVS quoque multa tædiiq̃ue plena mala recipit, \* nec  
in se multum \* abhorrentes curationes habet. At pri-  
mum in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis \* exciditur,  
Peyædia Græci vocant. Id si recens est, quiescere homo de-  
bet, & in aqua calida desidere. Columbina quoque oua co-  
quenda sunt, & ubi induruerunt, purganda: deinde alterum  
iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, sic  
ut inuicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum,  
aut rhypodes rosa diluendum est, aut \* hyssopum recens mi-  
scendum cum cerato liquido ex rosa facto. Aut eidem cerato  
liquido plumbum elotum adiciendum. Aut resinæ terēbin-  
thinæ myrrha, aut spumæ argenti vetus oleum. \* Et quolibet  
ex his id perungendum. Si quicquid læsum est, extrâ est, ne-  
que intus reconditum, eodem medicamento tinctum lina-  
mentum superdandum est, & quicquid antè adhibuimus ce-  
rato contegendum. In hoc autem casu neque acris cibis  
utendum, neque asperis, nec aluum comprimentibus: \* ne  
aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum pau-  
lum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt. Vino  
leni uti nihil prohibet.

#### ENARRATIO.

**R**HAGADES siue fissura in sedo sunt, primum per medicamenta; deinde, si non  
quandoque in astrictiore parte seu mu-  
sculo adstringente; quandoque verò in ano:  
successerint, per chirurgiam sunt.  
& aliquando ex insistentium acrimonia con-  
sistunt; aliquando autem propter condylo-  
matum inflammationem, partes circumsta-  
rupturam sustinent. Curationes quidem

Columbina quoque oua.

IDEM testatur Hippocrates libro De  
fistulis; recipit tamen pro aqua vinum vi-  
grum, ut intestinum confrinet.

#### De Condylomate.

**C**ONDYLOMA autem est tuberculum, quod ex qua-  
dam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod  
ad quietem, cibos, potionesq̃ue pertinet, eadem seruari de-  
bent, quæ proximè scripta sunt. Iisdem etiam ouis rectè tu-  
bercu-



berculum id fouetur. Sed desiderare antè homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus. Tum rectè imponitur & lenticula cum exigua mellis parte, & fertula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa factò, & cum eodem cerato contritū vel cotoneum malū, vel malicorij ex vino cocti pars interior, & chalcitis \*cocta \* vsta atque cōtrita, deinde \* hyssopo ac rosa excepta. Et ex ea compositione, quæ habet thuris p. i. \*. aluminis scissilis p. ii. \*. cerussæ p. iii. \*. spumæ argenti p. v. \*. Quibus dum reruntur, inuicem rosa & vinum instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ab altera verò parte totidem fascias habet: cumque subiectus est, ansis ad ventrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq. vbi artatæ sunt, dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdataque circa aluum inter se nouissimè nodo deligantur. Sed si vetus condyloma iam induruit, neque sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat, æruginis p. ii. \*. myrrhæ p. iiii. \*. gummi p. viii. \*. thuris p. xii. \*. stibis, papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū p. xvi. \*. quo medicamento quidam etiam vlcera, de quibus proximè dixi, renouant. Si \* hoc parum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementiùs adurentia. Vbi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est.

\* clypo,  
ac rol. id est  
rosaceo.

\* id non  
dum in

#### DE NARRATIO.

**C**ONDYLOMATA interim cum inflammatione sunt, interim sine eadem: quæ inflammationis expertia sunt, mollia esse consueverunt; quæ verò inflammationem adiunctam habent, dura magna ex parte sunt. Celsus inflammationem solam subsequi contendit. Sunt autem condylomata tubercula quæ in sede sunt, rursus aliquæ corporum in ano conduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescente; nonnulli

varices cæcas appellant: Paulus non antè quàm obcalluerit condyloma appellat; significat quando intumuit tantum, tuberculum nominat. quod & Celsus fecisse videtur, qui paulo post fungum vlcus pro tuberculo Æginetæ accepisse videtur: nam quid aliud per fungum velit, ingenuè fateor me ignorare.

Vinculum autem ei loco.

HVIC nō absimile est Heliodori vinculum quod inscribitur, Cassuta iunctura ad anū.

#### De Hemorrhoidibus.

**T**ERTIVM autem vitium est, ora venarum \* tanquam \* tanq. ca. ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt,



fundunt, αἱμορροΐδες Græci vocant. Idque etiam in ore vulvæ  
 fœminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum  
 tutò supprimitur, qui sanguinis profluuiò imbecilliores non  
 sunt. Habent enim purgationē hanc, non morbum. Ideo-  
 que curati quidam cum \* sanguinis exitum non haberent,  
 inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & grauissimis  
 morbis correpti sunt. Sicuti verò id nocet, is desidere in aqua  
 ex verbenis debet: imponere maximè malicorium cum ari-  
 dis rosæ foliis contritum, aut ex his aliqua quæ sanguinem  
 supprimunt. Solet autem \* oriri inflammatio, maximè vbi  
 dura aluus eum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum  
 est, & id fouendum ouis, imponendi vitelli cum rosæ foliis  
 ex passo \* subactis: idque si intus est, digito illinendum: si  
 extrà, super illitum panniculum imponendum est. Ea quo-  
 que medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic  
 idonea sunt. Cibis verò in hoc casu iisdem, quibus in priori-  
 bus, vtendum est. Si ista parum iuuant, solent imposita me-  
 dicamenta adurentia, ea capitula absumere. At si iam vetu-  
 stiora sunt, sub auctore Dionysio inspergenda sandaraca est,  
 deinde imponendum quod ex his constat: Squamæ æris, au-  
 ripigmenti, singulorum p. v. \*. saxi calcis p. viii. \*. postero  
 die acu compungendum. Adustis capitulis fit cicatrix, quæ  
 sanguinem fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne  
 quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia  
 est. Prætereaque & viris & fœminis, quibus menstrua non  
 proueniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

\* sanguis  
 ex. n. habet,  
 ret,

\* ibi oriri

\* subactis:

#### ENARRATIO.

IDEM tradit Auicennas; atque eas tan-  
 tum curationem recipere docet, quæ pro-  
 mment: nam quæ in profundo deliteſcunt,  
 incurabiles dicit: sunt enim hæmorrhoides  
 quandoque in osculo vteri, quandoque in  
 collo, & aliquando in ipſo vtero; & ali-  
 quando, licet rarò, in pudendo contingunt.  
 Respondent per omnia iis quæ in ano sunt:  
 nam & sanguinem sæpenumerò profun-  
 dunt.

#### Ideoquæ curati quidam.

SIC Hippocrates sexto De morbis vul-  
 garibus, Qui hæmorrhoides habent, inquit,  
 neque peripneumonia, neque pleuride, ne-  
 que phagedæna, neque furunculo, neque tu-  
 berculis terebinthi figuram habentibus, corri-  
 piuntur; fortassis autem neque lepra, for-  
 tassis neque vitiligine. Rationem reddidi-  
 mus secundo libro, vbi multa ad locum hunc  
 facientia in medium attulimus.

Si anus



*Si anus vel os vuluæ procidit, qua cura-  
ratione utendum sit.*

**A**T si anus ipse, vel os vuluæ procidit (nam id quoque interdum fit) considerari debet purumne id sit, quod prouolutum est, an humore mucoso \*circundatum. Si purum \*circun-  
est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis, detur.  
vel malicorio incocta. Si humidum, vino austero subluen-  
dum est, illinendumque fæce vini combusta. Vbi utrolibet  
modo curatum est, intus reponendum est, imponendaque  
plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta, tum linteo-  
lum, & supèr lana æquè deliganda, cruribus inter se deuinctis.

## ENARRATIO.

aut salsa.

plantago contrita.

**P**ER muriam (inquit Aërius) aut aquam  
marinam prius anum fovere solemus  
prolapsum; & sæpe nullo alio auxilio opus  
habemus.

**I**N pueris tamen astringentium usum  
remittere oportet, & mitiora adhibere.

*De ulcere fungo simili in ano.*

**F**VNGO quoque simile vlcus in eadem sede nasci solet. Id,  
si hyems est, egelida: si aliud tempus, frigida aqua foven-  
dum est: deinde \*spuma æris inspergenda, supraque ceratum \*squama  
ex myrteo factum, cui paulum \*squamæ fuliginis, calcis sit ad- \*ærisqua-  
iectum. Si id hac ratione non tollitur, vel medicamentis ve- \*ma, thuris  
hementioribus, vel ferro adurendum est. fol. & cal. C.  
adiectum,  
si hac rat.

## CAPVT XIX.

*De digitorum vlceribus.*

**D**IGITORVM autem vetera vlcera commodissimè cu-  
rantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum utrilibet vinum  
adiectum est. In iisdem recedere ab vngue caruncula cum  
magno dolore consuevit, πτερυγιον Græci appellant. Oportet  
alumen melinum rotundum in aqua liquare, donec mellis  
crassitudinem habeat: tum quantum eius aridi fuit, tantun-  
dem mellis infundere & \*radiculam miscere, donec similis \*radicula  
hh croco



\* malunt:  
cum

\* squamæ  
æris

\* aliquid  
\* aliàs  
P. IIII.

\* nascun-  
tur.

croco colore fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum decoquere simul \* maluam solent: cum paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fouendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factum: Chalcitis, malicorium, squama æris excipiuntur fico pingui leniter cocto ex melle. Aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. Aut æruginis rasæ P. I. \*. \* squamæ P. II. \*. mellis cyatho coguntur, aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est, tertio die digitus resoluendus est. Si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandus scalpello, tenuibusque ferramentis adurendus est, & sicut reliqua vsta curandus est. At ubi scabri vngues sunt, circumaperiri debent, quia corpus contingunt, tunc super eos ex hac compositione æquè imponi sandaracæ, sulphuris, singulorum P. II. \*. nitri, auripigmenti, singulorum P. II. \*. resinæ liquidæ P. VIII. \*. Tertioque id die resoluendum est. Sub quo medicamento vitiosi vngues cadunt, & in eorum locum meliores \* renascuntur.

#### ENARRATIO.

πτερυγίων.

SVNT nonnulli qui perperam πτερυγίων cum πτερυγίων, hoc est Latinorum Redumiis, confundant, atque idem esse existiment; quod πτερυγίων has magnâ ex parte subsequi soleat. Est autem πτερυγίων (quem admodum auctor est Ægineta libro 6. cap. 85.) in vnguibz carnis incrementum partem vnguis operiens. Fit autem potissimum in pedis nanisque pollicibus. in pedibus quidem ex offensione magna ex parte: in

manibus autem ex neglectâ redumiâ, & post inflammationem in pus mutatâ.

excipiuntur fico.

ABTIVS caricas pingues torret, ita ut probe teri possint; atque sic cum melle misceat.

At ubi scabri vngues.

GRÆCI leprosos vngues dicunt: Auicenna baras, & lepram patientes vngues vocat: Celsus, sicut & Plinius, scabros dicere maluit.

AVRE-



A V R E L I I  
C O R N E L I I C E L S I  
D E  
R E M E D I C A  
L I B E R S E P T I M V S ,  
D E C H I R V R G I A .

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

*De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis  
esse Chirurgus debeat, & quid in hoc  
libro describatur.*



TERTIAM esse medicinæ partem, quæ manu curet, & vulgo notum, & à me propositum est. Ea non quidem medicamentata atque victus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat, estque eius effectus inter omnes medicinæ partes euentissimus. Siquidem in morbis cum multum fortuna conferat, eademque sæpe salutaria, sæpe vana sint, potest dubitari secunda valetudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamenti maxime nitimur, quamuis profectus euentior est, tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quæ manu curat, euidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adiuuetur, hinc tamen \* plurimum trahere. \* vt plur.  
Hæc autem pars cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinæ Hippocrate, quam à prioribus ex-

h h 2

culca



culta est. Deinde posteaquàm diducta ab aliis habere professores suos cœpit, in Ægypto quoque increuit, Philoxeno maximè auctore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissimè comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & <sup>\*Heronēs,</sup> Hieron, & Apollonij duo, & Ammonius Alexandrinus, multiq̃ue alij celebres viri, singuli quædam repperunt. Ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeq̃ue nuper Tryphon pater, & Euelpistus, <sup>\*Phlegētis filius,</sup> & vt ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinæ adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec vnquàm intremescente, eaq̃ue non minus sinistra, quàm dextra promptus, acie oculorum acri, claraq̃ue, animo intrepidus, immisericors, sic vt sanari velit eum, quem accipit, non vt clamore eius motus, vel magis quàm res desiderat, properet, vel minus quàm necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti propriè vendicandum sit, quia vulnerum quoque vlcèrumq̃. multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominè posse omnia ista præstare concipio. Atque vbi se diuiserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit, & in quibus vulneribus vlcèribusve plus perfici manu, quàm medicamento credo: tum quicquid ad ossa pertinet, quæ deinceps exequi adgreddiar, dilatisq̃ue in aliud volumen ossibus, in hoc cetera explicabo: præpositisq̃ue his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

## CAPVT I.

*De Luxatis.*

**L**VXATA igitur, in quacunque parte corporis sunt, quamprimum sic curari debent, vt quà dolor est, ea scalpello <sup>\*detergeturq̃ue</sup> cutis crebro incidatur, \*detergeturq̃ue eodem aduerso profluens.



fluens sanguis. Quod si paulò tardiùs subuenitur, iamque etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoque accessit, quacunque is est, id optimum auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt: maximeque lana succida ex aceto & oleo. Quod si leuior is casus est, possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoque maximè ex sarmentis. Si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

## ENARRATIO.

Luxata igitur.

IMPROPRIE admodum luxationis nomine hic usus videtur Celsus pro con-

usione: clarum namque est luxatum membrum id propriè dici, quod suo loco motum est; de quo sequenti libro tractat.

## CAPVT II.

*De his quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sint.*

VERVM hoc quidem promptum est. In his autem negotium maius est, quæ per se vitio intus orto intumescunt, & ad suppurationem spectant. Ea omnia genera abcessuum esse aliàs proposui, medicamentaque eis idonea executus sum. Nunc superest, vt dicam in iisdem quæ manu fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet, quæ quicquid illuc malæ corruptæque materiæ coit, extrahat, idque iterum tertioque rectè fit, donec omne indicium inflammationis excedat. Neque tamen fas non est, nihil cucurbitula agere. Interdum enim, sed rarò, quicquid abscedit, velamento suo includitur, id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis neruosa est, dicit non nasci sub eo vitio neruum, quo caro consumeretur, sed subiecto iam vetustiore pure cal- lum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem si callus est, fieri debet. Neque vlla res prohibet, etiam si callus est, tamen quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturior

\*excedat.

\*cucurbitulam

Tunica:

h h 3

hæc



hæc interdum esse consuevit. Ideoque quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutauit. Ergo siue id incidit, siue iam durities est, in hac auxilij nihil est. Et ut alias scripsi, vel auertenda concurrens eò materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præter ea necessarium est. Si pus maturuit in alis quidem & in inguinibus, raro secandum est. Item ubicunque mediocris abscessus est. Item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est, nisi festinare \*curantis imbecillitas cogit. Satisque est \*cataplasmata efficere, ut per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem altius malum est, considerari debet, nervosusne is locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet. Cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euocandum patet, paruaque postea cicatrix fit. At si nerui iuxta sunt, \*in hoc periculum est, ne vel distendantur hi, vel membrum debilitent. Necessaria verò opera scalpelli est. Sed cætera etiam subcruda aperiri possunt. Inter nervos verò vltima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eique pus iungat, quod propius reperiatur. Itemque \*alia rectam \*plagam desiderant in \*carne, quia fere vehementer cutem \*extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem ubi scalpellus admouetur, id agendum est, ut & quam minimæ, & quam \*paucissimæ plagæ sint: cum eo tamen ut necessitati succurramus & in modo & in numero. Nam maiores sinus, latius interdum etiam duabus aut pluribus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut inus sinus exitum habeat, nequis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam ubi post longos morbos totus corporis habitus \*vitiatus est, lateque se sinus \*diffudit, & in eo pars cutis pallit, scire licet eam iam emortuam esse, & inutilem futuram. Ideoque excidere commodius est, maximè si circa articulos maiores id euenit, cubantemque agrum fluens alius \*exercuit, neque per alimenta quicquam corpori accedit.

\* eubantis

\* cataplasmatas

\* in hoc

\* alia

\* solum pl.

\* cute: a-

lia, quia

\* extenuat,

\* paucis-

simæ

\* suffudit,

\* exhau-

rit, al. ex-

haust,



dit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folij fiat, quo facilius sanescat. Idque perpetuum est. \* Vbi-  
cunque medicus ex quacunque causa cutem excidit, pure  
effuso in alis vel inguinibus, linamento opus non est. Spon-  
gia ex vino imponenda est. In cæteris partibus si æquè ea li-  
namenta superuacua sunt, purgationis causa paulum mellis  
infundendum, dein glutinantia super danda. Si illa necessa-  
ria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem modo  
ex vino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit,  
quando non sit, aliàs dictum est. Cætera eadem, incisa sup-  
puratione, facienda sunt, quæ ubi per medicamenta rupta est,  
facienda esse proposui.

\*, vb. m.  
& quac.  
de cau. c.  
excidat.  
Pure.

## ENARRATIO.

**A**BSCISSVM, ἀπόσκημα Græci vo-  
cant. eius duplex genus est, ut XIII.  
methodi medendi docet Galenus; unum, quum  
phlegmone in pus versâ, pus ipsum tanquam  
in sinu aliquo est collectum; alterum, quum  
nulla precedente phlegmonè humor aliquis  
statim ab initio, isq; aliâ specie alius, cæte-  
rum omnino acris, in parte aliqua colligitur.  
Porro excoriât hic circumposita corpora, spa-  
cium videlicet sibi moliens, vel inter duas  
innicas, vel sub certis membranis.

## Ergo priusquam.

**E**TSI quam maxime utilis sit usus  
cucurbitæ; cavendum tamen est, ne ante  
universalem purgationem applicetur, quod  
periculum sit ne plus noxii humoris ad par-  
ticulam affectam attrahatur, quam per ean-  
dem evacuari possit.

## Si pus maturuit.

**IDEM** suadere videtur Galenus XIII.  
methodi Therapeutice: Si pus aliquod, in-  
quit, notabile in suppurante particula sit  
contentum, non expedit (quod nonnulli faci-  
unt) protinus incidere; imò exhalationem  
moliri medicamentis ad id valentibus, quo-  
rum usus ex affectu sit contestatus. A duris  
autem abstinendum est; qualia emplastra  
sunt: nam & phlegmones reliquias contra-

hant, & rursus phlegmonem in egra parte  
excitant; quo fit ut Celsus cataplasmata sa-  
tis id efficere dixerit. Verum cur si in-  
flammationi contumax sit phlegmon, in alis  
& inguinibus rarò secundum dicat, admo-  
dum demiror; præsertim quando Galenus,  
Aëtius, atque alij omnes inrepide sectionem  
faciant, adhibita interim cautione, ne ner-  
uos, arterias aut tendones incidamus. Nam  
alioqui si ultra tempus sectionem differamus,  
gravissimo symptomati fenestrâ aperiemus.  
Siquidem (ut secundo De arte curatua ad  
Glaucanem libro Galenus) tumores qui in  
abscessum vertuntur, tardè inciduntur, aut  
medici imperitia, aut eorum qui curantur  
timiditate, sectionem non admittentium,  
sed diutius protelando, cutem ab eiusmodi  
pure erodi sustinuntium. hanc universam à  
congesto in abscessu pure, attriti panniculi  
in modum, vehementer attenuari sæpè con-  
tingit, unde & eiusmodi cutem ægrè coa-  
lescere videmus. Resectione igitur tam in  
alis quam in inguinibus, ex Galeni & Aëtij  
Amideni præscripto, utemur ad myrtei folij  
formam, longa videlicet & angusta; quin  
etiam si sic ferat occasio, ut sub axillis pars  
aliqua ex erosione computruerit, non ve-  
rentur portionem aliquam suppurantis par-  
tis excindere.

Semper



Semper autem.

SI QUIDEM magnarum sectionum occasione, ut auctor est Galenus libro XIII. Methodi. particula ubi ad cicatricem est perducta, non solum turpissima redditur, sed etiam sit imbecillis, & quæ sape homini admodum sit in mora.

ad similitudinem myr-  
rei folij.

SECTIO quæ myriacei folij formam

imitatur, est longitudinis, quàm latitudinis maioris, ac facillimè curationem admittit: nam circularis figura ad curationem inidonea est. atque ob id rotunda ulcera difficilius curationem recipere dicunt.

linamento opus non est.

GALENVS tantum siccantibus utitur. De mellis preparaturâ legito eundem De arte curativa secundo.

## CAPVT III.

De bonis malisque signis exulceratorum.

PROTINVS autem quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest, fereque iidem quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bona signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare. Itemque habere pus album, \*leue, non fœdi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus grauitas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut feculentum, & fœdi odoris. Item procedente curatione eruptio sanguinis: aut si antequàm sinus carne impleatur, ora \*carnosæ fiunt. Illa quoque ipsa carne hebet nec firma, deficere tamen animam, vel ipsa curatione vel postea, pessimum omnium est. Quinetiam morbus ipse siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est, siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hæc ipsa fortuua huc illucve \*discernit, sic medici partium est, eniti ad \*reperiendam sanitatem. Ergo quoties vlcus \*resiluerit, eluere id: si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluuiatili misto, vel aqua in qua lenticula cocta sit, debebit. Si purgandum erit, mulso: rursusque imponere eadem. Vbi iam repressus videbitur humor, vlcusque purum erit, produci carnem conueniet, & foveri vulnus pari portione vini ac mellis, superque imponi spongia ex vino & rosa tincta. Per quæ

\* laue

\* callosæ  
fiunt, il. q.  
i. c. h. n. fir-  
ma. Defi-  
cere t. a.  
vel in  
ipsa

\*decernit,

\*recupe-  
randam  
\*resiluerit,



quæ cum caro producat, plus tamen (ut aliàs quoque dixi) victus ratio eo confert, id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum, quotidiana, sed lenis, gestatio, cibi porionesque corpori reficiendo: \* Aptæque omnia quæ per medicamenta suppuratione quoque rupta sequuntur, sed quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reseruata sunt.

\* aptæ.  
Quæ o. p.  
m. l. q. ru-  
pta seq.

## ENARRATIO.

Itemque habere pus  
album.

& foueri vulnus.

**P**US, inquit in Predictionibus Hippocrates, optimū est, si candidum, æquale, lenēque & quāminimè fetidum est: maxime verò contrarium huic, deterrimum est; nam quod putidum, & graneolens est, putrefactionem denotat.

VINUM enim per se inter omnia præsidia est aptissimum, quum glutinandi vim quam habet ulceribus necessariam ad penitiores usque partes transmittat: hinc Hippocrates, Ulcera, inquit, vniuersa nisi vino humectare non oportet, si non in articulo fuerit vlus. Celsus ad modicam absterisionem non omnino malè mel addidit.

## CAPVT IIII.

## De fistulis.

**A**DVERSUS fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti collyrium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices, maius in manu quàm in medicamentis præsidium est, minusque operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quàm si rectè intus tendunt. Igitur si sub cute transuersa fistula est, demitti specillum debet, supraque id ea incidi: si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro \*persequendi sunt. Idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ ventum est, excidendus ex toto callus est, superque fibulæ dandæ, & medicamentum quo glutinetur. At si rectà subter tendit, vbi, quò maximè ferat, specillo exploratum est, \*excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis iniicienda est, & æquè glutinantia medicamenta superdanda sunt. Aut si corruptius vlus, quod interdum ossè vitiato fit, vbi id quoque curatum est, pus mouentia. Solent autem inter costas fistulæ subter \*exire: quod vbi incidit, eo

\* rectæ

\* persequen-  
di

\* incidi

\* ire,

ii

loco



loco costa ab utraque parte decidenda & eximenda est, ne  
 \* autē ubi quid intus corruptum relinquatur: solent \* ubi crustas tran-  
 sierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceri-  
 bus intestina discernit, violare. Quod intelligi & ex loco, &  
 ex magnitudine doloris potest, & quia nonnunquam spiritus  
 eò cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque si  
 hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est.  
 In ceteris verò quæ circa costas sanabilia sunt, pingua medi-  
 camenta inimica sunt, ceteris quæ ad vulnera accommodan-  
 tur, uti licet. Optimè tamen sicca linamenta, vel, si purgan-  
 dum aliquid videtur, in melle tineta imponuntur. Ventri  
 nullum os subest, sed ibi perniciosæ admodum fistulæ fiunt,  
 adeo ut Solstratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto  
 ita se habere usus ostendit. Et quidem (quod maximè mirum  
 videri potest) tutior fistula est contra iecur, & lienem, & ven-  
 triculum, quam contra intestina: non quo perniciosior res  
 ibi sit, sed quo alteri periculo locū faciat. Cuius experimento  
 \* scripse-  
 runt, pa-  
 rum tamē  
 mod.,  
 moti quidam auctores parū modum rei cognoverunt. Nam  
 venter sæpe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina con-  
 duntur, & oras vulneris futuræ comprehendunt, quod quem-  
 admodum fiat, mox indicabo. Itaque etiam ubi tenuis fistula  
 abdomen perumpit, excidere eam licet, futuraque oras con-  
 iungere. Si verò ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius  
 foramen relinquat, quod nisi magna vi utique ab interiore  
 parte sui non potest, qua quasi membrana quædam finit ab-  
 domen, quam *περιτόμιον* Græci vocant. Ergo ubi aliquis in-  
 gredi ac moveri cœpit, rumpitur illa futura, atque intestina  
 solvantur. Quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omni  
 modo res ea desperationem habet. Ideoq. tenuioribus fistu-  
 lis adhibenda curatio est.

## ENARRATIO.

pus mouentia.

POST callosarum partium sectionem,  
 carnosæ quidem partibus suppurandi  
 ductum exhibemus, & desquamata ossa  
 exicare conabimur, inquit Aërius. Basili-  
 enim quidem emplastrum suppurandi vim

habet; cephalica autem omnia siccantia.

Solent autem.

PAVLVS Ægineta nequaquam attingendas, vel certe cum multa artificiosaque diligentia atretendas dicit.

De an.



*De ani fistulis.*

**P**ROPRIAM etiamnum animaduersionem desiderant<sup>\* ea,</sup>  
<sup>\* hanc ad</sup>  
<sup>has</sup>  
 ea, quæ in ano sunt. In hac demisso specillo, ad vlti-  
 mum eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine spe-  
 cillum educi lino sequente, quod in aliam eius partem ob idi-  
 psam perforatam coniectum sit. Ibi lino prehendum,  
 vincendumque cum altero capite est, vt laxè cutem, quæ su-  
 per fistulam est, teneat. Idque lino esse debet crudum, &  
 duplex triplexve, sic tortum vt vnitas facta sit. Interim autem  
 licet negotia agere, ambulare, lauare, cibum capere perinde  
 atque sanissimo. Tantummodo id lino bis die saluo nodo  
 ducendum est, sic vt subeat fistulam pars quæ<sup>\* superior</sup> fuerit.  
 Neque committendum est, vt id lino putrescat. Sed ter-  
 tio quoque die nodus resoluendus est, & ad caput alterum re-  
 cens lino alligandum, eductoque vetere, id in fistula cum  
 simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quæ  
 supra fistulam est, incidit, simulque & id sanescit, quod à li-  
 no relictum est, & id quod ab eo morderetur, inciditur. Hæc  
 ratio curationis longa, sed sine dolore est. Qui festinat, astrin-  
 gere cutem lino debet, quo celerius secet, noctuque<sup>\* penicil-</sup>  
<sup>\* ex pen.</sup>  
 lo tenuia quædam intus demittere, vt cutis hoc ipso extenue-  
 tur, quo extenditur. Sed hæc dolorem mouent. Adijcitur ce-  
 leritati<sup>\* sic,</sup> vt tormento quoque, si & lino & id quod ex<sup>\* sicut</sup>  
 penicillo est, aliquo medicamento illinitur, ex his quibus cal-  
 lum exedi posui. Poterit tamen fieri vt ad scalpelli curatio-  
 nem etiam illò loci veniendum sit, si intus fistula fert, si mul-  
 tiplex est. Igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis  
 incidenda cutis est, vt media inter eas habenula tenuis admo-  
 dum eiciatur, ne protinus<sup>\* ora</sup> coeant, sitque locus aliquis<sup>\* ora</sup>  
 linamentis, quæ quàm paucissima superinijcienda sunt, om-  
 niaque eodem modo facienda, qui in abscessibus positus est.  
 Si verò ab vno ore plures sinus erunt, rectè<sup>\* recta</sup> fistula scalpello  
 erit incidenda, ab eo cæteræ quæ iam patebunt lino excipien-  
 dæ: si intus aliqua procedet, quò ferrum tutò peruenire non  
 poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omni-



bus eiusmodi casibus, siue manu siue medicamentis, agetur, dari debet humidus, potio liberalis, diuque aqua: vbi iam caro increfcit, tum demum & balneis raris vtendum erit, & cibis corpus implentibus.

## ENARRATIO.

In hac demisso specillo.

**P**AVLVS Aegineta, hanc per linum curandi rationem, ad eos tantum pertinere auctor est, qui scalpelli pertimescunt. Ceterum Celsus hunc medendi modum ex Hippocratis libro De fistulis mutuatus est, vbi sic habet: Crudum linum tenuissimum accipio, & ad palmi longitudinem quinquuplicato, & pilum equinum circumdato; deinde facto specillo stanneo in summa parte perforato, & initio lini complicati in specil-

lum immisso, in fistulam demittiro, & simul sinistra manus digiti in sedem indito, &c.

Neque committendum est.

HIPPOCRATES ne putrescat, equinam fetidam obvoluit.

Qui festinat.

GALENVS in eiusmodi casu perquirendum ab egrotante dicit, malit ne tardius ac sine magna molestia sanari; an celerius, sed cum maiore tormento.

## CAPVT V.

De Telis è corpore extrahendis.

**T**ELA quoque quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe eiiciuntur. Suntque quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in quam tetendit. Illic viam qua redeat, ipsum sibi fecit. Hic à scalpello accipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non altè telum insedit, & in summa carne est, aut certè magnas venas & loca nervosa non transiit, nihil melius est, quàm quàm venit, id euellere. Si verò plus est, per quod telo reuertendum, quàm quod perumpendum est: iamque venas nervosque id \*transit, commodius est aperire quod superest, \*itaque extrahere. Nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiore membro si medium mucro transiit, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinque medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendum est, amplianda scalpello plaga est, quo facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio: quæ maior fit,

\*transiit,

\*eaque  
alac ita



fit, si ab illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam ut telo postea transeunte ampliatur. Summa autem utraque parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumque scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendum est, tum quoque eodem modo & eadem cura habita, ne sub eo quod eximetur, aliquid eorum laceretur, quæ tuenda esse proposui. Hæc communia sunt. Propria quædam in singulis telorum generibus subiicienda sunt, quæ protinus subiiciam. Nihil tam facile in corpore quam sagitta conditur, eademque altissimè insidit. Hæc autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa in angusto est. Sæpius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est, præcipueque quia fere spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, quam si contrà trahuntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento ad similitudinem facti Græcæ literæ  $\psi$ . Deinde ubi apparuit, si mucro, si arundo inhaeret, propellenda est, donec ab altera parte adprehendi & extrahi possit. Si iam illa decidit, solumque intus ferrum est, mucro vel digitis adprehendi, vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arundo, si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque brevia & tenuia sunt, forficem ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea maiora valentioraque sunt, fistis scriptoriis calamis contegenda, ac ne quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est. Latum verò telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adiciamus. Euellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod Dioleum Græci graphiscum vocant, quoniam auctore Dioclem habet, quem inter priscos maximosque medicos fuisse iam posui. Lamina vel ferrea vel ænea etiam ab altero capite duos utrinque deorsum conuersos uncas habet, ab altero duplicata latetibus,

\* parte hab.

\* ab eo

\* adiicienda corpus incedit.

\* angusta est.

\* mucroni arundo

\* forcipe,

\* forcipe

\* fistis



\* extrema,  
leuiterque  
in

\* leuiterque extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est, insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc iuxta telum transuersa demittitur. Deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est, ilico duo digiti subiecti partis alterius vncis, simul & ferramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute, integrum intus infedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque quod inest, ea quæ venit, forfice extrahendum est. Accedit verò aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhæsit, vel in articulo se inter duo ossa demersit, in esse usque eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu vel forfice telum extrahendum est, quæ ratio in dentibus quoque eiciendis est. Et vix vnquam ita telum non sequitur. Sed si morabitur, excuti quoque \* ictum aliquo ferramento poterit. Vltimum est, ubi non euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoque foramine ad speciem literæ ¶ contra telum os excidere, sic ut lineæ quæ \* deducuntur, ad telum spectent: eo facto id necesse est labet, & facile auferatur. Inter duo verò ossa si per ipsum articulum perruerit, circa vulnus duo membra fasciis habentibus deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. Quibus extentis laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum id extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si venenato quoque telo qui ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantiùs actis adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quàm quæ esset, si corpore icto nihil inhæsisset. De qua satis alio loco dictum est.

\* victum

\* diducuntur,

ENAR-



## ENARRATIO.

**P**ROLIXE admodum Celsus atque clarè telorum eximendorum rationem edocuit; adeò ut ampliore enarratione non egeat.

ta eiusdem meminit; alij Diocleum à Diocle inuentore nominant.

## At si venenato.

## Diocleum.

IOANNES Casarius, legendum fortassis belelcum, ἀπὸ τοῦ βίλ & ἑλ & κω, vel belulcum ex eadem derivatione; sed κατὰ συνήθειαν & ἑλ & vocalium. Ægine-

PAVLVS Ægineia totam carnem quæ veneno iam immixta est, si quidem fieri potest, præcidere iubet; ἀποψι autem carnem quod à sana carne differat: pallida enim, sublimida, & velut emortua apparet.

## CAPVT VI.

*De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Steatomate capitis tuberculis.*

**H**ÆC venire in qualibet parte corporis possunt. Reliquæ certas sedes habent, de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa variaque tubercula oriuntur, γαγγλία, μελικερειδες, & ἀθήρωματα nominant, aliisque etiamnum vocabulis quædam alij discernunt, quibus ego στατώματα quoque adiciam. Quæquamuis & in ceruice & in alis & in lateribus oriri solent, per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres differentias habeant, ac neque periculo terreant, neque diuerso genere curentur. Omnia autem ista & ex paruulo incipiunt, & diu paulatimque increscunt, & tunica sua includuntur. Quædam ex his dura ac renitentia, quædam mollia cedentiaque sunt: quædam spatio nudantur, quædam recta capillo suo permanent, fereque sine dolore sunt. Quid intus habeant, ut coniectura prælagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. Maximè tamen in his quæ \*exiecta renitentur, aut lapillis quædam similia, aut concreti confertique pili reperiuntur. In his verò quæ cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui puliculæ, aut quasi rasæ cartilagini, aut carni hebeti, & cruentæ, quibus \*aliqui colores esse con-  
fuerunt, fereque ganglia renitentur. Atheromati subest, quasi tenuis pulicula. Meliceridi liquidior humor, ideoque pressus.



pressus circumfluit. Steatomati pingue quiddam, idque latissime patere consuevit, resoluitque totam cutem superpositam, sic, ut ea labet, cum in cæteris sit adstrictior. Omnia derafa antè, si capillis conteguntur, per medium oportet incidere: sed steatomatis tunica quoque secanda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile à cute, \* subiecta carne, ea separatur, in cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba & intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda à cute & à carne est, eiciendaque cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Vbi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaque his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt.

\* & sub c.  
ea separa-  
retur,

## ENARRATIO.

γᾶς, λία.

CELSVS ganglia in capite potissimum oriri dicit; quamuis & alias sedes habeant: Paulus & Aëtius id negant, ac frequentius quidem manuum iuncturas ac talos occupare dicunt, rariisque cubitum & caput. Est autem ganglium tumor inaequalis, parvus, & dum comprimitur stupidum sensum exhibens, non in alto, sed ipsa sub cute radices agens.

neque diuerso genere.

GANGLIA tamen, si talos aut manuum iuncturas obsederint, sectionem recusant, quā alioqui in capite admittunt; quum alias periculum esset ne sectione pars affecta mutila redderetur.

& tunica sua includuntur.

IN hoc ab abscessibus differunt, qui nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi sunt.

Maximè tamen in his.

VIDETVR hic tacite innuere tuberculi quandam speciem, in qua res diuersæ conti-

nentur; exempli causa, cænum, rhombus, mucus, ossa, pili, lapides, ostraca, & id genus alia, quale non ita dudum videre contigit. Erat supra geni tumor, quem nec omnino renitentem, nec cedentem rectè appellaueris, hic indies magis ac magis excrecebat; & quum medicamentis non cederet, ad manus operam deuenimus. incisione igitur facta primum sanguis, deinde substantia quadam papyro bibula non absimilis sese obtulit; quam cum paulatim cum sua tunica euulsissemus, vulnus sicuti reliqua recentia vulnera restituiimus. Aëtius sub atheromate comprehendisse videtur, quum dicit, aliquando in pultaceo humore lapidosa quadam duræque corpora, & alia tanquam sulphurisamenta comprehendit; aliquando velut gallinarum ossicula mansa; interdum etiam se inuenisse testatur velut pilos crassissimo humore complicatos.

sed steatomatis tunica.

IN meliceride & atheromate tunica incisionē formidamus, quod nimirum si humor euacuatus fuerit, ac tumor conciderit, tunica



tunica difficulter excoriari & curari poterit: necesse enim est tunicam seu membranam humorem continentem auferri; nam si vel minima illius portio relinquitur, renascendi illius occasionem præbebit. In steatomate au-

tem quum adiposa illa pinguedo difficulter effluat, in tunica dissectione, usque adeo vrgens periculum non est; quod quum non concidat tumor, leni occasione tunicam ipsam eduxeris.

## CAPVT VII.

*De oculorum vitiiis quæ scalpello & manu curantur.*

**S**ED vt hæc neque genere vitij neque ratione curationis inter se multum distant, sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicæ nasci solent pingues grauesque, quæ vix attollere oculos sinunt, leuesque pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Fere verò in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello \*transuersam lineam incidere, suspensa leuiter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & vt \*locus ei patefactus est, ipsa prorumpat, tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere. Facile autem sequitur. Dein superungi collyrio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur, paucissimisque diebus cicatricula inducitur. Molestius est, vbi incisa vesica est. Effundit enim humorem, neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si fortè id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

\*transuersa  
\*quæ locus

## ENARRATIO.

**PAVLVS** libro sexto hydatides nominat: Est autem, vt ipse dicit, pinguis quadam substantia palpebræ cuti naturaliter sulstrata. Horis antelucanis potissimum defluxione tentantur, neque contra solis splendorem cernere sistent, sed illa-

chrymant continuisque lippitudinibus instantur. pueris (quemadmodum docet Celsus) peculiare vitium; atque iis præsertim qui natura humidiores sunt. Auicennas alfernac, Haliabbas scissuram nominat.

*De Crithe tuberculo palpebrarum.*

**I**N eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruum nascitur, quod à similitudine ordeï, à Græcis *κρίθη* nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit,

kk

compre-



comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foueri oportet, sic ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione sæpe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est exprimi. Eodem deinde vapore postea quoque foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perueniat.

## ENARRATIO.

**C**RITHE interculum est oblongum  
figura hordeum representans, ordeolum  
ob id ab Anicenna nominatur: alij *πρόσιον*  
seu praputiolum dicere maluerunt.

cera subinde calefacta.

EIVSDEM facultatis est musca atque apis corpus, abiecto capite, si eodem crithe fricetur.

*De Chalaziiis palpebrarum.*

**A**LIA quoque quædam in palpebris huic non dissimilia nascuntur, sed neque utique figuræ eiusdem, & mobilia simul atque digito huc vel illuc impelluntur. Ideoque ea *χαλαζία* vocant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiore. Dein scalpelli manubriolo <sup>\*deducenda</sup> diducenda ab integris partibus sunt. Ac si intus plaga est, inungendum primo lenibus, deinde acrioribus. Si extra, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

## ENARRATIO.

**C**HALAZIVM Latini grandinem nominant: dicunt autem grandine affici palpebras, ut auctor est Aetius, quum emeris ipsis rotunda quædam eminentia pellucida grandini similes apparent; quibus dissectis humor evacuatur similis candido oni. Pan-

lus ociosi humoris in palpebra colluuiem esse dicit. Fit etiam extra palpebras nonnunquam chalazia subduri subis persimilis: hæc quando violentius attingitur, dolores ingentes suscitatur.

*De vngue oculorum, quod τερνύιον à Græcis vocatur.*

**V**NGVIS verò, quod pterygion Græci vocant, est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eiq. officit. Sæpius à narium, interdum etiam à temporum parte nascitur. Hunc recentem:



tem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueterauit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam verò vnius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic auersus, vt in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo vitium est, aduersum: si in dextro, resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiorem: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recuruato subiicere extremo vngui debet, eumque infigere, atque eam quoque palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso leuare vnguem, eumque acu traicere linum trahente. Deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto vngue, si qua parte oculo inhaeret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat. Deinde inuicem modò remittere, modò attrahere, vt sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est, ne vel ex vngue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem, vel ex angulo quoque caruncula abscindatur, quæ si vehementius vnguis ducitur, sequitur. Ideoque decipit: ac si abscissa est, <sup>\* patet</sup> patet foramen, <sup>al. patefecit</sup> per quod postea semper humor descendit, <sup>\* pūda</sup> <sup>Græci vocant.</sup> Verus ergo anguli finis vtique noscendus est, qui vbi satis constitit, non nimium adducto vngue scalpellus adhibendus est, deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, & aut spongia, aut lana succida; proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. Siquidem id quoque tertium periculum accedit, eodemque modo linamentum imponendum, ac nouissime inungendum collyrio, quo vlcera ad cicatricem perducuntur. Sed ea curatio <sup>\* verna</sup> vere esse debet, aut certe ante hyemem. De qua re ad plura loca pertinente semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt. Alia in quibus eligere tempus non licet, sed vtendum est eo, quod

kk 2

incidit,



incidit, sicut in vulneribus, & in fistulis. Alia in quibus nullus dies vrget, & expectare tutissimum & facile est, sicut euenit in iis, quæ & tardè crescunt, & dolore non cruciant, in his verè expectandum est. Aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus vel æstas, quàm hyems est. Atque is ipse medius, iam fractis æstatibus, nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoque maiori periculo subiecta est, & sæpe quo maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

## ENARRATIO.

**E**ANDEM curandi rationem describunt Paulus & Aetius: Cassius duplex pterygii genus facit; primum, quoties nervosa quædam eminentia adnatæ adnascitur, quæ ab angulo maiori oritur, & progreditur usque ad corneam, & papillam: alterum, quæ adnata in callosum tuber excrescit; quo piscatores maxime infestari idem auctor est.

## Duplex enim periculum.

PRÆTER hæc etiam cauendum docet Aetius ne palpebras attingamus; incisis enim palpebris, inquit, his concretiones accidunt.

quod exulceratum vix.

NON solum exulceratur, sed & frequenter regeneratur, quemadmodum de tunica melicevidis tam antea diximus: quare si quid eius reliquum sit, pharmaco aliquo consumendum est.

ῥυάδα Græci vocant.

IOANNES Casarius auctoritatē Hermolai Barbari, & Galeni ῥυάδα (cum antea esset ῥυάδα) legendum contendit; nec male: nam & Paulus sic appellat: Aetius verò ῥυάδα nominat.

## De Encanthide tuberculo.

**E**XCVRATIONE verò vnguis, ut dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo parum vngue exciso, vel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, ἑγκανθίς Græcè nominatur. Excidi hamulo & circuncidi debet, hinc quoque diligenter temperata manu, ne quid ex ipso \* abscindat. Tum exiguum linamentum respergendum est, vel cadmia, vel atramento sutorio, inque cum angulum diductis palpebris inse- rendum, supraque eodem modo deligandum, proximitque diebus similiter nutriendum, tantum ut primis aqua egelida, vel etiam frigida foueatur.

\* abscin-  
datur.

ENAR-



## ENARRATIO.

**E**NCANTHIDEM vocat, quum magnum oculi angulus ad nasum auctus carne excrescit: Avicenna additionem carnis lachrymalium vocat. Morbus canibus admodum familiaris, atque eos potissimum homines inuadit, qui frequenter in mari versantur. Estq; duplex: aut enim maligna est, aut non maligna; atque hac quidem do-

lore vacat, mollis, & subluxa est: Illa in-  
aqualis, & pungentes dolores affert, ac in-  
totum dimittenda est ut incurabilis.

ne quid ex ipso abscin-  
datur.

NAM si quid eius excindatur, peri-  
culum est ne subsequatur cecitas.

## De Ancyloblepharo oculorum vitio.

**I**NTERDUM inter se palpebrae coalescunt, aperiri que non  
potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut pal-  
pebrae cum albo oculi cohaerescant: scilicet cum in utroque  
fuit vlcer negligenter curatum. Sanescendo enim quod di-  
duci potuit & debuit, \*glutinabit, *ἀγκυλοβλέφαρον* sub utro- \*glutina-  
que vitio Graeci vocant. Palpebrae tantum inter se cohaeren-  
tes, non difficulter diducuntur, sed interdum frustra, nam  
rursus glutinantur. Experiri tamen oportet, quia bene res  
sapius cedit. Igitur aduersum specillum inferendum, didu-  
cendaeque eo palpebrae sunt, deinde exigua penicilla inter-  
ponenda, donec exulceratio eius loci finiatur. \*Aut ubi albo \*At  
ipsius oculi palpebra inhaerit, Heraclides Tarentinus auctor  
est, aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione, ut  
neque ex oculo, neque ex palpebra quicquam abscindatur, ac  
si necesse est, ex palpebra potius. Post haec inungatur oculus  
medicamentis, quibus aspritudo curatur, quotidieque pal-  
pebra \*vertatur, non solum ut vlceri medicamentum induca-  
tur, sed etiam ne rursus inhaereat, ipsique \*etiam praecipia-  
tur, ut saepe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum  
esse neminem memini. Meges se quoque multa tentasse,  
neque vnquam profuisse, quia semper iterum oculo palpebra  
inhaerit, memoriae prodit.

## ENARRATIO.

**P**AVLVS Aegineta *συνεχόμενος ὁφθαλμὸς* concretionem appellat: Aerius quum ad album  
concreto palpebrarum facta fuerit, & oculi  
mollis.

k k. 3.



motus impeditur, affectionem ἀγκύλωσις  
vocat.

suadet, dum scalpello prievygiū destinatio  
concretionem exolvit. anceps tamen videtur  
esse curandi ratio,

Heraclides Tarentinus.

IDEM ferè est quod Aëlius faciendum

*De Aegilope, fistula oculorum.*

**E**TIAM NVM in angulo, qui naribus propior est, ex ali-  
quo vicio quasi parva fistula aperitur, per quam pituita  
assidue distillat, αἰγίλωπα Græci vocant; idque assidue malè  
habet oculum, nonnumquam etiam exeso osse vsq. ad nares  
penetrat, idque interdum naturam carcinomatis habet. Vbi  
intentæ venæ, & \* recuruatæ sunt, \* color pallent, cutis dura  
est, & leui tactu irritatur, inflammationemque in eas partes,  
quæ coniunctæ sunt, euocat. Ex his eos qui quasi carcinoma  
habent, curare periculosum est. Nam mortem quoque ea  
res maturat. \* Ea verò quibus ad nares tendit, superuacuum:  
neque enim sanescunt. At quibus id in angulo est, potest ad-  
hiberi curatio, \* cùm \* eam non ignotum sit esse difficilem,  
quantoque angulo propius id foramen est, tanto difficilior  
est, quoniam perangustum est in quo versari manus possit.  
Recenti tamen re mederi facilius est. Sed hamulo summum  
eius foraminis excipiendum, deinde totum id cavum, sicut  
in fistulis dixi, vsque ad os excidendum, oculoque & cæteris  
iunctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum  
est vehementius. Quod si iam carie vexatum est, quo cras-  
sior his \* squama accedat, quidam adurentia imponunt, vt  
atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam.  
Quod & tardius & non idem facit. Osse adusto curatio se-  
quitur eadem, quæ in cæteris vltis.

\* æquatæ  
\* colore  
pallent,

\* Eos

\* quamuis  
\* eo, ne

\* hinc sq.  
abscedat,

**ENARRATIO.**

**Q**VAM Celsus & Græci ægilopa vo-  
cant, Plinius epinyctida appellare vi-  
detur; est exim, vt scribit libro xx. cap. vi.  
epinyctis vltis aciem hebetans. & in angulo  
oculi perpetim humer emanans: quæ de-  
finitionem non omnino malè continere ægi-

lopi dixerit, quisquis eius accidentia peritius  
considerarit; perpetim enim ex angulo humor  
distillat, & aciem oculorum (si diutius per-  
seuerauerit, quod ferè fit,) hebetat. Vix  
curatione admittit; tum partium tenuitatis  
causa, tum periculi ne oculum consortij lege  
afficiat.



afficiatur. Quod si exeso osse ad nares usque penetrarit, carcinomatis naturam iam quodammodo induit: quo fit ut periculi plenum malum, ac moriem si non inferre, curationi certe omnino rebelle esse dicamus.

os ferramento adurendum.

VSTIONIS modum docet Aëlius lib. VII. cap. LXXXVI. Paulus consueque adurit duram squamam abscedit; ait tamen esse qui terebra usque, humerem aut pui in nares deriuare contenderint.

*De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.*

**P**ILI verò qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueuerunt. Nam modò palpebræ superioris summa cutis relaxatur, & procidit: quo fit, ut eius pili ad ipsum oculum conuertantur, quia non simul cartilago quoque se remittit. Modò sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrefcit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes verò hæ sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata, in ignem conicienda est. Deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectum curantis veniant, \*sub ipsis pilorum radicibus \*super ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ \*transeat. Deinde iterum tertioque usque ad alterum angulum. Quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emorian-  
tur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat, atque vbi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillimè autè id genus sanescit: quidam aiunt acu transui iuxta pilos in exteriorem partem palpebræ oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem: atque vbi acus transiit, in ipsius capilli sinum, quâ duplicatur, pilum esse iniiciendum, & per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpori adglutinandum & imponendum medicamentum, quo \*foramen quoque glutinetur: sic enim fore, ut is pilus \*ferrumen in exteriorem partem postea spectet. Id primùm fieri non potest, nisi in pilo longiore, cum fere breues eo loco nascantur. Deinde si plures pili sunt, necesse est longum tormentum, cum toties acus transuet, magnam inflammationem moueat. Nouissimè cum humor aliquis ibi subsit, oculo & ante per pilos, & tum per palpebræ foramina affecto, vix fieri potest.



potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non resoluatur. Eoque fit, ut is eo unde vi abductus est, redeat. Ea verò curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubij. Siquidem oportet coniecto oculo mediam palpebræ cutem, siue ea superior, siue inferior est, apprehendere digitis, ac levare, tum considerare quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit: si parum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit.

\* Quod

\* inferiore

Quà deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est, sic ut de \* interiore quæ pilos continet, & propiore ei linea aliquid relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est, & si superior palpebra est, antè: si inferior, postea propius ipsi pilis incidendum, initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo qui temporis: in dextro, ab eo qui naribus propior est, idque quod inter duas lineas est, excidendum. Deinde oræ vulneris inter se simplici futura committendæ, operiendusque oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utrique: si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Vbi secta est, aliæ futuræ adiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idque si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spongia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum iniiciendum. Quarto futura tollenda est, & collyrio quod inflammationes reprimat, superinungendum.

#### ENARRATIO.

**V**TRUMQUE vitium Græci indifferenter *τρεχάσιον* nominant: particularius tamen *disεχάσιον* vocant pilorum subvectionem, duplicemque eorundem ordinem: Galenus *τρεχάσιον βλάφαρον*, Amicenas innerjos & alios pilos appellat. Ex multa humiditate ferè oriri solet. Palpe-

bra verò laxationem propriè *φασάσιον* dicunt.

quidam aiunt acu.

IDEM tradit Paulus lib. VI. cap. XIII, atque hanc quidem emulsionem arabrochismum appellat, atque vitiosorem longè eā dicit,



dicat, quæ per aduersionem fit: quam tamen  
anctor noster posere loco habere videtur.

ne contingi oculus.

ET ne si aliud oculum actum sit, mus-  
culus latur. Chirurgia hanc rationem  
habet apud Aetium libro VII.

*De Lagophthalmo oculorum.*

**N**ONNVNQVAM autem nimium sub hac curatione excisa  
cute euenit, vt oculus non contegatur. Idque interdum  
etiam alia de causa fit, *λεγόμενον* Græci appellant. In quo  
si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest.  
Si exiguum, mederi licet: paulum infra supercilium cutis in-  
cidenda est lunata figura, cornibus eius deorsum spectanti-  
bus. Altitudo esse plagæ vsque ad cartilaginem debet, ipsa  
illa nihil læsa. Nam si ea incisa est, palpebra concidit, neque  
attolli postea potest. \* Cute igitur tantum diducta fit, vt pau-  
lum in ima oculi ora descendat, hiantem scilicet super plagam, in  
quam linamentum coniiciendum est, quod & coniungi di-  
ductam cutem prohibeat, & in medio carunculam citet: quæ  
vbi eum locum impleuit, postea recte oculus operitur.

\* Cutis

ENARRATIO.

**L**AGOPHTHALMVM vocant, quoties  
superior palpebra sursum retracta est,  
& apertus est oculus: sicuti in leporibus ac-  
cidere solet: Anicennas palpebra inuersa-

tionem, & aspera vocat. Accidit autem  
aut naturaliter, aut ex cicatrice vulneris.  
Chirurgiam hanc ex Demosthene refert Aë-  
tius libro VII. capite LXXIII.

*De Ectropio.*

**V**T superioris autem palpebræ vitium est, quod parum  
descendit, ideoque oculum non contegit; sic inferioris,  
quod parum sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque po-  
test cum superiore committi. Atque id quoque euenit inter-  
dum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute,  
*ἐκτροπία* Græci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio  
medicinæ est, quæ supra posita est, plagæ tantum cornua ad  
maxillas, non ad oculum, conuertenda sunt. Si ex senectute  
est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est,



deinde melle inungendum, & quarto die vapore aquæ calidæ fouendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

## ENARRATIO.

**E**CTROPII dicuntur quibus inferior palpebra inuersa est. Paulus nunquam à natura pronouire auctor est; sed nonnunquam ex relaxatione quam medicamentum id efficacia inflammatione præcedente concitauit: Celsus contrarium dicit; qui ex senectute non raro oriri vult.

## De Staphylomate oculi.

**H**ÆC fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueuerunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit. Vnde id *στυλωμα* Græci vocant. Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium transuere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex \*interiore adstringere inter se, quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere, deinde spodium aut cadmiam infricare. Utrolibet autem facto, album oui lana excipiendum & imponendum, posteaque vapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis vngendus est.

## ENARRATIO.

**S**TAPHYLOMA Latine vitationem dicere possis: curatur autem manus actione, ut docet Aegineta, non ut abolutum visum restituamus, verum ut moderatim agrotanti decorem conciliemus.

Altera ad ipsas radices.

PRIORIS huius curationis Paulus lib. VI. cap. XIX. & Aetius lib. VII. cap. XXXV. meminerunt: ubi fusiùs multo actionis huius modum explicat Aetius, atque actionem secundum constrictionem vocat.

## De Clauis oculorum.

**C**LAUI autem vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque canem excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

ENAR-



## ENARRATIO.

QVVM maximum factum fuerit staphyloma, ut extra palpebras transgrediat, & induretur ita ut ipsa corniformis tunica circumcirca callosa facta sit, & affectionem constringat, clavius appellatur, inquit Aëtius, quoniam per omnia clavi capiti similis existit. Hac affectio visus de-

trimentum, & figura deformitatem coniunctam habet, atque egre omnino curationem admittit: nam quantumvis per chirurgiam deformitati aliquo modo consulere possimus, visus certe iacturam nunquam aut raro resarciemus.

## De natura oculorum, &amp; eorum suffusione.

SUFFUSIONIS iam aliàs feci mentionem, quia cum recens incidit, medicamentis quoque sæpe discutitur. Sed ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cum ad plura loca pertineat, tum vel præcipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas, ex quibus superior à Græcis *μεγαλειδης* vocatur. \* Ea qua parte alba \* est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic inferior adiuncta est media parte, quæ pupilla est, modico foramine concaua, circà tenuis, vltioribus partibus ipsa quoque plenior, quæ *μικροειδης* à Græcis nominatur. Hæ duæ tunicae cum interiora oculi cingant, rursus sub his coeunt, extenuataeque, & in vnum coactæ, per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perueniunt, ei que inhaerescunt. Sub his autem qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus *απαμικροειδης* nominavit. Ea media subsidit, \* eo que cauo continet quiddam, quod à vitri similitudine *υαλοειδης* Græci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est, sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color vel niger est, vel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membrana includit, sub his gutta humoris est, oui albo similis, à qua videndi facultas proficiscitur, *μυσουδοειδης* à Græcis nominatur. Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concrevit humor sub duabus tunicis, quæ locum vacuum esse proposui: isque paul-

\* Ea que  
est crassa  
pup.

\* *μεγαλειδης*

\* ea que  
al. ludo que



\* Vitij  
eius

\* in al.  
vertitur,

\* curatio-  
ni,

\* duritie  
quadam

\* lumini  
aduersus,  
sic vt con-  
tra medi-  
cum

\* vt

\* est acuta,  
aut certe  
nō demit-  
tenda, sed  
recta est,  
per

\* parte

latim indurefcens interiori potentia se opponit. \* Vitijque eius plures species sunt, quædam sanabiles, quædam quæ curationem non admittunt. Nam si exigua suffusio est, si immobilis, colorem verò habet marinæ aquæ, vel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam vertit, si suffusioni color cæruleus est, aut auro similis, si labat, & hac atque illac mouetur, vix vnquam succurritur. Ferè verò peior est, quo ex grauiore morbo, maioribusve capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neque idonea \* curatio si senilis ætas est, quæ sine nouo vitio tamen aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. Oculus quoque curationi neque exiguus, neque concauus satis opportunus est, atque ipsius suffusionis quædam maturitas est. Expectandum igitur est donec iam non fluere, sed \* durities quædam concreuisse videatur. Ante curationem autem modico cibo vt, bibere aquam triduo debet, pridie ab omnibus abstinere. Post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, \* lumine aduerso, sic vt contrà medicus paulo altius sedeat. A posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, \* & immobile id præstet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. Curari verò sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admouenda \* est, aut acuta, aut fortè non nimium tenuis, eaque demittenda. Sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi & angulum temporis propiorem è regione mediæ suffusionis, sic ne qua vena lædatur. Neque tamen timidè demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem cum ventum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest, quia prementi nihil renititur. Vbi cō ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est. Leuiterque ibi verti & paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet: vbi deinde eam transit, vehementius imprimi vt inferiori \* parti insidat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadem acu



acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est, quæ singulæ & facilius conduntur, & minus late efficiunt. Post hæc educenda acus recta est, imponendumque est lana molli exceptum oui album, & supra, quod inflammationem coercet, atque ita deuinciendum. Post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis maturè datur, primum liquido, ne maxillæ laborent, deinde, inflammatione finita, tali, qualis in vulnerebus propositus est. Quibus ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

## ENARRATIO.

Is igitur summas.

**Q**UANTUM Galenus atque eo posteriores, sex oculi tunicas esse dicunt; Celsus tamen, in hoc antiquos sequutus, tres tantum, corneam videlicet, rhagoidem, quæ & charoades dicitur, & arachnoeidem describit; atque inter has duos tantum humores, eum nempe qui à crystalli similitudine crystallinus, & à vitro fusio hyaloëdes appellatur, constituit. Galenus atque eo posteriores, his tertium humorem adiciunt, quem aqueum nominant. Realdus Columbus excrementum quoddam esse existimat; in hoc Theophilum sequutus, qui ab aqueo humore lachrymas exprimi suspicatus est: quæ opinio alijs non satis placet, quod ex oculorum glandulis easdem ferri dicunt.

Igitur vel ex morbo.

GALENVS: & Paulus etiam ex immoderato vomitu fieri dicunt.

quædam sanabiles.

**O**CVLVS, inquit Paulus, suffusione tentatus concluditur, & palpebra magno digito ad oculum premittitur, eiq; adducitur, simulque hac illac exprimitur; & deinde oculo aperto, & mente ei adhibita suffusionem conspicimus: in iis enim quibus humor nondum coalescit, fusio quædam ex digiti impressione oboritur, ac primum latior apparet; rursum in suam figuram, & magnitudinem recurrit. At in confirmatis suffusionibus nulla immutatio, nec latitudinis nec figure ex impressione obuenit. Discretionem præterea, sicuti & Celsus, ex colore, atque eandem planè curationem describit. quare si quis huius loci ampliorem enarrationem requirat, eundem lib. v. cap. XXI. consulat.

## De Pituita oculorum.

**D**E pituitæ quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animaduertimus autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere, quæ res asperitudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines



\* necessaria

\* parent

\* qualesque

\* rectas  
vel recta  
\* deduce-  
rent,

\* diducitque

excitat, totam denique vitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. Ac primum superuacua curatio est in his qui ab infantibus id vitium habent, quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non \* necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. Si quidem manu nihil adiuuantur, medicamentis, & victus ratione, quae crassiores pituitas reddit, ad sanitatem perueniunt. Lata etiam capita vix medicinae \* parent. Tum interest venae pituitam emittant, quae inter caluariam & cutem sunt, an quae inter membranam cerebri, & caluariam. Superiores ferè per tempora oculos rigant, inferiores per eas membranas, quae ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quae supra os fluunt, non potest his, quae sub osse. Ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit, quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à superciliis usque ad verticem illini debent. Si sicci oculi esse coeperunt, apparet per eas venas, quae sub cute sunt, irrigari. Si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. Si est humor, sed leuior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venae exerceant, ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Graecia tantummodo, sed in aliis quoque gentibus celebre est, adeo ut nulla medicinae pars magis per nationes \* quoque exposita sit. Reperti in Graecia sunt, qui nouem lineis cutem capitis inciderint, duabus in occipitio rectis, una super eas transuersa, dein duabus super aures, una inter eas item transuersa, tribus inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite \* recte eas lineas ad tempora \* diducerent, cognitisque ex motu maxillarum muscutorum initis, leuiter super eos cutem inciderent, \* inductisque per retulos hamos oris infereret linamenta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio caro increceret, quae venas ex quibus



quibus humor ad oculos transfret adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt, à media aure ad mediam alteram aurem, deinde à naribus ad verticem. Tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem atque caluariam eminentibus venis idem candens ferrum adinouerunt. Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere, quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut inflentur, magisque se ostendant, ceruix autem modicè deliganda est: tenuibusque ferramentis & retusis venæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excavatorum itinerum, per quæ humor ferebatur. \* Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæque venæ, ideoque legi non possunt. Eodem modo ceruice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter \* ceruicem, ac frontem, deinde ceruice resoluta, quæ notæ sunt, venas incidere, & sanguinem mittere. Vbi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem, timidè, ne subiecti musculi, qui \* maxillas tenent, sentiant: inter frontem verò & verticem, vehementer, ut sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem vsque ad os adurunt, sic ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quàm quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Adusta quomodo curanda sint, iam explicui. Nunc illud adiicio, neque ut crustæ decidant, neque ut vlcus impleatur adustis venis esse properandum, ne vel sanguis erumpat, vel citò pus supprimatur, cum per hoc siccescere eas partes opus sit, per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. Quemadmodum autem venæ deligendæ sint, quidque lectis his faciendum sit, cum venero ad crurum varices, dicam.

\* post sanguinem effusum

\* Violentior

\* verticem ac frontem oportet, deinde

\* maxillâ

ENARR.



## ENARRATIO.

**P**ITUITÆ tenuis cursum Græcorum esse epiphoram dictum est: ad quam licet non plane eadem esse videatur, proximè accedit Plinio oculorum illachrymatio dicta.

alienis humoribus etiam naturales absumentur, & ad extremam siccitatem oculi deducatur, unde & incurabilis affectio oritur.

Frequens curatio est.

Reperti in Græcia sunt.

**C**URATIONEM hanc quæ per vstionem fit, non admodum commendat Aërius, quod vstione ad profundum facta, una cum

TVM videlicet quum vasa in fronte & temporibus distenta, & caput quodammodo reuinctum esse videatur.

## CAPVT VIII.

*De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur.*

**V**ERVM vt oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt, quæ in hac medicinæ parte tractentur. Solet tamen euenire vel à prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum sit, ideoque audiendi vsu careat. Quod vbi incidit, specillo tentandum est, altène id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. Nam si altè est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur neruorum, & ex ea mortis periculum sit. Hoc facilè curatur. Nam quæ cauum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & iam vlcus purum est, iniicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque idem medicamentum dandum, vt curis circa pinnam sanescat: quo fit vt ea remota, postea facultas audiendi sit. At vbi aures, in viro puta, perforatæ sunt, & offendunt, traicere id cauum celeriter candente acu satis est, vt leniter eius ora exulcerentur, aut etiam adurentem medicamentum idem exulcerare, postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est (sicut solet esse in his,



his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod superest ad extremum oportet: suprâ deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quæ res cum in labris quoque & naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

## ENARRATIO.

Solet tamen euenire.

*Υπερτροφία* Græci vocant. Descri-

bit autem Paulus libro VI. capite XXIII. eandem planè chirurgie rationem.

## CAPVT IX.

*Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo  
sarciri & curari possint.*

**C**URTA igitur in his tribus, ac si qua parua paria sunt, curari possunt. Si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora antè fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest. In labris verò si nimium contracta sunt, vsus quoque necessarij iactura fit, quia minus facile & cibus assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur: quod in leui \*mutatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna non potest. Neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter vlcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est, quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. Ratio curationis eiusmodi est. Id quod \*curatum est, in quadratum redigere, ab interioribus eius angulis lineas transuersas incidere, quæ citiorem partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quæ sic \*repositum, in vnum adducere. Si non satis iunguntur, ultra lineas, quas antè fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conuersas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. Sic enim fit, ut facilius quod adducitur, sequi possit: quod non vi cogendum  
m m est,

\* mutila-  
tione,

\* curatum  
al. curatum  
al. curandum

\* resoluimus,



\* demissū

\* tamen

\* imisve  
narium  
al. gena-  
rum\* ha quinque  
voces irreps-  
erunt i mar-  
gine.

\* curta

est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & \* dimis-  
sum non multum recedat. Interdum \* autem ab altera parte  
cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit lo-  
cum, reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera  
intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex  
medio naso \* imis venarum partibus, neque ex angulis labro-  
rum quicquam attrahere tentabimus. Vtrinque autem pe-  
temus, si quid summis auribus, si quid imis, \* *si quid aut medio*  
*naso*, aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quæ tamen  
interdum etiam duobus locis \* curata esse consueverunt. Sed  
eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo quod incisum est  
eminet, excidenda est. Neque enim aut glutinatur, aut acu-  
tutò traicitur. Neque longè tamen excidi debet, ne inter  
duas oras liberæ cutis, vtrinque coitus puris fieri possit. Tum  
iunctæ oræ inrer se suendæ sunt, vtrinque cute apprehensa, &  
quæ priores lineæ sunt, eà quoque futuræ iniiciendæ sunt. Sic-  
cis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. In  
vltiores verò lunatasque plagas linamentum dandum est, ut  
caro increfcens vulnus impleat, summaque cura quod ita fu-  
tum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod decanero  
suprà posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit  
vapore aquæ calidæ, rursusque idem medicamentum iniicien-  
dum, fereque septimo die glutinatum est. Tum futuræ eximi,  
& vlcus ad sanitatem perducere debent.

## ENARRATIO.

Curta.

GRAECI *κρλοβάρμια* vocant, ut ait Paulus.

## CAPVT X.

*De Polypicuratione per ferrum.*

POLYPVM verò, qui in naribus nascitur, præcipuè ferro  
curari iam aliàs posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto  
in modum spathæ facto resolvere ab ossè oportet: adhibita  
diligentia, ne infrà cartilago lædatur, in qua difficilis cura-  
tio est.



tio est. Vbi abscissus est, vno ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentū, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoque nares leniter implendæ. Sanguine suppresso, linamento \*vul-  
nus purgandum est. Vbi purum est, eò pinna eodem modo, lam  
quo in aure suprà positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

## ENARRATIO.

NON quibus polypi mannalem altio-  
nem admittunt; sed qui neque male-  
fici admodum, sed laxi quodammodo & fria-  
biles sunt: nam duri & tactu renitentes,  
linidi ac maligni, cum cancri naturam in-  
duentes attingi non debent, ac non nisi can-  
dente ferro urendi atque extirpandi sunt.

## CAPVT XI.

## De Ozena.

Id autem vitium, quod ὄζαυα à Græcis vocatur, si medi-  
camentis non cederet, quemadmodum manu curandum  
esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res  
rarè ad sanitatem satis proficit, cum aliquod in ipsa curatione  
tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel  
\*subtilem  
fistulam, vel enodem scriptorium calamum in na-  
rem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum  
per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum  
os, deinde adustum locum purgandum esse æruginè & melle.  
Vbi purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Vel na-  
rem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit,  
& facilius candens ferramentum admoueri. Tum sui na-  
rem debere, & adustum quidem vlcus eadem ratione curari. Su-  
turam verò illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

## De oris vitiis, quæ manu &amp; ferro curantur.

## CAPVT XII.

## De dentibus.

IN ore quoque quædam manu curantur. Vbi in primis  
dentes nonnunquam mouentur, modò propter radicum  
mm 2 imbecil-



\* made-  
scentium

\* infidat.

\* forcipe,  
\* sic in re-  
liquis.

\* rarum,

\* factum  
\* intume-  
scit

\* aut

imbecillitatem, modò propter gingivarum \*arescentium vi-  
tium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis  
admoovere, ut leuiter attingat, non ut \*incidat. Adustræ gin-  
giuæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt. Ut pura vlcera  
esse cœperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his  
quæ reprimunt. Si verò dens dolores mouet, eximiq. eum,  
quia medicamenta nihil adiuuant, placuit, circumradi de-  
bet, ut gingiua ab eo resoluatur. Tum is concutiendus est.  
Eaque facienda, donec bene moueatur. Nam dens hærens  
cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla lo-  
co mouetur. Idq. etiam maiore periculo in superioribus  
dentibus fit, quia potest tempora oculòsve concutere. Tum  
si fieri potest manu, si minus, \*forcice, dens excipiendus est.  
Ac si exesus est, antè id foramen vel linamento, vel bene ac-  
commodato plumbo replendum est, ne sub forcice confrin-  
gatur. Recta verò forfex ducenda est, ne inflexis radicibus  
os \*earum, cui dens inhæret, parte aliqua frangatur. Neque  
ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breui-  
bus, qui ferè longiores radices habent. Sæpe enim forfex cum  
dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehen-  
dat, os gingiuæprehendit & frangit. Protinus autem ubi  
plus sanguinis profluit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse.  
Ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit, & vossella  
protrahenda est. Si non sequitur, incidi gingiua debet, donec  
labans ossis testa recipiatur. Quod si \*fractum statim non  
est, \*indurescit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit.  
Sed imponendum calidum ex farina \* & fico cataplasma est,  
donec ibi pus moueatur. Tum incidi gingiua debet. Pus  
quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam  
tum id extrahi conuenit. Nonnunquam etiam eo læso, fi-  
stula fit, quæ eradi debet. Dens autem scaber, qua parte ni-  
ger est, radendus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui  
gallæ quarta pars, & altera myrrhæ sit adiecta. Continen-  
dumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu ve-  
landum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non  
acri vtendum est. At si ex ictu, vel alio casu aliqui labant  
dentes,



dentes, auro cum his qui bene hærent vincendi sunt. Continendaq. ore reprimenda, ut vinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur quàm prior excidat, is qui cadere debuit, circum purgandus & euellendus est, is \* qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat. Quotiescunque dente exempto radix relicta est, protinus ea quoque ad id facta \* forcipe, quam rhizan Græci vocant, eximenda est. Tonsillas autem, quæ post inflammationes induruerunt, *αἰμάδες* autem à Græcis appellantur, cum sub leui tunica sint, oportet digito circumradere & euellere: si ne sic quidem resoluuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere, tum vlcus aceto eluere, & illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

## ENARRATIO.

## Nam dens hærens.

**O**MNIBVS dentibus id commune est, quòd ex tertia uernorum syzygia tenues uerni ad eorundem radices ferantur, quibus uenule ac parua arteria subseruiunt; unde præterquam alia ossa sentiunt, & nutriuntur, & quodammodo, ait Galenus, per arteriam pulsant. Superiores autem inferioribus tenacius implantantur, ac fixius hærent, aliisq. suas radices figunt: nam

& numero & longitudine radicum inferiores vincunt; unde & maiori cum molestia euelluntur, & conuulsiois periculum non raro inferunt, cerebro ipso lege consortij affecto.

## Si quando etiam in pueris.

ISTVD. appendicem dentium nominant: radicitus enim euulsus dens, nequaquam renascitur.

## De Vsa.

**V**VA si cum inflammatione descendit, doloriq. est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Solet enim multum sanguinem effundere. Itaque melius est his uti, quæ aliàs proposita sunt. Si verò inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum à pituita \* deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. Item, quæ si ima, liuida, & crassa, \* summa, tenuis est. Neque quicquam commodius est, quàm volsella prehendere, sub eaque quod volumus excidere. Neque enim vllum periculum est,

m. m. 3.

ne.



ne plus minúsve præcidatur, cum liceat tantùm infra volfellam relinquare, quantum inutile esse manifestum est, id quæ præcidere quo longior vua est, quàm esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt, quæ in consillis proximè posui.

## E N A R R A T I O.

**ÆGINETA** duplicem quæ per manum administratur, vna curationem describit; alteram videlicet quæ vssione, atque aliam quæ volfella obitur. Atqui contractæ omnes, cruenta, rotunda nec oblonga vel subnigra vua, attingi scalpello non debent. præcidendum autem id est, quod præter naturæ modum eminet, ita ut non nimis altè incisio fiat, præcisam enim vnam celerrimè ingulare auctor est Aëtius.

*De Lingua.*

**LINGVA** verò quibusdam cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. Horum extrema lingua volfella prehendida est, sub eaque membrana incidenda, magna cura habita, ne venæ quæ iuxta sunt, violentur, & profusione sanguinis noceant. Reliqua curationis vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognoui, qui succissa lingua cum abunde super dentes eam \*premeret, non tamen loquendi facultatem cōsecutus est. Aded in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit.

## E N A R R A T I O.

**VITIVM** hoc Ægineta ἀγνυλό- ationem lingue vocat: alij ligationem lingue  
γλωσσος nominat: Anicenna abbrevi- gna dicere maluerunt.

*De Abscessu sub lingua.*

**SUB** lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica, doloresque magnos \*mouet: quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis vsque ad tunicam excidenda est, deinde vtrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica vndique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

*De La-*



## De Labris.

**L**ABRA autem sæpe finduntur, eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur, qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est quæ ad vlcera oris fiunt. Si verò altius descendunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathæ simile quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea facienda eadem sunt, quæ in auribus adultis exposita sunt.

## CAPUT XIII.

## De Cervicis vitis, &amp; curatione.

**A**T in ceruice inter cutem & asperam arteriam tumor increfcit, *βρογχήλη* Græci vocant, quo modò caro hebes, modò humor aliquis melli aquæve similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immisti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica <sup>\*exeditur</sup> exeritur. Quo facto, siue humor est, profluit: siue quid densius, digitis educitur, tum vlcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Medio <sup>al. exurit.</sup> tumore vna linea inciditur vsque ad tunicam. Deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusque cum velamento suo eximitur. Tum aceto cui vel salem vel nitrum aliquis adiecit, eluitur, oræque vna sutura iunguntur, cæteraque eadem quæ in aliis futuris superiniiciuntur. Leniter deinde, ne fauces vrgat, deligatur: si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia, <sup>\*tumor</sup> linamentisque id curandum <sup>\*linamentis, idque</sup> est, cæteris pus mouentibus.

## ENARRATIO.

At in ceruice.

**B**RONCHOCELE tumor grandis  
& rotundus est in ceruice, ab interiore

parte, quam bronchon nominant, denominationem sortita: omnis enim tumor apud antiquos *πύλη* vocabatur. *Ægineta*, sicut. *Ætius*, duplicem bronchoceles differentiationem.



tiam posuit; alteram videlicet quæ partium  
dilatatione fiat, atque hanc tanquam de-  
ploratam omnino relinquendam consulunt;  
alteram in qua aut humor aliquis aut sub-  
stantia in tunica continetur, quemadmodum

iam antè de steatmate, atheromate & me-  
liceride diximus: atque hæc curationem ad-  
mittit, eamque duplicem, nempe aut per  
incisionem aut per ressectionem.

## CAPVT XIII.

## De Umbilici vitis.

SUNT etiam circa Umbilicum plura vitia, de quibus pro-  
pter raritatem inter auctores parum constat. Verisimile  
est autem id à quoque prætermisum, quod ipse non cogno-  
uerat, à nullo id quod non viderat fictum. Commune omni-  
bus est, umbilicum indecore prominere. Causæ requirun-  
tur. Meges tres has posuit. Modò intestinum eò irrumperere,  
modò omentum, modò humorem. Sostratus nihil de omento  
dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum incretce-  
re; eamque modò integram esse, modò carcinomati similem.  
Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. Sed eadem  
tria causatus, spiritum quoque interdum eò dixit irrumperere.  
Hieron omnibus his quatuor positus, & omenti mentionem  
habuit, & eius quod simul & omentum & intestinum ha-  
buerit. Quid autem horum sit, his indiciis cognoscitur. Vbi  
intestinum prolapsum est, tumor neque durus, neque mollis  
est, omni frigore comminuitur: non solum sub omni calore,  
sed etiam retento spiritu crescit. Sonat interdum, atque vbi  
resupinatus est aliquis, delapso intestino ipse desidit. Vbi verò  
omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior ab ima  
parte, \*latus extenuatum in ventrem est, si quis apprehendit,  
elabitur. Vbi vtrunque est, indicia quoque mista sunt, &  
inter vtrunque mollities. At caro durior est, semperque  
etiam resupinato corpore tumet, prementiq. non cedit, prio-  
ribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet,  
quas in carcinomate exposui. Humor autem si premitur,  
circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit, re-  
supinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet.  
Ex his id quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit.  
Caro quoque carcinomati similis cum periculo tractatur.

Itaque

\* non im-  
minuitur:

\* vna

\* latus, ex  
tenuatus  
in ventri-  
cem est:



Itaque omittenda est. Sana excidi debet, idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus \* iisdem linamentis curant. In reliquis variæ sententiæ sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur, ut in \* vterū siue intestinum, siue omentum est, delabatur. Sinus verò umbilici tum vacuus à quibusdam duabus regulis \* exceptus est, vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur. A quibusdam ad imum acu traiecitur, duo lina ducente, deinde utriusque lini duobus capitibus diuersæ partes astringuntur. Quod in vna quoque oculi fit. Nam \* sic id quod supra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidam, ut antequam vincirent, summum vna linea inciderent, exciderentque quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent, tum deinde \* vinxerunt. Sed abunde est, iubere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat, tum imam basim eius atramento notare, resupinatoque homine digitis tumorem cum premere, ut si quid delapsum non est, manu cogatur. Post hæc umbilicum attrahere, & quā nota atramenti est, lino vehementer astringere. Deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere donec emoriatur, atque ut cætera vsta vlcus mutire. Idque non solum vbi intestinum vel omentum vel vtrumque est, sed etiam vbi humor est, optimè proficit. Sed antè quædam videnda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartumdecimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. At quod mali habitus est, quodque papulas, imperigines, similiaque habet, idoneum non est. Leuibuscum quoque tumoribus faciliè subuenitur. At in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, & hybernū vitandum est. Ver idoneum maximè est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet, neque id satis est: sed alius quoque ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum confidant.

n n

E N A R -



## ENARRATIO.

**E**μφαλον vocari diximus: Paulum eadem umbilici prominentis causas, & signa libro VI. capite LI. describit.

Idque non solum.

ÆGINETA tamen adionem hanc ad omni aut intestini chrastionem tantum

pertinere auctor est: Nam si caro, inquit, aut humor aut sanguis vitium creavit, tumoris medio circulatori præciso, deinde eo quod incideri extra peritonæum sublato, curationem in umbilico carni generanda dicata tentabimus.

## CAPVT XV.

*Quomodo aqua hydropicis emittatur.*

**A**QUAM his qui hydropici sunt, emitti oportere aliàs dixi. Nunc quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato, facere consueverunt. Quidam cute primùm adusta, deinde interiore abdomine inciso, quia quod per ignem diuisum est, minus celementer coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, vt ferè tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat. Demittendumque ita est, vt membranam quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur, eò tum plumbea aut ænea fistula iniicienda est, vel recuruatis in exteriorem partem labris, vel in \*media circumfurgente \*quodam nodo, ne tota intus delabi possit, huius ea pars quæ intrà, paulo longior esse debet, quàm quæ extrà, vt vltra \*vteriorem membranam procedat. Per hanc effundendus humor est. Atque vbi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, & in vulnere, si id vltum non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ vestigium appareat. Quidam tamen etiam non vsta cute protinus fistulam recipiunt, & super vulnus spongiam expressam deligant. Deinde, postero die rursus fistulam demittunt, quod recens vulnus paulum diductum patitur, vt si quid humoris superest, emittatur. Idque bis ita fecisse contenti sunt.

ENAR-

\*medio  
\*quadam  
mota,  
\*interio-  
rem



## ENARRATIO.

Demittendumque ita est.

CAVENDVM tamen est, ne ea parte sectionem moliamur, cui vitium incumbit: nam si liene primario affectu ortum sit, dexteriore umbilici parte sectionem fa-

ciamus; sin primario iecinoris affectui malum fuerit acceptum, a sinistrore umbilici parte dissecabinus: sed & non quævis hydropis species chirurgiam admittit, verum ea tantum, quæ ascites dicitur, in qua videlicet humor in vterum influit.

## CAPVT XVI.

*De intestinorum vulneratorum curationibus.*

NONVNQVAM autem venter ictu aliquo perforatur, sequiturque ut intestina euoluantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam retuli. Latius intestinum sui potest, non quòd certa fiducia sit, sed quòd dubia spes certa desperatione sit potior. Interdum enim glutinatur. Tum si vtrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoque necessarium accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si verò adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est. Momento enim alienantur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectionibus. Et si angustius vulnus est, quàm ut intestina commodè refundantur, incidendum est donec satis pateat. Ac si iam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulù admodum olei sit adiectum. Tum minister oras vulneris leuiter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis membranæ interiori iniectis debet medicus priora semper intestina quæ posteriora prolapsa sunt, conde-  
re, sic ut orbium singulorum locum seruet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. Quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi \*concidant. His conditis omentum quoque considerandum est, ex quo si quid iam nigri & emortui est, forfice excidi debet. Si quid integrum est, \*leniter super intestina diduci: sutura autem  
nn 2 neque

\*confidant

\*leniter

\*deduci:



\*facienda  
vel ini-  
cienda

\*fit quæ  
acuta, pro-  
pinqua  
quæ ret.e.

\*expres-  
sam.

neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se satis proficit, sed vtriusque. Et quidem duobus linis \*vinciendæ est spissior, quàm alibi: quia & rumpi facilius motu ventris potest, & non æquè magnis inflammationibus pars ea expōsita est. Igitur in duabus acubus fila traicienda, eaq. duabus manibus tensa, & prius interiori membranæ futura iniicienda est, sic ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisterrima à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. Quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acuum longè \*sit, quæ retusa est. Semel vtraque parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit. Iterumque eodem modo per oras immittendæ sunt. Atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Posthæc eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ. Similique ratione ei quoque parti vtraque futura iniicienda, semper ab interiori parte acubus venientibus, semper inter manus traiectis. Dein glutiniantia iniicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto \*impressam accedere debere manifestius est, quàm ut semper dicendum sit. Impositis his leuiter deligari venter debet.

#### ENARRATIO.

Interdum enim glutinatur.

Et si angustius vulnus.

**P**RÆSERTIM si non diffissum, neque aliè vulneratum fuerit: verum & tunc quidem difficulter conglutinatur, tum propter intestinorum, ut antè diximus, substantiam, tum quòd vulnus ipsum oculis sese non offerat, atque localia non admittat; sicut in omnibus intrinsecis videre licet, in quibus per potiones eadem consolidare solemus.

**P**RIVS tamen considerandum morer Galenus, & post eum Albucius, an flatus in intestinum distendens, ipsum remitti prohibeat: nam tum quidem ante vltiorem vulveris apertionem resoluentibus ac modicè calidis fovendum est intestinum, atque sensim in suam sedem restituendum. vide Paulum libro VI. capite LII.

#### CAPUT



## CAPVT XVII.

*De Interiore parte abdominis rupta, & qua  
ratione curanda sit.*

**I**NTERDVM tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra, rumpitur. Quod fœminis quoque ex utero sæpe euenire consuevit, sitque præcipuè circa ilia, sequitur autem cum superior caro mollis sit, vt non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecore intumescat. Atque id quoque aliter ab aliis curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immittis, sic vtrinque deuinciunt, quemadmodum & in vmbilico, & in yua positum est, vt quicquid \* super vinculum est, emoriatur: quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folij, quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, & tum oras futura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maximè cedat, quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaque integra est, ea magis obnitatur, tum qua rupta videbitur, \* im-  
mittendæ scalpello \* duæ tunicae sunt, vt exciso medio inte-  
rior membrana vtrinque recentem plagam habeat, quia quod  
vetus est, futura non coit, loco patefacto. Si qua parte mem-  
brana non nouam plagam, sed veterem habet, tenuis exci-  
denda habena est, quæ tantum ora eius exulceret. Cætera,  
quæ ad futuræ reliquam curationem pertinent, supra com-  
prehensa sunt.

\* supra

\* inciden-  
dæ  
\* duæ li-  
near

## ENARRATIO.

**P**ER abdominis membranam peritonæum intelligit; Arabes siphac nomi-  
nant. est autem peritonæum circa pubis os  
tenuissimum; unde & ibidem facillimè  
dirumpitur; illaque intestina in scrotum  
ruunt.

*De Varicibus ventris.*

**P**RÆTER hæc euenit, vt in quorundam ventribus vari-  
ces sint, quarum quia nulla alia curatio est, quàm quæ in  
cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc  
quoque eò differo.

n.n. 3

CAPVT



*De Testiculorum natura, & morbis eorum.*

VENIO autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent, quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam \* glandulis medullis habent. Nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent. Dolent autem in ictibus & inflammationibus tunicæ, quibus hi continentur. Dependent verò ab inguinibus per singulos nervos, quos *πρεμωσῆρας* Græci nominant, cum quorum utroque binæ descendunt & venæ & arteriæ. Hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ \* *ἐπιδρωιδής* à Græcis nominatur: super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer ima parte inhaeret, Darton Græci vocant. Múltæ deinde membranulæ venas & arterias, eosque nervos comprehendunt. Atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus leues, paruulæque sunt. Hactenus propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui iam conspicitur à nobis, *ὄρχευ* Græci, serotum nostri vocant, isque ab ima parte mediis tunicis leuiter innexus est, à superiore tantum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia esse consuerunt. Quæ modò ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modò his integris sunt. Siquidem interdum vel ex morbo primùm inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit, tum pondere eò deuoluitur, aut omentum, aut etiam intestinum. Atque ibi reperiata via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque partes \* demissum, subinde nervosas tunicas, & ob id eius recipientes diducit, *ἐντεροκήλην* & *ἐπιπλοκήλην* Græci vocant, apud nos indecorum, sed commune his Herniæ nomen est. Deinde si descendit omentum, nunquam in seroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illucve conuersum, aut aliquo

\* glandulis

\* *ἐπιδρωιδής*

Serotum

\* nifunt,

Hernia.



aliquo modo collocatum. Itemque si retentus est spiritus, non magnopere increfcit, tactu verò inæqualis est, & mollis, & lubricus. At si intestinum quoque descendit, \* tumor is sine \* humor inflammatione modò minuitur, modò increfcit. Estque his ferè sine dolore, & cum conquiescit aliquis, aut iacet, interdum ex toto \* defidit, interdum sic \* diuiditur, vt in scroto \* definit, \* discutitur, exiguæ reliquæ mancant. \* At si clamore & satietate, & si sub \* At clam. aliquo pondere is homo nixus est, crefcit, frigore omni con- \* distendi- trahitur, calore \* diffunditur. Estque tum scrotum & rotun- tur. dum, & tactu leue, idque quod subest, lubricum est: si pres- sum est, ad inguen reuertitur, demissumque iterum cum quo- dam quasi murmure deuoluitur. Et id quidem in leuioribus malis euenit. Nonnunquam autem, stercore \* accepto vastius \* concepto tumet, retroque compelli non potest: adfertque tum dolo- rem & scroto, & inguinibus, & abdomini: nonnunquam sto- machus quoque affectus, primùm ruffam bilem per os red- dit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram. Integris verò membranis interdum eam partem humor \* disten- eius quoque species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is in- dit. crefcit, vel in membranis, quæ ibi circa venas & arterias sunt, vbi hæ grauata occaluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, vna sedes est. Nam modò inter summam & mediam, modò inter mediam & imam consistit. Græci communi nomine quicquid est, *ὀδρονήλην* appellant: nostri, vt scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoque sub eodem nomine, quo \* priora habent. Signa autem quædam \* propiora communia sunt, quædam propiora. Communia, quibus hu- mor deprehenditur. Propria, quibus locis humorem subesse dicimus: si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris, isque moris est, si non nimius humor subest. At si is vehementer increuit, renititur sic, vt vter re- pletus, & arte astrictus. Venæ quoque in scroto instantur, & si digito pressimus, cedit humor, circumfluentque id quod non premitur, attollit, & tanquam in vitro cornuæ per scro- tum apparet, isque. (quantum in ipso est) sine dolore est. Sedes autem



· visu, vel  
nixu,

autem eius sicprehenditur: Si inter summam mediamque tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit, scrotum ipsius albidius est. Si ducitur, aut nihil, aut paruulum intenditur, testiculus eaparte neque visu, neque tactu sentitur. At si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo, ut superior coles sub tumore eo delitescat. Præter hæc æquè integris tunicis ramex innascitur, *κισσοκήλην* Græci appellant, cum venæ intumescunt. Hæ quoque intortæ conglomeratæque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam. Interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum neruumque eius increseunt. Ex his eæ quæ in ipso scroto sunt, oculis patent: hæ verò quæ mediæ imæve tunicæ insident, ut magis conditæ, non æquè quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subiectæ sunt, præterquam quod & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo: & id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inæquale est: & qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. Cum verò etiam super ipsum testiculum neruumque eius, id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit, utpote alimento amisso. Rarò, sed aliquando caro quoque inter tunicas increseit, *σαρκοκήλην* Græci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque adfert, & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atque ilia peruenit, partesque hæ intumescunt: neruus ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulque indureseit: super hæc inguen quoque nonnunquam varices implent, *βεβρωκήλην* appellant.

#### ENARRATIO.

quos *κρημαςήρας*.

**A**LIJ parastatas nominant: spinalis medulla ex cerebro propagines sunt.

quæ *ἐρυθροειδής*.

VERBUM hoc (inquit Ioannes Casarini) quum de eo diu iam dubitasset quo-

nam modo scribendum esset, propterea quòd nondum ad manum mihi erant Galeni opera Græca omnia, unde ipsum restitui posse conieclabam; nec falsò: tandem à doctissimo Georgio Agricola restitutum accipio; què tamen & ipse de eius verbi scriptura, se aliquando dubitasse literis ad me scriptis testatur, quòd apud ipsum Galenum loco uno

ant



aut altero ita scriptum inueniuit, *ἰερεγε-  
δης*, per τ non per θ, in eodem significatu; id  
quod Anticorum cōsuetudine, proprietate ve  
factum à Galeno existimat, ut qui ε pro λ  
scribere consueverunt, ut *ελισαρον ἀντι τοῦ  
ελισαροῦ*. Verum quum idem verbum apud  
eundem Galenum locis compluribus, & apud  
alios eiusdem professionis auctores scriptum  
inuenisset, eo quo nunc modo annotatum  
est, hic quoque scribendum adiudicabat; ver-  
bum videlicet deductum ἀπὸ τῆς ἐλύεγρ  
ἀπὸ εἰδός. Sunt tamen alij doctissimi viri,  
quibus per θ scribendum magis placuerit,  
quum passim in suis translationibus tuni-  
cam aut pelliculam rubicundam red-  
diderint.

### Nonnumquam autem stercore.

PAVLVS interdum periculum asferre  
docet; & Aëtius mortem nonnumquam mi-  
nari contendit.

### Signa autem quædam.

AETIVS libro XIII. capite XXII.  
ex Leonida clariùs paulo signa hæc descri-  
bit, in hunc modum : Hernia aquosa quan-  
doque ex occulta, quandoque ex manifesta  
causa contingit : ex occulta quidem, quum  
aquosus humor circa partes corporis colorum  
qua scrotum contexunt, ac implicanti, san-  
guini admixtus collectus fuerit : ex mani-  
festa verò, quando ex plaga collisis aut fra-  
ctis vasis sanguis effluens ad aquosam sub-  
stantiam transmutatur. Vbi igitur spontè  
constiterit aquosus humor collectus, substa-  
ns ac pallidus is inuenitur; ubi verò ex plaga,  
cruentam ac fœculentam materiam inue-  
nies. Humor autem vel intra rubicundam  
testiculi pelliculam consistit, vel extra eam,  
inter ipsam & pelliculas adjacentes; vel in  
propria pellicula veluti vesica quadam con-

tinetur : atque hoc genus herniam in tunica  
superaguata vocamus. Aliquando verò du-  
plex hernia oboritur, quum collectio, & in-  
rubicunda tunica, & in superaguata consi-  
sit. Si quidem igitur in pellicula rubicunda  
humor collectus fuerit, tumor unius coloris  
apparet, sine dolore: in principio dum adhuc  
parua collectio est ad contactum cedens; po-  
stea verò aucta collectione, testiculus humore  
undique circumdatus occultatur, ac tumor  
in ambitu extensus ac renitens, ad tactum  
hernia carnosæ suffusionem plerisque exhi-  
bet. possunt tamen tactu discerni: nam her-  
nia carnosæ omnino renititur; veris aquosa  
dignis cedit. Si verò in superaguata tunica  
humor colligitur, tumor ipse, sine magnus  
sive parvus fuerit, omnino circumscribetur.  
At si simul in rubicunda quoque pellicula  
collectus fuerit, duo tumores deprehenden-  
tur, alter in superaguata, alter in rubicunda  
tunica. Quod si extra rubicundam pellicu-  
lam collectio fiat, testiculus tactui occurrit.  
Hæc ex Leonida Aëtius : quæ ideo adscriptæ  
volui, quòd ad capituli huius declarationem  
plurimum facere viderentur. Solent porro  
hernie aut ramici species hæc nominibus  
distingui: *ἐντεροκήλη* vocant, quoties in  
scrotum intestinum denoluitur; Latini inte-  
stinorum ramicem, Avicenna rupturam no-  
minat. *ἐπιπλοκήλη*, si omentum descen-  
dat; Avicenna Zirbi, Latini omenti rami-  
cem dicunt. *ὀδονοκήλη*, Latini & Avicen-  
na indifferenter aqua ramicem appellant.  
*σπερμακήλη* autem carnosum ramicem di-  
cimus; ut *κυστοκήλη*, varicosum : quod  
accidit quoties vena ultra modum repleta  
glomerantur. Si affectio composita est ex  
omenti & intestini simul prolapsu, *ἐπι-  
πλοσπερμακήλη* vocant; *βομβασοκήλη*  
verò, si non in scrotum, sed in inguina de-  
noluantur contenta; nos inguinis ramicem  
dicimus.



## CAPVT XIX.

*De testiculorum curationibus communibus, & primò de  
incisione & curatione inguinis, vel scroti.*

**H**is cognitis, de curatione dicendum est, in qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. Priùs de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. Nam quæ vel sanari non possint, vel aliter nutrirì debeant, dicendum erit, simul \* ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In vtraque curatione, homo ante \* triduum bibere aquam, pridie abstinere etiam à cibo debet; ipso autem die collocari supinus: deinde si inguen incidendum est, idque iam pube contegitur, antè radendum est, & tum extento scroto, vt cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunicæ inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perueniaturq. ad eam, \* qua media est plaga facta. Foramen deorsum versùs subest. In id demittendus est sinistræ manus digitus index, vt diductis interuenientibus membranulis \* simul laxet. Minister autem sinistra manu comprehenso scroto, fursum versus eum debet extendere, & quammaximè ab inguinibus abducere: primùm cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito deducere non potest, scalpello abscindat. Deinde sine eo, vt is \* delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoque inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multæ venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores verò antè longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sanguinem fundant. Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit, sic, vt altè ad ipsum inguen præcadatur. Infra tamen non tota demenda est. Nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est,

\* ac ad

\* triduo

\* quæ med.  
est. Plaga  
facta for.  
\* sinum

\* elapsus



est, excidi sine summo periculo non potest. Itaque ibi relin-  
quendum est. Idem in ima quoque tunica, si laesa est, facien-  
dum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra pau-  
lum ea abscindenda, ne laesa abdominis membrana inflam-  
mationes moueat. Neque tamen nimium ex ea sursum re-  
linquendum est, ne postea sinuetur, & sedem eidem malo  
praestet. Purgatus\* ita testiculus per ipsam plagam, cum ve-  
nis & arteriis, & neruo suo\* leuiter demittendus est, viden-  
dumque ne sanguis in scrotum descendat, neque concretus  
aliquo loco maneat. Quae ita fient, si venis vinciendo medi-  
cus prospexerit: lina quibus capita earum continebuntur, ex-  
tra plagam dependere debebunt, quae pure orto sine vlllo do-  
lore excident. Ipsi autem plagae iniiciendae duae fibulae sunt,  
& insuper medicamentum quo\* glutinentur. Solet inter-  
dum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix  
maior & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non  
\*fulcienda, sed leuiter tantum ponenda sunt, supraque ea  
quae inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana suc-  
cida vel spongia. Caetera eadem quae ubi pus moueri debet,  
adhibenda sunt. At cum\* infra incidi oportet, resupinato  
homine subiicienda sub scroto sinistra manus est, deinde id  
vehementer apprehendendum, & incidendum. Si paruulum est  
quod nocet, modicè, ut tertia pars integra ad sustinendum  
testiculum infra relinquatur. Si maius est, etiam amplius, ut  
paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit,  
integrum maneat. Sed primò rectus scalpellus, quam leuif-  
sima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat. Tum  
inclinandus mucro est, ut\* transuersa membrana secet, quae  
inter summam mediamque tunicam sunt. At si vitium in  
proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. Si sub  
illa quoque conditur, etiam illa incidenda est, sic ut tertia  
quoque, si illa vitium tegit. Vbicunque repertum malum est,  
ministrum ab inferiore parte exprimere moderatè scrotum  
oportet, medium digito, manubriolo, vel scalpello diductam  
inferiorem partem tunica extra collocare: deinde eam ferra-  
mento, quod ad similitudinem curuum vocant, incidere,  
sic ut

\* itaque  
\* leniter

\* glutine-  
tur.

\* fascienda

\* inguen

\* transuer-  
sas mem-  
branas

\* munda

\* utique



sic vt in eadem intrare duo digiti, index & medius, possint.  
 \* confectis His deinde \* coniectis, excipienda reliqua pars tunicae, & inter  
 digitos scalpellus immittendus est, eximendumq. aut effun-  
 dendum quicquid est noxium. Quamcunque autem tuni-  
 cam quis violauit, illam quoque debet excidere, ac mediam  
 quidem (vt supra dixi) quam altissime ab inguine, imam au-  
 tem paulo infra. Caterum antequam excidantur, hae quo-  
 \* summae que vinciri lino \* summe debent, & eius lini capita extra pla-  
 \* illis gam relinquenda sunt, sicut in \* aliis quoque venis, quae id re-  
 quisierint. Eo facto testiculus intus reponendus est, oraeque  
 scroti suturis inter se committendae, neque paucis, ne parum  
 glutinentur, & longior fiat curatio, neque multis, ne inflam-  
 mationem augeant. Atque hic quoq. videndum est, ne quid  
 in scroto sanguinis maneat. Tum imponenda glutinantia  
 sunt. Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve  
 concretum ex eo decidit, incidi subter id debet, purgatoque  
 eo spongia acri aceto madens circumdari. Deligatur autem  
 vulnus omne, quod ex his caussis factum est. Si dolor nullus  
 est, quinque primis diebus non est resoluendum, sed bis die  
 tantum aceto \* irroranda lana vel spongia. Si dolor est, tertia  
 \* irroran- die resoluendum, & vbi fibulae sunt, hae incidendae, vbi lina-  
 dum mentum, id mutandum est: rosaque & vino madefaciendum  
 id, quod imponitur. Si inflammatio increfcit, adiiciendum  
 prioribus cataplasma ex lenticula & melle, vel ex malicorio,  
 quod in austero vino coctum sit, vel ex his mistis. Si sub his  
 inflammatio non conquirit, post diem quintum multa ca-  
 lida aqua vulnus fouendum, donec scrotum ipsum & exte-  
 nuetur, & rugosius fiat. Tum imponendum cataplasma ex  
 triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. Quae ipsa si robu-  
 stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. Ne-  
 \* virium que dubium est, quodcumque \* initium fuit, si magna in-  
 flammatio est, quin ea, quae pus mouent, imponenda sint.  
 Quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi de-  
 bet, vt exitus detur. Linamentumque eatenus imponendum  
 est, vt foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos  
 \* propiore \* priore cataplasmate, deinceps vtendum est. Haec proprie  
 ad eius-



ad eiusmodi vulnera pertinent. Cetera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus.

## ENARRATIO.

deinde si inguen incidendum.

**E**TSI omnes veteres intestinorum ramiciis inciso inguine curationem moliti sint; Paulus tamen à recentioribus magis

probatam dicit eam quæ per vulsionem fit, quam & ipse Aetius commendat: nam, Tutissima, inquit, curatio herniarum, chirourgia & vulsione perficitur, si peritus artifex contingat; tutior tamen ipsa chirourgia est vulsio.

## CAPVT XX.

*De intestini curatione.*

**H**IS propositis, ad singulas species veniendum est, ac si cui paruulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experienda iunctura est. Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila assuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subiicitur, deinde reliqua fasciæ pars arcè circundatur, sub quo sæpe & intus compellitur intestinum, & inter se tunicæ glutinantur. Rursus si ætas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adiungunturque \*dolor & vomitus, quæ ex stercore, & ex cruditate eò delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse manifestum est. Leuandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est. Sanguis mitti ex brachio debet, deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est: si minus, certè pro vi corporis quàm \*longissimè. Eodem verò tempore supèr habendum cataplasma ex lini semine, quod antè aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & is demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoque adiectum sit, dandumque aliquid cibi \*lenis calidi. Quidam etiam aluum ducunt. Id ducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea verò, quæ suprà scripta sunt, leuato malo, si quando alias dolor reuerterit, eadem erunt facienda. Sine

\*dolores

\*longissima.

\*leuis



\* non nisi  
cum  
\* incidenda  
\* diducta  
\* is ipse

dolore quoque, si multa intestina prolapsa sunt, secari superuacuum est, non quòd excludi à scroto non possint, nisi tamen id inflammatio prohibuit, sed quòd repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis sed mutatio. At in eo quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus in inguine factum peruenit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Neque enim \* cum periculo lædatur, quæ \* excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. Vbi \* deducta autem erit, ab inguine vsque ad testiculum incidi debet, sic, ne \* ipse lædatur, tum excidi. Ferè tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit. Si vir robustus est, maiusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione vsque ad mediam tunicam scalpello aperitur, eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur, sic ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur, sub eaque index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit. Deinde dextræ manus duo digiti pollex atque index, venam & arteriam & nervum, tunicamque eorum à superiore tunica diducunt. Quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resoluuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quæ excidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quoque eius vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulò latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

## ENARRATIO.

**A**GINETA eum tantum qui ex intensione erit, intestinorum ramicem chirurgià curandum dicit: Alexander Benedictus libro XXI. capite XXVII. à se primum proditum curandi citra ferramentum alium modum describit: qui etsi ma-

num omnino desiderare videatur, unica tamen punctione constat. & nec sanguinis profusum, neque ullam inflammationem comitem habet; eam curationem non solum in intestini, sed & in omenti ramice utilissimam dicit.

CAPVT



## CAPVT XXI.

*De Omenti curatione.*

**A**T si omentum descendit, eodem quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen diducendæque tunicae sunt. Considerandum autem est, maiorne is modus, an exiguus sit. Nam quod paruulum est, super inguen in alutem vel digito vel auerso specillo repellendum est. Si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex utero prolapsum est, idque adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur & excidat. Quidam hinc quoque duo lina acu traiciunt, binisque singulorum capitibus diuersas partes astringunt. Sub quo æquè, sed tardiùs emoriatur. Adicitur tamen hinc quoque celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis quæ sic exedunt, ne erodant, \* ομητιὰ Græci vocant. \* ομητιὰ  
Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent, quod in paruulo non est necessarium. Si maius est, potest profusionem sanguinis facere. Siquidem omentum quoque venis quibusdam etiam maioribus illigatum est. Neque verò si \* discisso ventre id prolapsum forfice præciditur, cum & \* discisso emortuum sit, & aliter tutiùs auelli non possit, inde huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari, si \* reli- \* reductū etum omentum est, sutura debet. Si id amplius \* fuit, & ex- \* Auit, tra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. Si verò humor intus est, incidendum est, in pueris quidem inguen, nisi in his quoque liquoris eius maior modus prohibet: in viris verò & ubicunque multus humor subest, scrotum. Deinde si inguen incisum est, eò protractis tunicis humor effundi debet. Si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quàm humor est effundendus, abscindendæque membranulae sunt, si quæ eum continuerunt: deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adiectum, vel nitrum habeat: si sub media imãve tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæque sunt.

CAPVT



**R**AMEX autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsis venis infigantur, cum eo ne amplius quam has vrant, maximeque ubi inter se implicatæ glomerantur, eò ferrum id admouendum est, tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est, utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. Tertio die lenticula cum melle imponenda est, post eiectionis crustis vlcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus verò super mediam tunicam venæ tument, incidendum inguen est, atque tunica promouenda, ab eaq. venæ digito vel manubriolo scalpelli separandæ. Qua parte verò inhærebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vinciendæ, tum sub ipsis vinculis præcidendæ, reponendusque testiculus est. At ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duæ tresve venæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore \* vitio vacet, idem faciendum quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligatæ venæ præcidantur, isque condatur. Sin totum id ramex obsederit, per plagam demittendus digitus index erit, subiiciendusque venis, sic ut paulatim protrahat æquè adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. Tum fibulæ oris sic \* vinciendæ, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit: Acus ab exteriori parte oram vulneris perforat. Tum non per ipsam venam, sed per membranam eius immittitur, per eamque in alteram oram compellitur. Venæ vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, & \* filo comprehensas illas abundè tenet. Itaque etiam satis est, duas fibulas esse: tum venæ quæcunque protractæ sunt in ipsum inguen, \* aduerso specillo comprehendere debent: soluendi fibulas tempus \* & inflammatione finita & purgato vulnere est, \* vt \* vna simul & \* ima oras

\* sui parte  
vit.

\* iniicien-  
da,

\* filum

\* auerso  
specillo  
comprehendi  
d.

\* &

\* ima

oras



oras & venas cicatrix deuinciat. Vbi verò inter imam tunicam & ipsum testiculum neruumque eius ramex ortus est, vna curatio est, quæ totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecorè, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est, idem in ima faciendum, neruusque ex quo testiculus dependet, præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad inguen lino deligandæ, & infra vinculum abscindendæ sunt.

## ENARRATIO.

Ramex autem si.

**V**IDE ne non legendum sit De varicis curatione: & rursum, Varix autem; ita ut hic varicosum ramicem intelligamus, quemadmodum iam ante quoque per omentum ac intestinum, omenti at-

que intestini ramicem comprehendimus: nam quod ita legendum censeam, facit quod curatio quam hic habet Celsus, omnino conveniat cum ea quam varicoso ramici ascribit Paulus: quanquam si quis veterem lectionem servare malit, non improbo.

## CAPVT XXIII.

*De Carne quæ inter tunicas testiculorum concrevit, & de neruo indurato.*

**C**ARO quoque, si quando inter tunicas concrevit, nihil dubij est, quin eximenda sit, sed id ipso scroto inciso fieri commodius est. At si neruus induruit, curari res neque manu neque medicamento potest. Vrgent enim febres ardentes, & aut virides aut nigri vomitus: præter hæc ingens sitis, & linguæ aspritudo, fereque à die tertio spumans bilis aluo cum rosione redditur. Atque neque assumi facile cibus, neque contineri potest, neque multo post extremæ partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur, deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

## ENARRATIO.

At si neruus induruit.

**S**VADENT propterea alij, ut ramicem hunc cem deploratum, ac desperata

salutis omnino, relinquamus prognosticū, ac repudiemus.

PP

De



## CAPVT XXIII.

*De Ramice inguinis.*

**V**BI verò in ipso inguinē ramex est, si tumor modicus est, semel incidi: si maior, duabus lineis debet, ut medium excidatur: deinde non extracto testiculo, sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui, colligendæ venæ, vinciendæque vbi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ sunt. Neque quicquam noui curatio vulneris eius requirit.

## ENARRATIO.

deinde non extracto. *id incisum magnam admodum periculum afferat.*  
**N**ON solum à testiculis temperandum est, sed & à peritonæo, quod

## CAPVT XXV.

*Ad tegendam glandem colis, si nuda est.*

**A**B his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt, in quo si glans nuda est, vultque aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest, sed expeditius in puero quàm in viro. In eo cui id naturale est, quàm in eo, qui quarundam gentium more circumciseus est. In eo cui glans parua iuxtaque eam cutis, spatiosior verò ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est: Cutis circa glandem \*apprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condat, ibique deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergo inciditur, donec coles nudetur: magnaque cura cauetur ne vel urinæ iter, vel venæ, quæ ibi sunt, incidantur. Eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturque circa pubem velut circulus, \*eoque linamenta dantur, ut caro increseat & id impleat, satilque velamenti supra latitudo plagæ \*præstat. Sed donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinæ itinere. At in eo qui circumciseus

\*prehenditur,

\*super eo-  
que

\*præstat.



cum eis est, sub circulo glandis scalpello dducenda cutis ab interiore cole est. Non ita \*dolet, quia summo soluto, diduci • vero dol. deorsum vsque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur supra glandem. Tum multa frigida aqua fouetur, \*emplastrumque • empla- stroq. cir- cumdatur, quod va- lenter circa datur, quod valentem inflammationem reprimat, pro- ximisq. diebus vt propè à fame victus est, ne fortè eam par- tem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube vsque circulum. Super glandem autem ad- uerso emplastro imposito induci. Sic enim fit, vt inferior pars glutinetur, superior ita sanescat, ne inhæreat.

## ENARRATIO.

PAVLVS Ægineta lib. VI. cap. LIII. duplicem administrationis modum ex- plicat: inter artis tamen opera neutrum requiri, docet; tum quod affectus obeundis muniis nullam difficultatem pariat; tum quod neque tantum indecori asserat, vt chi- rurgi operâ omnino opus sit.

*Quomodo glans penis contecta aperiri possit.*

CONTRA si glans ita contecta est, vt nudari non possit, quod vitium Græci φήμωτον appellant, aperienda est. Quod hoc modo fit: Subter à summa ora cutis inciditur recta linea vsque ad frænum, atque ita superius tergus relaxa- tum cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est, sic vt vertex eius ad frænum basis in tergo extremo sit. Tum su- perdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quæ ad sa- nitatem perducant. Necessarium autem est donec cicatrix sit conuiescere. Nam ambulatio atterendo vlcus sordi- dum reddit.

*Infibulandi ratio.*

INFIBVLARE quoque adolescentulos interdum vocis, interdum valetudinis causa quidam consueverunt. Eiusque hæc ratio est. Cutis quæ super glandem est extenditur, nota-

PP 2

turque



\* perforatur,

\* infra

\* inditur,  
quæ quo  
leuior, eo  
melior est.

turque vtrinque à lateribus atramento quâ \* perforatur, deinde remittitur. Si super glandem notæ reuertuntur, nimis apprehensum est, & \* vltra notari debet. Si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est. Tum quâ notæ sunt, cutis acu filum ducente transiit, cuiusque fili capita inter se deligantur, quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. Vbi hæ confirmatæ sunt, exempto filo fibula \* additur, quæ quo melior, eo leuior est. Sed hoc quidem sæpius inter superuacua, quàm inter necessaria est.

## CAPVT XXVI.

*De Urinæ reddendæ difficultate, & de Calculo, curationibusque eorum.*

\* emollire

\* leuesque

**R**ES. verò interdum cogit \* emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. At mediocris quoque inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, sed in foeminis quoque interdum necessarium est. Ergo aneæ fistulæ fiunt, quæ vt omni corpori ampliori minori que sufficiant, ad mares tres, ad foeminas duæ medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque est digitorum: media, duodecim: minima, nouem. Ex muliebribus, maior nouem: minor, sex. Lucruas verò esse eas paulum, sed magis viriles oportet, \* leuesque admodum: ac neque nimis plenas, neque nimis tenues. Homo tum resupinus, eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra verò fistulam demittere in iter urinæ debet. Atque vbi ad ceruicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque vrina reddita recipere. Foemina breuius urinæ similiter & rectius iter habet, quod mammulæ simile inter imasoras super naturale positum, non minus sæpe auxilio



auxilio eget, \* aliquanto minus difficultatis \* exigit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longè ab exitu inhærescit. Eum si fieri potest, oportet \* vellere, vel oriculario specillo, vel eo feramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda, & condita glande lino vincienda est, deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est, tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

\* sed aliq.  
\* exhibet.

\* euellere,

## ENARRATIO.

At mediocris quoque.

tur, suppuratione facta, & eruptione soluitur.

Q VIBVS in urinaria fistula, inquit Hippocrates, tubercula nascun-

*Quæ curatio calculosis adhibeatur.*

CVM vesicæ verò calculique facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiiciam quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceptum sit, nullo modo conuenit: ac neq. in omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni vitio id experendum est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam nouem annos, nondum quatuordecim excessit, & si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo \* interdum etiam temeraria medicina proficiat, sed quo \* tamen non sæpius utique in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. Quæ simul cum ipsa curatione proponam. Igitur ubi vltima experiri statutum est, antè aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minimè glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi verò inter hæc exercitatione vratur, quo magis calculus ad vesicæ ceruicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Vbi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido.

PP. 3

lido.



lido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur: Homo præualens & peritus in sedili alto confidit, supinumque cum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductisque eius cruribus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis eos quam maximè possit attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quo & sedilia & interiora crura inter se \*deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter prout confedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Siue autem vnus, siue duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine vllis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc etiamnum à lateribus duo valentes obiciuntur, qui circumstantes \*leuare, vel vnum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde diligenter vnguibus circuncisis, \*atque sinistra manu duos eius digitos, indicem & medium, leniter prius vnum, deinde alterum in anum eius demittit, dextraque digitos super imum abdomen leniter imponit, ne si vtrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam lædant. Neque verò festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est, sed ita ut quam maximè id tutò fiat. Nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primùm circa ceruicem quæritur calculus. Ibi repertus minore negotio expellitur. Et ideò dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc iudiciis suis cognitum est. Si verò aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad vltimam vesicam dantur, paulatimque dextra quoque manus eius vltra translata subsequitur. Atque vbi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eo curiosius deducitur, quo minor \*leuiorque est, ne effugiat, id est, ne sæpius agitata vesica sit. Ergo vltra calculum dextra semper manus eius opponitur, \*sinistræ digiti deorsum eum compellunt, donec ad ceruicem peruenitur. In quam si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat: si planus, sic,

\*deligantur,

\*leuari al.  
ab leuari  
al labare  
\*seder, atque sinistra manus duos digitos

\*leuiorq.

\*sinistra digitis eum compellit,



sic, vt transuersus sit: si quadratus, vt duobus angulis sedeat:  
 si altera parte plenior, sic vt prius ea, qua tenuior sit, euadat.  
 In rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si \*leuior  
 altera parte est, vt ea antecedit. Cum iam eò \*venit, vt in-  
 cidi super vesicæ ceruicē iuxta anum cutis plaga lunata vsque  
 ad ceruicem vesicæ \*debeat, cornibus ad coxas spectantibus  
 paulum, deinde ea parte qua strictior ima plaga est, etiamnum  
 sub cute altera transuersa plaga facienda est, qua ceruix ape-  
 riatur, donec vrinæ iter pateat, sic vt plaga paulo maior, quàm  
 calculus sit. Nam qui \*metu fistulæ, quàm illo loco \*ἐπὶ θύρῳ  
 Græci vocant, parum patefaciunt, cum maiore eodem peri-  
 culo reuoluuntur, quia calculus iter, cum vi premitur, facit,  
 nisi accipit. Idque etiam perniciosius est, si figura quoque  
 calculi vel asperitudo aliquid eò contulit. Ex quo & sanguinis  
 profusio, & distentio neruorum fieri potest. Quæ si quis eua-  
 sit, multo tamen patentiore fistulam habiturus est, rupta  
 ceruice, quàm habuisset incisa. Cum verò patefacta est, in  
 conspectu calculus venit, in cuius corpore nullum discrimen  
 est. Ipse si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera  
 protrahi potest. Si maior, eiiciendus à superiore ei parte vn-  
 cus est, eius rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in  
 semicirculi speciem retusæ latitudinis, ab exteriori parte \*le-  
 uis, qua corpori iungitur, ab interiori asper, qua calculum at-  
 tingit. Isque longior potius esse debet. Nam brevis extra-  
 hendi vim habet. Vbi iniectus est, in vtrunque latus inclinan-  
 dus est, vt appareat calculus, & teneatur, quia si apprehensus  
 est, ille simul inclinatur. Ideoque eo \*minimè  
 cum adduci uncus cœperit, calculus intus effugiat, hic in  
 oram vulneris incidat, eamque conuulneret. In quâ re quod  
 periculum esset, iam suprà proposui. Vbi satis teneri calcu-  
 lum patet, eodem penè momento triplex motus adhibendus  
 est, in vtrunque latus, deinde extra; sic tamen, vt leniter id  
 fiat, paulumque primò calculus attrahatur: quo facto, attol-  
 lendus uncus extremus est, vti intus magis maneat, facilius-  
 que illum producat. Quòd si aliquando à superiore parte cal-  
 culus parum commodè comprehendatur, à latere erit appre-  
 hendend-

\*leuior

\*venit, in-  
cidi

\*debet,

\*meatum

\*ἐπιθυμία  
vel ἐπιθυμία

\*leuis,

\*minimè



hendendus. Hæc est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine ullo periculo eximuntur. In vesica verò non tutò vel hî conquiruntur, vel attrahuntur, quoniam vbi illam conuulnerunt, ex distentione neruorum mortem maturant: multoque magis, si spina aliqua vesicæ inhæret, eamque cum duceretur, duplicauit. Colligitur autem eo, quòd difficilius vrina redditur, in ceruice calculum esse: eo quòd cruenta destillat, illum esse spinosum, maximeque id sub digitis quoque experiendum est, neque adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoque leniter intus digiti obiciendi, ne violenter promouendo conuulnerent, tum incidendum. Multi hîc quoque scalpello vti sunt. Meges (quoniam is infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, quâ cauum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in summâ parte labrosum, in ima semicirculatum acutumque. Id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat, vt simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo \* cum sequebatur, vt semel quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo ceruix ea parte facta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet, nulla propter festinationem vi admota.

\*consequatur,

#### ENARRATIO.

in eo corpore, quod.

**A**GINETA tamen etiam ante nonnum annum, idq; usque ad XIIII. propter corporum mollitudinem, pueros facillimè curationem recipere auctor est: senes autem, quòd corpus eorum contumax sit, vix sanescere; mediam ætatem, medio inter has se habere loco.

Ambulandi verò.

NON solum ambulandum, sed & con-

cutiendum corpus aliq; censent; atque interdum ex alto saltare inibent, vt eo impetu lapsi loco dimoueat.

Nam læsa vesica.

QVVM enim nervosa planè sit vesica, eadem læsa facillè in consortium trahet spinalem medullam, & cerebrum ipsum; vnde & lethales omnino conuulsiones oriuntur.

Signa



*Signa calculorum, vel arenosorum, vel mollium.*

**A**T calculus arenosus, & antè manifestus est; quoniam, & vrina quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neque æquè <sup>\* sed len.</sup> leniter renitur, & insuper dilatatur. Item mollis calculus, & ex pluribus minutisque, sed inter se parum astrictis compositus <sup>\* indica-</sup> indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. Hos omneis <sup>tur, de se</sup> leniter permutatis subinde digitorum vicibus sic oportet <sup>abstrahēs</sup> abducere, ne vesicam lædant, nè intus aliquæ dissipatæ reliquæ mancant, quæ postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis vel vncō eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter inuenitur, inuentusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica læditur, excitatque inflammationes mortiferas, adedò ut quidam secti, cum diu frustra per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiam quòd exiguus calculus, ad plagam vrina postea <sup>\* promo-</sup> promouente, excidit. Si quando autem is maior, <sup>uetur, &</sup> non videtur, nisi rupta ceruice, extrahi posse, findendus est. <sup>excidit.</sup> Cuius repertor Ammonius, ob id Lithotomos cognominatus est. Id hoc modo fit. Vncus iniicitur calculo, sic ut facilè eum <sup>\* concussus</sup> concussum quoque teneat, ne is retro reuoluatur. Tum feramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam <sup>\* vesicam</sup> vesicam per fer- <sup>fer.</sup> ramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

## ENARRATIO.

Si quando autem is.

**C**URATIONEM hanc tanquam minimè ruitam hodie ferè reiciunt. Paulus minus periculi in parno, quàm magno

lapide esse restatur, quòd qui magno calculo torqueantur, cruciatibus atque inflammationibus perferendis magis assueverint, ac proinde ad dissectionem aut curationem opportunius sese habeant.



*De Calculis feminarum.*

\* parum  
proprie,  
tamē quæ-  
dam  
\* cum vir-  
na in cer-  
uicem cō-  
pellit,

**H**Æ verò curationes in fœminis quoque similes sunt: de quibus \* tamen parum proprie quædam dicenda sunt. Siquidem in his vbi paruulus calculus est, scapellus superuacuum est, quia \* is vrinam in ceruicem non compellit, quæ & breuior, quàm in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & si in primo quod est angustius inhæret, eodem tamen vincto sine vlla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subiici digiti tanquam masculo: mulieri per naturalia eius debent. Tum virgini quidem sub ima sinisteriore ora. Mulieri verò inter vrinæ iter & os pubis incidendum est, sic vt utroque loco plaga transuersa sit: neque terreri conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

## ENARRATIO.

**R**ARIVS multò mulieres, quàm viri calculis afficiuntur; idque tum propter colli vesicæ breuitatem; tum etiam eiusdem (vt sic dicam) amplitudinem: unde crassos & sæculentos humores minore quàm viri molestia excernunt. quibus accedit, quòd dum iuuenes sunt, quietiores ac sedentariæ magis viris sint.

Sed virgini subiici digiti.

QVOD virginibus per annum, non secus ac in viris, digitos subiicimus, in causâ est tum pudendi ipsius angustia, tum pellicula hymenis impedimentum.

*Quæ curatio calculo euulso habenda sit.*

\* excipit

**C**ALCVLO euulso, si valens corpus est, neque magno-  
pere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo mi-  
nor inflammatio oriatur. Atque ingredi quoque eum pau-  
lum non alienum est; vt excidat, si quid intus concreti san-  
guinis mansit. Quòd si per se non desistit, rursus ne vis omnis  
intereat, supprimi debet. Idque protinus in imbecillioribus  
ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem vt distentione  
neruorum periclitatur aliquis, dum vesica eius agitur: sic  
alter metus \* excipitur remotis medicaminibus, ne tantum  
sanguinis profluat vt occidat. Quod ne incidat, desidere is  
debet



debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. Sub quo & sanguis ferè conquiet, & astringitur vesica, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus & coxis, & super pubem. Vbi iam satis vel euocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est; sic ut caput humile sit, coxæ paulū excitentur: ac super \*vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde interpositis duabus horis, in solium is aquæ calidæ resupinus demittendus est, sic, ut à genibus ad umbilicum \*in aqua aqua teneat, cætera vestimentis circumdata sint, manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet, qui spongia subinde \*in facie facile detergendus est, finisque eius fomenti est, donec infirmo offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletur, qui pubem & coxas & inguina, & plagam ipsam contactam eodem ante se linteolo protegat, isque subinde oleo tepido madefaciendus est, ut neque frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, \*quæ vesicam urgendo vulnus irritant, quàm calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est. Proximo die, si spiritus difficilius redditur, si vrina non excedit, si locus circa pubem maturè intumuit, scire licet in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur demissis eodem modo digitis leniter pertractanda vesica est, & discutienda si qua coierunt. Quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mistum per plagam in vesicam compellere. Nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. Eaque facere etiam primo die conuenit. Si timemus, ne quid intus sit, maximeque vbi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cætera eadem facienda sunt: ut demittatur in solium, ut eodem modo panniculus, eadem lana superiniiciatur. Sed neque sæpe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quàm adolescens est; infirmus quàm valens; leui, quàm grauiore inflammatione



\* imus fe-  
det, medio  
cris & cum

\* vrina

\* trans-  
fluens

adfectus: is cuius corpus digeritur, quàm is cuius astrictum est. Inter hæc verò si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter \* imus, sed & medio-  
cris est cum febre modica dolor, scire licet rectè procedere curationem. Atq. in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur. Qua leuata, solum superuacuum est. Supini tantummodo vulnus aqua calida fouendum est, vt si quid  
\* vrinae rodet, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, & si purgandum vlcus videbitur, melle linendum. Id si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur Enneapharmacum emplastrum. Nam & seuum habet ad pus mouendum, & mel ad vlcus repurgandum: medulla etiam, maximeque vitulina, quod in id ne fistula relinquatur, præcipuè proficit. Linamenta verò tum super vlcus non sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum, rectè imponuntur. At vbi vlcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ prælagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiât, si \* transfluens vrina id non rodit, si similiter ante tertium diem quædam liuida excidunt, si is aut nihil, aut tardè responderet, si vehementes dolores sunt, si post diem quintum magnæ febres vrgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem iucundius est. Nihil tamen prius est, distentione nervorum, & ante novum diem vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinencia modicis & tempestiuis cibis, inter hæc fomentis, de quibus suprà scripsimus, oportet.

#### ENARRATIO.

Deinde interpositis.

SUNT quibus hæc curatio non satis ardeat.

hapsus lanæ mollis.

HAPSUS id Latinè dici videtur, quod Græci *πιδνα*: ita enim Linacer verbum

illud veritè *πιδνα* in Therapentica Galeni duobus quos observamus, locis. Caterum *πιδνα* Suidas exponit *οὐκ ἀπομα*: Hesychius *ζώνη*. Hapsus ergo significare videtur potest, vel sacculum, crumenam, vel huiusmodi aliquid rectorium, aut velamen aut cingulum sacculi aut crumene modo factum. hæc Casarius.

CAPVT



## CAPVT XXVII.

*De cancro qui excisa vesica nascitur, & qua  
curatione vti deceat.*

**P**ROXIMVS canceri metus est: is cognoscitur, si & per  
vulnus, & per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cum-  
que \*eo quædam à concreto sanguine non abhorrentia, te- \*ca  
nuesque carunculæ \*lanulis similes: præter hæc si oræ vulne- \*lanulis  
ris aridæ sunt, si dolent inguina, si febris non defuit, eaque al. squa-  
in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Consi- mulis  
derandum autem est, in quam partem cancer istendat. Si ad  
colem, indurefcit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat,  
testiculique intumescunt. Si in ipsam vesicam, ani dolor se-  
quitur, coxæ durescunt, non facile crura extendi possunt. Ac  
si in alterutrum latus, oculis id expositum est, paresque vtrin-  
que easdem notas, sed minores habet. Primum autem ad  
rem pertinet, corpus rectè iacere, vt superior pars semper  
\*eadem sit, in quam vitium fertur: ita si ad colem it, supinus \*ea fit,  
is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id  
quod integrius est. Deinde vbi ventum fuerit ad curatio-  
nem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium deco-  
ctum sit, aut cupressus, aut myrtus: idemque humor clystere  
intus \*adiicietur. Tum superponetur lenticula cum malico- \*iniicie-  
rio mista, quæ vtraque ex vino decocta sint: vel rubus aut oleæ tur.  
folia eodem modo decocta aliaque medicamenta, quæ ad co-  
hibendos purgandosque caneros proposuimus, ex quibus,  
si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur.  
Vbi stare cœperit cancer, mulsò vulnus eluetur. Vitabitur-  
que eo tempore ceratum, quod ad \*recipiendum id malum \*decipiend-  
corpus emollit: potius plumbum elotum cum vino inunge- dum  
tur, superque idem linteolo illicitum imponetur. Sub quibus  
perueniri ad sanitatem potest cum eo tamen quòd non igno-  
remus, orto Cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica  
quoddam consortium est, exque eo fieri, vt neque retineatur  
cibus, neque si quis retentus est, concoquatur, neque corpus



alatur: ideoque ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit, quæ necessario mortem maturant: sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen \* diu tenenda ratio curationis est. In qua quædam observatio ad cibum quoque potionemque pertinens necessaria est. Nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. Vbi vlus purgatum est, ex media materia olera & fassamenta semper aliena sunt. Potione opus est non \* modica. Nam si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur. Si plus æquo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendam esse manifestius est, quam ut subinde dicendum sit. Solet verò sub eiusmodi victu \* venire, ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel foenum græcum, vel malua decocta sit. Idem humor rosa mistus in ipsum vulnus oriculario clystere \* agendus est, ubi id rodit vrina, neque purgari patitur. Fere verò primò per vulnus exit hæc, deinde eo sanescente diuiditur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur, quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit. Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ magnæque carunculae, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricem vulnus \* tendit, extentis iacere feminibus & cruribus oportet, nisi tamen molles arenosive calculi fuerint. Sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est, & tum demum ubi iam nihil tale extrà fertur, ad cicatricem perducitur: quod si antequam vesica purgata est, orae se glutinarunt, dolorque & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel \* aduerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur, hisque effusis tum diutius \* pura vrina descendat. Tum demum quæ cicatricem inducant, imponenda sunt, \* extendique, ut supra docui, pedes quam maximè \* vincti. Quod si fistulae metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo facilius claudatur ea,



tur ea, vel certè coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est: extentisque cruribus, femina taliq̃ue inter se deliganda sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

## ENARRATIO.

**Q**UUM cancroſa ulcera antiqui maligna & difficulter curationem recipiunt, nonnunquam ſoleant nominare, inducor omnino, ut & hic Celfus noſtrum cancri nomen pro ſordido ulcere cum inflammatione accepiſſe credam; idq̃ poſſimum, quòd dicat, Is locus rubet, & tactu &c. Neque enim, ut chinis notum eſt, cancer rubet, ſed ex nigrore quopiam linet poſius. His accedit quòd neque ſtatim niſi poſt exulcerationem ſanies mali odoris eſſinet.

orto Cancro ſæpe affici ſtomachum.

**S**ICUTI per propaginem verno- rum cum ſtomacho conſortium ſortita eſt veſica; ſic & eidem iecur facillimè coaf- ſicitur: procedunt enim duo validi me- tus ab aëria ad veſicam; unde contin- git nonnunquam veſica affecta, nec hepar, nec ſtomachum omnino ſuo fungi officio.

## CAPUT XXVIII.

*Si naturalia fœminarum concubitus non admittunt,  
quomodo curari conueniat.*

**E**T hoc quidem commune eſſe maribus & fœminis po- teſt. Propriè verò quædam ad fœminas pertinent, ut in primis quòd earum naturalia nonnunquam inter ſe glutinatis oris, concubitus non admittunt. Idq̃ interdum euenit protinus in utero matris, interdum exulceratione in his par- tibus facta, & per malam curationem his oris ſaneſcendo iun- ctis. Si ex utero eſt, membrana ori vulvæ oppoſita eſt. Si ex ulcere, caro id repleuit. Oportet autem membranam duabus lineis inter ſe tranſuerſis incidere ad ſimilitudinem litteræ X, magna cura habita, ne yrinæ iter violetur. Deinde vndique eam membranam excidere: \* ac ſi caro increuit, neceſſarium \* at eſt recta linea patefacere. Tum ab ora vel voſſella vel hamo apprehenſam, tanquam habenulam excidere: & intus impli- citum in longitudinem linamentum, λημίσκον Græci vocant, in aceto tinctum demittere, ſupraque ſuccidam lanam aceto madentem deligare. Tertio die ſoluere \* vlcus, & ſicut alia \* & vlcus vlcera curare. Cumq̃ue iam ad ſanitatē tendet, plumbeam ſicut fiſtulam fiſtulam



fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eam-  
que intus dare. Supraque idem medicamentum iniicere,  
donec ad cicatricem plaga perueniat.

## ENARRATIO.

quod earum naturalia.

circa vteri osculum eadem fit obstrutio.

**A**ETIVS, si ex utero malum sit,  
irifariam id accidere docet: nam qui-  
busdam in ipsius pudendi alis, sine labiis  
membrana aut caro obstruens adnascitur;  
aliis in ipso pudendi sinu id contingit; aliis

ad similitudinem literæ X.

ÆGINETA, & Aëtius recta li-  
nea scalpello fistula accommodato commis-  
suram dissolunt.

## CAPVT XXIX.

*Qua curatione partus emortuus ex utero excutiat.*

\* concepit

**V**BI \* concepit autem aliqua, si iam propè maturus par-  
tus intus emortuus est, neque excidere per se potest,  
adhibenda curatio est, quæ numerari inter difficillimas po-  
test. Nam & summam prudentiam moderationemque de-  
siderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vulvæ  
natura mirabilis, cum in multis aliis, tum in hac re quoque  
facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resupinam  
mulierem transuerso lecto sic collocare, ut feminibus eius ipsius  
ilia comprimantur. Quo fit, ut & imus venter in conspectu  
medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur, quæ emortuo  
partu id comprimit, ex interuallo verò paulum \* dehiscere.  
Hac occasione usus medicus, vinctæ manus indicem digitum  
primùm debet inferere, atque ibi continere, donec iterum  
\* dehiscit. \* ad os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere de-  
\* os ada- \* ad os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere de-  
periat. bebit, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus  
\* facilita- manus possit. Ad cuius rei \* facultatem multum confert, &  
tem magnitudo vulvæ, & vis neruorum eius, & corporis totius  
habitus, & mentis etiam robur, cum præsertim intus non-  
\* dum in- nunquam etiam duæ manus dari debeant. Pertinet etiam  
flamma- ad rem quam calidissimum esse imum ventrem, & extrema  
tionem cæ- corporis, neque \* cum inflammatione incepisse, sed recenti re  
pisse, protinus



protinus adhiberi medicinam. Nam si corpus iam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi ægerrimè potest, sequiturque sæpe cum vomitu & cum tremore mortifera neruorum distentio. Verùm intus emortuo corpori manus iniecta protinus habitum eius sentit. Nam aut in caput aut in pedes conuersum est, aut in transuersum iacet, fere tamen sic vt vel manus eius vel pes in propinquo sit. Medici verò propositum est, vt eum manu dirigat, vel in \* caput, vel etiam in pedes, si fortè aliter compositus est: ac si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in caput, pes in pedes eum conuertet. Tum si caput proximum est, demitti debet vncus vndique læuis, acuminis breuis, qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti rectè iniicitur, deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. Nam si compresso vuluæ ore id tentatum est, non emittente eo infans abrum-pitur, & vnci acumen in ipsum os vuluæ delabitur, sequiturque neruorum distentio, & ingens periculum mortis. Igitur compressa vulua, conuiescere: hiantē, leniter trahere oportet, & per has occasiones paulatim eum educere. Trahere autem dextra manus vncum, sinistra intus posita infantem ipsum, simulque dirigere eum debet. Solet etiam euenire, vt is infans humore distendatur, exque eo profluat fœdi odoris sanies. Si quid tale est, indice digito corpus illud forandum est, vt effuso humore extenuetur. Tum id leniter per ipsas manus recipiendum est, nam vncus iniectus \* facile hebeti corpusculo eleuabitur. In quo quid periculi sit, supra posuit. Sed in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commodè educitur. Si verò transuersus est, neque dirigi potuit, vncus alæ iniiciendus, paulatimque attrahendus est. Sub quo fere ceruix replicatur, retroque caput ac reliquum corpus spectat. Remedio est, ceruix præcisa, vt separatim vtraque pars auferatur. Id vnco fit, qui priori similis in \* interiorem tantum partem per totam aciem exacuitur. Tum id agendum est, vt antè caput, deinde reliqua pars auferatur, quia fere

\* manus,

\* ene est  
corp. facile  
elabitur.\* interiore  
t. parte p.  
t. acie

r r

maiore



maiore parte extracta, caput in vacuâ vuluam prolabitur: extrahi que sine summo periculo non potest, si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo iniecto, valens homo non imperitus à sinistro latere eius debet assistere, & super imum ventrem eius duas manus imponere, altera que alteram premere. Quo fit, ut illud caput ad os vuluæ compellatur. Idq. eadem ratione quæ supra posita est, vncō extrahitur. At si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid \* protractum est, paulatim abscindendum est: & si clunes os vuluæ vrgere cœperunt, iterum retro repellendæ sunt, conquisituq. pes eius adducendus. Aliæ que etiamnum difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere vmbilicum debet, ita ne abrumpat, dextra que eum sequi vsque ad eas, quas

*\* prola-  
sum*

*Secunda.* secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit, his que vltimis apprehensis venulas membranulas que omnes eadem ratione manu diducere à vulua, totum que illud extrahere, & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in vnum feminibus, illa in conclauī collocanda est, modicum calorem sine vllō perflatu habente. Super imum ventrem eius imponenda lana succida in aceto & rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, \* adhibeatur.

*\* adhibe-  
tur.*

## ENARRATIO.

Tum si caput proximum est.

Igitur compressa vulua.

QVONIAM vncī mentionem hic facit, non fuerit inutile explicare, qui potissimum loci vncum admittant. In capite igitur, ad infigendum instrumentum idonei sunt oculi, aurium meatus, os, menti pars inferior: in thorace, axille, claviculæ, præcordia, pectus, vertebrarum articuli, ingulum: in cruribus, ossa pubis, sæmineum pudendum.

TUM enim infusionibus pinguius utendum est ex prescripto Aëtij: ad hæc infusionibus, irrigationibus & cataplasmatibus; quæ inflammatione aliquatenus sedata, & osculo dilataro sermō educatur.

Trahere autem dextra.

Æqualiter trahendum est, non solum in directum, sed & in obliquum.

De



## CAPVT XXX.

*De Ani vitiis, & eorum curatione.*

**A**N I quoque vitia vbi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in co vetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere aluum, tum spongiam calidam admouere, vt relaxentur illa, & foras prodeant. Vbi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & vlcera \*renouare, deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle, locumque eum molli lana implere, & ita vincire altero die, deincepsque ceteris lenibus medicamentis vti, quæ ad recentia eadem vitia necessaria esse aliàs proposui, & vtiq; per primos dies sorbitionibus eum sustinere, paulatim deinde cibis adicere aliquid, generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, vbi primum id apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret. Neque tamen antè properandum est: nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit, & puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medicamentis opus est.

*De condylomatum curatione.*

**A**T tubercula, quæ condylomata appellantur, vbi induruerunt, hac ratione curantur: Aluus ante omnia ducitur, tum vossella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. Quod vbi factum est, eadem sequuntur, quæ suprà post curationem adhibenda esse proposui. Tantummodo si quid increfcit, squama æris coercendum est. Ora etiam venarum fundentia sanguinem sic tolluntur: Vbi sanguini qui effluit, sanies adicitur, aluus \*acrius ducitur, quo magis \*ora \*promoucantur. Eoque fit, vt \*omnia vela, quasi capitula conspicua sint. Tum si capitulum exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum suprà est, quàm vbi cum

\* remouere,

\* acrioribus  
\* ora  
\* omnes  
venæ  
al. omnia  
venarum



\* ex aqua  
\* doleat.

ano committitur. Imponenda spongia \* aqua calida est, donec id \* libeat. Deinde aut vngue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur, interdum etiam urinae difficultas. Si id maius est, & basis latior, hamulo vno aut altero excipiendum est, paulumque supra basim incidendum, neque relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. Quod consequitur is, qui neque nimium, neque parum hamos ducit. Quam incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari: si duo triaue sunt, imum quodque primum curandum est. Si plura, non omnia simul, ne tempore eodem vndique tenerae cicatrices sint: si sanguis profluit, excipiendus est spongia, deinde linamentum imponendum. Vngenda femina & inguina, & quicquid iuxta vlcus est, ceratumque superdandum est. Farina ordeacea calida implendus is locus est: sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foueri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, ceruices ac femina liquido cerato perungenda sunt, tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. Tum lenibus medicamentis, iisdemque, quae alibi posui, vlcera ad sanitatem perduenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, iam alias superius exposui.

## ENARRATIO.

vt omnia vela.

quasi capitula conspicere, reddas. Ha-

**M**HI magis placeret lectio, si videretur  
omnia vela, in vno omnes venas, strationem.

bes autem apud Paulum lib. VI. cap. LXXIX.  
aliam, qua per chirurgiam fit, admini-

## CAPVT XXXI.

*De varicum curatione.*

**A**B his ad crura proximus transitus est, in quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum quae in capite nocent, & eorum varicum qui in ven.



in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quamvis transversa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur. Si curua est, & velut in orbem quosdam implicatur, pluresque inter se inuoluuntur, vtilius eximere est. Adurendi ratio hæc est: Cutis superinciditur, tum patefacta vena, tenui & retuso ferramento candente modicè premitur, vitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur, quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit, & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. \* At exciditur hoc modo: Cute eadem ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloque vndique à corpore vena diducitur, caueturque, ne inter hæc ipsa lædatur; ei que retusus hamulus subiicitur, \* impositoque eodem fere spatio quod supra positum est, in eadem vena idem fit: quæ quò tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Vbi iam idem, quacunque varices sunt, factum est, vno loco adducta per hamulum vena præciditur, deinde quæ proximus hamus est, attrahitur & euellitur, \* ibi rursus abscinditur. Ac sic vndique varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans iniicitur.

\* Exciden-  
di ratio  
hæc est:

\* interpo-  
sitoque

\* ibique

## CAPUT XXXII.

*Curatio digitorum coherentium.*

**A**T si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem, postea cohæserunt, scalpello diducuntur, dein separatim vterque non pingui emplastro circumdatur. Atque ita per se vterque sanescit. Si verò sit vlcus in digito, posteaque malè indurata cicatrix curuam eum reddit, primum malagma tentandum est. Dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & vbi nerui læsi sunt, euenire consuevit) videre oportet, neruine id vitium, an cutis sit. Si nerui est, attingi non debet, neque enim sanabile est: si cutis,

II 2

tota.



tota cicatrix excidenda est, quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitum non patiatur, tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

## ENARRATIO.

At si digiti.

QVVM ex altius quam quisquam  
aliis singulas chirurgie partes absol-

uerit Celsus, nescio quomodo adnatos digi-  
tos prætermiserit: siquidem sicuti coheren-  
tes digiti sectione curantur; sic & si qui ad-  
nascantur digiti, statim præcidendi sunt.

## CAPVT XXXIII.

## De Gangræna curatione.

GANGRÆNA inter ungues alasque aut inguina nasci,  
& si quando medicamenta vincuntur, membrum præ-  
cidi oportere, alio loco mihi dictum est. Sed id quoque cum  
periculo summo fit. Nam sæpe in ipso opere, vel profusione  
sanguinis, vel animæ defectione moriuntur. Verum hic quo-  
que nihil interest an satis tutum præsidium sit, quod unicum  
est. Igitur inter sanam viciatamque partem incidenda scal-  
pello caro usque ad os est: sic ut neque contra ipsum articu-  
lum id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam  
ex ægra relinquatur. Vbi ad os ventum est, reducenda ab eo  
sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte ali-  
quid \* os nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quam  
proximè sanæ carni etiam inhaerenti: ac tum frons ossis  
quam ferrula exasperauit, \* lauanda est, supraque inducenda  
cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet, ut quàm  
maximè vndique os contegat. Quod cutis inducta non fue-  
rit, id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex  
aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus,  
in quibus pus moueri \* debet, præceptum est.

\* ossis

\* lauando

\* non de-  
bet,

## ENARRATIO.

& potius ex sanâ parte.

GALVNVS mortificatam partem ita  
refecandam vult, ut nihil prorsus pu-

tridi ac cariosi super sit: periculum enim est,  
ne si quid reliqui sit, id quod sanum est  
contagione contamineat.

AVRE-



# AVRELII CORNELII CELSI

## DE RE MEDICA LIBER OCTAVVS,

A BALDVINO RONSSEO *Gandensi, medico,*  
*Enarrationibus illustratus.*

### CAPVT. I.

*De positu & figura \* totius humani corporis.*

\* osimum 10-  
lius

**S**VPEREST ea pars quæ ad ossa pertinet, quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurasque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, vtrinque lævis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillum gignente contegitur. Eaque simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in verticem à fronte est. Ossaque eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interque ea venæ discunt, quas his alimentum subministrare credibile est: raro autem calvaria solida sine suturis est. Locis tamen æstuosius facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atque à dolore tutissimum est: ex cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. Neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Ferè tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. Tertia ad aures per verticem tendens occipitium à summo capite diducit. Quarta ab eodem vertice per medium



dium caput ad frontem procedit, eaq. modò sub imo capillo  
desinit, modò frontem ipsam secans, inter supercilia, finitur.  
Ex his ceteræ quidem futuræ in vnguem committuntur. Hæ  
verò quæ super aures transversæ sunt, totis oris paulatim ex-  
tenuantur, atque ita \* inferiora ossa superioribus leniter \* insi-  
dunt. Crassissimum verò in capite os post aurem est, \* quia  
capillus, vt verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Sub his  
quoque musculis qui tempora \* connectunt, os \* medium in  
interiorem partem \* inclinatum positum est. At facies futu-  
ram habet maximam, quæ à tempore incipiens, per medios  
oculos naresq. transversa peruenit ad alterum tempus. A qua  
breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et  
malæ quoque in summa parte singulas transversas futuras ha-  
bent. A mediisq. naribus aut superiorum dentium \* gingi-  
uis per medium palatum vna procedit, aliaq. transversa idem  
palatum secat. Et futuræ quidem in plurimis hæ sunt. For-  
amina autem intra caput maxima oculorum sunt, deinde na-  
rium, tum quæ in auribus habemus. Ex his quæ oculorum  
sunt, recta simpliciaq. ad cerebrum tendunt. Narium duo  
\* hæ foramina osse medio discernuntur. Siquidem \* hæ primùm  
à superciliis angulisq. oculorum osse inchoantur ad tertiam  
fere partem: deinde in \* cartilagine versæ quo propius ori de-  
scendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. Sed ea  
foramina, quæ \* à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi  
rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaq. ex his ad fauces  
peruia spiritum & reddunt & accipiunt, alia ad cerebrum  
tendunt. In vltima parte in multa & tenuia foramina dissi-  
pantur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque  
primò rectū & simplex iter procedendo flexuosum fit, quod  
ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diduci-  
tur, per quæ facultas audiendi est: iuxta ea duo paruuli quasi  
sinus sunt, superq. eos finitur os, quod transversum à genis  
tendens ab inferioribus ossibus sustinetur, iugale appellari po-  
test, ab eadem similitudine, à qua id Græci ζυγάδες appel-  
lant. Maxilla verò est molle os, eaq. vna est, cuius eadem  
& media & etiam ima pars mentum est, à quo vtrinq. pro-  
cedit

\* infirmio-  
ra  
\* insident.  
al. incidit.  
\* quæ  
\* cōtegūt,  
\* malæ  
\* incitina-  
tam

\* maxilla

\* hæ

\* cartilagi-  
nem

\* ab imis  
ad sum-  
mas

*Iugale.*



cedit ad tempora, solaque ea mouetur. Nam mala cum toto  
 osse, quod superiores dentes \*exigit, immobiles sunt. Verum \*excipit,  
 ipsius maxillae partes extremae quasi bicornes sunt. Alter pro-  
 cessus intra latior, vertice ipso tenuatur, longiusque proce-  
 dens sub osse iugali subit, & super id temporum musculis illi-  
 gatur. Alter breuior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta fo-  
 ramina auris est, cardinis modo fit: ibique huc & illuc se in-  
 clinans maxillae \*facilitatem motus praestat. Duriore osse \*facilita-  
 dentes sunt, quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum tem  
 haeret. Ex his quaterni primi quia secant, Τετταροι à Græcis \*τετταροι  
 nominantur, hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni Canini.  
 parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere maxillares qua- Maxillares  
 terni sunt, praeterquam in his in quibus tres ultimi qui serò  
 gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radici-  
 bus, maxillares utique binis, quidam etiam ternis quaternisve  
 nituntur. Fereque longior radix breuiorem dentem edit, re-  
 cti que dentis recta etiam radix, curui flexa est: ex eadem ra-  
 dice in pueris nouus dens subit, qui multo saepius priorem ex-  
 pellit, interdum tamen supra infrave eum se ostendit. Caput  
 autem spina excipit. Ea constat ex vertebrae quatuor & vi-  
 ginti. Septem in ceruice sunt, duodecim ad costas, reliquae  
 quinque sunt proximae costis. Hae teretes breuesque ab utro-  
 que latere, processus duos exigunt: \*media perforata, qua \*medio  
 spinæ medulla cerebro commissa descendit, circa quoque  
 \*per duos processus tenuibus cauis peruiæ, per quæ à mem- \*subter  
 brana cerebri similes membranulae deducuntur. Omnesque  
 vertebrae exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis pro-  
 cessibus parum desidentes sinus habent, ab inferiore alios deor-  
 sum versus processus exigunt. Summa igitur protinus caput  
 sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo  
 fit, ut caput sursum deorsum \*versum \*tuberibus exasperetur, \*versum  
 \*insemitur secunda superiori parti \*inferiore. Quod ad circuitum per- \*mouea-  
 tinet, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior tur, & tu-  
 summae circumdata, in latera quoque caput moueri finit. ber.  
 tia eodem modo secundam excipit. Ex quo facilis ceruici  
 mobilitas est. Ac ne \*sustinere quidem caput posset, nisi \*sustineri  
 ff vtrin-



vtrunque recti valentesque nervi collum continerent, quos  
 \* *νεκστρας* Græci appellant. Siquidem horum inter omnes  
 flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non pati-  
 tur. Iamque vertebra tertia tubercula quæ inferiori infe-  
 rantur, \* *exigit.* cæteræ processibus deorsum spectantibus,  
 in inferiores insinuantur, ac per sinus quos vtrunque habent,  
 superiores accipiunt, multisque nervis & multa cartilagine  
 continentur. Ac sic vno flexu modico in \* *promptu* dato  
 cæteris negotiis homo & rectus insistit, & alioqui ad necessa-  
 ria opera curuatur. Infra cervicem verò summa costa con-  
 tra humeros sita est, inde undecim inferiores usque ad imum  
 pectus perueniunt, hæque primis partibus rotundæ & leniter  
 quasi capitulatæ, vertebrarum transuersis processibus ibi quo-  
 que paulum \* *sinuatis* insinuatis inhaerent. Inde \* *latefcit,* patefcunt, & in ex-  
 teriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilaginem dege-  
 nerant. Eaque parte rursus in interiora leniter flexæ com-  
 mittuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à fau-  
 cibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis iam  
 ipsum quoque cartilagine mollitum terminatur: sub costis  
 \* *εἰσας* verò prioribus quinque, quas \* *ὀστας* Græci nominant, bre-  
 ues tenuioresque, atque ipsæ quoque paulatim in cartilagi-  
 nem versæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt, ima-  
 que ex his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. Rursus  
 à ceruice duo lata ossa vtrunque ad scapulas tendunt, nostri  
 scoptula operta, \* *σπονδυλα* Græci nominant. Ea in summis  
 verticibus sinuata ab his triangula, paulatimque latefcientia  
 ad spinam tendunt, & quo latiora quaque parte sunt, hoc he-  
 betiora. Atque ipsa quoque in imo cartilaginosa, posteriore  
 parte velut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhae-  
 rescunt. Ibi verò validis musculis nervisque constricta sunt.  
 At à summa costa paulo interius quàm vbi ea media est, os  
 excrescit, ibi quidem tenue, procedens verò quo propius lato  
 scapularum ossi fit, eo plenius latiusque & paulatim in exte-  
 riora curuatur: quod propius altera verticis parte modicè in-  
 tumescens, sustinet iugulum. Id autem ipsum recuruum ac  
 neque inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo  
 quod

scoptula  
 operta.



quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit: paulumque motu brachij mouetur, & cum lato osse scapularum infra caput eius, neruis & \* cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit, extremis vtrunque capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilaginofus: medius teres, durus, medullifus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, interiorem & exteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit, exterior quæ ab eo recedit: quod ad omnes articulos pertinere in vltioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quàm cætera ossa, de quibus adhuc dixi, \* verticillatis scapularum \* ossibus paruo excessu inferitur, ac maiore parte ex transitu neruis deligatur. At inferius duos processus habet, inter quos quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur. Quæ res sedem brachio præstat, quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem *ῥαδις* Græci appellant, superior breuiorque, & primò tenuior, rotundo & leniter cauo capite exiguum humeri tuberculum recipit, atque ibi neruis & cartilagine continetur. Cubitus inferior longiorque, & primo plenior in summo capite, duobus quasi verticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos processus eius esse proposui, se inferit. Primò verò duobus radiis brachij ossa iuncta paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein radius in caput cartilaginofum confurgens, in verticem eius sinuatur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera paulum procedit. Ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet, plurima ossa in cartilaginem \* desinere, nullum articulum non sic finiri. neque enim aut moueri posset, nisi \* leui inniteretur; aut cum carne neruisque coniungi, nisi ea media quadam materia committeret. In manu verò prima palmæ pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia & triangula structura quadam inter se connectuntur, cum inuicem superior alterius angulus, alterius planicies sit, eoque sit ex his \* vnus ossis paulum

\* cartilagine

\* verticillatis  
\* ossibus  
inferitur,

Radius.

Cubitus.

\* desinere  
\* leui\* veluti  
vnus



\* vertice

\* superio-  
ris

Pecten.

\* subter.

Femina.

\* inferiori  
quoque  
parte\* extror-  
sus

Patella.

lum in interiora concaui species. Verum ex manu duo exigui  
processus in sinus radij coniiciuntur. Tum ex altera parte  
recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à  
quibus ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis constant,  
omniumque eadem ratio est. Interius os in \*verticem sinua-  
tur, recipitque \*exterioris exiguum tuberculum, nervique ea  
continent, à quibus orti ungues indurescunt. Ideoque non  
ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores  
quidem partes sic ordinatae sunt. Ima verò spina in coxarum  
osse desidit, quod transversum longeque valentissimum,  
vulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur, idque ab exte-  
riore parte gibbum, ad spinam resupinatum, à lateribus, id  
est, in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os,  
quod pectinem vocant, idque. \*super intestina sub pube trans-  
versum ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis  
in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. Inde femina  
oriuntur, quorum capita rotundiora etiam quam humero-  
rum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra verò  
duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein  
dura, & medullosa & ab exteriori parte gibba: rursus ab \*in-  
ferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus  
coxarum, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniiciun-  
tur, tum infra \*introrsus leniter tendunt, quo aequalius supe-  
riora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque ca-  
pita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint.  
Quae commissura, osse parvo, molli, cartilaginoso tegitur,  
patellam vocant. Haec super innatans, nec ulli ossi inhaerens,  
sed carne & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os  
tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur. Ipsum  
autem crus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia femur  
humero, crus verò brachio simile est: adeo ut habitus quo-  
que & decor alterius ex altero cognoscatur, quod ab ossibus  
incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab  
exteriore parte supra positum est, quod ipsum quoque Sura  
rectè nominatur. Id brevius, supraque tenuius ad ipsos talos  
intumescit. Alterum à priore parte positum, cui Tibiae no-  
men



men est, longius & in superiore parte plenius solum cum femoris inferiore capite committitur, sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa infra supraque coniuncta \*media, \* medio, vt in brachio dehiscunt. Excipitur autem crus infra \* ossa ex \* osse transuerso talorum, idq. ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, & procedentia ex talo recipit, & in sinum eius inseritur. Idque sine medulla durum, magisq. in posteriorem partem proiectum, teretem ibi figuram repræsentat. Cætera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Plantæ palmis, digiti digitis, ungues unguibus, respondent.

## ENARRATIO.

raro autem caluaria solida sine suturis est.

**S**UTURÆ capiti in hunc usum attributæ sunt, tum vt fuliginosi humores, &crementa, per easdem commodius expurgarentur atque transmitterentur; tum vt prohiberent ne unico ictu tota caluaria confringeretur. Quare sine externas sine internas causas spectes, soliditas cerebri, vt hic inferre videtur Celsus, capite firmitudinem nullam afferet: verum id grauissimis periculis subiicit. sicuti inueni cuidam in cuius caluaria suturarum vestigia nulla apparebant, Patauij accidisse Realdus Columbus libro primo Anatomicarum administrationum refert: qui quum grauissimo capitis dolore premeretur, atque appositissimis remediis sedando dolori videretur, non prius dolere desuit, quam vitam morte commutaret. Adde quod qui solida atque crassa caluaria sunt, stolidi, indociles, atque obliuiosi magna ex parte sint. Si quis tamen hic Celso patrocinari velit, atque inferre, caput quod pauciores suturas habeat, eò minus subiacere externis ludentibus causis; is tamen fateatur necesse est, internis afficientibus causis magis subiectum esse.

Neque enim certus.

OCTO tantum generatim sutura esse

dicuntur; quarum tres, lambdoides videlicet, sagittalis & coronalis, propria ac vera vocantur; quinque reliquæ spurie appellantur, quas rectius commissuras quam suturas dixeris; cuiusmodi sunt squamosa dñs, atque ea quam additamentum lambdoidis sutura Galenus vocat; & illa quæ a canis temporum ortum habet, eaque quæ os frontis a capitis osse discriminat.

Narium duo foramina.

HVIUS reddit Galenus libro De usu partium VIII. rationem.

Maxilla verò.

NON solum homini, sed & omnibus animantibus maxilla superior motu carer, crocodilo excepto, qui eandem mouet, inferiorēque immobilem seruat, psittacōque, qui (vti à nonnullis obseruatum est) utranque maxillam simul eodēque tempore mouet, separātēque alterutram.

Duriore osse dentes.

DURISSIMI dentes sunt, præsertim molares & canini (nam incisorij reliquis molliores sunt) ut cibis conficiendis sufficerent, neque ab his contererentur.

Ultra quos utrinque.

GALENVS & reliqui Anatomici  
ss 3. utrinque



virique quinos molares constitunt: esse tamen quandoque, quod varius est, quando quaterni tantum sint.

præterquam in his.

CELSVS hic eos dentes intelligere videtur, quos genuinos ac nouissimos vocant; vulgus, quod tardè nascantur, sapientia dentes appellat; raro siquidem ante xxviii. annum aut trigessimū proveniunt; uti etiam nonnullis, quemadmodum memorie prodit Plinius, ante sexagesimum aut octuagesimum annum non pullulascunt.

Omnesque vertebræ.

SVPEREMA tamen vertebra omnium capacissima & tenuissima est, protinusque caput ipsum sustinet, per duos sinus receptis suis processibus; aliquando quidem exactè complectitur secunda vertebra tubercula, & gibbositates vel capitis eminentias, aliquando ab illis recedit plurimum. Processum habet à superiore sui parte omnium magis obusum, & parum admodum prominentem, adeo ut hunc nullum esse dicat Galenus; à lateribus virique alium transversum, perforatum, parte antica conspicuum. Secunda vertebra angustior validiorque est, processum admodum magnum & plurimum bifidum habens à parte posteriore; duos item alios à lateribus superioris vertebra similes, sed eos multo minores tantum. Eius verò processum posteriorem, qui bifidus est, Hippocrates dentem vocat; Galenus à figura turbinata pyrenoidem; eminet enim, ac sursum spectat priori spondylo virique quibusdam vinculis alligatus, quæ ab utroque superioris vertebra latere partis interna prodeunt: ita ut valido rotundoque ligamento nixæ duæ priores vertebrae, caput in viramnis partem flectant. Hæc Carolus Stephanus, libro De diss. part. hum. corporis.

καεστὰς Græci appellant.

CÆSARIUS: Sic quidem Ludovicus Calius auctor Latinarum Lectionum dicendos esse contendit: quod & se posse probare dicit per Galenum & Apollonium in Argo-

nauticis. eosdem tamen Hermolam Barbarum τερνίτας appellandos putavit.

& à præcordiis.

HANC à gladioli similitudine ensiformem, & à clypei forma, scutiformem cartilaginem vocant.

sub costis verò.

HI C exemplaria præter rationem variare video: nam siue ῥόας siue ῥόας legeris, idem est; quum ῥόας Græci dicantur costa breviores mollioræque, quas Latini spurias, sicuti & Græci ῥόας, vocant.

Ac ne sapius dicendum sit.

GALENVS primo De usu partium libro: Quoniam, inquit, periculum erat ne motiones difficiliter fierent, & eminentia ossium extenderentur, duplex rursus auxilium in id natura molita est; primum quidem cartilagine utrumque os subiungens ac obliniens; alterum verò ipsi cartilagini humorem viscosum ac viscosum velut oleum aliquod superinfundens, per quem facile mobilis simul, & attritu continetur omnis articulatio ossis facta est.

In manu verò.

CELSVS postbrachiali seu μετακαρπία quinque ossa tribuit, contra Galenum. Nam is, & post eum Vesalius & Carolus Stephanus, quatuor tantum attribuerunt: quamquam non incongruum fuerit, si quis primum articulum pollicis cum postbrachiali numeraret. Erunt igitur summa manus ossa quatuordecim, si Celsum sequamur; si Galenum, tredecim: ita ut tria ossa pollicis, uti reliquis quoque digitis, præter sesamina dicta ossa, ascribamus.

Quæ commissura, osse paruo.

Επιγνάμνδα Græci vocant, Latini molam aut patellam nominant: est autem os rotundum, genu constituens qua parte femur tibia annectitur, eique canitanti oppositum qua à poplite per extrema femoris tubercula



*inhercula producitur, ne crus in anteriora  
aque ac in posteriora infectatur, sed ut pro-  
ius facilius efficiatur. Est autem per totam* *substantiam canernosum in modum pumicis;  
extrinsecus autem cartilagine obvoluitur:  
quo fit ut Celsus cartilaginosum dixerit.*

## CAPVT II.

*Ossa vitiata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur.*

**O**MNE autem os, vbi iniuria accessit, aut vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. Id quod vitiatum est, primò ferè pingue fit, deinde vel nigrum vel cariosum. Quæ super natis grauibz vlceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet ante omnia os nudare vlcere exciso: & si latius eius vitium est, quàm vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os vndique pateat: tum id quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, vt ex eo statu secedat: aut eradere donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integrius nota est. Nam necesse est, aridum sit id quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque læsa faciendum est. Siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquatur. Deinde si vel os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt vbi caries nigritiesve in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum vel radendum est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid, & maturius definat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albø finiri ex nigritye vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descenderit, vtrumlibet dubium est. In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramen dimittitur, quod magis minùsve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore & ex febre. Quæ vbi mediocria sunt, illa altè descendisse non potest.



\* h. a. 4. v. o.  
ces delenda.

test. Manifestior tamen adacta terebra fit. Nam finis vitij est, vbi scobis nigra esse desit. Igitur si caries altè descendit, per terebram vrgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resoluetur ab inferiore osse quodcunque vitiatum est, & is sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigricies\* est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariola est, inutilis vitio est, & excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato, diem tertium expectant, vt tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia vix etiam si rectè cessit, curatio veram sanitatem reddit.

#### ENARRATIO.

Id quod vitiatum est.

**C**ARO quum tabescit aut liquatur, glutinosa fit & pinguis; unde & ossa leniora quodammodo & pinguiora reddi contingit; sicuti libro De vulneribus ostendit Hippocrates. Nigrescit autem ob acrem inflammationis calorem. Quare non immerito in aphorismis Hippocrates, ex osse egrotante carnem liuidam malam dixit.

Oportet ante omnia.

**H**IPPOCRATES, Quum caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, & progressu temporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura: & si hanc rescueris, comperies ipsum os eleuatum ac

asperum, ac fuluum; quibusdam etiam ad cerebrum usque corrosum. Vbi in hoc modo affectum incideris, si quidem ultra corrosum fuerit, sinere optimum est, & vlcus quam celerrimè curare: si verò corrosum non fuerit, sed asperum; ad secundam usque laminam rasum expurgabis, & veluti fracturam curabis.

vbi caries nigriciesve.

**H**YEME, vt docet Hippocrates, ante decimum quartum, æstate post septimum febris accedit: & postquam hoc factum fuerit, vlcus colorem amittit, & ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflammatum est, ex ipso emoritur, ac viscosum fit.

Item



Item siue capitis.

quam subsequente capite meningophylaca  
vocari dicit, ne principem aliquam partem  
hic tamen subiicienda lamina est, afficiamus.

## CAPVT III.

*Quomodo os excidatur: & de Modiolo, & Terebra, ferramenti ad id paratis.*

**E**XCIDITVR verò os duobus modis. Si paruulum est, quod læsum est, modiolo, quem *κομίστρον* Græci vocant: Si spatiosum, terebris. Vtriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concuum teres est, imis oris ferratum, per quod medium clauus \* ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: Alterum simile ei, quo fabri vtuntur. Alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subitò latius fit, atque iterum ab alio principio paulo minus quàm æqualiter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. Et si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri finis exiguus fit, qui clauum recipiat, vt eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. Deinde is habena quasi terebra conuertitur. Estque quidam premendi modus, vt & foretur, & circumagatur, quia si \* leuiter imprimitur, parum proficit: Si grauius, non mouetur. Neque alienum est instillare paulum rosæ, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. Quod ipsum tamen si \* obtusius est, aciem ferramenti hebetat: at vbi iam iter modiolo pressum est, medius clauus educitur, & ille per se agitur. Deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur: at si latius vitium est, quàm vt illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso sine vitioso ossis atque integri, deinde alterum non ita longè, tertiumque donec totus is locus qui excidendus est, his cauis cinctus sit, atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tum excisorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus, id  
t t quod



quod inter vtrunque medium est, excidit: ac si ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiololo imprimitur. Vtro modo verò id circumductum est, idem excisorius scalper in osse corrupto planus summam quamque testam \*læsit, donec integrum os relinquatur. Vix vnquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit, maximeque vbi vitata caluaria est. Id quoque signi specillo significatur, qui depressus in id foramen, quod intra solidam sedem habet, & ob id renitens aliquid inuenit, & madens exit. Si peruium inuenit, altius descendens inter os & membranam nihil oppositum inuenit, educiturque siccus, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam ibi vt in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra detexit, siue caries, quam specillum ostendit, os transit, modiololi quidem vsus ferè superuacuuus est, quia latius pateat necesse est, quod \* iam altè processit. Terebra verò ea, quam secundo loco posui, vtendum, eaque ne nimis incaleseat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum maiore cura agendum est, cum iam aut simplex os dimidium perforatum est, aut in duplici, superius. Illud, spatium ipsum: hoc, sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis sinistra manus est, & sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda: vt quodocunque os perrumpitur, sentiamus: neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lædatur. Ex quo graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus eodem modo media saepe, sed multo circumspectius excidenda sunt, ne fortè angulus scalpri eandem membranam violet, donec fiat aditus, per quem membranæ custos immittatur, *μωρὸς σφύρα* Græci vocant. Lamina ænea est, firma, paulum resima, ab exteriori parte læuis, quæ demissa \* est, vt exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subiicitur, quod scalpro discutiendum est: ac si excipit eius angulum, vltra transire non patitur, eoque & audacius & tutius scalprum malleolo subinde medicus ferit, donec excisum vndique os eadem lamina leuetur, tolliq. sine vlla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiectum est, circumradendæ  
\* leuandæ.



\* leuandæque sunt oræ, & \* si quis scolis membranæ insedit, colligendum. Vbi superiori parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum, sed os quoque totum \* lauandum est, vt sine noxa postea cutis increſcat, quæ aspero \* osse innascens protinus non sanitatem, sed nouos dolores mouet. Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa peruenero. Si basis aliqua seruata est, super imponenda sunt medicamenta non pingua, quæ recentibus vulneribus accommodantur, supraque imponenda lana succida oleo atque aceto madens. Vbi tempus processit, ab ipso \* ore caro increſcit, eaque factum manu sinum complet. Si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ quod abscellit expellat, eaque fere quia testa tenuis & angusta est, \* squama est: id λεπίς à Græcis nominatur. Potest etiam euenire, vt ex ictu neque findatur os, neque perfringatur, sed summum \* tamen collidatur, exaspereturque. Quod vbi incidit, radi & \* lauari satis est. Hæc quamuis maximè fiunt in capite, tamen cæteris quoque ossibus communia sunt, vt ubicunque idem incidet, eodem remedio sit vtendum. Atque cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

\* leuandæ  
\* si quis  
\* ora  
\* leuandæ  
\* ossi

\* osse

\* λεπίς, id  
est, squa-  
ma à G.  
\* tantum

\* lauari

## ENARRATIO.

## Modiolus.

**V**IDVS Vidiū modiolū enim esse putat, quem Hippocrates ferram terebram nominat, cuiusque vsum in capitis tantum affectibus necessarium autumat; idque auctoritate Hippocratis: qui dum caluaria os secatur, considerari subinde ferre circinatum voluit. Galenus sub finem sexti methodi Therapeutice, *τερεβρῆδος* vocat: Aëtius modiolī vsum tamquam noxiū omnino reiecit.

## Terebrarum autem.

**Q**UONIAM quæ per terebellam sit

curationem parū tutam existimāunt veteres, vt auctor est Galenus, propterea quod dum audacius eam tractant, duram membranā quæ ossi subſternitur violant; Quidam, inquit, quo minus, vsquam aberrant, eiusmodi terebellas excogitauerūt quæ mergi non possint, quas ab argumento *επακρίσας* dicunt. Supercurrit enim paulū supra terebella acutam cuspidem circulus quidam parū extans. Sanè expedit complures id genus preparatas habere ad omnem caluariæ craſtitudinem: nam craſſiori longior terebra conuenit (voco autem ita, cuius spaciū quod inter summam est cuspidem, & circulum



culum qui extans circumcurrit, malus est) tenuiori breuior: est autē huic quoque quod iuxta est inter cuspidem, & quod circumcurrit minus. hactenus Galenus sexto Methodi. Ceterum quoniam parum iuta est curatio, ut diximus, (nam qui sic curantur, debili capite, atq. omnibus casibus obnoxio superuivunt) videndum restat in quibus admitti possit: siquidem si nec contractum, nec scissum sit os, frustra terebella admoventur. quin & si in superficie vulneratum sit, sanies verò ad cerebri membranā succingentem non peringat, inutilis erit eiusdē usus, quemadmodum etiam ubi rima in osse temporis fuerit. Verum si percussus aliquis in capite rimam in calvaria contraxerit exilem aded, ut per eam sanies exudare nequeat; tum demum eiusdē usus erit, ac tum ex Galeni sententia, curam aggrediemur. quam in hunc modum de vulneribus capitis describit Hippocrates: Si ab initio assumptam curationem, inquit, administras, non oportet os statim ad membranā perforare ac excindere; non enim conducit membranā osse denudatam esse, ad multum tempus male afflicta; sed postremum ubi madore corrumpi ac putrescere ipsam periculum est. Est & aliud periculum, si statim osse ad membranā vulnerato ipsum auferas, ne in ipso opere membranā per terebellum vulneres. Verum terebrantem oportet, ubi iam valde parum abest ut os iam sit perforatum, & os iam monetur, à terebratione desistere, & sinere ut os sua sponte discedat. Oportet autem os ipsum quod excidendum est, terebellis in circuitu perforari: cauendum tamen est ne in ossibus admodum præruptis, atque infirmis terebra utaris; periculum enim esset, ne dum circumagitur, terebella & os ad cerebri membranā urgeretur, cerebrumque comprimeret: nam si vel comprimatur vel concutiat cerebrum, ut idem auctor est libro De locis affectis, attonitus mortuus illico supervenit.

### Tunc excisforius scalper.

Is potissimum quem Græci *κυνδριοσ* vocant: de cuius, & aliorum scalpellorum usus plura apud Galenum sexto methodi Therap.

### caque ne nimis incalescat.

TREBRANTEM, inquit Hippocrates, frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calescens enim ex circumductione terebellum etiam os excalescens ac resiccans adurit, & maius os perforationem ambiens discedere facit, quam alias discessurum fuisset. Si verò etiam statim volueris usque ad membranā perforare, & postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum convenit, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam acceperis, ita ut posterior tardè ad curationem devenias, terebello exculpto statim os ad membranā perforare ac excindere oportet, & exemplo terebello, sæpius speculari, tum alias, tum per admotum specillum circumcirca per ipsius terebelli viam: nam multo citius suppuratur os, si suppuratum iam, ac transperatum perforaveris; & sæpe contingit ut non profundum os sit.

### per quem membranæ custos.

HÆC à Galeno in commentariis De officina medici, chirurgicis instrumentis annumeratur, qua etiam vititur in corporum incidendis; ut quum costam secat, eius membranā intactam relinquit. Huic non dissimile instrumentum est quod chirurgi nostri vellem dicunt, quum eo attollant os quod in totum ferè excisum est & iam labat. Verum nimis nunc quoniam Celsus noster in describendis ferramentis, chirurgicis que instrumentis sedulus admodum fuit, schemata singulorum ex Vidi Vidi commentariis petere visum fuit, atque huic capiti subiungere.

Modiolus



Ferramentum in imo terebræ semi-  
circula-  
tum.



Modiolus.




Ferramentum quod ima parte  
terebræ vnguis speciem  
repræsentat.



Ferramentum quod ab ima parte  
terebræ, quasi in pomum  
desinit striatum.



Terebra quæ per  
manubriolum  
vertitur.



Terebella  
alia aliis  
longiora.

tt 3.

Lamina



Lamina custos membranae.



Vectis, quo recentiores membranam  
tueniunt, & os attollunt.



CAPVT



## CAPVT IIII.

*De caluarie curatione.*

**I**GITUR vbica \*pertusa, protinus requirendum est, num \*percutsa, bilem is homo vomuerit, num oculi eius obcæcati sint, num obmutuerit, num per nares aurêve sanguis ei effluerit, num conciderit, num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. Atque vbi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. Si verò etiam torpor accessit, si mens non constat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est etiam cerebri membranam esse violatam, eoque in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit. Et protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit, & hoc ipso leni an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leniter. Quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. Ergo quâ plaga est, demitri specillum oportet, neque nimis tenue, neque acutum; ne cùm in quosdam sinus naturales inciderit, opinionem fracti ossis frustrâ faciat; neque nimis plenum, ne paruulæ rimulæ fallant. Vbi specillum ad os venit, \*nihil nisi lene & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utique quâ futuræ non sint, fractum os esse testatur. A futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit; more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt: Magno ingenio, multaquæ nihilominus habituro, conuenit etiam simplex veri erroris confessio, præcipueque in eo ministerio quod vtilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis antè deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria

\* si nihil  
nisi laue



inoria magni professoris, uti interponeremus effecit. Potest  
 \* quia autem futura eo nomine fallere, \* quæ æquè aspera est, ut ali-  
 quis hanc esse, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse  
 hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet, sed  
 os aperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, ut  
 supra posui, futurarum est, & potest idem, & naturaliter com-  
 missum, & ictu fissum esse, iuxta ve aliquid fissum habere.  
 Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit vehementior, quamvis  
 specillo nihil inuenitur, tamen aperire commodius est. At si  
 ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os  
 atramentum scriptorium est, deinde scalpro id \* detrahen-  
 dum. Nigritiem enim continet, si quid fissum est. Solet  
 etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit.  
 Itaque si grauiter aliquis percussus est, si mala indicia subse-  
 cuta sunt, neque ea parte qua cutis \* discussa est, rima reperi-  
 tur, non incommodum est parte altera considerare, nunquis  
 locus mollior sit, & tumeat, eumque aperire. Siquidem ibi  
 fissum os reperiretur, nec tamen magno negotio cutis sanescit,  
 etiam si frustra defecta est. Os fractum, nisi succursum est,  
 grauibz inflammationibus afficit, difficiliusque postea tra-  
 ctatur. Rarò, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem to-  
 tum integrum maneat, intus verò ex ictu vena aliqua in cere-  
 bri membrana rupta aliquid sanguinis mittat, isque ibi con-  
 cretus magnos dolores moueat, \* oculos quibus obcaeret. Sed  
 fere contra id dolor est, & eo loco cute incisa pallidum os re-  
 peritur. Ideoque id quoque os excidendum est. Quacunque  
 autem de causa curatio hæc necessaria est: si nondum satis  
 cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum  
 est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex  
 ipsa membranula, quæ sub cute caluariam cingit, super os re-  
 linquatur. Siquidem hæc scalpro terebrisve lacerata, vehe-  
 mentes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam  
 commodius est ex toto ab osse diduci. Plagam, si ex vulnere  
 est, talem necesse est habeamus qualem acceperimus. Si  
 manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus  
 \* accipit, transuersis lineis litteræ X figuram \* accipit, ut deinde à sin-  
 gulis



gulis procedentibus \* singulis cutis subsequatur. Inter quæ  
 si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus  
 est, occupandusque obiectis linamentis, & caput altius exci-  
 tandum. Neque id vitium vllum metum, nisi inter muscu-  
 los, qui tempora continent, adfert, sed ibi quoque \* nihil tu-  
 tius fit. In omni verò fisso fractove osse protinus antiquio-  
 res medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent.  
 Sed multo melius est, antè emplastra experiri, quæ caluaria  
 causa componuntur. Eorumque aliquid oportet ex aceto  
 molitum, per se super fissum fractumve os imponere, deinde  
 super id aliquanto latius quàm vulnus est, eodem medica-  
 mento illitum linteolum, & præterea succidam lanam aceto  
 tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, simili-  
 terque curare vsque ad diem quintum. A sexto die etiam va-  
 pore aquæ calidæ per spongiam fouere, \* cætera ex eadem fa-  
 cere. Quod si caruncula increfcere cœperit, & febricula aut  
 soluta erit, aut \* leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisque  
 somni accedet, in eodem medicamento erit perseverandum.  
 Procedente deinde tempore, emolliendum id emplastrum  
 adiecto cerato ex rosa factò, quo facilius carnem producat.  
 nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione sæpe rimæ  
 callo quodam implentur, estque ea ossis velut cicatrix; & la-  
 tius fracta ossa, si qua inter se non cohærebant, eodem callo  
 glutinantur, estque aliquanto melius velamentum cerebro,  
 quàm caro quæ exciso osse increfcit. Si verò sub prima cura-  
 tione febris intenditur, breuesq. somni & iidem per somnia  
 tumultuosi sunt, vlcus mader, neque alitur, & in ceruicibus  
 glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibi que super hæc fa-  
 stidium increfcit, tum demum ad manû scalpumque venien-  
 dum est. Duo verò sub ictu caluariæ periculi sunt, ne vel  
 findatur, vel \* medium desidat: si fissum est, possunt oræ esse  
 compressæ, vel quia altera super alteram excessit, vel etiam  
 quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo euenit, vt  
 humor ad membranam quidem descendat, exitum verò non  
 habeat, ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat.  
 Vbi medium desedit, eandem cerebri membranam os vrget,  
 interdum

\* alij, lin-  
 gulis: alij,  
 ligulis le-  
 gunt.

\* nihilo-  
 minus tu-  
 to fit.

\* cætera  
 ead.

\* lenior

\* media



interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis est id quod eminet, plano scalpro excidere; quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. At si ora inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spatium terebrâ foramen faciendum est, ab eoque scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem \* C. literæ, sic ut vertex eius à foramine basis ad \* rimas sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet, & ita nihil latens in eo osse concavum est, abundeque exitus datur intus \* latentibus. Ne si fractum quidem os defecit, totum excidi necesse est. Sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ calvariæ inhæret exigua parte, ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diuidendum est: deinde in eo quod defecit iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. Si in angusto noxa est, duo: si latius patet, tria: septaque eorum excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam agendus, sic ut lunatum sinum faciat, imaque pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeque ea quæ acuta membranam infestant. Si id ex facili fieri non potest, subiicienda lamina est, quam custodem eius membranæ esse proposui, & super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excidendum est: eadem lamina quicquid deorsum insedit attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut qua parte fracta ossa tamen inhærent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub \* medicamento tempore excidant, spatiumque inter hæc satis \* illi magnum ad extrahendam saniem relinquatur, plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam habiturum fuit, eo exciso. His factis, ea membrana acri aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor remanet, discutiatur. Tum idem medicamentum eodem modo, qui suprapositus est, mollium, ipsi membranæ imponendum est. Cæteraque eodem

\* medica-  
mentis  
\* illis



eodem modo facienda sunt, quæ ad linteolum illitum & lan-  
 nam succidam pertinent, collocandusque is loco in tepido, &  
 curandum quotidie vulnus; bis etiam ætate. Quodd si mem-  
 brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa  
 tepida. Si usque eò tumebit, ut super ossa quoque emineat,  
 coërcebit eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita,  
 & cum recenti vel butyro vel adipe anserino mista: cer-  
 uixque molliri debebit, liquido cerato ex irino facto. At si  
 parum pura membrana videbitur, par modus eius emplastri  
 & mellis miscendus erit, idque super infundendum, eiusque  
 continendi causa vnum aut alterum linamentum iniicien-  
 dum, & super linteolo cui emplastrum illitum sit, conte-  
 gendum. Vbi plus pura membrana est, eadem ratione adii-  
 ciendum emplastro ceratum, ut carnem producat. Quod  
 ad abstinentiam verò & primos vltioresque cibos potiones-  
 que pertinet, eadem quæ in vulneribus præcepi, seruanda  
 sunt: eò magis quò periculosius hæc pars afficitur. Quin-  
 etiam cum iam non solum sustineri, sed ali \* his quoque ap-  
 parebunt, tamen erunt vitanda quæcunque mandenda sunt,  
 item fumus, & quicquid excitat sternutamentum. Spem  
 verò certam faciunt membrana \* mobilis ac sui coloris, caro  
 increfcens rubicunda, facilis motus maxillæ atque ceruicis.  
 Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel liuida: vel  
 aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, neruorum  
 vel resolutio, vel distentio, caro liuida, maxillarum rigor, at-  
 que ceruicis. Cæteraque quæ ad somnum, cibi desiderium,  
 febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris vulne-  
 ribus, vel salutaria vel mortifera sunt: vbi bene res cedit, in-  
 cipit ab ipsa membrana: vel si os eo loco duplex est, inde quo-  
 que caro increfcere, eaque id quod inter ossa vacuum est, re-  
 plet, nonnunquam etiam super caluariam excrescit. Quod  
 si incidit, inspergenda squama æris est, ut id reprimat, cohi-  
 beatque, ea carni superdando, quæ ad cicatricem perducant.  
 Omnibusque ea locis commodè inducitur, excepta frontis  
 ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est.  
 Ibi enim vix fieri potest, ut \* per omnem ætatem sit exulce-  
 ratio,

\* hos q. ap-  
 parebit,  
 al. oportet-  
 bit,

\* mollis

\* non per



ratio, quæ linteolo medicamentum habente contegenda sit. Illa utique capite fracto seruanda sunt, ut donec iam valida cicatrix erit, soluenda vitentur, frequens balneum, maior vini modus.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES septimo Aphorismo XIII. Ex plaga in caput supor, aut delirium, malum: & Aphorismo XXI. III. Ex ossis dissectione delirium, si ad vacuum usque processerit. & Aphorismo LVI. III. Quibus cerebrum concussum fuerit ex aliqua causa, eos voce statim priuari necesse est. & sectione sexta Aphorismorum Aphorismo L. Quibus cerebrum dissectum fuerit, eis necesse est febrem, & bilis vomitum succedere. Horum rationem in commentariis reddit Galenus.

## Et protinus confiderandum est.

SECANT, inquit quinto Methodi Galenus, tela quæ acuta sunt; collidunt quæ graviora duræque; abrumpunt omnia quæ vim vehemens ictus fuerit. idem facit casus ab alto, vel graue aliquid durumque incidens.

## Quia quo mitior ictus.

NULLVM etenim capitis vulnus conremni debet; sæpe namque cutis sola ferro contusa, aut alia quavis re, si non diligenter curetur, ut si concretus sanguis non expurgetur, incrudescens vlcus non parum molestia ægro afferet, eiq; periculum minatur.

## A futuris se deceptum.

ETSI Hippocrates hominum capita atque suturas, parum inter se conuenire dicat, non tamen ob id, ut hic inferi Celsus, eundem à futuris deceptum fuisse consequens est. Habet autem libro De vulnerebus capitis sic Hippocrates: Hominum capita nihil inter se commune habent; neque sutura capitis in omnibus eodem loco consistunt: verum quisquis ex priore parte capitis prominen-

tiam habet (est autem prominentia, rotunda ossis pars eminent pra altera,) huius sutura consistunt in capite, velut T. litera Græca pingitur, brevior enim lineam ad prominentiam transversam constitutam habet; altera vero linea per medium caput, sed secundum longitudinem ad collum semper habet: qui vero ex posteriori parte capitis prominentiam habet, huius sutura etiam contrario priori modo consistunt; nam brevior linea transversa super prominentiam fertur; longior per mediam calvariæ ad frontem perpetua: At si caput utrimque à priori & posteriori parte promineat, sutura H. literæ similitudinem habent. Caput quod neutra parte prominet, suturas habet ad imaginem X. literæ.

## Solet etiam euenire.

HIPPOCRATES, Frangitur, inquit, calvaria sub vulnere alia parte quam ubi plaga est, atque id nudatum est. Ægineta id reprehendit, neque verisimile putat, vnde parte percussa eam fundi quæ contraria est. Nobis tamen Brugis Flandriæ oppido id videre contigit: siquidem quum euidam altera parte percusso os nudaretur, ac terebello saucium latus aperiretur, & neque inflammationis neque ossis fissuræ ibidem aliqua nota subesset, quarto tamen die conuulsus interit. Dissecto igitur nudatoque mortui capite, altera parte os fissum, membranæque os contegens inflammata conspiciebatur.

## Si manu facienda est.

IDEM suadet Paulus: Derafo, inquit, super vulnus capite duas lineas in xta rectos angulos mutuo se secantes quæ X. litera figuram accipiant, incidemus; harum autem alteram esse conuenit, quæ iam præcessit; deinde



inde quatuor in vertice angulos excoriantes, ut totum os quod perforabatur nudum existeret. si quidam sanguis ferretur, linamentis exposita obiectis cohibebimus, sin minus, siccis. Hippocrates de dissectionis figura nullam facit mentionem. hoc illi dixisse sufficit, quod eatenus incidi debet, quatenus opus esse videatur. Oportet autem ubi secatur diducere ab osse carnem, quae membrana, & osi iuncta est: deinde vulcus uniuersum linamentis implere, quae in posterum diem minimo labore ipsum apertum exhibeant.

### Neque id vitium.

MYSCVLII temporales, quos *negra* vocant, si violentur, distentionem faciunt, maxillaque motum impediunt. Rationem reddit Hippocrates: dicit enim, Vbi caput incidendum est, ceterae eius partes intus inciduntur: tempus & regio superior iuxta ueniam quae per tempora fertur, hic, inquam, locus scalpello attingi non debet: enim enim qui incisus fuerit, nervorum distentio prehendit, ac si tempus sinistrum inciditur, dextrum nervorum distensione occupatur; si dextrum, uerni distenduntur in sinistro. Celsus etsi metum afferre dicat, ibi tamen nihil tutius fieri dicit, quod quam sit verum, alij inducent.

### antè emplastra experiri.

CATAGMATICA aut cephalica appellabant. Aceto autem mollienda dicit, quod id neque simpliciter calidum, neque frigidum dici possit, & quod colliquans in corporibus humiditatem consumat. Hippocrati tamen haec curandi ratio suspecta videtur, ut qui vulcus capitis neque vino (quod alioqui ulceribus, si asperum sit, quia glutinat & repellit, conuenientissimum est) neque aliâ quantis re madefaciendum dicit, aut certe quamminimam, & neque cataplasmatibus neque linamentis curandum, quod uidelicet cataplasmata resoluant atque effeminent. Vlceri enim cui nullus affectus innascitur, omnia quae molliunt & maturant, aliena sunt: sub his enim diutius persenerat immundum, sordidumque & malignum

redolitur; quaeque proxima sunt putrescunt. Videtur tamen Celsus ad eum Hippocratis locum respexisse, ubi dicit: Danda uero opera est, ut vlcus quam celerrimè suppuret; hoc enim pacto quae intra sunt, inflammari non poterunt, ipsūque purum quam celerrimè efficitur; necesse est enim laceratam collisamque à telo carnem in pus versam tabescere. Atqui idem non uapore aquae calidae per spongiam fouendum dicit; verum siccandum esse vlcus: sic enim maturè admodum sanescet, & caro non humida, sed sicca producet. & neque simplex vlcus ita curat, sed confusam tantum carnem.

### Si uerò sub prima.

VERVM ubi intelligis febrem innuadere, inquit Hippocrates, vel quod aliud languenti signum superuenire, nihil cessare debes, sed os ad membranam secare, vel scalpello radere: facile autem secatur, & facile raditur.

### Duo uerò sub icu.

ID os, inquit Hippocrates, quod à suo statu recedens desidit, raro secandum est; & quae maximè desistunt & maximè praeputa sunt, minimè sectionem requirunt; quod uidelicet satis spaciū habeat (quanquam hic contrarium asserat Celsus) ad saniam educendam, & per se, & quum circa sectionem eiusmodi os ad id facta forcipe demitur: nam & demi alioqui deberet, si cerebri membranam pungeret; aut cerè attolli, si eandem comprimeret, etiamsi nulla subefferet sanies.

### Ne si fractum quidem.

GALENVS tamen os quod uolenter praeputum est, totum auferri iussit; ubi rimia longius pertineat, eam demi usque ad finem noluit.

### His factis, ea membrana.

IDEM suadet Hippocrates: celerrimè enim purgandam dicit, & siccandam; ne diutius madens hebes fiat, & atrollatur. quae quum ita accidunt, periculum est ne putrescat.



infundenda erit rosa.

O L E V M *etsi per se ulceribus inimicum sit, ut auctor est Hippocrates libro De ulceribus, rectè tamen adhibetur;*

*praesertim rosaceum, quod reprimendi & leniendi vi praeditum est, in ulceribus capitibus & membranae quae per inflammationem intumuit.*

C A P V T V.

*De narium fracturarum curatione.*

\* iniicien-  
da al. adi-  
genda

\* medio

**I**N narium verò & os & cartilago frangi solet, & quidem modò aduersa, modò à latere. Si aduersa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur: si à latere os fractum est, is locus cauus est: si cartilago, in alteram partem nares declinantur. Quicquid in cartilagine incidit, excitandum leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis vtrique compressis. Deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula cincta circumfutaque intus \* adiicienda sunt. Aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo. Aut grandis pinna, gummi vel fabrilis glutine illicita, & molli pellicula circumdata, quae desidere cartilagine non sinat. Sed si aduersa ea fracta est, aequaliter vtraque naris implenda est. Si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua nasus iacet, ab altera tenuius, id quod inferitur. Extrinsecus autem circundanda habena est mollis, \* media illita mistis inter se similia & thuris fuligine, eaque vltra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. Id enim corpori quasi gluten inhaerescit, & cum induruit, nares commodè continet. Sin quod intus inditum est laedit, sicut maximè fit, vbi interior cartilago perfracta est, excitatae nares eadem tantummodo habena continendae sunt. Deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resoluitur autem aqua calida, eaque tum is locus quotidie fouendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque vbi aduersum id ictum est, vtraque naris implenda est: vbi à latere, ea in quam os impulsus est, imponendumque ceratum, & paulo vehementius deligandum est, quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam



etiam ad tumorem increfcit. A tertio die fouendum id aqua calida eft, tantoque magis, quanto propius efle fanitati debet. Quod fi plura erunt fragmenta, nihilominus \* extrinsecus fingula in fuas fedes digitis erunt compellenda, imponendaque extrinsecus eadem habena, & super eam ceratum, neque \* vltra fascia adhibenda eft. At fi quod fragmentum vndique refolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur, voffella verò extrahetur. Finitisque inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex iis, quæ leniter reprimunt. Peius eft, vbi aut offi, aut cartilagini fractæ, cutis quoque vulnus acceffit. Id admodum rarò fit: fi incidit illa quidem, nihilominus eadem ratione in fuas fedes excitanda funt. Cui verò fuperimponendum emplaftrum aliquod ex his quæ recentibus vulneribus accommodata funt, fed infuper nullo vinculo deligandum eft.

\* intrinsecus

\* fupra

## ENARRATIO.

**H**OC alienum à vero efle contendit Paulus Aegineta: dicit enim, Narium pars ima quum fit cartilaginosa, frangi non folet, fed contundi, fima fieri & perneri.

Deinde, poft quatuordecim dies.

Id ante decimumquartum etiam diem.

intum erit: nam quum ex omnibus corporis partibus natus facillimè confirmari poffit, atque brevi tempore callo obducatur, decem etiam diebus corroboratur, fi non corruptio accedat: quæ eifi accedat, non magnopere turbari oportet, vt auctor eft Hippocrates libro De artionibus.

## CAPVT VI.

*De aurium fractarum curatione.*

**I**N aure quoque interdum fumpitur cartilago: quod fi incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum eft. Sæpe enim fuppurationem prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipfam glutinari, circa tamen carnem increfcere, folidarique eum locum. Itaque fi cum cute cartilago rupta eft, cutis vtrinque fuitur. Nunc autem de ea dico, quæ cute integra frangitur. In ea verò fi iam pus



\* primis  
temporibus

pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contrà lunata plaga excidenda est. Deinde vtendum est medicamento leniter supprime, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. Tum imponendum lintecolum cum emplastro; sic vt pingue omne vitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subiicienda est, quæ quod est inter hanc & caput compleat. Tum ea leniter deliganda est, & à tertio die vapore, vt in naribus posui, fouenda. Arque in his quoque generibus abstinentia \* primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

## ENARRATIO.

**A**GINETA aures tantum contundi, quum cartilaginosa sint, non autem frangi, existimat.

## glutinans medicamentum.

**Q**UALIA sunt quæ iraspea vocantur; sicut ad secundum ferè gradum, media ratione inter ea quæ cicatricem trahunt, & carnem regenerant; suntq; astrictionis aliquam participia. ceterum hæc post sectionem tantum adhibenda docet Hippocrates.

## In ea verò.

**A**T si ad suppurationem, inquit Hippocrates, citò deueniat, citò quidem aperire

non oportet. Multa quidem ex his quæ suppurari videntur, quandoque resorbentur; etiam si quæ cataplasma aliquod imposuit. Si quis verò aperire cogatur, celerrimè quidem sana fit, si in vltiorem partem perueniat. Illud tamen certò scire expedit, quòd mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit.

## Tum ea leniter deliganda.

**H**IPPOCRATES deligationes omnes vitandas præcipit: nam & sana auris, inquit, deligatione pressa, dolore & pulsatione, & febre afficitur; & neque laxam deligationem ita quis circumdare poterit, ut non premas.

## CAPVT VII.

## De maxilla fracta curatione, de quibusdam ad omnia ossa pertinentibus.

**A**B his ad maxillam venturus, indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sapiùs eadem dicenda sint. Omne igitur os modò rectum vt lignum in longitudinem finditur, modò frangitur transuersum, interdum obliquum: atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita, nonnunquam acuta. Quod genus pessimum est, quia neque



neque facillè committuntur, quæ nulli retuso innituntur, & carnem vulnerant, interdum neruum quoque aut muscolum. Quinetiam aliquando plura fragmenta à \* fragmento \* segmento fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto saepe fragmentum à fragmento recedit. Maxillæ verò semper aliqua parte etiam vexata, ossa inter se coherant. Igitur in primis digitis duobus vtrinque prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde si transuersa maxilla fracta est, sub quo casu ferè dens super proximum dentem \* excedit, ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes: aut si hi labant, vteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturæ superuacuum est. Cætera eadem facienda sunt. Nam linteolum duplex madens vino & oleo superiniiciendum cum eadem similia, & eadem thuris fuligine est. Deinde aut fascia, aut mollis habena \* media in longitudinem incisa, vt vtrinque \* medio mentum complectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi \* deligentur. Illud quoque ad omnia ossa perti- \* deligentur. nens dictum erit, famem primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenior, eumque qui carnem alat: per omne tempus vinum esse alienum. Deinde tertio die resolui debere, fouerique per spongiam vapore aquæ calidæ, eademque quæ primò fuerunt superdari. Idem die quinto fieri, & donec inflammatio finiatur, quæ vel octauo die, vel septimo ferè \* resoluitur. Ea sublata rursus ossa esse tractanda, vt si quod \* soluitur. fragmentum loco suo non est, reponatur. Neque id esse soluendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæque ossa conseruntur, transferint. Fere verò intra quartumdecimum & vnum & vigesimum diem sanescunt, maxilla, \* latum os malæ, iugulum, pectus, \* latus, os scapularum, costæ, spina \* intra coxarum, os tali, calx, manus, planta. \* intra \* intra Inter vigesimum & trigesimum diem crura, brachiaque. \* Inter septimum & vigesimum & quadragesimum, humeri & femina. Sed in maxilla illud quoque adiciendum est, quod humidus cibis diu assumendus est. Atque etiam cum tempus processit, in lagano,



lagano, similibusque aliis perseverandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. Item utique primis diebus habendum silentium.

## ENARRATIO.

PAVLVS Ægineta fracturarum differentias hasce ponit: Alia, inquit, fieri dicitur *εαφενδον* hoc est ad raphani speciem; alia *σχιδακονδον*, alia *εις ονυχας*, alia *αλφιστονδον*, alia *κατα αποκαπτον*, id est iuxta refractionem. *Παφενδον* igitur fractura est ossis transversim per crassitudinem facta, quæ etiam *σχιδακονδον* aut *καυλονδον* à nonnullis vocatur, ex cucumerum & caulium fractorum similitudine. *Σχιδακονδον* autem quasi assule modo, est oblonga ossis fissura: *εις ονυχας*, quasi dicas in unguem, iuxta partem aliquam est fissura, in extremo lunata; quæ etiam *καλακονδον* vocatur. *Αλφιστονδον*, ad farinæ similitudinem est appellata; estque quando os in multas partes tenues finditur, quæ & ipsa *καφενδον* à quibusdam appellatur. Refractio autem quæ *αποκαπτον* dicitur, vel etiam practio, est quum ossis pars per summitatis rupturam auferitur, ut ablata supernaret. Verum hæ fracturarum differentia ambi-

tiose nimis, atque curiosa, ut inquit Galenus, à medicis Hippocrate innieritis; iis nominibus enarrata sunt. non contenti enim fuerunt, omne os quod variè multifariamque sit fractum, explicasse. Ab huiusmodi appellationibus omnino abstinent Hippocrates. Galenus autem duas potissimum simplices fracturarum differentias, à quibus curandi indicationes sumuntur, posuit; rectam, hoc est quæ in longum protrahitur, & transversam. Celsus his obliquam addidit.

famem primum esse necessariam.

ATTENVANDVM, inquit Hippocrates, corpus ad dies decem usque, deinde renutriendum non tardè: si enim primis diebus inflammatio non accesserit, in viginti diebus maxilla corroboratur, quoniam laxa & medulla plena est. Humidum autem citum, hoc est sorbibile & tenue exhibet, quod mandere ipsis nocuum sit.

## CAPVT VIII.

## De Iuguli fracti curatione.

*\*vinctura* IUGVLVM verò si transversum fractum est, nonnunquam per se rursus rectè coit, & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. Nonnunquam verò, maximeque ubi motum est, elabitur, fereque id quod à pectore sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non mouetur, sed cum humeri motu consentit. Itaque eo subsistente, sub id humerus agitur. Rarò verò admodum in priorem partem iugulum inclinatur, adeò ut magni professores nunquam se vidisse memoriæ mandarent. Sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est.

*\*super al. subinde hum. \*posteriorémve par.*

Verum



Verùm vt dissimilis vterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. Vbi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu \* planè propellendus in posteriorem partem humerus est, & \* placidè illuc in priorem attrahendum. Vbi ad pectus conuersum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est. At si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est, sed humerus ipse attollendus. Si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lana, & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contrà cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda sunt: tunc retusa ossa committenda sunt. Si quid ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex lintecolum est, in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato, ne fascia diducatur, quæ iugulo composito circumdanda est sæpius potius, quàm valentius. Quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro verò iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram, à sinistro ad dextram. Rursusque sub ala \* sua fasciari debet. Post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus: si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. Supinusque homo collocandus, cæteraque eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. Sunt verò plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel fiuntur, vt malæ, pectus, \* latus, os scapularum, costæ, spina \* latum os costarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. Quo sanescente rimas quoque ossis, aut si quod \* ferrumen est, callus implet. Si cutis integra est, & \* foramen os læsum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quàm quiescendum, imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

\* sana fascia dari

\* latum os

\* foramen



## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES libro De articulis, Iugulum comminutum, si ex toto fractum sit, facilius curatur; sin in longitudinem, egrius: ex toto fractum dicens, quod non adheret aliqua sui parte; quod Celsus transversum fractum appellat. Atque hæc quidem contraria sunt, atque aliquis existimet: nam quod ex toto fractum est, magis in suam sedem compelli potest; ac si summa cura provideatur, quod sublimius est, magis deorsum cogetur idoneo habitu, ac debito vinculo: quamvis autem ex toto in suam sedem non collocetur, tamen ea pars quæ excedit, non valde acuta apparebit. At quibus in longitudinem frangitur, simile vitium est, atque ubi ossa diducuntur: non enim ita in suam sedem restituitur; extansque ossis extremitas aspicitur admodum acuta.

curas videre licet apud Hippocratem De articulis libro.

## Si acuta fragmenta.

**I**DEM planè suadet Ægineta: Nam si inguli, inquit, partem aliquam refractam instabilem, aut etiam pungentem percipiamus, scalpello in rectum diuisam eandem auferemus: ac reliqua scalpris excisoris, lamina quæ integra tueatur, aut alio scalpro propter firmitatem clavicula subiecto exa-  
quabimus. si quidem inflammatione careat, futuris; sin aliter, linamentis utemur: & splenis diuersis preparatis ad ossis eminentis inclinationem maiora ex eis & crassiora superaccommodabimus; si inflammatio infestet, oleo imbuta; si minus, arida.

## Si cutis integra est.

**I**D decimoquarto die, aut ad summum vicesimo complebitur.

## Sed locuples tamen.

**V**ARIAS clavicula aut inguli fra-

## CAPVT IX.

## De costarum fractarum curatione.

**P**ROPRIE tamen quædam de costa dicenda sunt, quia iuxta viscera est, grauioribusq. periculis is locus expositus est. Hæc quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rata est, lædatur: interdum sic, ut eam totam is casus pertrahat. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum rarè, nec dolor magnus est, tactu tamen is locus \* leniter indolefcit, abunde est eadem quæ suprâ scripta sunt, facere, & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab vno verò & vigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum. Cibis vberioribus est utendum, ut corpus quàm plenissimum fiat, quo melius os vestiatur, quod illo loco tenerum adhuc iniuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne  
autem

\* leniter  
al. grauiter



autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, puluis, & quicquid vel tussim vel sternutamentum mouet, \* ne spi- \* nec al. nā  
ritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammatio-  
nes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis \* ipuitur. Ergo si vires patiuntur, ab eo brachio \* exspni-  
quod super eam costam est, sanguis mittendus est. Si non tur.  
patiuntur, alius tamen sine vlllo acri ducenda est, diutiusque inedia pugnandum. Panis verò ante septimum diem non assumendus, sed vna sorbitione viuendum, imponendumque ei loco ceratum ex lino factum, cui costæ quoque resina adiecta sit, aut Polyarchi malagma, aut panaces ex vino & rosa & oleo, superque imponenda lana succida mollis, & duæ fasciæ à mediis oris, minimeque astrictæ. Multo verò magis omnia vitanda, quæ suprà posui, aded, vt ne spiritus quidem sæpius mouendus sit. Quòd si tussis infestabit, ad id potio fumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stœchade, vel ex cumino & pipere. Grauioribus verò doloribus vrgentibus, cataplasma imponi quoque conueniet vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdiu superiacebit. Noctu verò \* idem aut cera- \* item  
tum, aut malagma, aut panni, quia potest cataplasma decidere. Ergo quotidie \* quoque resoluetur, donec iam cerato \* quæque  
aut malagmate possimus esse contenti, & decem quidem diebus extenuabitur fame corpus, ab vndecimo verò ali incipiet. Ideoque etiam laxior quàm primò fascia circumligabitur, fereque ea curatio ad quadragesimum diem perueniet: \* quod si  
\* quæ si modus erit suppurationis, plus malagma quàm cera- metus  
tum ad digerendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per quæ suprà scripta sunt discuti potuerit, omnis mora vitanda erit ne os infra vitietur: sed qua parte maximè tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat, idque effundendum. Si nusquam caput se ostendit, vbi maximè pus \* subit, sic intelligimas: creta cimolia \* subest,  
totum locum illinimus, & siccari patiemur quo loco maximè

humor

xx 3



humor in ea perseveravit, ibi pus proximum erit, eaque vri debeat. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum, demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit deinctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, quae in ceteris adustis facienda sunt. Vbi purum erit vlcus, ali corpus debeat, ne tabes perniciosa futura id malum subsequatur. Nonnunquam etiam leuius ipso osse adfecto, & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam muceis similis intus coit, mollescitque contra cutis, in qua simili vitione vtendum est.

## ENARRATIO.

**O**RDINE quodam hoc caput ex Hippocrate De articulis transumptum est.

Ab vno verò & vigesimo.

**I**TA quidem & ipse Hippocrates sentit: aliis tamen non nisi post vigesimum octauum ferrumen implet.

Cibis vberioribus.

**T**YMOR enim ventris, ut auctor est Galenus, costas fulcit: quare vbi hæc rumpatur, qui magis ventricosi sunt, minus dolent; quibus gracilis venter est & contractus, dolore magis vexantur, quum costas sentiant sine fulcro suspensas. At si febris continens aut inflammatio, hominem detinet, ut postea docet, inedia vti satius est; quoniam magis leditur à cibo, quam à costis non fulcitis. At si nulla febris sit, præstat eatenus cibum sumere, ut venter in eum tumorem assurgat; ut costas sedes sit ac fulcimentum cura offensa partis compressionem.

Ergo si vires patiuntur.

**H**IPPOCRATES absque limitatione venam secare iubet, Celsus exactius non nihil locum ipsum describit, & directo lateris affectu eandem tundendam edocens.

Si non patiuntur.

**H**IPPOCRATES nullo virium habito

discrimine alui etiam si quammaximè sanguis missus sit, leui aliquo medicamento ducere iubet.

aut Polyarchi malagma.

**H**VIUS descriptionem ponit Celsus libro quinto.

Quòd si tussis infestabit.

**N**ESCIO quam appositè hic potionem ex ruta aut pipere insipientius accommodarit; ut quæ sua acrimonia, quantumvis quammaximè attenuare dicas, tussim magis ac magis exagitet.

Grauioribus verò.

**S**ORANVS quoque, ut auctor est Ægineta, si magna urgeat necessitas, puta si membrana costas cingens vehementer compungatur, cutim diuidendam docet, ac fractam costæ partem deregendam; deinde (lamina, ne tunica costas regens vulnereatur, prius subiecta) oscula quæ pungunt, ingeniose excidenda atque eicienda, ac cruentorum vulnerum modo curanda.

& decem quidem diebus.

**H**IPPOCRATES, Decem, inquit, diebus inedia vti conuenit: deinde corpus rescire, ac implere. Ad hæc dum offensus inedia vritur, arctius alligandus est; vbi pleniore victu laxius.

Si sup-



## Si suppuratio vicerit.

CELSUS brevis admodum hic est: Hippocrates suppurationis causas explicat, atque quorum ossa vitientur, edisserit.

sed quâ parte maximè.

IVXTA illud senis libro De internis affectionibus: Si pus in thoracem prorumpat, quâ tibi monstrare videatur, illic potissimum secans aut urens, primum exiguum puris emittito. Libro tamen De articulis,

(unde hæc desumpsit Celsus) non ante faciendam vulsionem dicit, quam os corruptum esse pro comperto habeamus: eâ interim animaduersione habitâ, ne ipsum vulsionem incalcescat.

Nonnunquam etiam.

MYCCVS hic facillimè os corrumpit, doloribusque locum exercet; neque alia ratione expelli potest, quam vulsionem aut incisionem.

## De spine curatione.

IN spina quoque est quod propriè notemus. Nam si id \*ex <sup>quod ex</sup> vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit, punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. Quo fit, ut homo in \*interio- <sup>\*anterio-</sup> rem partem subinde nitatur. Hæc noscendæ rei causæ sunt. <sup>rem</sup> Medicamentis verò iisdem opus est, quæ \*plurima parte <sup>\*prima</sup> huius capitis exposita sunt.

## ENARRATIO.

Medicamentis verò.

CONVENIT, inquit Ægineta, id quod refractum est, auferre, cute ex-

trinsecus incisa futurisque commissa; remedio cruentis idoneo vi.

## CAPVT X.

*De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum vel euulsorum, communibus curationibus.*

SIMILES rursus ex magna parte casus curationesq. sunt humeris & femoribus. Communia etiam quædam humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis. Siquidem ea \*minimè periculose media franguntur. Quo propior fra- <sup>\*minus</sup> ctura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est. Nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. \*Ea maximè <sup>\*Earum</sup> tolerabilis est simplex, transversa: peior, ubi fragmenta, atque <sup>ubi</sup>



\* pessima vbi obliqua: \* pessimum vbi eadem acuta. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sa-  
pius excidunt, aliudq. super aliud effertur. Idque ante omnia  
considerari debet, & sunt notæ certæ. Si suis sedibus mota,  
resima, punctioisq. sensum repræsentant, tactu inæqualia  
sunt. Si verò non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit  
\* sape vbi \* vbi loco suo non sunt, membrum id altero latere brevius  
\* depre- est, & musculi eius tument. Ergo si hoc \* depressum est, proti-  
\* hensum nus id membrum oportet extendere. Nam nerui muscu-  
liq. intenti per ossa contrahuntur, neque in suum locum  
\* intende- veniunt, nisi illos per vim aliquis \* intendit. Rursus si primis  
rit. diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & dif-  
ficile & periculose vis neruis adhibetur. Nam dissentio ner-  
uorum, vel cancer sequitur, vel certum, vt \* diutissime \* ala-  
\* mitissi- tur, pus. Itaque si antè reposita ossa non sunt, postea repo-  
me \* agatur nenda sunt. Intendere autem digitum vel aliud quoque  
pus. membrum si adhuc tenerum est, etiam vnus homo potest,  
cùm alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. Valen-  
tius membrum duobus eget, qui in diuersa contendant. Si  
firmiores nerui sunt (vt in viris robustis, maximeq. eorum  
feminibus & cruribus euenit) habenis quoq. vel linteis fasciis  
vtrinq. capita articulorum deliganda, & per plures in diuer-  
sa ducenda sunt. Vbi paulò longius quàm naturaliter esse de-  
bet, membrum vis fecit: tum demum ossa manibus in suam  
sedem compellenda sunt; indiciumq. ossis repositi est, dor-  
lor sublatus. Et membrum alteri parti æquatum inuoluen-  
dum duplicibus triplicib.ve pannis, & in vino & oleo tin-  
ctis, quos \* linteos esse commodius est. Ferè verò fasciis sex  
\* lincos opus est. Prima breuissima adhibenda, quæ circa fracturam  
ter voluta sursum versum feratur, & quasi in cochlea serpat,  
satisq. est eam ter hoc quoque modo circuire. Altera di-  
midio longiore, eaq. qua parte os eminet, ab ea si totum  
æquale est, vnde libet super fracturam debet incipere priori  
aduersa, deorsumq. tendere, atque iterum de fractura re-  
uersa in superiore parte vltra priorem fasciam desinere. Super  
has iniciendum latiore linteo ceratum est, quod eas conti-  
neat,



neat, ac si qua parte os eminet, triplex ea pannus obiciendus, eodem vino & oleo madens. Hæc tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque, sic ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore  
 \* finiant, quia satius est, sæpius circuire, quam adstringi. Si \* faciant, quidem id quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est: articulum autem quamminimè vincire opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum verò membrum in diem tertium continendum est. Eaque  
 \* iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non \* vincu- tamen laxa visa sit, secundolaxior, tertio iam penè resoluta. ra  
 Ergo tum rursus id membrum deligandum, adiciendaque prioribus quinta fascia, iterumque quinto resoluendum est, & \* sexto fasciis inuoluendum, sic ut tertia & quinta infra, \* sexta fa- ceteræ suprâ finiantur. Quotiescunq. autem soluitur mem- scia  
 brum, calida aqua fouendum est. Sed si iuxta articulum fractura est, diu instillandum vinum est, exigua parte olei adiecta, eademque omnia facienda donec \* ab eo inflammatio \* oleo soluatur, vel leuius quoque quam ex consuetudine id membrum fiat. Quod si septimus dies non dedit, certè nonus exhibet. Tum facillimè ossa tractantur. Rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. Si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. Deinde eodem modo membrum deligandum, ferulæque super accommodandæ sunt, quæ fissæ circumpositæque ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinât, ab ea latior, valentiorque ferula imponenda est. Easque omnes \* citra articulum esse \* circa oportet resimas, ne hunc lædant, nec ultra astringi, quam ut ossa contineant: & cum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod os quoque conseruet compleantur, postea lenius aqua calida fouere, quia primò digeri materiam opus est, tum euocari. Ergo  
 cerato quoque liquido id \* leniter est vngendum, perfrican- \* pleniter daque summa cutis est, laxiusque id deligandum est. Tertio quoque die soluendum sic, ut remota calida aqua, cæ-



tera eadem fiant. Tantummodo singulae fasciae quoties resolutae fuerint, subtrahantur.

### ENARRATIO.

vel cancer sequitur.

**C**ANCRI nomine pro sphacelo, hic passim abutitur.

Ferè verò fasciis sex.

**M**ODVS hic deligandi Tagaultio non placet; neque tam numerosis fasciis opus esse censet, quòd hæc in membro praefracto præter solitum iam cooperto, pruritum & dolorem (quæ duo symptomata à fractis membris diligenti studio arcenda sunt) excitare, atque eius quod iam fractura infixum est, perspirationem prohibere possint. Hippocrates duobus linteis contentus est.

Deligatum verò membrum.

**T**ERTIO die ob id ligamenta solvenda sunt, ne tensio quæpiam aut motus præter solitum contextæ particula obueniat; aut eius quod infixum est fractura perspiratus prohibeatur.

Quotiescunque autem soluitur.

**T**ANTVM aqua temperata, inquit Ægineta, superinfundere ratio est, quantum sanien discutere sufficit. Hippocrates libro De offcina medici, Quod ad aqua ca-

lorem pertinet, inquit, & copiam; calor vehementior non sit, quam ut infusa possit ferri à manu: copiam ubi relaxandum attenuandumque est, esse convenit maximam; ubi caro producenda est; aut molliendum, minimam.

diu instillandum vinum.

**S**OLIVS olei calidi suffusio suffecerit; quanquam non inutile sit vinum, præsertim ansterum.

donec duæ partes eius.

**V**ARIIS temporibus ossa coalescunt; sicuti etiam Celsus antè scripsit: nam pedis ossa, exceptis his quæ cum tibia ossibus communionem habent, atque iis quæ malè curantur (siquidem hæc non ante quadragesimum diem curationem perfectam admittunt) vicefimo die absolute restituntur. Tibia verò & brachiorum ossa, quum benè curantur, quadragesimo die restituntur. Femoris os quinquagesimo die conferuet: maxilla ossa triginta quinque diebus agglutinantur. In genere autem omnia ossa tardius corroborantur, atque ferrumen implent, si non secundum naturam posita fuerint. cuius quoque generis sunt, quæ non in eadem figura conquiescunt: nam & calli debiliores iisdem obducuntur.

### De fracti humeri curatione.

**H**ÆC communia sunt. Illa propria. Siquidem humerus fractus, non sic, ut membrum aliud intenditur, Sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore aduersus. Vna fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius qui læsus est, id sustineat. Altera ab altera parte super \*caput data, ibi \*iuncto accipit nodum. Tercia \*iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capribus eius inter se \*iunctis. Deinde ab occipitio ipsius minister, sub ea fascia quam secundo loco posui,



sui, correpto: si dexter humerus ducendus est, dextro: si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina eius qui curatur baculum tenet: medicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi, \* palmam iniicit \* dextram: si sinister, sinistram: si dexter humerus sumatur, simulque alteram fasciam minister attollit, alteram \* premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus, ut ab eo sub altera quoque ala per pectus & scapulas porrigantur. Protinus vero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic \* figurandum sit: ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerum inclinet. Brachioque suspensio, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. Per quæ fit, ut minimè moueatur, ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent, à lacerto breuiores, sed sub ala breuissimæ. Sæpius cæ resoluendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda, cubitus aqua calida fouendus, & molli cerato perfricandus, ferulæque vel omnino non imponendæ contra \* eminentia cubiti, vel aliquanto breuior-  
\* planam  
\* dextram,  
\* si sinister,  
\* dextram,  
\* si d. h. fi-  
\* nuatur,  
\* deprimie  
\* figuratū  
\* eminentiam  
\* sint.

## ENARRATIO.

Sed homo collocatur.

**R**EPOSITIONIS in proprium locum, convenientiorem multo ac faciliorem rationem edocet Hippocrates libro De fracturis. Id porro in omnibus luxationibus, fracturæ observandum est: ut quàm fieri potest maxime, in deligationibus, coaptationibus, repositionibusque ossum, eam partem figuram observemus, in qua & eger diu immotus persistere possit, & quæ maxime à dolore abest, quæque, rectissima sit. Rectissimam autem vocat Galenus, quæ venas, arterias, musculos quàm rectissimos habeat: sic angularem figuram brachio rectissimam,

ut quæ dolore maxime vacet, & quæ eidem naturalis sit, appellat.

Cum ad ferulas ventum.

**FERULÆ** usus Hippocrati septimo primum die ant nono esse debet: nostri temporis chirurgi non omnino malè, protinus easdem circumponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor ex inflammatione (si adsit) postulat: ideoque easdem adhibent, non ut astringant, verum ut adaptionis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita fulciant. Debent autem ferulæ, sicuti docet Hippocrates De officina medici, esse levis & æquales, ab ex-

yy 2

irema



irema parte resina, ab utraque parte vin-  
culo paulo breviores, crassissimaq; quā fra-  
ctura extat.

### & molli cerato.

Id molle, lane, & purum esse vult Hip-  
pocrates, hoc est ut nihil sordium, nihil pro-  
polis terreni arenosiq; ei sit immixtum Vii-

tur autem eiusmodi cerato, ut auctor est  
Galenus, in vicem perfusionis, qua perfu-  
cere quidem & id poterat; verum ceratum  
id tutius praestat; praesertim ubi semper assi-  
dere medicus non potest, ac continuo madore  
aliquo subiectas partes madefacere perfun-  
deretque.

### De brachij fracti curatione.

**A**t si brachium fractum est, in primis considerandum est,  
alterum os, an utrumque comminutum sit, non quod  
alia in eiusmodi casu curatio admouenda, sed primum, ut  
valentius extendatur, si utrunq; os fractum est: quia necesse  
est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque inten-  
dente. Deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus  
fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum  
est, plus opis in eo, quam in fasciis, ferulisque est. Deligari  
autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato.

\* est, Siquidem is maximè brachij naturalis habitus \* sit, idque in-  
uolutum mitella commodissimè excipitur, quæ latitudine  
ipsi brachio, perangustis capitibus collo iniicitur, atque ita  
commodè brachium ex ceruice suspensum est. Idque pau-  
lum supra cubiti alterius regionem pendere oportet. Quod  
si \* in  
\* fractum  
si ex summo cubito id \* factum sit, glutinare id vinciendo  
alienum est. Fit enim brachium immobile, ac si nihil aliud  
quàm dolori occursum est, idem qui fuit eius usus est.

### ENARRATIO.

**E**x cubiti ossibus, inquit Hippocrates,  
ubi non ambo fracta existant, facilior  
curatio est, si supernum os sanciatum est,  
etiamsi crassius id existat; partim quod sa-  
niam subrentum fundamento loco ipsi est;  
partim quod facilius occultari potest, nisi  
iuxta manus iuncturam sanciari contigerit.

Crassa enim est caro quæ superne innasci-  
tur; infernum verò os excarnie est, & non  
facile occultari potest, & vehementiore  
extensione opus habet. si verò hoc contritum  
non fuerit, sed alterum illud, vilius extensio  
sufficit: at si ambo fracta fuerint, fortissima  
extensione opus habent.

### De crurum femorūque fractorum curatione.

**I**n crure aequè ad rem pertinet, alterum saltem os integrum  
manere. Commune verò ei femori que est, quod ubi de-  
ligatum



ligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habet, per quæ si quis humor excesserit, descendat : & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur : & à lateribus caua, per quæ loris datis mora quidem crus femurque, vt collocatum est, \*detineatur. \*detineatur.  
Esse etiam is debet à planta, si crus fractum est, circa popliteum : si femur, vsque ad \*coxam : si iuxta superius caput femoris, sic vt ipsa quoque \*ei coxa sit. Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum reuertitur, summisque digitis postea cruris eius insisti \*, sed multa tamen femori debilitas est, vbi fortunæ negligentia quoque accessit. \*coxam, iux.  
\*in eo  
\*. Sed m. tum

## ENARRATIO.

**F**EMUR fractum in anteriorem & posteriorem partem magis promouetur; crus seu tibia in omnem partem prolabitur, quum utraque ossa fracta fuerint. Constat enim crus, sicuti & brachium, duobus ossibus, puta sura & tibia : in tres autem, quum alterum, intra, & extra, tibia quidem retrò, sura verò antèrius.

## Neque tamen ignorari.

IOANNES Tagaultius libro suo Institutionum chirurgicarum quarto, ex Hippocrate sententiam hanc non citra rationem suspectam habet. Non enim inquit, quoties femur frangitur, necessarium ipsum breuius efficitur, sed dumtaxat si statim quum fractum est, minus quam par sit à chirurgo distentum fuerit, vel tortuose distractum, & separate & distantes ossis fracti partes non rectè & ad amussim, priusquam ferrumen impleatur, coaptatæ extiterint : tunc enim & breuius femur reddetur, & crure eius partis homo claudicabit. Sic autem de hac re libro

De fracturis scripsit Hippocrates : At verò si femoris os fractum sit, extensio imprimis diligenter facienda est, ne minus quam debeat efficiatur ; amplior enim si sit, nullam offensionem affert. Verum quoque est, vt in eodem opere testatur Hippocrates, quòd quibuscumque utraque tibia vel cubiti fracta sint ossa, illa breuiora effici : quod sanè intelligendum est, nempe, vt Galenus interpretatur, nisi ante conformationem debita adhibeatur extensio, & commoda deligatione ossium coaptatio seruetur, quoad callus obducatur : tunc enim non solum in maiorem tumorem quam naturaliter illes conueniat, membrum attollitur ; verum etiam breuius propter retractos musculos efficitur. Hæc Tagaultius. Nisi igitur hac in re quisquam Celso patrocinari velit, locum hunc sic legendum existimārim : Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quoties in antiquum statum non reuertitur.

## De fracti digiti curatione.

**D**IGITVM satis est ad vnum \*furunculum post inflammationem deligari.

\*furculum al. furunculum



## ENARRATIO.

**A**GINETA articuloꝝ ossa in digitijs, quum laxa fistuloꝝque sint, contundi quidem plerumque; raro autem frangi auctor est. Idem deligatura vien-

dum docet, dum urget inflammatio: nam facile in ipsis propter laxitatem callus amplior concrescit.

*Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosque confractos pertinentes.*

**H**is propriè ad singula membra pertinentibus, rursus \*illa communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum iam increfcere callum oportet, liberalius alimentum, longa à vino abstinentia, fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio est, liberale, cum ea desit, modicum. Tum etiam longior vltioribus è liquido cerato membris, & mollis tamen vntio. Neque protinus exercendum id membrum, sed ad antiquos vsus \*reducendum est. Grauius aliquanto est, cum ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, maximeque si id musculi femoris aut humeri senserunt. Nam & inflammationes multo grauiores & promptiores cancos habent. Ac femur quidem si ossa inter se cesserunt, ferè præcidi necesse est. Humerus verò quoque in periculum venit, sed facilius \*conferuatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod iuxta ipsos articulos ictum est. Curiosius igitur agendum est, & musculus quidem per mediam plagam transuersus præcidendus. Sanguis verò, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia extenuandū, ac reliqua quidè membra lentius intendenda, & lenius in his ossa in suā sedem reponenda sunt. His verò neque intendi nervos, neque ossa tractari satis expedit. Ipsique homini permittendum est, vt sic ea collocata habeat, quemadmodum minimè lædunt. Omnibus autem his vulneribus imponendum primò linamentum est vino madens, cui rosæ paulum admodum adiectum sit: \*cetera eadem deliganda fasciis sunt aliquanto quàm vulnus latioribus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset, \*quanto facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest, \*numeris potius

\* paulatim red.

\* conferi-  
tur.

\* cæterum

\* Quando

\* numero



potius fasciarum id agendum est, ut laxæ quoque æquè con-  
 tineant. Quod in femore humeroque sic fiet, si ossa fortè  
 rectè concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus circundari  
 fascia debet, ut impositum medicamentum contineat.  
 Cætera eadem quæ suprà scripsi, facienda sunt, præterquam  
 quod neque ferulis, neque canalibus, inter quæ vulnus sane-  
 scere non potest, sed pluribus tantummodo & latioribus fa-  
 sciis opus est, ingerendumq. subinde in eas est calidum oleum  
 & vinum, magisq. in \* principio fame vtendum, vulnus ca-  
 lida aqua fouendum, frigusq. omni ratione vitandum est, &  
 transeundum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt, ma-  
 iorq. \* vulneris q. ossis  
 iorq. \* vulneris q. ossis  
 uendum nutriendumq. est. Inter quæ si quod paruulum  
 fragmentum ossis eminet, id si retusum est, in suam sedem  
 dandum: si acutum, antè acumen eius \* longius est præciden-  
 dum: si breuius, limandum, & vtrinque scalpro \* limandum,  
 tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non po-  
 test, volsella, quali fabri vtuntur, iniicienda est, rectè se ha-  
 bent capite ab ea parte qua \* sima est, ut ea parte qua gibba  
 est, eminens os in suam sedem compellat. Si id maius est,  
 membranulisq. \* cinguntur, sinere oportet \* ea sub medi-  
 camētis resolui, idq. os, vbi iam nudatum est, abscindere:  
 quod maturius scilicet faciendum est, \* prodestq. ea ratione  
 & os coire, & vulnus sanescere. Illud suo tempore, hoc prout  
 se habet. Nonnunquam etiā in magno vulnere euenit, ut  
 fragmenta quædam velut emoriantur, neque cum cæteris  
 coeant. Quod hic quoque ex modo fluentis humoris colli-  
 gitur. Quo magis necessarium est, sæpius vlcus soluere at-  
 que nutrire. Sequitur verò, ut id os per se post aliquot dies  
 excidat, \* cū tam misera antea conditio vulneris sit, tamen  
 id interdum maius \* diutiusq. facies. Sæpe enim integra  
 \* cutis osse abrumptitur, protinusq. prurigo & dolor oritur. \* Ac cū  
 Quæ soluere, si accidit, maturius oportet, & fouere aqua per  
 æstatem frigida, per hyemem egelida: deinde ceratum myr-  
 teum imponere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis  
 carnem vexat, quo à prurigine & punctionibus cognito, ape-  
 rire.



rire id melius, eosque aculeos præcidere necesse habet. Reliqua verò curatio in utroque hoc casu eadem est, quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. Cibis hîc quoque utendum est carnem producentibus: si breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm \*leuissimi generis inter ea demitti debet, sic ut capite paulum supra ulcus emineat, isque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est, cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæve similes verbenæ sint: illinendumque medicamentum quod siccet, & magis etiam hîc quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando verò ossa non conserbuerunt, \*quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est: possunt enim \*coire. Si vetustas occupauit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur. Ossa inter se manu diuidenda, ut concurrendo exasperentur, ut si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat. Magna tamen cura habita, ne nerui musculive lædantur. Tum vino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit, imponendumque id ipsum oui albo mistum. Tercio die resoluendum, fouendumque aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. Quinto die idem faciendum, ferulæque circundandæ. Cætera & antè & post eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa \*cohærere. Eoque & breuius membrum & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assidue punitiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & \*dirigi debent. id hoc modo fit: Calida aqua multa membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: & inter hæc medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo manibus ea diducit, compellitque id, quod eminet, in suam sedem: & si parum valuit, ab ea partes, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obiicit. Atque ita deligando assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nonnunquam autem rectè quidem ossa \*coeperunt, superincreuit verò nimius callus, ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum

\*leuissimi

\* quod sæpe mota sæpe soluta sunt, \* diu qui. cscendo

\* conseruere: vel coalescere. \* dirimi

\* cohærescant,



brum perfricandum est ex oleo & sale & nitro, multum aqua calida salsa fouendum, & imponendum malagma quod digeratur, alitriusque alligandum, olemusque & praeterea vomitu utendum. Per quae cum carne callus quoque extenuatur, confertque aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum pariter membrum impositum, donec id paulum erodatur, coque euocet materiam. Vbi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitae reuertendum est.

## ENARRATIO.

**T**ENVIS victus adhibendus est, dum inflammationis omnis suspicio praesentibus; abstinentiisque, ut docet Hippocrates, à pane & vino ad decem usque dies: dehinc paulatim sunt resiciendi. ac tum demum intrepide vinum crassum & stipitum concedendum est.

## Grauius aliquanto est.

**NAM** quibus haec ossa nudantur, ut auctor est Galenus, non tam osium, quam musculorum, arteriarum ac venarum magnitudine periclitantur: quibus accedit quod propinquiora sunt nervorum musculorumque iniuriis. Quare magis quoque iis periculis subiacere dicit eos Celsus, qui iuxta ipsos articulos isti sunt: cui non absimile est quod dicit Hippocrates, magis enadere eos, quilus inferior pars ossis quam quibus superior excescit. Celsus hic suo more Hippocratis sententiam nonnihil immutavit; & neque repositionis, neque aliorum meminit: nam Hippocrates, At quilus, inquit, femoris aut brachij os, extra emineat, hi non valde superstities euadunt; sunt enim ossa haec grandia, & medulla plena; & quae simul vulnerantur, multa sunt & magni momenti, & musculi & nervi, & vena: & si quidem reposueris, convulsiones accedere solent; si vero non reposita fuerint, febres acutae & biliosae, & singultuosae oboriantur; & denigrantur. Non minus autem superstities euadunt hi quibus reposita non sunt, neque tentatum est, ut reponeretur. Celsus hic suo more cancerum pro nigritie reddit.

## Humerus vero.

**HIC** utendum fuisse videtur, legendumque sed facilius curatur.

## Omnibus autem his.

**BENE** admodum parum olei admiscendum monet: neque enim ossis fractura, si iisdem carnis vultus decedat, ceratum aut rosatum admittunt, quod haec vltus tunc sordidum, tum putre efficiant; sed in eorum locum puluillus oblonges vino austero nigro imbutos superintincimus.

## Cetera eadem quae supra.

**FERVILAS** vetat, ne comprimant: Hippocrates tamen easdem nonnunquam admittit: dicit enim, Reliqua curatio esse debet, perinde ac si ossa citra plagam perfringantur, nisi quod ferule non sint imponenda. quam obrem hic plures fasciis epus est, quam alibi, quum & minus consistendum sit, & ferula tardius circumdanda: tamen si ferula superaccommodentur, è regione ulceris circumponantur; detur opera ut laxiores sint, ne vehementer astringantur.

## Frigusque omni ratione.

**PERICVLUM** enim est ne cum felre gravis horror subsequatur, neque nervorum dissentio superueniat: nam frigida semper nervorum disentionem afferunt; praeterquam in ulceribus.

ZZ

Inter



## Inter quæ si quod.

HIPPOCRATES libro De fracturis: Os præcidendum est, si restitui nequit, & parum quid excedere videatur: abscindere hoc licet, si noxium sit, & carnem aliqua ex parte vulneret ac molestiam afferat, nudatūque sit, hoc quoque abscindendum est. Reliqua verò non multum refert præcidantur nec ne: ea verò præcidi non oportet, ex quibus squama resolvenda est.

## vbi iam nudatum.

NAM quæcumque ossa in suam sedem reuerti non potuerunt, hæc scire licet abscessura esse; non etiam quæ ex toto carne iam nudata sunt: nudatur autem carne quibusdam superior, plerisque verò emortitur caro quæ circa fracturam est.

## Nonnunquam etiam.

VBI copiosius quàm pro ulcere modopius feratur (dicit Galenus) verendum est ne subiectum os vitiatum sit: si præter id ad exitum festinet, iam certa res est. Propter humoris igitur abundantiam hic frequentius deligandum ac resolvendum mones Hippocrates.

## Quæ solvere.

SATIVS tamen fuerit aqua temperata suffusione vii.

## Si vetustas occupavit.

LOCVS admodum est obscurus: id ta-

men innuere videtur Celsus, quòd si fortè debito tempore ossa in suo callo non obsumentur, propter mucosam quandam pinguedinem iisdem adhaerentem, tum demum ita extendenda esse ut ledantur, manūque diducenda: sic ut si quid ex osse corruptum sit (diximus namque mucosam illum osis corruptionem præfigere) extripetur. Quamquam & ipsa constabit sententia, si de ea fractura intelligatur locus, quæ nondum rectam repositionem admisit; verum per patientis negligentiam simile quid poro confractis ossibus accideret.

## Ob quam causam.

ID tamen faciendum est, antequam profus induruerit callus: nam alioqui difficilior erit curatio, neque tam facile soluetur, laborantēque in extremos labores atque pericula adducet.

## Nonnunquam autem.

NON solum intumesceat locus, sed & dolorem nonnunquam inuehit, atque functiones impedit, si iuxta articulum coaluerit.

## malagma quod digerat.

ID enim Galeno auctore iam factos callos imminuit: Aegineta si recens adhuc callus est, restringentibus medicamentis vitatur, in quem usum laminam plumbi exhibet.

## CAPVT XI.

## De luxatis ossibus.

Ac de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modò quæ iuncta sunt inter se dehiscunt, ut cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura, interdum à saltu, calcis os à talo, quod rarò tamen fit. Modò articuli suis sedibus excidunt. Antè de prioribus dicam. Quorum vbi aliquid incidit, protinus is locus cauus est, depressusque digitus sinum inuenit. Deinde  
gravis.



grauis inflammatio oritur, atque in talis præcipua. Siquidem  
 febres quoque & caneros & neruorum vel distentiones vel  
 rigores, qui caput scapulis annectunt, mouere consuevit.  
 Quorum vitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in  
 \* ossibus mollibus læsis: ubi aliquid incidit, protinus his locis \* ossum  
 proposita sunt, ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam molibus  
 diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur, & ut ali- \* hæc ossa  
 quid decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. Maxilla verò  
 & \* vertebra omnesque articuli cum validis neruis compre- \* vertebræ  
 hendantur, excidunt: aut vi expulsi, aut aliquo casu neruis  
 vel ruptis vel infirmis: faciliusque in pueris & adolescentu-  
 lis, quam in robustioribus: hi que elabuntur in priorem & in  
 exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis.  
 Suntque quædam communia omnium signa, quædam pro-  
 pria sunt cuiusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in  
 qua os prorumpit: ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem  
 in omnibus deprehenduntur, alia \* verò si in singulis. \* verò in  
 Quæ simul atque de quoque dicam, proponenda erunt. Sed  
 ut excidere omnes \* articuli non possunt, sic non omnes repo- \* articuli  
 nuntur. Caput enim nonnunquam compellitur, neque in poss.  
 spina vertebra, neque ea maxilla quæ utraque parte prolapsa  
 antequam reponeretur, inflammationem mouit. Rursum  
 qui neruorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas se-  
 des iterum excidunt. At quibus in pueritia exciderunt, ne-  
 que reposita sunt, minus quam ceteri crescunt. Omnium-  
 que, quæ loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisque in  
 proximo membro, quam in vltiore. Ut puta si humerus  
 loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio: maior  
 in hoc, quam in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus  
 qui inciderunt, aut maior aut minor usus eius membri relin-  
 quitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenua-  
 tur. Quicquid autem loco suo morum est, ante inflamma-  
 tionem reponendum est. Si illa occupauit, \* tum conquies-  
 cat, lacescendum non est: ubi finita est, tentandum est in his \* dum c.  
 membris, quæ id patiuntur. Multum autem eò confert & tunc lac.  
 corporis & neruorum habitus. Nam si corpus tenue, si humi- est:  
 dum



dum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. Sed & primò faciliùs excidit, & postea minùs fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, meliùs continent. Sed id quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. A cibo, si valentioris articuli casus est, triduo: interdum etiam quinque diebus abstinere debet. Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curiosiusque hæc facere his osibus motis, quæ validis plenisque musculis continentur: si verò etiam febris accessit, multo magis: \*deinde ex die quinto fouere aqua calida, remotaque lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infriktionem ei membro adhibere, cibis vti bonis, vti vino modicè, iamque ad vsus quoque suos id membrum promouere: quia motus vt in dolore pestifer, sic aliàs saluberri- mus corpori est. Hæc communia sunt, nunc de singulis dicam.

\*deinde  
dieq. fo. ex  
aq.

#### ENARRATIO.

**L**UXATA in suam sedem tribus generalibus modis collocantur, vt auctor est Oribasius: vnus vocatur palæstricus, ad quem ferè solas manus adhibemus: atque hic vtpote imbecillis aptatur ad mollia corpora, qualia sunt puerilia, & muliebria. Alter methodicus dicitur, ad quem instrumenta adhibemus, quorum vsus in communi vita est: & hic omnibus idoneus est, pueris, mulieribus, masculis iam robustioribus & corpori inuenili, atque iis luxatis, quæ iam vetusta sunt. Tertius reponendi modus qui per organa est, maior habet momentum; valet enim ad prolapsa vbi malum diutius trahitur; valet ad corpora athletarum: præterea quæcunque prolapsa curationem non accipiunt, & sub methodico modo curari nequeunt, omnia organorum opera restituntur. Est autem luxatio, sicut docet Paulus, quum articulus à proprio sinu ad insolitum excidit, in qua motus arbitrius impeditur. Hippocrates in luxatis multa perpendenda monet: Si quidem nosse oportet, inquit, quod

natura à naturis multum differant; ad hoc vt elabentia faciliè rursus incidunt: differt enim acerabulum ab acerabulo, quum aliud faciliè transcendendi possit, aliud minùs. Plurimum item differt nervorum ligamentum, quum in quibusdam remissum sit, in quibusdam intentum: nam humiditas hominibus sit ex articulis propter nervorum connectionem, si laxa fuerit & intensiones faciliè ferat: multos enim videas qui adeo humidi sunt, vt quando velint, articuli ipsis citrà dolorem excidant, & absque dolore restituantur. Differt etiam habitus quidam corporis: nam his quibus bene se habet membrum, & minùs excidit, & difficilius incidit.

#### Mouetur autem ea.

**S**ic post Hippocratem Paulus Aegineta, alias luxationis differentias esse negauit, quàm quæ ex maioris minorisque ratione sumuntur. Nam quum in totum articulus exciderit, igitur hæc: quum autem aliqua-



aliquatenus emoritur est, aut usque ad inberculum è sinu elapsus, *παραρριζωμενα* aut *παραρριζωμενα* appellatur. Recentiores, si quas alias luxationum differentias commentii sunt, improprie luxationes appellant, quum potius affectus luxationibus coniuñcti dicendi sint.

### Caput enim nonnumquam.

Id quantumvis fieri possit, rarum tamen est: nam si in partem posteriorem probatur, aut exciderit caput, numquam in suos sinus compellitur, sed inenitabilem mortem affert: idem de spina vertebri/que in totum luxatis, & maxilla quæ inflammationi iam obnoxia est, censendum est.

### Quicquid autem loco suo.

Locum hunc ita restituit Ioannes Tagaultius Institutionum chirurgicarum libro v. Quicquid autem suo loco motum est, ante inflammationem reponendum est; sin illa iam occupa-

uit, dum cõquiescat, haudquaquam laceßendum est; ubi finita est, tentandum in his membris quæ id patiuntur. Leonartus Fuchsius libro octavo Methodi curatiuæ sic legere maluit: Si verò illa occupauit, tum conquiescat; haudquaquam enim laceßendum est, &c.

### Multum autem eo.

CELSVS improprie nervos pro tendonibus aut ligamentiis usurpat; sicuti passim hoc libro cancri nomine, pro sphacelo aut gangrana abutiuntur.

### Oportet autem.

INFLAMMATIONEM magis compesceris, doloremque lenieris, si hydreleum cum acetii momento lana succida imponas.

### deinde ex die quinto.

FOTVS enim aquæ calidæ geminatione prodest: nam dolorem, si quis adsit, demulcet, & quod in particula laborante noxium conceptum est, elicit.

## CAPVT XII.

### De maxilla luxatæ curatione.

MAXILLA in priorem partem propellitur, sed modò altera parte, modò vtraque. Si altera in contrariam partem ipsa, mentumque inclinatur, dentes paribus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si vtraque, totum mentum in exteriorem partem promouetur, inferioresque dentes longius quàm superiores excedunt, intentique super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic vt minister à posteriore parte caput eius contineat: vel sic, vt iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro: eoque caput eiusque per ministrum vrgeatur, quo sit immobilius. Tum medici digiti pollices linteolis vel fascijs, ne dilabantur, inuoluti in os eius coniiciendi: cæteri extrinsecus ad mouendi sunt. Vbi

zz 3

vehe-



vehementer maxilla apprehensa est, si vna parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic ut omnia penè vno momento fiant. \* Si in vtrâque parte prolapsa est, eadem omnia facienda, sed aequaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus verò, quorum ossa mota sunt, primò liquidioribus conueniat, tum his præcipuè, ad eò ut sermo quoque frequenti motu oris\* per nervos lædat.

\* Sin ab  
vir.

\* nervos  
perlædat.

## E N A R R A T I O.

Primo quoque tempore.

**I**PERICVLVM enim esset in mora: Si quidem, ut auctor est Hippocrates, si non repenatur, anima periculum imminet, præsebitus continuus, & torpido sopore. Somniferi enim hi muscoli sunt, & dum algerantur, & dum intenduntur præter naturam.

quo sit immobilis.

**C**ÆSARIUS in suis Annotationibus mobilis legi posse existimat: ego cerè, si immobilis legatur, sententiam rectius constare existimo: nam quantumvis Hippocrates maxillam in vtramvis partem esse velit mobilem, & quæ huc & illuc manu deduci possit, idem tamen præcipit, ut caput florido puluillo subiciatur, ut quam minime cedat.

vno momento fiant.

**P**RIVSQVAM videlicet musculi distenti ob consortium cerebrum coassant: habent enim hi musculi nervos ab ipso cerebro, ac prope ipsum contingunt; quo fit ut celerrimè coassentur: quare & nisi reueri queat maxilla, moris periculum imminere docet Hippocrates.

Si in vtrâque parte.

**S**ATIS est concutere, mentumque adducere deorsum, ut docet Galenus, ut processus extremitas rostro similis, in tali osi inferius collocetur; sicq; in anteriorem partem vtrinque totam maxillam compellere, simulque præcipere homini ut os claudat.

ex brachio sanguis.

**V**T fluxionem à laborante particula auertamus.

## CAPVT XIII.

De capite luxato.

**C**APVT duobus processibus in duos sinus summæ vertebræ demissis, super cervicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excedunt, quo fit, ut nervus sub occipitio extendatur, mentum pectori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. Quibus celerrimè

mors



mors superuenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quò curatio eius rei vlla sit, sed vt res indicijs cognosceretur; & non putarent, sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

## CAPVT XIII.

*De spina luxata.*

**I**DEM casus manet eos, quorum in spina vertebræ exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi \* ex medulla, quæ per \* & medium, & duabus membranulis, quæ per duos à lateribus processus feruntur, & neruis, qui continent, ruptis. Excident autem & in posteriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, & infra. \* Si in vtranque partem exciderint, \* sed in v-  
à posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum transuers part.  
id incidit, manus resoluuntur, vomitus aut distentio neruorum insequitur, spiritus difficulter mouetur, dolor vrget, & aures obtusæ sunt. Si sub septo, femina resoluuntur, vrina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus, vt tardiùs quàm ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nam quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem partem prolapsa, pronum hominem collocandum esse, & extendendum, tum calce aliquem super ipsum debere consistere, \* id intus impellere: in his accipien- \* idque-  
dum est, quæ paulum excesserunt, non in his, quæ toto loco motæ sunt. Nonnunquam enim neruorum imbecillitas efficit, vt quamuis non exciderit vertebra, paulum tamen in priorem partem promineat. Id non iugulat, sed ab interiore parte non contingit quidem \* posse: ab exteriore si \* propul- \* redire  
sum est, plerumque iterum redit: nisi, quod admodum rarum \* quid  
est, vis neruis restituta est. prop.

## ENARRATIO.

Idem casus manet:

**V**ERTEBRÆ spinæ, vt ait Paulus, si ex toto prolabantur procidentq; præcipitem mortem afferunt; medulla siquidem

ipsius spinæ, vel quamlibet compressionem non sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si contundatur, hominem in periculum perducere possit.

Exci-



## Excidunt autem.

GALENVS tria vitia in spina, quum vertebra loco moventur, incidere dicit. nam quando in posteriorem partem convertitur,  $\chi\epsilon\phi\omega\sigma\tau\iota$ , quum in priorem,  $\lambda\epsilon\rho\delta\omega\sigma\tau\iota$ . & quoties in latus inclinat,  $\sigma\kappa\omicron\lambda\iota\omega\sigma\tau\iota$  appellat; & extra hac quatuor vitium in spina incidere dicit, quod  $\sigma\tau\epsilon\iota\varsigma$  vocatur; ubi videlicet vertebra loco manent, sed earum compago loco moventur.

Si in vtranque.

Vtramuis legendum videtur.

## Ex eiusmodi casibus.

NERVI omnes qui à spina medulla oriuntur, in anteriorem partem procedunt. Premuntur ergo magis ubi spina in hanc partem convertitur, ut docet Galenus, quam ubi in posteriorem, cumq; iis videntur partes, quaecunque spina superinsident: quo fit ut interdum quoque superior vesica pars comprimatur, & quae cum his consortia habent omnia inflammatione occupentur; unde periculum mortis subitaneae imminet.

## CAPVT XV.

## De humero luxato.

\* ei victus  
\* al. eiectus  
\* rursusq.

HUMERVS autem modò in alam excidit: modò in partem priorem. Si in alam delapsus est, \* & victus cubitus recedit ab latere, \* rursus iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter, difficiliusque in priorem partem quam in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certè & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lari scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum sub ala eius cogere, simulque & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. At si vastius corpus nervi robusteiores sunt, necessaria est \* spathula lignea, & quae crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos peruenit. In qua summa capitulum est rotundum, & leniter cauum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt inter se spatio distantibus, inque ea lora mollia coniunguntur. Ea-que spatha fascia involuta, quo minus tactu laedat, ad alam à brachio dirigitur, sic ut caput eius summæ alae subijciatur: Deinde, loris suis ad brachium deligatur, vno loco paulum

infra



infra humeri caput, altero paulū supra cubitū, tertio supra manum. Cui rei protinus interualla tunc quoq. foraminū aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traicitur, ita altè, vt consistere homo ipse non possit, simulq. in alteram partem corpus demittitur, in alterā brachium intenditur. Eoque fit vt capite ligni caput humeri impulsū, in suam sedem, modò cum sono, modò sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est, vno Hippocrate lecto, sed non alia magis vsu comprobata est. At si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est, fasciaque aut habena media ala circumdanda est, capitaque eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumque, vt ille habenam, hic brachium extendat. Deinde, medicus caput quidem \* hominis sinistra debet repellere, dextra verò cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere, faciliusque id in hoc casu, quàm in priore reuertitur. Reposito humero, lana alæ subijcienda est. Si in interiore parte os fuit, vt ei opponatur. Si in priore parte, vt tamen commodiùs deligetur. Tum fascia primū sub ala obuoluta, caput eius debet comprehendere, deinde \* profectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque \* profecta ad eiusdem humeri caput tendere. Sæpiusque ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vincit hac ratione humerus commodiùs continetur\*. Si adductus ad latus fit, ad id quoque fascia deligatur.

\* humeri

\* profecta

\*, qui add. quoque ad latus, ad id fasc. del.

## ENARRATIO.

**H**IPPOCRATES vno tantū modo humeri articulum luxari auctor est; atque adeò decipi medicos qui in anteriorem quoque partem luxari contendunt. eius autem verba initio de luxatis sic habent: Humeri verò articulum vno modo luxari noni ad locum sub aliis; sursum autem nunquam, neque ad exteriorem partem. Non tamen affirmaverim an luxetur an non, etiamsi habeam quod de ipso dicam. Sed neque in anteriorem partem umquam vidi, neque videtur mihi umquam excidisse: me-

dis tamen videtur valde in anteriorem partem luxari; & maximè decipiuntur in his, quorum carnes tabes circa articulum, & brachium occupant: apparet enim in talibus caput brachij omnino in anteriorem partem eminens. Galenus (vbi etiam Celsus) in alias etiam partes excidere testatur; idq. quinquies se vidiſſe affirmat, quater Roma, semel in Asia. Aegineta autem inquit, Brachij caput, scapularum sinui insertum excidit quidem frequenter; verum neque in superiorem partem (vt quod scapu-

larum

AAa



larum processus anchora similis impediatur neque in posteriorem, propter ipsas scapulas; neque in anteriorem, ob musculus bicipitis tendinem ipsiusque humeri tuberculum: sed raro quidem in interiorem, exteriorémque prolabitur: continuè verò, præsertim macilentioribus, ad ima, atque his sanè facile excidit, & rursus inferitur: multa autem carne præditis contrà, raro quidem elabitur, sed egrè in suam sedem compellitur.

simæ item sunt in utramque partem adanationem facientes delibrationes, & adhæc ossi brachij secura. Recentes itaque luxationes citius incidunt quàm quis putare possit, & priusquam extensa esse videantur. Sed & veteres sola hac repositis reponere potest, si non iam ob vetustatem quidem caro in acetabulum devenit: caput autem brachij in loco ad quem declinavit, semitam sibi ipsi ianu fecit. Hactenus Hippocrates.

### At si vastius corpus.

REPOSITIONIS modum hunc inter reliquos commendat Hippocrates; iustissimè enim commotionem facit, si solum penitus intus ad brachij caput lignum fuerit: iustis-

### Reposito humero, lana.

SI quidem inflammationem non sentiat pars affecta, mediocris pila ex lanâ (id enim per lanam intelligit Celsus) sicca; sin iam inflammata sit, eadem oleo madens subicitur.

## CAPUT XVI.

### De cubiti luxati curatione.

IN cubito autem tria coire ossa, humeri, & radii, & cubiti ipsius, ex his quæ prima parte huius voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui innexus humero est, ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes verò quatuor partes excidere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extensum brachium est, neque recurvatur. Si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, breviusque altero est. Interdum febrem vomitumque bilis movet. Si in exteriorémve brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recurvatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. Neque in cubito tantum est, sed in omnibus quoque membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur. Vtrunque membrum in diuersas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte, in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc illucve sederunt. Ac modò manibus solis utendum est, modò quædam alia adhibenda. Ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus

\* distrahitur.

\* posteriorem  
\* priorem

\* se dede-  
runt. al. ce-  
ciderunt.



manus, interdum etiam habenis iniectis satis est. Deinde rotundum aliquid à lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ fracto \* cubito suprâ posita est, & tum ossa reponere. \* humero  
Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius \* tan- \* tamen  
tùm & sæpius id resoluendum est, multoque magis aqua calida fouendum, \* diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. \* & diut.  
In cubito enim celerius, quàm in vlllo alio articulo, siue extrâ remansit, siue intus reuertit, callus circumdatur, isque si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

## ENARRATIO.

**Q**UANTO gibberi cubiti articulus magis varius est humero, ut ait Ægineta, tanto plus negotij exhibet; & tardius quidem excidit, sed difficilius reponitur, propter tuberculorum sinuumque frequentiam. Dilabitur autem in omnem partem; præcipue tamen in priorem, & posteriorem.

## Interdum febrem.

HIPPOCRATES libro De articulis: Re-  
trudescit maximè cubiti gibbus, febrilis, doloribus, nausea, & vomitu meraca bilis: præsertim si retrorsum luxatus fuerit, ob torporem; deinde in anteriorem partem.

## Si in exteriorem.

ID nullam prorsus curationem recipere testatur Paulus Ægineta: Hac enim, in-

quit, luxatio omnium quæ in cubiti gibbero sunt, maximè dolorifica est, & periculosa.

## Extendendi tamen alia.

EA ex Hippocratis De fracturis libro, & Oribasio De machinamentis petenda sunt. Caterum in cubiti repositione considerandum est, an videlicet protinus in ipso principio accersitus sit, & num ante aut febris, aut inflammatio apprehenderit: nam si horum alterutrum apprehenderit, tantisper quiescendum est, dum inflammatio aut febris remiserit: adhibita enim vi, ut docet Hippocrates, hominem perimeret; & quum nullus articulus dum febris urget, in suam sedem compellendus sit, minimè omnium cubitus.

## CAPVT XVII.

## De manu luxata.

**M**ANVS quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. Reponi non difficilimè potest. Super durum locum & renitentem ex altera parte intendi

AAa 2 manus,



manus, ex altera brachium debet, sic ut prona sit: si in posteriore partem os excidit, supina: si in priorem, si in anteriorem exteriorēve, in latus. Vbi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, \* brachium in contrarium repellendum est. At his, quæ in priorem posterioremve partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid, idque supra prominens os manu urgendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit.

\* ut &  
brach. in  
c. repel-  
lenda est.

## ENARRATIO.

**M**ANVS in quatuor prolabitur aut intro luxari auctor est. Manus autem art-  
monetur partes; anteriorem videlicet, ticulum aut intro, idq; maximè, aut extrà  
exteriorem, posteriorem & anteriorem. Hip- tantum prolabi contendit; sicuti sequenti  
pocrates totam quidem manum aut intro, quoque capite Celsus de palma scribit.  
aut extrà, aut hac aut illac, maximè verò

## CAPVT XVIII.

*De Palma.*

**I**N palma quoque ossa interdum suis sedibus promouentur, modò in priorem partem, modò in posteriorem. In latus enim moueri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea, in quam os venit: sinus ab ea, à qua recessit. Sed sine intentione  
\*, digito \* digitorum, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

## CAPVT XIX.

*De digitis.*

**A**T in digitis totidem ferè casus, eademque signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æquè vi opus est, cum & articuli breuiiores, & nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt, tum iam palma compelli, atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

## CAPVT



## CAPVT XX.

*De Femore.*

**C**UM de his dixerim, de his quoque quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse. Siquidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori & humerò, & tibiæ & cubito, pedi & manui. Quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde in exteriorem, raro admodum in priorem aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero & \* vastius est: extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, breuius \* rarumque fit, & intus inclinatur, calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu fert, minusque baculo eget. Si in priorem crus \* extensum est, implicarique non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorem partem inclinatur, dolorque in hoc casu præcipue est, & maximè vrina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit, commodè ingrediuntur, totusque eorum \* pes est. Sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusque est, ubi \* constitit, calx quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam iterum semper excidere contendunt, sed Hippocrates & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, \* Andreas Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est, sic illud verum est. Cum ibi valentissimi nerui, musculique sint, si suum robur habent, vix admittere; si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. Si validius, melius adducent, qui

\* valgium

\* varumq.

\* plicari  
nō potest,  
extensum-  
que alteri

\* pes etiam  
feder. Sed  
si

\* constitit,  
al. infistit,

\* Andreas,  
Nil.

A A a 3 eadem



eadem habenas ad valida bacula deligarint: tumque eorum  
 fustium imas partes oppositæ moræ obiecerint, superioresque  
 ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intendi-  
 tur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes  
 sunt, ad quos habenæ illæ deligantur, qui ut in torcularibus  
 conuersi, rumpere quoque, si quis perseverauerit, non so-  
 lum extendere nervos \* & musculos possunt. Collocandus  
 autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus,  
 aut in latus: sic ut semper ea pars superior sit, in quam os pro-  
 lapsum est: ea etiam inferior, à qua recessit. Nervis extentis  
 \* in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponen-  
 dum, subitoque super id genu adducendum est eodem mo-  
 do, eademque de causa, qua idem in brachio fit, protinusque  
 \* plicari si complicari femur potest, intus est. In cæteris verò casibus,  
 ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet  
 id quod eminet, retrò cogere, minister contra inde coxam  
 \* Reposito propellere. \* Posito osse, nihil aliud novi curatio requirit,  
 quam ut diutius is in lecto detineatur, ne si motum adhuc  
 nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

## ENARRATIO.

## Si in interiorem.

**N**ON solum longius apparet crus, si  
 sano cõferatur, & genu ipsum promi-  
 nentius; sed & ad inguina crus inflectere ne-  
 quit, & iuxta penem tumor manifestus oc-  
 currit, tanquam femoris capite illic desi-  
 dente. Dnas autem potissimum ob causas  
 crus ipsum altero longius est, ut docet Hip-  
 pocrates: nam os, inquit, quod à coxa pro-  
 cedit, & sursum ad pectinem fertur, fun-  
 damentum sit capitis femoris, & articuli  
 cervix in acetabulo vehitur.

## Si in exteriorem.

**Q**UIBVS in exteriora femur exci-  
 derit, contraria omnia apparent: siquidem  
 iuxta penem regio debescit, clunes intus ge-  
 scunt, & genu interius demergitur, & crus  
 inflectere non possunt ob musculos postero-

res qui flexui repugnant; quoniam ita figu-  
 rati plurimum extendi non sistent. Con-  
 spicitur & affectum crus sano trahimus; idque  
 non immerito, ut docet Hippocrates, quum  
 femoris caput non feratur super os, sicut  
 quando in interiorem partem prociidebat;  
 sed iuxta os quod non prominet, sed natura  
 residet, in carnem natura humidam ceden-  
 temque infigatur.

## dolorque in hoc casu.

**EST** quidem in principio dolor, femo-  
 ris capite comprimente carnem in quam in-  
 cumbit; unde interdum antequam occalle-  
 scat, inflammationes oriri soleant, quas  
 urina suppressio aut difficultas comitari con-  
 suevit; potissimum quoties cervix vesicæ  
 comprimitur.

Magnum



Magnum autem  
femori.

REPOSITVM crurum aliàs, tum quotiescunque mucosus humor in iunctura coxa coacervatus fuerit, excidere solet: nam, ut Hippocrates sectione VI. Aphorismorum Aphorismus XLIX. & quinquagesimo, Quibuscunque à coxendicium dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit; iis mucrores supernenunt. & Quibuscunque à coxendicium dolore diuturno molestatis excidit coxa, iis crur tabescit, & claudicant nisi urantur. Quos Aphorismos sic coniunctim legit & interpretatur Tagaulius: Quibuscunque à diuturno coxendicium dolore conflatis, propter mucrores seu mucosi humoris ac pituitosi copiam in articulo seu iunctura coxa coacervatam, & ioxior, id est, coxa ipsa ( hoc est femoris caput quod in coxa sine ossis ischij cavo inferitur ) suo naturali acetabulo propulsa excidit, & rursus

incidit ( id est, in nativam suam sedem sponte resiliit, aut aliter repulsa est; inibi tamen dum persistere non potest, sed soluta compage lubrica continenter relabatur ) iis processu temporis crur ( quod Græcis oxé- & dicitur, hoc est totum membrum, tam tibia scilicet quam femur ) necessariò alimonia penuria contabescit, & ariditate conficitur, omnesque in claudicationem enadunt, si non urantur; hoc est nisi prius ferramentis igne candentibus urendo, & mucus ille qui ossis ischij sinum occupat, absumatur, & laxitas cutis ad quam femoris caput subinde lubricum procidebat, contrahatur.

Collocandus autem  
homo.

SI in posteriorem partem femur prolapsus sit, neque prorum neque supinum hominem collocamus, sed sedentem; magis autem in integram coxam inclinatum.

## CAPVT XXI.

## De Genu.

GENV quoque & in anteriorem, & in posteriorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorem non prolabi plerique scripserunt. Potestque id vero proximum esse: cum inde opposita patella, ipsa quoque caput tibiae contineat. Meges tamen cum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memorie prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus iisdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure reconditur. Cætera verò manibus simul, tum ossa in diuersas partes compelluntur.

## ENARRATIO.

GENV in tres partes facillimè erumpit atque excidit; facillimè etiam reponitur: in priorem partem non prolabitur, propter patellam ei oppositam; quanquam id asserat Meges.

## In his casibus.

ITA ut si in anteriorem partem & anteriorem veniat, homo resupinandus sit; si in posteriorem, prorum collocandus.

## CAPVT

\* iunctis,  
ossa inde  
versus  
par.



## CAPVT XXII.

*De Tallo.*

**T**ALVS in omnes partes prolabitur. Vbi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. Vbi huic contrarius \* talus, contrarium etiam signum extat. Si in priorem partem erumpit, à posteriore latus nēruus durus & \* infanus est, minusque is opus est: si in posteriorem, \* calx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem is quoque per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est, ne is talus, qui totum corpus sustinet, parū confirmatis neruis ferendo oneri cedat, rursusque prorumpat. Calceamentis quoque humilioribus primo tempore vtendum, ne \* iunctura talum ipsum lædat.

## ENARRATIO.

**O**RIBASIVS, *Modò, inquit, in tem prolabitur talus; nonnumquam etiam interiorem, modò in exteriorem partem in posteriorem.*

## CAPVT XXIII.

*De Planta.*

**P**LANTÆ ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemque conduntur. Fascia tantummodò calcem quoque debet comprehendere: ne cū mediam plantam inumque eius vinciri necesse est, liber talus \* in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoque suppuret.

## CAPVT XXIII.

*De Digitis.*

**I**N digitis nihil vltra fieri debet, quàm quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri. Hæc facienda sunt in his casibus, vbi sine vulnere ossa exciderunt. Hic quoque & ingens periculum est: & eo grauius, quo maius membrum est, quòve validioribus neruis aut musculis contine-



continetur. Ideoque humeris, femoribusque metus mortis est\*, ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoque maior in utroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tutò reponi posse, præter digitos & plantas & manus dixit, atque in his quoque diligenter esse agendum, ne præcipitarent. Quidam brachia quoque & crura reposuerunt. Et ne canceri, distentionesque nervorum orientur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verùm ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet\* ante inflammationem, aut postea cum iam vetus\* res est. Si reposito quoque osse nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic iacere convenit, ut maximè cubantem iuuat, tantùm ne moueatur, nève dependeat. In omni quoque tali morbo magnum ex longa fame præsidium est. Deinde ex curatione eadem quæ proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. Id quod excedit, abscindi dum est. Imponendaque super arida linamenta sunt & medicamenta non pingua, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest veniat. Nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur, quæ necesse est faciliè noxæ postea pateat.

\* nisi ante

\* luxatio est.

## ENARRATIO.

Hæc facienda sunt.

**P**LVRIMA qua huc referri possunt, iam antè dicta sunt: nam quòd luxatio cum ulcere periculosa sit, atque magna ex

parie lethalis (præsertim si nervis aut musculis principalioribus vicina sit) enarratum est. Quare si quis antè dicta huc accommodet, caput hoc planissimum comperiet.

Octavi &amp; vltimi libri

F I N I S.

BBb

LECTO.



## L E C T O R I S.

**B**ENIVOLE Lector: Ecce tibi duas has  
 Celsi epistolas, vnam ad Iulium Calli-  
 stum; alteram ad Pullium Natalem. Quas  
 huic nostræ Celsi editioni adiungere bonum  
 factum visum nobis fuit: partim, quòd idem  
 argumentum quod hi Celsi libri, tractant,  
 nempe de re medicâ: partim etiam quia eius-  
 dem auctoris videbantur; ne quid forte Cel-  
 si de re medicâ, à nobis desiderare possis.  
 Vale & fruire.

CORNE-



## CORNELIVS CELSVS

CAIO IVLIO CALLISTO S.D.

**I**NTER maximos quondam habitus medicos Herophilus, Cai Iuli Calliste, fertur dixisse, *medicamenta deorum immortalium manus esse: non sine ratione, ut mea fert opinio. prorsus enim quod tactus diuinus efficere potest, id praestant medicamenta* *usu experientia comprobata.* Animaduertimus itaque saepe inter deliberationes contentionesque Medicorum auctoritate praecedentium, dum quaritur quidnam faciendum, aut qua ratione succurrendum sit agro, quosdam humiles quidem, & alioquin ignotos, reuera peritiores, vel (quod fateri pudet) longe semotos a disciplina medicinae, & ne affines quidem eius professioni, medicamento efficaci dato, protinus velut praesenti numine, omni dolore periculoque liberasse agros. Quamobrem spernendi sunt quidem, qui medicinam spoliare student usu medicamentorum, forsan non a medendo, sed a potentia, effectoque medicamentorum ita appellatam. Probandi autem sunt, qui omnino succurrere periclitantur student. Ego certe aliquoties magnum scientiae consequutus sum titulum, ex usu prosperè datorum medicamentorum, multosque ex eadem causa non mediocrem gloriam tulisse memini. Est enim hac pars Medicinae vel maxime necessaria, certè antiquissima, & ob hoc primum celebrata atque illustrata: siquidem verum est, antiquos herbis ac radicibus, corporis vitia curasse: quia timidum genus mortalium inter initia non facile ferro ignique se committebat. Quod etiam nunc plerique faciunt, ne dicam omnes. Et nisi magna compulsi necessitate,

BB b 2

ipsius



ipsius salutis, non patiuntur sibi fieri, quæ sanis vix toleranda sunt. Cur ergo aliqui excludant medicinam de usu medicamentorum, non inuenio, nisi ut detergant impudentiam suam. siue enim nullum experimentum eius generis remediorum habent, meritò accusandi sunt, quòd tam negligentes in tam necessaria parte artis fuerint: siue experti quidem sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi sunt, qui crimine inuidentiæ flagrant: quod malum quum omnibus animantibus inuisum debeat esse, tum præcipuè medicis, in quibus nisi plenus misericordiæ, & humanitatis animus est, secundum ipsius professionis voluntatem, hominibus, Diis quæ omnibus inuisi debent esse. Iccircò ne hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medicinae legitime est obligatus. Sed persequetur eos, cum res postulauerit, ut militans, & ciuis bonus omni modo, quia medicina non fortuna, neque personis æstimat homines, verum æqualiter omnibus implorantibus auxilia sua porrecturam & succursuram se pollicetur, nullique vnquam nocituram proficetur. Hippocrates conditor nostræ professionis initia disciplina à iureiurando tradidit, in quo sanctum est, ut ne prægnanti quidem medicamentum, quo conceptum excutitur, aut detur, aut demonstretur à quoquam medico, videlicet longè præformans animos discipulorum ad humanitatem. Qui enim nefas existimauerit, spe dubia homines ledere, quanto scelestius perfecti iam nocere iudicabunt? Magni ergo æstimauit nomen decusque medicinae conseruare, pio sanctoque animo quemque secundum ipsius propositum se gerentem, scientia enim sanandi, non nocendi est medicina: quæ nisi omni parte sua plenè excubat in auxilia laborantium, non præstat quam hominibus pollicetur misericordiam. Desinant ergo qui prodesse afflictis, aut nolunt, aut non possunt, alios quoque deterrere, negando ægris  
auxilla,



749

auxilia, quæ per vim medicamentorum frequenter exhiben-  
tur. Etenim per gradus quosdam medicina laborantibus  
succurrit. Nam primum cibus, ratione aptoque tempore datis  
tentat prodesse languentibus: Deinde si ad hos non respon-  
derit curatio, ad medicamentorum decurrit vim. Potentiora  
enim hæc & efficaciora quam cibi. Post ubi ne ad hæc qui-  
dem cedunt difficultates aduersæ valetudinis, tunc coacta ad  
sectionem; vel ultimò ad usionem venit. At Asclepiades  
maximus auctor medicinae negavit aëris danda medicamenta.  
Quidam enim hoc mendacio pro argumento vtuntur. Pote-  
ram tamen, si verum id esset, dicere quid Asclepiades sen-  
serit. forsitan non omnino in hanc partem animum intendit.  
Homo sanè fuit qui parùm feliciter se in hoc negotio gessit.  
Itaque non deterreor persona, cum re manifesta prodesse vi-  
deor. Nunc verò cum tam impudenter quidam de eo mala  
comminiscantur, quid possum ultra dicere, nisi quodammodo  
parricidium ac sacrilegium eos committere qui hæc dicunt? Ille  
enim febricitantibus, vitiiisque præcipitibus correptis, quæ  
oxypathe Græci dicunt, negavit medicamenta danda, quia cibo  
vinoque interdum aptè dato remediari eos tutius existimauit.  
Ceterum in libro qui Parascension, id est, Preparationum  
inscribitur, contendit ultimæ sortis esse medicum, qui non ad  
singula quæque vitia binas ternasque compositiones, & ex-  
pertas, & protinus paratas habeat. Vides ergo quàm non  
placeat Asclepiadi usus medicamentorum? cui nisi plura ad  
vnumquodque genus vitij medicamenta composita habeat,  
non videtur dignus professione medicinae. Sed ista licentia  
nomine tantummodò medicorum propter quorundam negli-  
gentiam latius processit. Rarò enim aliquis priusquàm se suosq.  
tradat medico, diligenter de eo iudicat, cum nemo ne imaginem  
suam pingendam committat, nisi probato prius artifice per quæ-  
dam



dam experimenta, atque electo, habeat ne omnia pondera ac  
 mensuras exactas, ne quid errorum in rebus necessariis accidat:  
 videlicet quia sunt quidam qui pluris alia quam seipsos aesti-  
 ment. Ob quod sublata est unicuique studendi necessitas, &  
 non solum antiquos auctores per quos consummatur professio,  
 quidam ignorant sed etiam comminisci falsa de iis audent. Vbi  
 enim delectus non est personarum, sed eodem modo bonus ma-  
 lusque habetur, disciplina ac fecta observatio perit, quodque sine  
 labore potest contingere, & in quo dignitatis atque utilitatis  
 prestare videtur aequalitas, id unusquisque magis sequitur.  
 Atque ut quisque vult facit & medicinam. Quosdam enim a  
 peruerso proposito nemo potest mouere: Et sane omnibus per-  
 misit liberum arbitrium magnitudo professionis eius. Multos  
 itaque animaduertimus vnius infirmitatis scientia, medici ple-  
 num nomen consecutos. Nos vero ab initio etiam viam se-  
 cuti, nihil prius in totius artis perceptione, quam homini per-  
 mittitur, iudicauimus. Quia ex hac omnia comoda consecu-  
 turos nos existimabamus, non mediis fidius tam pecunia aut  
 gloria cupiditate, quam ipsius artis scientia. Magnum enim,  
 & supra hominis naturam duximus, posse aliquem tueri, vel  
 recuperare suam, & vniuscuique bonam valetudinem: ita-  
 que ut ceteris partibus disciplina, ita huic quoque, quae per  
 medicamenta virtutem suam exhibet, curiose instuimus, eo  
 magis quod percipiebamus indies ex usu profectus eius, quos  
 interdum supra fidem & opinionem plurimorum exhibeba-  
 mus. Sed quid ultra opus est probare necessarium esse usum  
 medicamentorum? praecipue tibi, qui, quia percepisti utilita-  
 tem eorum, idcirco a me compositiones quasdam petisti. Ego  
 autem memor humanitatis tuae, candorisque animi tui, quem  
 omnibus quidem hominibus plenissime, mihi etiam peculiariter  
 praestas, non solum quae desideras remedia, verum etiam si  
 qua



751

qua alia de expertis in presenti habui, in hunc librum contuli, quem ad te misi. Cupio enim mediusfidius quàm possum tuæ in me tam perseveranti benevolentia respondere, adiutus omnî tempore à te, præcipuè verò istis diebus: ut primum enim potuisti, non es passus cessare tuæ erga me pietatis officium, tradendo mea scripta Latina de medicinalibus, nostro Casari. Quorum potestatem tibi feceram, ut ipse prior legeres, simpliciterque indicares mihi quid sentiret de iis. Plurimum enim iudicio tuo tribuo. Tu porro candidissimo animo, & erga me benevolentissimo, dignos nomine editionis, non verbis, sed re probasti, periculumque non minùs tui iudicii quàm ego stili propter me adisti, quo tempore diuinis manibus ea tradendo consecrasti. Fateor itaque me gratias tibi agere, quòd & prius quàm rogareris consummasti amicissimo affectu vota mea, & quòd contigit mihi favore tuo maturiorem percipere studij huius mei fructum ac voluptatem. Ignosces autem, si pauca tibi visæ fuerint compositiones, & non ad omnia vitia scriptæ: sumus enim, ut scis, peregrè, nec sequitur nos nisi necessarius admodum numerus libellorum. Postea autem si & tibi videbitur, ad singula quæque compositiones colligemus. Oportet enim copiam earum selectam habere, quoniam reuerà quedam magis quibusdam, & non omnes omnibus conveniunt, propter differentiam scilicet corporum, & affectionum, quarum initium à capite faciemus (summum enim & quasi primum locum hoc obtinet,) dantes operam ut simplicia remedia prima quæque ponamus. Interdum enim hæc efficaciora sunt, quàm ex pluribus composita medicamenta. Erit autem nota denarij pro Græca drachma: æquè enim in libra denarij LXXXIII. apud nos sunt, sicut drachmæ apud Græcos incurrunt.

CORNE-



**L**ECTIS duobus libris compositionum Gracis, Pulli Natalis, quos misisti mihi ut in Latinum sermonem conuerterem, libenter parui tuae voluntati, dignos eos existimans quibus operam impenderem, quos plenos utilitatis comperi, alioqui excusassetem, ni me propositum haberet, nihil non dignum sublimi Romanorum maiestate, de bono medicinae artis splendidissime scribere, idque perennitati, & literis mandare. Habebit ergo & praesens tempus, & futura posteritas, in hoc perpetuae voluntatis meae curaeque gratissimum munus, siquidem bona valetudine nihil est pulchrius. Dedi operam quantum potui, ut ad verbum transferrem, quae in Gracis medicinalibus reperi, nec necessariam curam cultus orationis putavi, quia rectius duxi proprietates nominum edere, & rem veram sub herbarum peregrinarum vocabulis explicare. Unum genus fateor me translationis de industria declinasse, quo fere Graci utuntur, in medicamentorum scripturis, omnia ad secundam personam dirigentes. Ego vero in usum medicamentorum quae edidi, omnis boni gratia nullam malui quam infinitam inserere personam. Admoneremque, nisi certum haberem te non ignorare, me huiusmodi bona utilitatis magis quam delectationis causa scripsisse. Graci medici pondera medicamentorum ad drachmas redigunt: quae quia ad denarium nostrum conueniunt, (octoginta enim & quatuor in libram incurrunt) pro nota Graecae drachmae quae est figura talis, Z, notam denarii Latinam, quam nosti, posui, id est hanc, \*: & ad eius pondus Graecas drachmas rediges. Et quando quae volui praefatus sum, nunc quae desideras explicabo.

INDEX



753

INDEX  
OMNIVM, QVÆ IN CELSO  
CONTINENTVR.

*Primus numerus librum, secundus caput designat.*

A.		Agamemnon	1. proœ.
<b>A</b>	Bdomen	lib. 4. cap. 1	Agricolam vsu fieri, non disputa-
	Abdominis ruptura quo-		tione
	modo curanda sit	7. 17	ibid.
	Abditæ causæ	1. in proœ.	Aiax quo genere insanix labora-
	Abcessus quibus signis indicen-		uerit.
	tur futuri	2. 6	3. 18
	Abortus periculum quando	1. 7	Alentia
	Abstinentia nimia sæpe inutilis		5. 14
	ibidem		Alopecia
	Accessiones in febribus	3. 3	6. 4
	Aceri natura & vsus	5. 27	Alphos
	Acopa	5. 2. 3	lib. 5. cap. ult.
	Acrochordones	lib. 2. cap. 14. &	Aluum stringentia
	lib. 5. cap. 28		1. 5
	Actiones naturales quæ	1. proœ.	Aluum soluentia
	Adolescentia quibus morbis ma-		ibid.
	gis obnoxia sit	1. 1	Aluus quæ mala
	Adurentia	5. 8	1. 3
	Aduſta quomodo curari debeant		Aluus soluta, quibus remediis
	5. 26		coërceatur
	Ægilops	7. 7	1. 6
	Æſtas periculosa	2. 1	Alui indicatio
	Æſtas quos pariat morbos	1. 2. 1	2. 7
	Æſtate quæ ad victum magis con-		Ambrosia Antidoti nomē lib. 5. 2. 3
	ducant	1. 3	Ammonius lithotom.
	Æſtuanti in balneo, quid opus		7. 26
	ſit facere	1. 3	Anatomice, id eſt, infectio corpo-
	Ætatis differentia victu & cura-		rum neceſſaria
	tione	1. 3	1. proœm.
	Ætatum differentia, quantum ad		Ancyloblepharos
	bonam, malamve valetudi-		7. 7
	nem	2. 1	Andreas medicus
	Æſculapius in deorum numerum		5. proœ.
	relatus	1. proœ.	Andræ collyrium
			6. 6
			Andro medicus
			6. 18
			Angina
			4. 4
			Angina ſubitò finita, quid por-
			tendat
			2. 5
			Animalium quadrupedum diffe-
			rentia
			2. 17
			Angues in Italia, & in frigidis re-
			gionibus minus terribiles
			5. 26
			Ani vitia quomodo curari de-
			beant
			7. 30
			Anodyna
			5. 25
			Antidoti, & eorum compositio-
			nes
			5. 23
			Antheræ
			6. 11
			Antigo-

CCc

Antigo-



I N D E X,

Antigonus rex	3.22	Aurium morbi	7.8
Apollonius medicus	1. proœ.	Aurium fracturatum curatio	8.6
Apollonius, qui Mys cognominatus est	5. proœ.	Autumnus periculosissimus	2.1
Apostemata	2.1	Autumnus quos morbos pariat	ibid.
Aphthæ	ibid.	Autumni tempore quæ ad victum	
Aperientia	5.8	magis conferant	1.3
Aqua frigida quibus proſit	1.9	Auſter quos morbos generet	2.1
Aquæ differentia in potionibus	2.17	Autopyron.	2.17
Aquæ bonitatis probatio	ibid.		
Aqua in qua candens ferrum tin- ctum ſit	4.9	B.	
Aqua inter cutem quando mini- mè terribilis	2.7	<b>B</b> afilicon emplaſtrum	5.19
Aqua quomodo hydropicis emit- tatur	7.13	Boërthaus	ibidem
Aquilonis ſtatus quos generet morbos, & quid boni ſanis cor- poribus adferat	2.1	Brachij fracti curatio	8.10
Area	6.4	Brachium	8.1
Arquatus morbus	3.24	Bronchocele	7.13
Arteriæ compoſitio	5.26	Bubonocèle.	7.18
Articulorum vitia	2.7		
Arteria aſpera, cuiusque deſcri- ptio	4.1	C.	
Articulorum dolores	4. vlt.	<b>C</b> achexia	2.1. & 3.22
Ad articulos malagma	5.18.	Cacoëthes	5.28
Aristonis malagma	ibid.	Calefacientia	1.3
Articulorum curationes	5.26	Calculoſi quibus indicijſ cognof- cantur	2.6
Aſclepiades	1. proœ.	Calculus quibus ſignis cognof- catur	7.26
Aſcites	3.21	Caluaria	8.7
Aſhma	4.4	Caligatio oculorum	6.6
Aſius lapis lib. 4. cap. vlt. aduerſus		Calor quibus proſit	1.9
Aſpidis iſtum	5.26	Calor quid corporibus adferat	2.1
Athenio	5.25	Calculo quomodo ſuccurratur	7.26
Atheroma	7.6	Cancer in ore	6.15
Attoniti qui dicantur	3.26	Cancer in cole	6.18
Atrophia	3.22	aduerſus Cantharidas	2.27
Attalicum emplaſtrum	5.19	Capitis dolores quibus leuentur	2.7
Auium differentia in cibo	2.17	Capitis longus dolor ſi ſine cauſa eſt, &c.	ibid.
Aurium vitium	6.7. & cap. 18	Capitis deſcriptio	4.1
		Capitis morbi, & eorum curatio	4.2

Caput



# INDEX

Caput quibus infirmum est, quid facere conveniat	1.4	Chrysippi malagma	5.18
Caput quod firmissimum	8.1	Cibus à quibus rebus melius inci- piat	1.2
Caput luxatum	8.13	Ciborum potionumque differen- tiæ	2.17
de Capillis fluentibus	6.1	Cibus quomodo & quando in fe- bribus dandus	lib.3.cap.4.5
Carbunculus in oculis	6.6	Cibi varij eduntur facilius quàm concoquantur	3.6
Carbunculi in cole curatio	6.18	Cibus febricitantibus dandus, qualis esse debeat	ibid.
Carcinodes	6.8	aduersus Cicutam	5.27
ad Carcinodas malagma	5.18	Cirfocele	7.18
Carcinoma	5.28	Circulatores	5.26
Cardiacus morbus quis dicatur	3.19	Clauus	5.28
Casus quid inuenerit	5.26	Clauus oculorum	7.7
Cassius medicus	1.proæ.	Cleonis collyrium	6.6
Catapotionum descriptio, siue va- ria compositio	5.25	Coli dolor quibus remedijs iuue- tur	1.7
Catapotionum ad somnum	ibid.	Coles	4.1
Catapotionum Athenionis	ibid.	Colicon medicamenti genus, ex quibus rebus constet	4.14
Catapotionum Heraclidis	ibid.	Collyriorum variaz compositiones	6.6. & 4.28
Causæ abditæ quæ sint	1.proæ.	Coëuntia in aliqua corporis par- te dissoluentia	5.11
Causæ euidentibus quæ	cod.	Cæliacus morbus, & eius curatio	4.12
Causæ obscuræ quæ	eodem	Comitialis morbus	3.23
Cephalæa	4.2	Concoctio cibi in stomacho, lib.1, in proæm.	
Cerebri vel membranæ eius per- cussæ curatio	5.22	Concoctio quibus fit, quomodo se gerere debeant	1.2
Chirurgus Tryphon lib.7.in pro- æm. & lib.8.cap.5.		Concubitus qualis esse debeat	1.1
Chirurgus Sostratus	1.proæ.	Concubitus in scæminis, si per na- turam prohibitus, quomodo restitui debeat	7.28
Cæsarianum collyrium	6.6	Condita duabus de causis inutilia	1.2
Cercis	lib.8.cap.1	Condylomata	5.28
Chiragra	2.6. & 4.24	Condylomatum curatio	7.30
Chirurgica	lib.1.in proæ.	Coquentia & maturantia pus	5.3
Chironium vlcus	5.28	CCc 2	Cordis
Chirurgus qualis esse debeat	7.		
Chænicion	8.3		
Cholera	4.11		
Chordapfos	4.13		
Chordien	ibidem		
Crite tuberculum	7.6		
Chrysippus	1.in proæ.		
Chrysippi discipulus medicus	2.21		



I N D E X.

Cordis descriptio, & ubi sitū sit	4.1	Defruti differentia in potionibus	
Cordis percussi signa	5.22		2.17
Coryza	4.2	Denarij pondus	5.17
Corpus integrum quodnam ha-		Dentium situs & ordo & nume-	
beatū	1.2	rus & nomina	8.1.
Corporum incisio,	1. proce.	Dentium dolor	6.7
Corpus gracile quale	2.1	Dentium curatio	7.12
Corpus quā extenuent	1.3	Dentes quomodo extrahendi sint,	
Corporis humani descriptio	8.1	ibidem	
Corpus quodnā habilissimū	2.1	Destillatio, eiusque curatio	4.2
Corporis noxæ quinque	5.26	Destillatione laborantibus quid	
Costæ, & earum situs atque diffe-		opus sit	1.5
rentiæ	8.1	Desidia	lib. 1. in proce.
Costarum fracturarū curatio	8.9	Detractio materiæ à corporibus,	
Coxarum dolores	4.22	quot modis fiat	2.8
Coxarū dolor, quid portēdat	2.5	Dexij malagma	5.18
Coxarum os	8.1	Diaphragma	1. proce.
Crato medicus	6.7	Dietetica medicina	ibid.
Crustas vulneribus inducētias	5.10	Dies critici	3.4
Crustas ulcerum resoluentia	eod.	Digiti	lib. 8. cap. 1. 19.
Cremaſteres	7.18	Digitorum coherentium curatio	
Crassissimum os in capite	8.1		7.32
Cubitus	ibid.	Digitorum ulcera	6.19
Cubitus luxatus quomodo resti-		Difficillimè curationem admi-	
tui debeat, & quot in eo ossa		tentia	5.22.
coēant	8.16	Diocles	1. proce.
Curta in auribus quomodo sarci-		Disciplina corpori inimica	ibid.
ri debeant	7.9	Dionysij collyrium	6.6.
Cutem purgantia	5.16	Dyspnœa	4.4
Cucurbitularum genera duo	2.10	Dysenteria.	4.15
Curatio morborum quot modis			
fiat	2.8	E.	
Curationum duo genera	7.7	Ectropium oculbrum	7.7
Cucurbitulis quomodo sanguinis		Elæodes	5.26
detractio fiat	2.10	Elcodes	5.28
Cynicus spasmus.	4.2.	Elephantia	3.25
		Empiricus unde dictus sit	lib. 1.
D.		in proce.	
Democritus	lib. 1. proce.	Empirici qui sint	ibid.
Deiectio	1.3	Empedocles	ibid.
Deiectio quando sine vlla noxa		Emplastrorū variæ cōpositiones,	
fit	2.4	& descriptiones	5.17. & deinceps.
		Empro-	



- Emprosthotonos 4.3  
 Encanthis 7.7  
 Enterocoele 7.18  
 Enneapharmacu emplastrum 5.19  
 Ephesium emplastrum 5.19  
 Epinyctis 5.28  
 Ephelis 6.5  
 Epiploce 7.18  
 Epispastica 5.18. & 19  
 Erasistratus 1. in proœ.  
 Errorem suum de futuris in ca-  
 pite ingenue confessus est Hip-  
 pocrates 8.4  
 Erysipelas lib. 5. cap. 26. & 28  
 Euidentes causae 1. proœ.  
 Euocantia & educentia 5.12  
 Euticleus 5.18  
 Euelpidis collyrium 6.6  
 Euelpistus chirurgus 7. proœ.  
 Exagitatio quid faciat 4.15  
 Exanthemata 5.28  
 Experientia 1. in proœ.  
 Exercitatio quibus fiat modis 1.2  
 Exercitationis finis, quisnam esse  
 debeat ibid.  
 Exercitationem quæ sequi de-  
 beat ibid.  
 Excedentia 5.7  
 Expletus cibo potuue quid facere  
 debeat 1.2  
 F.  
**F**acies in homine 8.1  
 Fatigato quotidianum cubile  
 tutissimum 1.3  
 Fatigatum inter ambulandum  
 quæ resiciant ibid.  
 Febrium differentia 3.5  
 Febrem sæpe praesidio esse 2.7  
 Fel & eius situs 4.1  
 Ferarum differentia in cibis 2.17  
 Femur 8.1.  
 Fistula in homine ibid.  
 Fistularum curatio 5.28  
 Fluxus ventris, eiusq. curatio 4.19  
 Foemina 8.1  
 in Foeminis secundæ 7.30  
 Foramina in capite ibid.  
 Frigus quibus inimicum 1.9  
 Frigus quibus proffit ibid.  
 Frigus quid mali corporibus ad-  
 ferat 2.1  
 Frigus in febribus quid dicatur 3  
 Fructuum arboreorum differen-  
 tia in cibis 2.17  
 Frumentorum differentia in cibis  
 ibid.  
 Furunculus 5.28  
 G.  
**G**Angræna curatio 7.33  
 Ganglion 7.6  
 Gargarizationes 5.22  
 Genuum dolores & eorum cu-  
 ratio 4.25  
 Genu luxatum 8.21  
 Gingivarum vlcera 5.13  
 Glaucias 1. proœ.  
 Glandula 4.1  
 Glans colis quo pacto tegenda 7.25  
 Glans colis siue penis contacta,  
 quomodo aperienda sit ibid.  
 Glutinantia 5.2  
 Glutinatio vulnerrum 5.26  
 Gorgias medicus 2.14. & lib. 7.  
 in proœ.  
 Grauedines quomodo curerentur 4.2  
 Grauedine laborantibus quid con-  
 ueniat 15.  
 Gubernatorem vsu fieri non dis-  
 putatione. 1. proœ.  
 H.  
**H**Ammonius medicus 7. pro.  
 Hapfus 7.26  
 Hecatei emplastrum 5.19  
 C C c 3. Hepati-



I N D E X.			
Hepaticus morbus	4.7	Hypochoylis.	6.6
Hæmorrhoids	6.18	I.	
Herbarū differentia in cibis	2.17	I Chor	5.26
Heraclides	1.proæ.	Iecur, & eius situs	4.18
Herophilus lib.1. in proæ. &		ad Iecur dolens malagma	5.18
lib.5. cap.25.		Ieiuni hominis vis aduersus ser-	
Hecataus	5.25	pentis iſtum	5.26
Hermionis collyrium	6.6	Ignauia quid faciat	1.1
Hernia	7.18	Ileos	2.1
Heron ſiue Hieron medicus	7.	Ileon	4.13
proæm.		ad Infantem mortuum expellen-	
Herpes	5.28	dum	5.25
Hippocrates	1.proæ.	Ilia, & eorum ſitus	4.1
Hippocrates omnis medicina pa-		per Imbres qui morbi oriatur	2.1
rens	7.proæ.	Imbecilliffima materia quæ	2.17
Hirenæus	5.25	Implentia	5.14
Hieracis collyrium	6.6	Inſanabilia quæ ſint	5.26
Hieræ compositio	5.27	Inſibulatio quomodo fiat	7.25
Homerus	1.proæ.	Inedia ſi cui eueniat, quid facien-	
Homo ſanus, nullis ſe medicorum		dum	1.2
legibus obligare debet	1.1	Inguen quomodo incidendum ſit	
Hominem ſanum, varium vitæ			7.20
genus habere oportet	eod.	Intemperantia qua in re tolerabi-	
Horror in febribus	3.3	lior	1.2
Humectantia	1.3	Intemperantiæ exemplum	3.21
Humerus	8.1	Inſania quibus ſignis denuntie-	
Humerorum dolores quibus tol-		tur futura	2.5
lantur	2.7	Inſaniæ ſpecies	3.18
Humeri fracti curatio	8.10	Inſanientium communia reme-	
Humerus luxatus quomodo re-		dia	3.18
ſtitui debeat	8.15	Intestinum ieiunum, & cur ita	
Humor ſpiſſeſcens, aceto intus		dictum	4.1
ſumpto diſcutitur	5.26	Intestinum tenuius	ibid.
Hyeme quæ magis cōueniant	1.3	Intestinum craſſius	ibid.
Hyems ſalubris eſt	2.1	Intestinatorum nomina diuerſa, &	
Hyems quos morbos pariat	ibid.	differentiæ & ſitus	ibid.
Hydrocele	7.18	Intestinum cæcū & rectum	ibid.
Hydrops, ac eius ſpecies tres	3.21	Intestinatorum morbi, & eorum	
Hydropis curatio	ibid.	curatio	4.10
Hydrocephalon	4.2	Intestini tenuioris morbi curatio	
aduerſus Hyoſcyamum	5.27		4.14
Hypoſarca	3.21	Iocinoris morbus	4.8
		in Ioci-	



I N D E X.

in Iocinoris morbo quæ periculo- sa	2.7	ad Lienem malagma	5.18
Intestinatorum percussorum signa	5.26	Lienis vulnerati signa	5.26
Intestina vulnerata quomodo cu- rari debeant	7.16	Linguae resolutio, eiusque cura- tio	4.2
Iollæ medici compositio	5.22	Linguarum vlcera	6.12
Iocinoris percussi signa	5.26	Lippitudine laborantibus quid opus sit	1.5
Iudæi compositio	5.22	Litterarum disciplina animo ne- cessaria, corpori inimica	1.pro.
Iudæi emplastrum	5.19	Lucubrandum quando potissi- mum	1.2
Iugale	lib.8.cap.1.	Luxata membra quomodo resti- tui debeant	8.11
Iuguli fracti curatio.	4.8	Luxuria.	lib.1. in proœ.
L.			
<b>L</b> Abor quid faciat	1.1	M.	
Laborem quis facilius toleret per ætatem	1.3	<b>M</b> Achaon	lib.1. in proœ.
Laborantibus ex partu remedium	5.25	Malagmatum compositio- nes variae	5.17
Lagophthalmos.	7.7	Malæ	8.1
Lateris dolor	4.6	Manus luxata quomodo restitui debeat	8.17
ad Laterû dolores malagma	5.18	Materia extrahenda per mala- gmata	5.18
Lauatio	1.3	Materiae genere & modo vten- dum pro viribus cuiusq.	2.17
Leguminum differentiae in cibis	2.17	Maxilla.	8.1
Lenticula	6.5	Maxillæ fractæ curatio	8.7
Lepis	8.3	Maxillæ luxatæ curatio	8.12
Lethargus	3.20	Medicina nusquã non est	1.pro.
Leucæ	lib.5.cap.vlt.	Medicina quid promittat	ibid.
Leuia ingenia qualia	8.4	Medicina multiplex	ibid.
Leuitas intestinatorum, à quibus ætatibus depellitur	2.7	Medendi scientia, sapientiæ pars	ibidem
Leuitas intestinatorum, & eius cu- ratio	4.16	Medicina triplex	ibid.
Leucophlegmatia	3.21	Medicina quæ victu curat, in duas partes diuisa	ibid.
Leuantia siue laxigantia	5.13	Medicinæ quæ pars difficillima	ibidem
Lienteria	2.1	Medicinam artem coniecturalem	ibidem
Lien siue lienis	4.1	Medicina quid	ibid.
Lienes quibus magni sint	2.5	Medico-	
Lienis malum quando periculo- sum	2.7		
Lienis morbi curatio	4.9		



Medicorum officium, quodnam sit in curando, ex Asclepiadis sententia	3.4	do æger tractandus sit	eod.
Medici periti officiū circa ægrum, cuiusmodi esse debeat	3.6	Morbus si longus sit quomodo æger tractandus sit	eod.
Media materia	2.17	Morbus comitialis	3.23
Medulla percussæ signa	5.26	Morsus omnis quodam modo venenosus	5.26
Meges chirurgus lib. 5. cap. 28. & lib. 7. in proœ.		Mortis indicia quæ	2.5
Melas lib. 5. cap. vlt.		Mos magnorum virorum qui sit	8.4
Melancholia	2.5	Mulieri grauidæ quæ incommoda evenire possint	2.5
Mellis natura in medicina	3.9	Mulli differentia in potionibus	2.17
ad Melicerias malagma	5.18	Mutatio per vitæ cursum quomodo moderanda	1.5
Meliceria	5.26	Mycon	5.18
Meliceria siue meliceris lib. 5. cap. 28. & lib. 7. cap. 6.		Myron	5.28
Meningophylax	8.3	Myrmecia	4.28
Menophilus medicus	8.7	Mydriasis oculorum.	6.6
Menemachus	6.9	N.	
Mensa secunda	1.2	Narium morbi	6.6
Metrodorus medicus, Epicuri discipulus	3.20	Narium fracturâ curatio	8.5
Mentum	8.1	Naturales causæ quæ sint i. proœ.	
Mithridatis antidotum	5.23	Nauiganti & nausea presso, quid facere opus sit	1.3
Modiolus	8.3	Negotiosi hominis prima curatio, exercitatio est	1.2
Mollientia	5.15	Neruorum dolore laborantibus, quid obseruandum sit	1.9
Morbos in deorum iram relatos i. in proœ.		Neruorum distentio, quibus futura deprehendatur	2.5
Morbos non eloquentia, sed remedijs curati	ibid.	Nileus, siue Nilei collyrium	6.5
Morborum tria genera	ibid.	Notæ in singulis morbis obseruandæ	2.6
Morbi per singulas tempestates	2.1	Notæ	8.1
Morbus comitalis, qua ætate ægè curetur	2.7	Numenij malagma	5.18
Morborum diuisio & differentiæ	3.1	Nymphodorus medic.	8.20
Morbus increfcens quibus signis dignoscatur	3.2	O.	
Morbi decedentis quæ notæ sint eodem		Obscurnarū partiū vitia quomodo curanda sint	6.18
Morbus si acutus fuerit, quomo-		Oculorum varij morbi	6.6



I N D E X.

Oculorum natura indicatio	7.7	Pastillus Andronis	ibid.
Oculorum vitia, & eorum cura- tiones	6.6	Parotides arteria	4.1
Olerum differentia	5.17	Patella	8.1
Omentum, cuiusque officium	4.1	Pecten	ibid.
Omenti curatio	7.21	Pediculi in palpebris oculorum	6.6
Omoplatæ	8.1	ad Pedū dolores malagma	5.18
Opisthotonos	4.3	Peripneumonia	4.7
Opisthotonos	6.4	Pessī compositio	5.21
Orestes, quo genere infantiæ labo- rauerit	3.18	Pessī alia compositio	eod.
Oris vlcera, quomodo curari de- beant	7.11. & 6.11	Pessī Numenij	eod.
Orthopnea	4.14	Pestilentia unde fiat.	1.2
Offis fracti curatio	8.7	in Pestilentia quæ sint obseruan- da	1.3. cap. 10
Os quot modis excidatur	8.3	Petro medicus	3.3
Ossa vitata	8.1	Pharmaceutica	1. proæ.
Osteos	7.18	Phacos	6.5
Osteos	6.8. & 7.18	Phagedænæ in cole nascentis cu- ratio	6.18
Osteos	5.11	Philippus Epirotes medicus	3.21
P.		Philocratis emplastrum	5.19
P.		Philocrates	5.26
P.		Philon	6.6
P.		Philothis collyrium	eod.
P.		Philoxenus medicus	6.19
P.		Philotimus	8.20
P.		Phlegmone	1. in proæ.
P.		Phrenesis siue phrenetidis genera plura	3.18
P.		Phthisis	2. ca. 1. & lib. 3. cap. 22
P.		Phygethlon	5.18. & 6.28
P.		Phymata	2.7. & 5.18. & 5.28
P.		Piscium differentia in cibis	2.17
P.		Pituita oculorū quomodo curan- da sit	7.7
P.		Planta	8.1
P.		Plistonius Praxagoræ discipulus	1. in proæ.
P.		Podagra	lib. 2. cap. 6. & 4.24.
P.		Podagræ calidæ curatio, per ma- lagma	5.18
P.		Polypus	6.8
P.		Poly-	

D D d

Poly-



INDEX.	
Polypus in naribus	7.10
Ponderum ratio	5.17
Porrigo	6.2
Potionum differentia	2.17
Potiones in febribus, quando & quomodo dari debeant	3.6
Praxagoras	lib. 1. in pro.
Prandium quid requirat	1.3
Protarchus	5.28
Proptosis	6.6
Prudens medicus quis habeatur	5.26
Psorici descriptio	6.6
Pydracion	5.28
Psylli, quibus medicamentis v- tuntur aduersus venena	5.26
Pterygion	6.19
Ptolemaeus rex	5.23
Ptolemaeus chirurgus	6.7
Pueritia quibus morbis periclite- tur	2.1
Pulmo vbi situs sit & qualis sit	4.1
Pulmonis morbus, quæ pericula portendat	2.7
Pulmonis percussi sig.	5.26
Purgantia	5.5
Purgationes reiectæ ab Aesclepi- de	1.12
Purgationes interdum necessariae, interdum inutiles	1.3
Pustula in oculis	6.6
Pustularum genera	5.28
Pus, eiusque differentia	5.26
Puris significatio	2.7
Pus coquentia siue maturantia, & mouentia	5.3
Pyloros	4.1
Pyrites	5.18
Pythagoras.	1. proce.
<b>Q</b> Quartana neminem iugulat	
3.5	
<b>in Quartana veteri quid observa- re profit</b>	
3.15	
<b>Quartanae febris curatio.</b>	
ibid.	
<b>R.</b>	
<b>R</b> Adius	
8.1	
<b>R</b> Rationalis medicus quis, & vnde dicatur	
1. pro.	
<b>aduersus Rabidi canis morbum</b>	
5.26.	
Ramex	7.18
Ramicis curatio	7.22
Recidiva quando timenda	3.4
Refrigerantia quæ	2.3
Regius morbus, & cur ita dictus sit	3.24
Renes & eorum situs	4.1
Renum curatio	4.10
Renum percussorum siue vulne- ratorum signa	5.26
Resolutio stomachi	4.5
Resolutio oculorum	6.6
Rhagadia	6.18
Rhyas	7.7
Rhypodes emplastrum	5.19
Rodentia	5.6
Rosa natura in medicina.	3.9
<b>S.</b>	
<b>S</b> Acer ignis	
5.28.	
<b>S</b> Sanguis ex naribus, quibus saepe fluit	
2.5	
<b>S</b> Sanguinis detractio, quot modis fiat	
2.9.	
<b>S</b> Sanguinis natura & proprietas.	
4.3	
<b>S</b> Sanguinem supprimentia	
5.1	
<b>ad Sanguinem supprimendum</b>	
malagma	
5.8	
<b>S</b> Sanguis, atq. eius differētia	
5.16.	
<b>aduersus Sanguinis profusionem</b>	
in vulneribus	
eodem.	
aduersus	



INDEX.

568

aduersus Sanguisugam	ibi.	Sphagitides venæ	4.1
Sanies & eius differentia	ibid.	Spina luxata quomodo restitui	
de Sanitate tuenda librum scripsit		debeat	4.14
Asclepiades	1.3	Sputum quid significet	2.7
Satietas nimia nunquã utilis	1.2	Staphiloma	7.7
Sarcophagus	4.c.vlt.	Statura longa	2.1
Sarcocele	7.18	Steatomata	7.6
Scapula	8.1	Sternutamenta quomodo exci-	
Scoptula	cod.	tanda	5.22
Scorpio sibi ipse medetur	5.26	Stercus animalium	5.5. & 8.12
aduersus Scorpionis ictum	ibid.	Stomachum infirmum indicantia	
Scrotum, quod & scortum qui-		1.8	
dam dicere malunt	7.18	Stomacho laborantibus quæ a-	
Secundæ quæ sint	7.29	genda sint	cod.
Secunda mensa	1.2	Stomachi infirmitas quibus signis	
Seminis profusio, & eius curatio		cognoscatur	ibidem
4.21		Stomachus nonnunquam pro gu-	
Senectus, quibus morbis magis		la accipitur	4.1
obnoxia sit	2.1	Stomachi duplex significatio	ibid.
Septum transuersum	lib.1. in	Stomachi curatio	4.5
procc. & lib.4.c.1.		Stomachi percussi sig.	5.26
Septi trãuersi percussi signa	5.26	Stomachus studiosorum qualis	
Septicum	7.21	plerumque sit	1.2
Serapion	1. in procc.	Stomoma	6.6
Siccitas quid mali inferat corpo-		Stranguria	2.1
ribus	2.1	Struma	5.28
Signa in ægrotantibus bona quæ		Strophos	2.6
sint	2.2	Sudanti ex labore & itinere frigi-	
Signa in ægrotantibus mala quæ		da potio periculosissima est	
sint	2.3.	1.3	
Signa longæ valetudinis quæ sint		Suffusio oculorum	6.6
2.4		Sumpturis cibum post fatiga-	
Signa membrorum percussorum		tionem, quæ obseruanda	1.3
5.26		Suppurationes	3.27
Silanus	3.18	Supprimentia sanguinem	5.1
Siligo	2.7	Suturæ in capite quot sint	8.1
Singultus frequens quid indicet		Sycosis	6.3
2.5		Synanche.	4.4
Singultus sternutamento finitur		T.	
2.7		T. Abes	2.1. & 4.7
Sofagoras	5.8	Tabes, eiusque species	3.12
Spasmos	2.1	Tali	8.1
		DDd 2	Talus



# I N D E X.

Talus luxatus, quomodo restitui debeat	8.22	Varices quomodo curandi sint	7.17
Telum latum, quomodo educen- dum	7.5	Varicum curatio	7.31
Telis extrahendis remediū	cod.	Vectus toto die quid facere de- beat	1.3
Tempora anni consideranda	1.3	Ventrem solum quid comprimi- mat	cod.
Tempestates quæ optimæ, quæ- que pessimæ	2.1	Ventrem compressum quid soluat eodem	codem
Terebra	8.3	Ventriculus ex quibus constet, & eius situs	4.1
Teranus	2.1. & 4.3	Ventriculi vulnerati signa	5.26
Tetherapeumena	5.19	Venarum ora subito suppressa, alioqui sanguinē fundere con- sueti, quid indicent	2.5
Tetrapharmacum emplastrum	5.19. & 6.18	Venere abstinendum quando sit, & quando non	1.3
Testiculorum natura, & eorum morbi	7.18	Venti quinam salubres, & qui non sint	1.1
de Testiculorum morbis	6.18	Venenis omnibus contrarium quid	5.26
Testiculorum incisio	7.19	aduersus Venenosorum anima- lium ictus	cod.
Thartias medicus	3.20	Ver saluberrimum	2.1
Themison	1. in proœ.	Vere quæ ad victum magis con- ueniant	1.3
Theodoti collyrium	6.6	Vere qui morbi fiant	2.1
Therionia	5.28	Vertebrae	8.1
Theosenus	5.18	Vesica, & eius situs	4.1
Thymium	5.28	Vesica vulnerata signa	5.26
Tibiae	8.1	Vivere elatum Asclepiades funeri obuius intellexit	2.5
Timæi compositio	5.22	Viuorum corpora incidere, crude- le & superuacuum esse 1. proœ.	
Titio extinctus	3.12	Vmbilici prominētis curatio	6.17
Tonsillarum vitium	6.10	Vmbilici vitia quomodo curari debeant	7.18
Tonsillis laborantibus quid con- ueniat	1.5	Vngues	8.1
Tormina quando periculosa non sint	2.7	Vnctio	1.3
Tormina quibus bona sint	cod.	Vomitum quando, & quibus utilis aut inutilis	cod.
Tormina id est dysenteria	4.15	Vomitum si post cibum fieri de- beat,	
Tristitia longa quid indicet	2.3		
Tussis	4.4		
Tympanites	3.21		
V.			
V Aletudinis instantis quæ signa	lib. 1. proœ.		
Valentissimum quid	2.17		
Vari	6.5		



INDEX.

465

beat, quomodo prouocandus		Vulnerum signa	cod.
eodem		Vulnerum differentia ex ipso	cod.
Vrina sana quæ	1.2	morsu	cod.
Vrina reddendæ difficultati quomodo succurratur	lib.7.	Vulnus glutinantia	5.2
cap.26.& lib.1. cap.25.		Vulnera aperientia.	5.4
Vrina parum liquida, in sano homine quid significet.	2.5	Vulfella	7.30
Vrina quæ mala	2.3	Vulua & eius situs	4.1
Vreteres	4.1	Vulua percussæ signa	3.26
Vt synanche	4.4	Vulua natura mirabilis.	7.21
Vua morbus intra fauces	6.14.& 7.12.		
Vulnera quomodo glutinanda.	5.26	Z.	
		Zenon	lib.5.in proce.
		Zopyrus	lib.5.cap.25

FINIS.

DDd 3

ERRA-



## E R R A T A.

Pagina 14. Columna 1. Linea 20.	quidem lege quidam.
Pag. 16. colum. 1. linea 27.	sine lege si ne.
Pag. 18. colum. 2. lin. 24.	( quantum enim spiritus cibo statim recream-
ti, r, proportio statim ostendit corporis) est	parenthesis.
Pag. 23. colum. 1. lin. 34.	vilescunt, lege vilescunt.
Pag. 31. colum. 1. lin. 12.	emariat lege amariat.
Pag. 36. colum. 2. lin. 32.	vocant lege vorant.
Pag. 37. col. 1. lin. 1.	lege enim ex iis sunt qui medicamentis.
Pag. 38. col. 1. lin. 33.	non tamen si lege nam.
eadem col. 2. lin. 21.	fusio lege fusior.
Pag. 40. col. 1. lin. 5.	Itaque lege ita.
Pag. 61. col. 1. lin. 13.	huic lege hinc.
Pag. 63. col. 1. lin. 43.	siquidem eos lege siquidem si eos.
Pag. 72. col. 2. lin. 6.	sed ita vitio lege sed id vitio.
Pag. 73. col. 1. lin. 31.	sanguinum lege sanguinis.
Pag. 74. colum. 2. lin. 9.	pituitosam lege pituitosarum.
Pag. 88. col. 2. lin. 15.	non solum illa lege non solum in illa.
Pag. 92. col. 2. lin. 26.	expunge ut.
Pag. 93. col. 2. lin. 8.	quam lege quum.
Pag. 121. col. 2. lin. 11.	soluturam lege solvere
Pag. 132. colum. 2. lin. 21.	abscessum lege abscessuum.
Pag. 146. col. 1. lin. 28.	frigidorum in siccos lege in calidos & siccos.
Pag. 180. col. 2. lin. 20.	lege eliciant, ac euacuent.
Pag. 184. col. 2. lin. 7.	D. 3. lege D. 1. aut D. 1. s. pro, &c.
Pag. 197. col. 2. lin. 43.	principio vitium, deest frictione.
Pag. 200. colum. 2. lin. 12.	stratatoria, lege stratoria.
Pag. 215. col. 2. lin. penultima.	quo lege quum
Pag. 217. col. 2. lin. 15.	habeat, lege habet
Pag. 243. col. 2. lin. 10.	dele fuerint.
Pag. 254. col. 1. lin. 26.	adiuermus lege adiuuermus.
Pag. 256. colum. 1. lin. 42.	ipsas oleo lege ipsas cum oleo.
Pag. 313. col. 2. lin. 2.	cubitus lege decubitus.
Pag. 315. col. 2. lin. 20.	vacuatus lege vacuatis.
Pag. 320. col. 1. lin. 5.	fit ut, lege fit qua leniter.
Pag. 321. col. 2. lin. 3.	etiam magnis lege etiam a magnis.
Pag. 361. col. 2. lin. 20.	deest tota hæc periodus:

### Protinus.

Vtriusq. cubiti secunda vena est sine dila- tione; renouiscit enim, ut docet Aëtius, inde aliquo modo insitit calor, ut sensibilibus cor- pus ipsum alleuetur: habendus tamen modus est in euacuando: in multo enim inutili, &	vitiatum sanguine, parum quiddam gennium sanguinis inest. Mittendus est sanguis si morbi ferat occasio, verno potissimum tem- pore; siquidem lues hæc sub hoc tempore & nascitur & intenditur.
Pag. 370. colum. 1. lin. 33.	scilicet lege scilicet.
Pag. 386. col. 1. lin. 24.	tum lege tam.
Pag. 408. col. 1. lin. 29.	minatur lege minantur.

Pag.



Pag. 419. col. 2. lin. 13.  
eadem eadem lin. 31.

Pag. 442. colum. 2. lin. 23.

Pag. 489. post §.  
ratio:

Sanguis enim quo nutritur lien, crassior, faculentiorque est, unde & magis nigri-  
cans redditur.

Pag. 511. col. 2. lin. 23.

exercere lege exerere.

quem quidam lege quod quidam.

glossos, lege grossos.

Signa vulnerati lienis deest hæc enar-

deest tota hæc periodus:

### Miserrimum.

Ut quod plurimos iugulet, nullos etenim verum nec iidem à cane rabioso morfo  
qui mortem euassent, se vidisse meminis erant, sed ab homine.

Paulus ex Ægina Medicus, præter duos:

Pag. 539. col. 2. lin. 2.

Pag. 543. col. 2. lin. vltima

Pag. 547. col. 2. lin. 8.

Pag. 693. col. 1. lin. 22.

Pag. 724. col. 2. lin. 31.

atque ad lege atque id ad.

psydriachiam, lege psydriachion.

ordiri lege oriri.

capite, lege capiti.

fundamento lege fundamenti.




168

168  
Pag. 111. col. 1. lin. 1.  
Pag. 111. col. 1. lin. 2.  
Pag. 111. col. 1. lin. 3.  
Pag. 111. col. 1. lin. 4.  
Pag. 111. col. 1. lin. 5.  
Pag. 111. col. 1. lin. 6.  
Pag. 111. col. 1. lin. 7.  
Pag. 111. col. 1. lin. 8.  
Pag. 111. col. 1. lin. 9.  
Pag. 111. col. 1. lin. 10.  
Pag. 111. col. 1. lin. 11.  
Pag. 111. col. 1. lin. 12.  
Pag. 111. col. 1. lin. 13.  
Pag. 111. col. 1. lin. 14.  
Pag. 111. col. 1. lin. 15.  
Pag. 111. col. 1. lin. 16.  
Pag. 111. col. 1. lin. 17.  
Pag. 111. col. 1. lin. 18.  
Pag. 111. col. 1. lin. 19.  
Pag. 111. col. 1. lin. 20.  
Pag. 111. col. 1. lin. 21.  
Pag. 111. col. 1. lin. 22.  
Pag. 111. col. 1. lin. 23.  
Pag. 111. col. 1. lin. 24.  
Pag. 111. col. 1. lin. 25.  
Pag. 111. col. 1. lin. 26.  
Pag. 111. col. 1. lin. 27.  
Pag. 111. col. 1. lin. 28.  
Pag. 111. col. 1. lin. 29.  
Pag. 111. col. 1. lin. 30.  
Pag. 111. col. 1. lin. 31.  
Pag. 111. col. 1. lin. 32.  
Pag. 111. col. 1. lin. 33.  
Pag. 111. col. 1. lin. 34.  
Pag. 111. col. 1. lin. 35.  
Pag. 111. col. 1. lin. 36.  
Pag. 111. col. 1. lin. 37.  
Pag. 111. col. 1. lin. 38.  
Pag. 111. col. 1. lin. 39.  
Pag. 111. col. 1. lin. 40.  
Pag. 111. col. 1. lin. 41.  
Pag. 111. col. 1. lin. 42.  
Pag. 111. col. 1. lin. 43.  
Pag. 111. col. 1. lin. 44.  
Pag. 111. col. 1. lin. 45.  
Pag. 111. col. 1. lin. 46.  
Pag. 111. col. 1. lin. 47.  
Pag. 111. col. 1. lin. 48.  
Pag. 111. col. 1. lin. 49.  
Pag. 111. col. 1. lin. 50.  
Pag. 111. col. 1. lin. 51.  
Pag. 111. col. 1. lin. 52.  
Pag. 111. col. 1. lin. 53.  
Pag. 111. col. 1. lin. 54.  
Pag. 111. col. 1. lin. 55.  
Pag. 111. col. 1. lin. 56.  
Pag. 111. col. 1. lin. 57.  
Pag. 111. col. 1. lin. 58.  
Pag. 111. col. 1. lin. 59.  
Pag. 111. col. 1. lin. 60.  
Pag. 111. col. 1. lin. 61.  
Pag. 111. col. 1. lin. 62.  
Pag. 111. col. 1. lin. 63.  
Pag. 111. col. 1. lin. 64.  
Pag. 111. col. 1. lin. 65.  
Pag. 111. col. 1. lin. 66.  
Pag. 111. col. 1. lin. 67.  
Pag. 111. col. 1. lin. 68.  
Pag. 111. col. 1. lin. 69.  
Pag. 111. col. 1. lin. 70.  
Pag. 111. col. 1. lin. 71.  
Pag. 111. col. 1. lin. 72.  
Pag. 111. col. 1. lin. 73.  
Pag. 111. col. 1. lin. 74.  
Pag. 111. col. 1. lin. 75.  
Pag. 111. col. 1. lin. 76.  
Pag. 111. col. 1. lin. 77.  
Pag. 111. col. 1. lin. 78.  
Pag. 111. col. 1. lin. 79.  
Pag. 111. col. 1. lin. 80.  
Pag. 111. col. 1. lin. 81.  
Pag. 111. col. 1. lin. 82.  
Pag. 111. col. 1. lin. 83.  
Pag. 111. col. 1. lin. 84.  
Pag. 111. col. 1. lin. 85.  
Pag. 111. col. 1. lin. 86.  
Pag. 111. col. 1. lin. 87.  
Pag. 111. col. 1. lin. 88.  
Pag. 111. col. 1. lin. 89.  
Pag. 111. col. 1. lin. 90.  
Pag. 111. col. 1. lin. 91.  
Pag. 111. col. 1. lin. 92.  
Pag. 111. col. 1. lin. 93.  
Pag. 111. col. 1. lin. 94.  
Pag. 111. col. 1. lin. 95.  
Pag. 111. col. 1. lin. 96.  
Pag. 111. col. 1. lin. 97.  
Pag. 111. col. 1. lin. 98.  
Pag. 111. col. 1. lin. 99.  
Pag. 111. col. 1. lin. 100.

Z

16498







1.6.498




Solu calidi 26. dilute portiones 25. conclusus altus 20.  
Et Palmarum aspectu eni arbitramur in quibus sunt quae faciendi existunt.

1.6.498



































005663628

11